PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

C101/1815
V.4

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

保嬰易知錄下

保赤彙編九

陽湖吳甯瀾溶堂

胎疾類

初生不啼

或氣閉不通或難產勞傷胎氣或天時寒冷所致謂之夢生

心鑑云切不可斷臍以綿衣包兒離胞寸許用苧麻紮緊臍帶將紙條蘸麻油點火於臍帶上緩緩薰燒俟煖氣入臍氣回能啼方可斷也

又云將陳蘄艾灸臍帶上煖氣透腹即生

尊生書云用煖臍法氣已入腹取壹貓用青布裹

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

頭目令一伶俐婦人拏住貓頭向兒耳邊以口咬破貓耳貓大叫一聲兒卽醒矣

外臺秘要云由於難產少氣也取臍帶向身却捋之令氣入腹仍以本生父母眞氣度之

事急方有因口噤不能出聲者急看兒口內上腭齒齦舌上下如法刺之刮之令淨詳見上卷挑口法

三因方云以葱白細鞭背上卽啼此法似不如葱湯洗其腹就以熟葱熨其背也

大生要旨云有因肛門爲脂膜所塞閉住兒氣故不能出聲者以金銀玉簪脚輕輕透破脂膜卽能出聲以油紙撚套住免其再合參看肛門內各條

初生無皮

胎中熱毒也其症有三審因而治之

清涼膏治父母霉毒遺害兒上半身或下半身赤爛甚至皆黑者或非因霉毒由胎中蘊熱所致者敷之皆效石灰肆兩未經水濕成塊者用水泡之沒指半許露一宿面有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多寡對小磨香油亦如之順攪成膏爲度用鵞翎搽之

鵞黃散生黃柏熟石膏各等分研細末加珍珠粉尤效濕則乾摻乾則用猪膽汁調敷

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

米粉撲法。治月分不足。遍身浸漬紅嫩而光。亦有面白肢冷。不煩赤者。早稻白米。研細粉。時時撲之。

生肌散。人參、黃芪、珍珠粉、各等分。時時撲之。

伏龍肝散。以伏龍肝研細末。雞子白調搽之。

本草方。治母處高樓。不沾地氣所致者。車輾上土。研細撲之。或用淨黃土。和黃柏敷之。或掘土坑。臥宿卽生皮。

醫通方。夏月臥兒水芭蕉葉上。

不乳

兒初生卽不吮乳。細看兒口中。照挑口法治之。再議與藥。

愼齋方。治牙關不開。不吮乳者。其噤在齒根也。內星炙研片腦少許。二味和勻。指染薑汁栢葉汁。和藥擦牙根卽開。如不效。用秘方吹鼻法。

聖惠方。治能吮乳而不能咽者。其噤在咽中也。水銀米粒大。與之咽下卽愈。按此方不可輕用

又方。葛蔓燒灰壹字。和乳點之。卽瘥。

卽得方。治兒腹中胎糞未下。腹滿氣促。嘔吐不乳。汞粉伍分。研細。蜜少許。溫水調化。徐徐與之。按此方不可輕用

青蒿丸。見大治方內

Last Asian Library DO NOT COPY and the Gest Collection Princeton University Library

良方。小兒熱毒內閉。數日不乳。用活蚌剖開取水。叁肆茶匙服之。取蚌水法見重腭

陳文中方。治兒母過食寒涼。胎受其氣。令兒吐乳多啼。面色青白。丁香拾枚。陳皮去白壹錢。乳汁壹盞。石器煎一二十沸。細細與服。

目不開

胎中熱毒。蘊于兒脾。眼胞屬脾。其脈絡緊束。故不能開也。

心鑑方。熊膽、黃連、各少許。滾湯淬洗。一日七八次。如無熊膽將黑羊膽青魚膽代

又方。川芎、薄荷、樸硝、各壹錢。爲細末。以少許吹鼻中。

幼幼新書。甘草壹截。以猪膽汁炙透。研爲末。每用米泔水調少許灌之。

生地黃湯。乾地黃、赤芍、當歸、瓜蔞根、各壹錢。川芎、甘草、各伍分。燈心叁拾寸。煎湯與兒服之。

又方。治目不開。或出血。蒼朮貳錢。入猪膽汁中紮煮。將藥氣熏眼。後更嚼汁與服。

丹溪方。以燈心、黃連、秦皮、木賊、紅棗、各伍錢。水壹盞。煎澄清。頻洗而開。

吐不止

初生吐不止。古法指謂穢惡下咽。用鎮墜之品。恐非

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

臟腑柔嫩者所宜。受病之源非一。當審其因以治之。

大全方。治咽穢。腹滿而痛者。莪朮少許。鹽壹菉豆大。以人乳壹合。煎三五沸。去滓。入牛黃兩粟大。服之甚效。

醫藥入門。黃連、枳殼、赤茯苓、等分爲末。乳汁調灌之。又方。木瓜、生薑、煎湯灌之。

湯氏方。治觸冒風邪。鼻塞多啼者。全葱白叁枚。紫蘇莖壹錢。生薑壹大片。人乳兩合。煎沸去滓飲之。

黃連二陳湯。治胎前受熱。面黃赤。手足溫。口吐黃涎酸黏者。製半夏、陳皮、茯苓、各等分。甘草、黃連、各叁分。加生薑。水煎服。

聖惠方。田中地龍糞、壹兩。研末。空心以米湯下之。三服效。加木香叁錢。大黃伍錢。尤效。按木香酌減大黃尤宜愼

陳文中方。治胎前受寒。面清白。四肢冷。口吐清稀白沫者。方見不乳

得效方。治乳積吐。用大麥芽伍錢。生薑壹片。人乳煎沸飲之。

燒針丸。治吐乳痰壅者。用黃丹研末。小棗和丸如芡實大。鍼簽于燈上燒過。研細末。乳汁調服。一方加硃砂、枯礬、等分。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不小便

胎受熱毒之氣流於下也內服外敷小便自通若生而臍腹腫脹臍四旁有青黑色及撮口者不治

豆豉膏豆豉壹勺田螺拾玖箇蔥壹大束同搗爛用水芭蕉汁調敷臍上或將陳大麥芒壹掬煎湯飲（按麥芒須濾淨）

蒜螺敷法兼治水腫臌脹大田螺肆箇大蒜伍箇車前子貳叁錢麝香少許前三味同研後入麝香再研為餅每用壹箇貼臍中將膏藥護之半日許服白馬通壹大盃立通（按馬尿曰通）

又方白鳳仙連根帶葉熬水乘熱浸洗外腎兩胯立通

單方蔥連鬚壹大束搗爛加麝香少許分作貳包更換熨臍下

加味導赤散細生地黃叁錢細木通壹錢生甘草叁分黃連叁分飛滑石貳錢赤茯苓貳錢淡竹葉念張燈心伍拾寸水煎服之（按分兩宜酌減）

愼齋全書兼治不乳葱白切肆片乳汁半盃瓦器內同煎沸分肆服飲之

又方地龍數條去泥和蜜研敷陰莖上內用蠶退紙燒灰入硃砂、龍腦、麝香、各壹分共研細末用麥冬燈心湯食前調服（按分兩宜酌減）

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

全幼心鑑車前子搗汁入蜜少許灌之厚水車缺內鮮車前子尤效

又方雄黃牛尿滴毛數拾根煎湯壹盃飲之

藥性論安鹽少許於臍中以艾灸之

雷公方見臍突

不大便

兒生三四日不大便者名曰鎖肚乃胎中受辛熱之毒氣滯不通也其兒必面赤腹脹不乳多啼急用口咂法再議與藥

口咂法令婦人以溫水漱口咂兒前後心手足心並臍共七處每處咂三次以得見紅色爲度

熨臍法用連根葱壹莖生薑壹塊淡豆豉貳拾粒鹽壹小匙同研爛揑作餅了貼臍中烘熱熨之用絹紮定良久氣透自通

田氏方先以硬葱紝入肛門內如不下用硃砂水飛南星炮巴豆霜各等分共爲糊丸黍米大薄荷煎湯灌下叁丸

心鑑方枳殼煨去穰叁錢甘草稍壹錢以水煎服

必效方治大小便不通腹脹欲死急用白頭蚯蚓搗爛敷腹上空臍孔不敷半時許取白馬尿和水絞取汁灌之立通

青蒿丸見大治方內

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

備驗方見臍風

大小便不通

胎中熱毒之甚也急用前口唾五心臍下法若延至七日不治

外臺秘要猪苓壹兩以水少許煮雞屎白壹錢調服亦治小便不通

經驗方眞麻油壹兩皮硝少許同煎滚冷定徐徐灌之

又方輕粉叁分蜜少許温水化開時與少許亦治大便不通

立效方大黃酒浸郁李仁去皮研各壹錢滑石末壹兩搗和丸黍米大日服伍丸開水下亦治大便不通

青蒿丸

紫霜丸俱見大治方內

以上三症諸方參看擇用

肛門內合

其症有二或因熱毒太盛壅結肛門穀道有孔者急服黑白散外以手輕輕拍之或爲脂膜遮瞞無隙可通者先以鉛刀或金玉簪刺破脂膜急以油紙燃插入隔之不令再合或納蘇合丸導之

黑白散

蘇合丸俱見大治方內

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

預防口噤撮口臍風三症及治之宜急論

小兒初生三急症。曰口噤。曰撮口。曰臍風。皆惡候也。症雖有三。病源則一。此症發於一臘之內者。方書雖有治療之法。究竟百無一生。其致病之由。總在於臍。臍者在兩腎之間。與命門相通。乃人之根蒂也。衝任胃脈。皆起於臍下。任脈自中而上。至于人中。與腎脈合。衝脈二道。夾任脈而上。散於舌下。與脾脈合。胃脈二道。又夾任脈而上。入於齦中。上下往來。如環無端。小兒初生。三脈方具。而臍爲三脈之門戶。干係尤重。所以斷臍之時。不可不愼。或翦臍帶太短。或結縛不固。致外風侵於臍中。或用鐵器斷臍。爲冷氣所侵。或浴時牽動。水濕灌入生瘡。客氣乘虛而入。內傷於腎。腎傳肝。肝傳心。心傳脾。脾傳肺。肺蘊蓄其毒。發爲臍風等症。面赤啼哭者。心病也。手足微搐者。肝病也。唇青口撮。痰涎壅塞者。脾病也。牙關緊閉者。腎病也。啼聲不出者。肺病也。五症之中。畧見一二症者。病猶可治。悉見萬無活理。若能預防於未發之時。急治於將發之際。尚可挽回萬一。凡小兒墮地。視其臍帶軟者無病。如臍帶硬直者。卽有臍風也。或浴後綳裹停當。卽噴嚏連連者。或臍下發出青筋。或赤筋一道上行者。或大便熱者。一有見端。卽爲將發之候。急抱兒向明處。視其口中。或上腭有泡。或齒根有白點。或有黃

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

筋。或舌上白屑堆聚。或舌下膜如榴子。急遵挑口法。詳見上卷刺之刮之拭之塗之。再視兒臍下逆上之筋。必生兩岔。於岔行盡頭處。安艾灸叁壯。以截上攻之路。更灸中腕叁壯。中腕穴在臍上三寸寸以兒左手中指屈曲節盡處爲度再灸然谷穴叁壯。穴在內踝前起大骨下陷中鍼入叁分。不宜見血。或再於承漿穴。在下唇稜下腕之中頰車穴。在耳下頰骨後各灸叁壯。以洩其毒發之標。此皆古人預防急治之良法也。若不知早爲之計。病變已重而藥之。鮮克有濟矣。爲兒父母者。可不愼之於始哉。

噤口

其候舌上生瘡。如黍米狀。啼聲漸小。口吐白沫。牙關緊急。吮乳不得。由胎熱內蘊風寒外襲故也。見于七日及一月之內。曰噤口。見於百晬之內。百二十日之後者。曰噤風。風噤。其實一也。

秘方擦牙散。生南星貳錢。去皮臍。龍腦少許。研爲極細末。用指蘸合生薑汁。放於牙根上擦之。如不開者。將藥調如稀糊。含在不病人口中。用通心筆管。插入小兒鼻孔。用氣將藥極力吹入。其關立時卽開。此法有通仙之妙。不可不知。

本草綱目方。天南星壹枚。煨熟。紙裹斜包。翦一孔透氣於口中。牙關自開。

搐鼻法。鬱金、藜蘆、瓜蒂、各等分爲末。搐鼻中。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

聖惠方直殭蠶貳條去絲嘴畧炒爲末蜜調敷唇中

辰砂全蠍散辰砂伍分飛全蠍貳枚去毒龍腦麝香硼砂各壹分爲細末唾調搽唇裏及齒上

聖濟總錄取白牛糞塗口中

外臺秘要取東行牛口中涎沫塗口中及頤上

聖惠方牛口中蘸草絞汁灌之

又方大蜘蛛壹枚去足炙焦研末入猪乳壹合和勻分作三服徐徐灌之

聖濟總錄牛黃壹字許爲末淡竹瀝調灌之更以猪乳滴之尤妙

千金方雞屎白如棗大綿裹以水壹合煮分二服

一方酒研灌之

又方雀屎水丸麻子大飲下貳丸

又方以猪乳飲之

撮口

口撮如囊也不乳啼低舌强唇青面黃赤色氣高痰盛乃心脾之熱受自胎中也若兼二便秘結手足抽搐厥冷者不治

五通膏生地黃老生薑慈白菜菔子活田螺肉各等分共搗爛敷臍四圍一指厚抱住久之屁洩而愈兼治臍風噤口

聖惠方。小兒撮口。看舌上有瘡如粟米大。以指甲刮破。取蝦蟆搗汁敷之。如無生者。乾者亦可用。仍以厚衣包裹。納母懷中。取大汗出而愈。兼治臍風

辰砂殭蠶散。辰砂水飛伍分。殭蠶壹錢。去絲嘴炒。蛇脫皮壹錢炒。麝香伍分。共爲末。蜜調敷口中。備驗方。蟬蛻貳拾枚。去頭足。全蠍柒枚。去毒。爲細末。入輕粉少許。和研乳汁調服。兼治噤口

聖惠方。取蠹魚研末。每以少許塗乳。令兒吮之。

又方。兼治臍風撮口。取鼠負蟲搗汁灌之。按綱目曰濕生蟲俗名地雞地虱者像形也

本草綱目。治撮口。用蝸牛伍枚。即負殼蜒蚰也去殼研。汁塗口中。兼治臍風

慎齋全書。治撮口。用全蠍念壹箇。酒塗炙爲末。加入麝少許。金銀花湯調服半匙。兼治臍風

子母秘錄。用夜合花枝煎濃汁。拭口中并洗之。

普濟方。以初生豆芽研爛絞汁。和乳灌少許。

永類鈐方。生川烏尖叁枚。全足蜈蚣半條。酒浸炙。入麝香少許。共爲末。以少許吹鼻取嚏。仍以薄荷湯灌壹字。兼治臍風

金匱玉函。用生甘草貳錢伍分。水壹盞。煎陸分。溫服。令吐痰涎。後以乳汁點兒口中

簡便方。艾葉燒灰。塡臍中。以帛縛定。隔蒜灸之。候

NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

口中有艾氣可愈。兼治臍風撮口

錢氏方。治撮口出白沫。以艾灸口之上下肆壯。鯽魚燒研。酒調少許灌之。仍掐兒手足。

又方。先灸兒兩乳中叁壯。後以黑驢乳壹合。以東引槐枝拾根。叁寸長。火煨一頭。出水拭淨。浸乳中。取乳滴兒口中。

醫通方。急於顖門灸柒壯。灸之不哭。弔睛吐沫者不治。

臍風

臍者。小兒之命蒂也。穴近三陰。喜溫惡涼。喜乾惡濕。如斷臍不知愼重。爲水濕風冷之氣所傷。致兒七日之內。腹脹臍突。啼不吮乳。四肢柔直。痰壅氣塞。或面青吐沫。若兼口噤撮口。抽搐不止者。神丹莫療也。

頭治方。小兒臍風噤口撮口等症。其毒先現口中。用刮口法畢。以黃連半錢。豆豉貳拾肆粒。甘草叁寸。葱白頭叁寸。用童子小便煎。綿蘸拭口中。

驅風散。治兒腹脹臍腫。啼不吮乳。此臍風將發之候也。急以此方治之。用蘇葉、防風、陳皮、薑炒厚樸、麩炒枳殼、煨木香、殭蠶去絲嘴酒炒、鈎藤鈎、甘草各等分。加生薑水煎服。

稀涎散。治臍風已成。用此方以吐風痰。蠍尾。銅青。各半錢。硃砂壹錢。膩粉壹字。麝香少許。共爲末。

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

每服壹字茶清調下。

盪臍法。麝香伍分。置臍上。浮萍草不拘多少。用熱水蘸半熟。蓋麝香上。又用鹽半觔炒熱。分兩袋。盪於臍上。冷更換壹袋。如此一頓飯久即愈。

尊生書。蜈蚣壹條。蠍稍肆尾。殭蠶柒箇。瞿麥伍分。研細末。吹入鼻內。候噴嚏啼哭爲可醫。隨用薄荷湯調末服。

聖惠方。用天漿子壹枚。按此蟲多生石榴樹上其背毛螫人俗呼刺毛。殭蠶壹枚炒。膩粉少許。研勻。以薄荷自然汁灌之。取下毒物。名曰白龍膏。

辰砂膏。辰砂叁錢。牙硝、硼砂、各壹錢伍分。全蠍壹錢。珍珠壹錢。麝香叁分。元明粉壹錢伍分。共爲細末。蜜研膏。塗乳頭上。令兒吮之。兼治噤口撮口驚搐。

備驗方。巴豆壹粒。不去油研爛。透明雄黃壹錢。研末和勻。每用叁釐。新汲井水調服。下喉覺胸腹中有響聲。大便下痰即愈。兼治鎖肚。

鄧華峰雜興方。用壁虎後半截焙爲末。男用女乳。女用男乳。調勻。入稀雞屎少許。摻舌根及牙關。仍以手蘸摩兒胸腹。取汗出甚妙。

青蒿蟲丸

紫霜丸 俱見大治方內

以上治臍風噤口撮口各方。通治三症者

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

居多互參採用可也三症必先用挑口法已然後藥之

臍濕

或因包裹不愼或因浴水入臍或因尿濕侵臍以致臍腫浸漬不乾曰臍濕不治恐成臍瘡臍風

摻臍散枯礬龍骨煅各貳錢麝香少許共爲末乾摻臍中

又方紅綿灰黃牛糞灰乾胭脂龍骨髮灰各伍分共爲細末濕乾摻乾清油調敷

又方當歸頭絳帛或舊錦燒灰胡粉各壹錢共爲細末入麝香少許同研乾摻臍中

蘖墨散黃栢釜下墨亂髮灰各等分共爲細末每用少許敷之

胡粉散胡粉乾薑燒灰白石脂燒存性各等分共爲細末時時敷臍中

顱顖經燒絳錫敷之

聖惠方枯礬敷之

又方屋爛草爲末摻之

活嬰方以甑帶燒灰敷之

姚和仲方用桂心炙熱熨之

千金方用猪頰骨髓拾貳條杏仁半兩研敷

聖濟總錄螻蛄甘草等分炙研爲末敷之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

子母秘錄。蜂房燒末敷之。
活嬰方。取蟾蜍蟲研末敷之。
外臺秘要。龍骨煅研末敷之。
備驗方。棉繭亂髮燒灰擦之。

臍瘡

臍濕成瘡。甚則赤腫濃血。曰臍瘡。宜速療之。庶不致寒濕內攻也。

心鑑方。本兒落下臍帶。錦帛裹燒研壹錢。入當歸頭末壹錢。麝香少許。敷臍中。治臍濕尤效。
聖惠方。臍瘡出濃血。海螵蛸、胭脂爲末。香油調敷之。

又方。伏龍肝末敷之。
準繩方。枯礬、龍骨煅、各半錢。研末敷之。
千金方。馬莧燒研敷之。
子母秘錄。臍瘡不合者。黃柏末敷之。
又方。臍爛成風。以杏仁去皮研敷之。
外臺秘要。蝦蟇燒灰。加牡蠣煅等分敷之。日三次。
又方。兒臍不合。取車轄油脂燒灰敷之。
活嬰方。用棉子燒灰敷之。
肘後方。乾蝦蟇燒灰、枯礬、各等分。共爲末敷之。
金黃散。川黃連、胡粉、龍骨煅、各壹錢。共爲細末敷之。

East Asian Library Princeton University
Do Not COPY
and the Gest Collection

異功散。龍骨煅、薄荷葉、蛇牀子各貳錢。輕粉伍分。共爲末摻臍中。

龍骨散。龍骨、輕粉、各半錢。黃連壹錢。共研細摻之。

愼齋方。人參末、黃牛糞灰、乾胭脂、各等分爲末。瘡濕乾摻。瘡乾香油調敷。

臍突

臍突一症。謂斷臍不如法。裹臍不致愼。而使之然者。非也。此由母驚悸鬱結。或恣食熱毒之物。兒受其氣。腹中蘊熱。無所發洩。頻頻伸引。呃呃作聲。弩氣衝臍。所以臍突。腫赤虛大可畏。此症忌敷寒藥。恐寒凝熱毒。反爲害也。若由啼哭太過。中氣弩出者。十居七八。不必治。漸自收。

二豆散。赤小豆、不去皮。豆豉、天南星去皮臍、白斂、各壹錢。共爲末。用伍分。水芭蕉汁調敷臍四旁。日二次。

葱貼法。先以荊芥湯洗之。再以葱葉火上微炙。放地下出火氣。以指甲刮薄。搭放突處。卽消。

聖惠方。胡椒、木鼈子仁、各等分爲末。和杵丸如菉豆大。每服貳叁拾丸。荊芥湯下。

雷公方。白茯苓、車前子、各壹錢。陳皮、通草、各貳錢。生甘草、梢、貳分。水煎服。兼治小便不通

臍血

兒初生多啼叫致臍出血者。
準繩方白石脂炒研細末乾摻之不可剝揭俟其
自落。

天釣

胎熱蘊於心脾加以外夾風邪內熱不得發越而成。
其症壯熱痰壅驚悸抽搐眼睛上翻淚出不流症似
驚風但目多仰視爲辨
直指方治目久不下眼見白睛角弓反張聲不出
者用大蜈蚣壹條竹刀批開記定左右去頭足
酥炙又以麝香壹錢研末包定每用左邊者吹
左鼻右邊者吹右鼻各少許不可過多若眼未
下再吹些須眼下乃止。
聖濟總錄烏頭生用去皮臍芸薹子各貳錢共爲
末每用壹錢新汲水調敷兒頂上。
衛生簡易方用金牛兒即蟬脫也以漿水煮一日曬乾
爲末每日用壹字冷水調下。
聖惠方用壁魚兒即蠹魚也乾者拾箇濕者伍箇用乳
汁和研灌之。
又方取家桑東行根研汁服。
又方全蠍叁箇硃砂如叁菉豆大和飯爲丸酒化
服。
牛黃散牛黃貳分硃砂叁分麝香半分天竺黃壹

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

錢蠍梢伍分鈎藤鈎壹錢其爲細末新汲水下
鈎藤飲鈎藤鈎叁錢全蠍伍分犀角伍分羚羊角
亦可天麻伍分生甘草貳分水煎服

內鈎

內鈎者肝臟有病外受寒冷所致其胸膈反張糞青
潮搐腰曲腹痛口吐痰沫多啼多汗咬乳目瞪有類
驚癇但目有紅絲血點爲異

乳香膏乳香伍分沉香壹錢爲細末將鮮石菖蒲
鈎藤鈎煎湯下

心鑑方用硃砂壹錢乳香煨蒜各壹錢爲末研丸
如黍米大薄荷湯下貳丸

木香丸木香乳香沒藥茴香各伍分炒鈎籐鈎貳
錢全蠍壹錢先將乳香沒藥研勻後入諸藥末
和畢取大蒜少許研細和丸桐子大曬乾每服
兩丸鈎藤湯下

盤腸氣痛

其症腰曲腹痛腸鳴失氣口閉足冷下利糞青乾啼
無淚額上有汗其致病之由或因寒邪團結於小腸
或因妊婦憂愁思鬱心氣蘊結總屬寒結氣滯也

洗肚法全葱壹大束煎湯洗其腹就以熱葱熨其

臍腹閉

熨臍方見不大便

直指方。用蘿蔔子炒黃研末。乳香湯服半錢。
又方用乳香、沒藥、等分爲末。以木香磨水煎沸。調服壹錢。
保幼大全。莪朮半兩、用阿魏壹錢化水。浸一日夜。焙研。每服壹字。紫蘇湯下。
川楝子散。木香、小茴香、鹽炒去鹽。各壹錢。川楝子貳錢。用巴豆貳粒、同炒去巴豆不用。共研末。酒調服。
白豆蔻散。白豆蔻、砂仁、青皮、陳皮、炙甘草、香附酒炒、蓬莪朮、各等分。蠍尾量加。薑壹片。水煎服。
此症有兼大便不通者。參用大小便不

諸方治法之。

胎驚搐

母娠時。調攝乖常。醉酒嗜慾。忿怒驚撲。母有所觸。胎必感之。或外夾風邪。有傷於胎。子受母氣。以致月內壯熱。翻眼握拳。噤口咬牙。身腰強直。嘔吐驚啼。腮縮頤開。或頰赤。或面青。等候。當以疎風利驚化痰調氣主之。百日內抽搐不止者。謂之眞搐。不治。其假者。因外傷風冷所致。口中氣出熱也。可發散而愈。

噫驚散。生半夏末壹錢、皂角末半錢、吹入鼻中。少許。即甦。一方加薄荷、細辛、等分。名通關散。吹之不醒者不治。

原書如此

貼顖法。麝香壹分。蠍尾伍分。蜈蚣伍分去足炙。牛黃叁分。青黛叁分。薄荷葉叁分。右除牛黃先搗蠍尾等五味。各取淨末。入牛黃研細。煮紅棗肉和成膏。塗貼顖上四邊。畧出一指。以手烘煖頻頻熨之。

斗門方。硃砂新汲水。塗五心最驗。

鄧華峰雜興。芭蕉汁、薄荷汁、煎勻塗頭頂。留顖門。塗四肢。留手足心勿塗。

經驗方。全蠍壹箇。以薄荷肆葉裹定。火上炙焦。同研爲末。入硃砂、麝香、少許。分作肆服。麥門冬煎湯調下。

太乙散。天漿子、去殼微炒。牛膽製南星、白附子、炮天麻、防風、茯苓、各貳錢。全蠍、硃砂、各壹錢。麝香少許。共爲末。每服半錢。乳汁化下。一方加人參壹錢。

蚯蚓膏。陳京墨貳錢。硃砂叁錢。麝香壹錢。共爲末。用蚯蚓頭上白漿和藥。成丸重柒釐。每服壹丸。用金銀器燒紅淬入乳內。將乳調藥服之。

聖惠方。五月內柳樹上蟬去翅足炙。叁分。赤芍藥叁分。黃芩貳分。水貳盞煎。壹盞溫服。三四次。

直指方。兼治胎癇。琥珀、防風、各壹錢。硃砂伍分爲末。猪乳調壹字。入口中。

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

鎮驚散。硃砂研細。入牛黃少許。猪乳調稀。抹兒口中。

備驗方。治胎搐。因外感風冷所成者。用葱頭柒枚。生薑壹片。擂細攤紙上。合置掌中。令熱。急貼顖門。以熱手熨之。鼻利搐止。

大青膏。治胎搐。因傷風得之。口中氣熱。呵欠煩悶。手足動搖者。天麻末壹分。生白附子末壹錢半。蠍尾去毒生末。烏梢蛇肉酒浸焙研各伍分。青黛壹錢。硃砂。天竺黃末。各叁分。蜜和成膏。月中兒服菉豆大。薄荷湯下。

紫霜丸。治傷食後發搐身溫。多涎多睡。不思乳食。見大治方

保命丹 見急驚

辰砂膏 見臍風

加味導赤散 見不小便

抱龍丸 見大治方

牛黃散 見天釣

青蒿丸 見大治方

胎癇

此症眼直目牽。口噤流涎。腹膨搐搦。背項反張。腰脊强勁。形如死狀。或一二時始醒。小兒之惡候也。受母氣之偏者不治。爲風邪所束者可醫。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

仁齋法。癇症方萌。耳後高骨閒。當有青紋。紛紛如線。見之則爲爪破。須令血出。啼叫。先得氣通。爲妙。

羌活膏。用羌活、獨活、各伍錢。天麻、全蠍、白殭蠶、各貳錢伍分。烏蛇肉伍錢。酒浸一宿。焙。麝香叁分。人參去蘆貳錢。隨宜用。其搗羅爲細末。煉蜜和膏。每服皂子大。荆芥湯化下。

天南星煎。天南星微炮、白附子、白花蛇酒浸、去皮骨炙黃、各壹兩。已上搗羅爲細末。用好酒兩大盞。慢火熬。不住手攪。以酒盡爲度。次用硃砂水飛伍錢。膩粉貳錢伍分。牛黃、麝香、龍腦、各半錢。研細入膏內。和如皂子大。每服壹粒。竹瀝化下。按準繩此方有乾蝎天麻各五錢

聖濟錄大石榴壹枚。去頂剜空。入全蠍伍枚。黃泥固濟。煅存性。取中焦者爲末。每服半錢。防風湯下。

直指方。琥珀、硃砂、各少許。全蠍壹枚。爲末。麥冬湯調下壹字。

聖惠方。棘枝上雀甕。研其閒蟲出。取汁灌之。

聖星丹見後癇症

胎寒

母受寒邪。或過食生冷。致兒口冷。腹痛多啼。腸鳴下

East Asian Library Princeton University
Do not COPY and the Gest Collection

利。寒慄時發。握拳曲足。因胎中受寒所致也。

白芍藥湯。白芍藥壹錢。澤瀉捌分。甘草肆分。薄桂叁分。薑水煎。虛加人參、木香。發驚加鉤藤鉤。

肘後方。治晝夜多啼。以當歸末壹小豆許。以乳汁灌之。日夜三四度。

和濟方。治胎寒腹痛。薑黃壹錢。沒藥、乳香、研去油、各貳錢。爲末。蜜丸芡子大。每服壹貳丸。鉤藤湯下。

聖惠方。治腹痛汗出。用衣中白魚貳拾枚。絹包於兒腹上。回轉摩之。以愈爲度。

胎熱

母多驚恐。或食熱毒之物。生後旬日之間。兒多虛痰。氣急喘滿。眼閉目赤。目胞浮腫。神困呵欠。吸吸作聲。遍身壯熱。小便赤。大便閉。時驚煩。總因胎中受熱所致也。

衛生要訣。以葱涎、入香油內。抹小兒五心頂背等處。善解毒涼肌。

又方。以秋梨拾箇。取汁。熬熱飲之。

聖惠方。瓜蔞根末。乳汁調服半錢。

全幼心鑑。黑豆貳錢。生甘草壹錢。燈心柒寸。淡竹葉叁片。水煎服。

錢乙方。眞牛黃壹豆大。入蜜調膏。乳汁化開。時時

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

滴兒口中。形色不實者。勿多服。亦治胎黃

育嬰家秘。黃連、炙甘草、各等分爲末。入硃砂少許。和勻。生蜜調成劑。每取豆許納兒口令咽下。

地黃膏。山梔仁、菉豆粉、各壹兩。伍錢。甘草陸錢。共爲末。聽用。以生地黃壹兩伍錢。杵爛。和蜜壹兩。伍錢。盛薄瓦器內。在銅銚中隔水煮成膏。與稀糊相似。候冷。入前藥末。同在擂鉢中。再研勻。丸如芡子大。每服壹丸。麥門冬湯化服。

青蒿丸 見大方內 治胎黃

小兒生下。遍身面目皆黃。狀如金色。壯熱。大便難通。小便如梔汁。乳食不思。啼哭不止。此胎黃之候。皆因母受濕熱而傳於胎也。

子母秘錄。韭根搗汁。日滴鼻中。取黃水爲效。

肘後方。杜赤豆。秫米。雞屎白。各貳分。搗篩爲末。分三服。黃汁當出。

普濟方。青瓜蔞。焙研。每服壹錢。水半盞。煎柒分。臥時服。五更瀉下黃物。立愈。

正元廣和方。秦艽貳錢。人乳半鍾。水壹盞。煎半盞。去滓。溫服。按秦艽宜酌減

錢乙方 見胎熱

蘇頌圖經。土瓜根生搗汁。叁合。與服。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

總微論。胡黃連、川黃連、各伍錢爲末。用黃瓜壹箇。去瓤留蓋入藥在內合定。麪裹煨熟。去麪搗丸菉豆大。量兒强弱與之。溫水下。

地黃湯生地黃、赤芍藥、天花粉、赤茯苓、川芎、當歸、猪苓、澤瀉、生甘草、茵陳、各等分。水煎。子母俱服之。

胎肥胎怯

兒生下。肌肉厚。遍身血紅色。彌月後漸漸羸瘦。目白睛粉紅色。五心煩熱。大便難。時時生涎。此胎肥症也。兒生下面無精光。肌肉薄。大便白。水時時哽氣多噦。目無神采。此胎怯也。古法兩症皆用浴體法。以疏通腠理。

浴體法。天麻貳錢。蠍尾去毒。硃砂各伍分。烏蛇肉酒浸焙乾爲末。白礬各叁錢。麝香壹字。青黛叁錢。共研勻。每用叁錢。水叁碗。桃枝壹握。并葉伍柒枝。同煎至十沸。溫熱浴之。勿浴背。

赤遊風

此症或受胎中熱毒。或生後過於溫煖。以致熱毒外發。皮膚赤熱而腫。色若塗丹。遊走不定。行於遍身。故曰赤遊風。發於頭面四肢。而內歸心腹者不治。

證治準繩十二件單方。水苔、生地黃、生菘菜、即白菜也、蒴藋、即烏頭苗也、慎火草、即景天也、浮萍、豆豉、大黃、梔子、

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

黃芩、硝石、豆葉、以上十二味。得一味和水搗貼之即瘥。

簡易備驗方。治十種丹瘤。

一治從頂頭起腫。先用葱白研取自然汁塗之。

二從頭上紅腫痛。用赤小豆末雞子清調抹。

三從面起赤腫。用竈心土雞子清調搽。

四從背起赤點。用桑白皮研末羊脂調搽。

五從兩臂黃色。用柳木燒灰水調敷。

六從兩脇虛腫。用生鐵屑和猪糞調敷。

七從臍上起黃腫。用檳榔爲末米醋調敷。

八從兩脚赤腫。用乳香末羊脂調敷。

九從兩脚有赤白點。用猪槽下土麻油調敷。

十從陰上起黃腫。用屋漏處土羊脂調敷。

千金方。取屋塵和臘猪油敷之。

又方。用唾和胡粉。從外至內敷之。

又方。取煅鐵屎研末猪脂和敷之。

又方。用大豆煮汁塗之。

又方。治丹毒。從兩股走及陰頭。用李根燒爲末。以田中流水和塗之。

又方。水煎棘根洗之。

又方。治丹毒從髀起流下。陰頭赤腫出血。用鯽魚肉伍合。赤小豆貳合。擣勻入水和敷之。

衛生簡易方。取向陽燕窩土爲末。雞子白和敷。

Eastern Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

陳氏本草。燒鐵淬水。飲壹合。

子母秘錄。用藍靛敷之。

楊氏產乳方。治丹毒從兩股兩脇起。用景天草搗如泥。入眞珠末。塗之。乾卽易。

全幼心鑑。菉豆伍錢。大黃貳錢。爲末。用薄荷汁入蜜調敷。

又方。丹瘤初發。急以截風散截之。白芷。寒水石。爲末。生葱汁調敷。

譚氏方。胡荽汁塗之。

廣利方。用馬莧搗塗。

簡要方。以生萊菔汁塗之。亦可灌服數匙。更以萊菔渣絹包。烘煖熨之。

又方。以水芭蕉根搗汁塗之。

刪繁方。以蠐螬蟲搗塗之。

奇方。用竈馬。卽俗呼樟木蟲。在竈內尋出活的去頭。以白漿擦上。不過數次。卽愈。

本草綱目。猪肉切片貼之。

修眞秘旨。用蔑麻子伍箇。去皮研。入麪壹匙。水調塗之。

外科精義。以木鼈子仁。研如泥。醋調敷之。一日三五次。

神功散。用黃栢、生草烏、各等分爲末。以嗽口水調

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

敷頻以嗽口水潤之

砭血法口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將筋頭劈開夾住以線縛定兩指輕撮筋梢令磁鋒對聚血處再用筋壹根頻擊刺出毒血砭後毒甚者以神功散敷之毒輕者砭後不可用恐皮膚既破草烏能作痛也如患在頭者不用砭法祇宜臥鍼倒挑患處出毒血則愈百日內者忌砭血以其肌肉難任也

夜啼

其症有二一曰脾寒一曰心熱如面色青白手腹俱冷不欲吮乳曲腰不伸者脾寒也面赤唇紅身腹俱熱小便不利煩躁多啼者心熱也分別治之

本草綱目燈花貳叁顆燈心湯調抹乳上令兒吮之

簡易方用燈草灰辰砂末少許塗乳令兒吮之

又方燈花柒枚硼砂壹字辰砂少許蜜調塗兒唇上

全幼心鑑蟬蛻拾玖箇去前截用後截爲末分四服鈎藤湯下或薄荷湯下之

塗乳方眞牛黃飛過辰砂極細末各半分塗兒舌上

聖惠方以乳香壹錢燈花柒枚爲末每服半字乳

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Gest Collection

汁下。

又方。以猪矢燒灰。淋汁浴兒。并以少許服之。

聖濟總錄。劉寄奴貳錢。地龍炒壹條。甘草壹寸。水煎服。

導赤散見弄舌

生生編。用青黛量兒大小研服之。

又方。用黑牽牛末壹錢。水調敷臍下。以上治心熱方

總驗方。竈心土貳兩研。雞子壹枚。和水調勻。塗兒五心及頂門。

普濟方。以伏龍肝貳錢。硃砂壹錢。麝香少許。蜜丸菉豆大。每服伍丸。桃符湯下。

又方。硫黃貳錢半。鉛丹貳兩。研勻。瓶固煅。遲埋地中七日。取出飯丸黍米大。每服貳丸。冷水下。按此方不可輕用

本草綱目。取梳頭垢少許服之。以上治脾寒方

楊氏方。用淡豆豉、竈中土、蚯蚓糞、入醋、杵搗和丸如雞卵大。摩兒頂心顱門及手足心并臍上下。各七次。擘開有毛棄之。

聖濟總錄。以馬蹄末。敷乳上飲之。

姚和仲方。取虎眼壹隻。爲散。以竹瀝調少許與喫。以上通治寒熱方

集簡方。取燒尸場上土。置枕邊。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

聖惠方。取明鏡挂牀脚下。毋令人知。
拾遺方。用井口邊草。私著席下。勿令母知。
生生編。用本兒初穿毛衫。放瓶內。自不哭也。
日華本草。取雞窠中草。安席下。勿令母知。
本草綱目。取猪頸下毛。絳囊盛。繫兒背上。
食療本草。取牛屎壹塊。安席下。勿令母知。
經驗方。摺父之褲。與兒作枕。
又方。雞屎塗兒臍中。男雄女雌。
又方。硃書田字於兒臍下。
又方。硃書甲寅二字貼牀頭。
又方。五倍子爲末。津唾調塡臍內。書小兒父名貼之。
又方。仙人杖取叁尺。安兒睡處。勿使人知。此杖卽笋欲成時立死者。
又法。用紙寫天蒼蒼地皇皇。我家有箇夜啼郎。來往君子念一遍。小兒睡到大天光。書此貼此總不要四眼見。須貼在大路旁。人易見之處。
又法。用柴頭壹箇。長肆伍寸。削平一面。硃砂寫云。撥火杖。撥火杖。差來捉神將。捉著夜啼鬼。打死不要放。急急如律令。以上壓勝法

鵞口

初生口內白屑滿舌。拭去復生。重則滿口白斑。時吐

白沫。咽閉疊疊腫起。難乳夜啼。心脾二經胎熱上攻所致。

洗法。急以毛青布裹指頭。蘸薄荷汁。或甘草、黃連、各壹錢。煎汁。或新汲水、拭淨白屑。如不脫。選方治之。

集效方。天南星醋調。敷腳心。乾則潤之。兼治重腭。

重齦。

又方。吳茱萸末。米醋調敷腳心。

聖惠方。以白芨末。乳汁調塗足心。

四寶丹。用雄黃叁錢。硼砂壹錢。甘草壹錢。氷片貳分。研末。摻之。或用蜜水調敷之。

青液散。青黛、樸硝、各壹錢。龍腦壹字。硼砂少許。共研細末。鵞翎挑少許。掃舌上。

大全方。用黃丹研細。竹瀝調塗口中。其白點卽落。一日塗三四次。再用辰砂益元散。滑石陸錢。甘草壹錢。辰砂少許。燈心湯調下。

又方。用鵞糞泡湯。拭洗口內。

子母秘錄。用桑白皮汁。和胡粉敷之。

活幼新書。用雞胵黃皮燒末。和水服之。

姚和仲方。以馬牙硝擦舌上。日五度。

普濟方。白枯礬壹錢。硃砂貳分。爲末。以少許敷之。日三次。

Do Not Copy East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

又方。用赤小豆末。米醋和塗之。

聖惠方。甑帶燒灰。敷舌下。兼治重舌

集簡方。以坯子胭脂。乳汁調塗之。男用女乳。女用男乳。

千金方。柘根伍觔。剉。水伍升。煮叁升。去渣。煎取伍合。頻塗之。無柘根。弓材亦可。兼治重舌

正傳方。白楊樹枝燒取瀝塗之

簡易備驗方。白殭蠶炒黃爲末。蜜和敷之。

永類鈐方。鵞口瘡自內生出者可治。自外生入者不可治。用食草白鵞下清糞。濾汁。入沙糖少許搽之。或用雄鵞糞。眠倒者燒灰。入麝香少許搽之。

懸癰

初生小兒上腭腫起。或如蘆蓽盛水之狀。或如紫李墜下抵舌。名曰懸癰。胎中熱毒也。急宜刺破癰頭。令泄去青黃赤汁。再生再刺。刺破後。以鹽湯洗淨。用藥摻之。

一字散。用硃砂、硼砂、各伍分。龍腦、樸硝、各壹字。共研末。蜜調搽口內。

大全方。食鹽煅研、枯礬、各等分。研細水調。以筯頭蘸點患處。

重腭

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

上腭層疊腫硬者急宜長鍼刺之甚則上腭成瘡如黃粟口中腥臭皆脾經蘊熱也

必效方先以蚌水布蘸絞淨以一字散方見懸癰搽之

取蚌水法將蚌洗淨打碎用濕棉布濾清水用之不可用疎夏布恐布孔疎蚌中螞蝗蟲濾在水中也此方通治口舌咽喉諸熱症甚效

天南星散以天南星生去皮臍研細末用醋調塗

男左女右腳心厚皮紙貼如乾再用醋潤之

聖惠方用蛇脫灰醋調敷之

集效方敷法見鵞口

重齦

初生兒貼著齒齦有物脹起者是也由脾胃蘊熱所致急以鍼刺去腫處惡血以鹽湯洗之再生再刺治

參懸癰重腭法

錢氏方人中白煅研末擦之

備驗方桑樹上用斧斫二三下少時其漿流出取搽腫處

集要方白芷壹錢硃砂伍分研末擦齦上

集效方敷法見鵞口

牙關蟲

初生兒喫乳不穩壯熱色赤鼻孔黃急看牙關如有蟲似蝸牛又似黃頭白蚌螺如法治之即瘥

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

證治準繩方。用竹瀝半合。和少許牛黃服瘥。

又方用猪肉拭口其蟲卽去。

吐舌

吐舌者伸長而收緩也。面赤煩啼。口渴尿赤。因心經有熱也。

導赤散。木通伍分。生地黃伍錢。黃連叁分。甘草梢伍分。黑山梔壹錢伍分。淡竹葉壹錢。燈心伍拾寸。煎服

大全方。以牛黃少許塗舌上卽止。或點氷片少許。亦效。

愼齋全書方見弄舌

弄舌

舌如蛇餂。左右上下。伸縮動搖。謂之弄舌。因心脾有熱。以致唇焦舌乾。煩啼便穢也。

愼齋全書。用川黃連煎湯。細細與服。輕者燈心湯亦可。並治吐舌

瀉黃散。用藿香葉、山梔子、熟石膏、防風、生甘草、燈心、竹葉湯煎。或兼導赤散。見吐舌散各半服。

重舌

心脾蘊熱。則氣血俱盛。腫附舌根。其狀如舌下又有一小舌。故曰重舌也。當以鍼刺之。出血。然後與藥。用線鍼刺患上。向旁挑之。不可深刺。正中主筋之上也。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

聖惠方元精石貳兩牛黃硃砂氷片各壹分共研末以鍼刺舌上去血鹽湯洗摻末敷之

又方伏龍肝末牛蒡子汁調塗之

又方皂角刺灰入樸硝或腦子少許洗口摻入舌下涎出自消

又方桑根白皮取入土者搗汁飲之

千金方取釜下土和苦酒塗之

又方黃柏浸苦竹瀝點之兼治木舌

又方衣魚燒灰敷舌上

又方取三家居肉切指大摩舌上兒立啼

子母秘錄木蘭皮即木蘭樹皮也壹尺廣肆寸削去粗皮入醋壹升漬汁嚥之

又方蜣螂蟲末唾和敷舌上

簡易濟衆方以亂髮燒灰半錢敷舌上

普濟方以竹瀝同芒硝點舌上

本草綱目半夏和醋煎洗之木舌同治

聖惠方

千金方俱見鵞口

木舌

舌尖腫大塞滿口中硬不能轉動故名木舌也由心脾積熱上沖而成急刺之出血若舌胎堅硬藥味不得入者用竹刀輕輕刮去舌胎拭淨然後用藥此證

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Not COPY

不可用手按之按則舌根乃損長成言語不正

吹鼻法舌腫滿口或吐出在外難以納藥者用殭蠶牙皂俱製過爲末用少許吹鼻中口自開頑痰自出用筯繞絲綿蘸甘草湯潤其舌然後用藥敷之

大生要旨用萆蔴子肉搗爛以棉紙取油將紙掐成條點火吹滅以煙薰之即消若舌下有如螻蛄或如臥蠶者急於腫處砭去血仍用釜底灰以鹽醋調敷或井水亦可脫去再敷

寒氷散用生石膏氷片少許共研末敷舌上如出血石膏炒焦用

直指方以蜀葵花壹錢黃丹伍分共爲末敷之

本草綱目以半夏貳拾枚水煮過再炮片時乘熱以酒壹升浸之密封良久熱漱冷即吐之

千金方舌長大塞口取鯉魚肉切片貼舌上

又方蛇脫燒灰乳和服少許

局方用蒲黃末頻刷舌上自消

大全方蜜炙黃連白殭蠶各等分共研末摻舌上

又方生薑切片蘸硼砂擦之

又方冬青葉煎濃汁浸之

又方百草霜海鹽各等分研末井華水調下

必效方皂礬不拘多少新瓦上火煅變紅色放地

Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

上候冷研細末擦舌上

千金方點法見重舌

膜舌

初生小兒有白膜裹舌或遍舌根急以指甲刺破出血否則其兒必啞

姚和仲方刮破舌膜令出血即以燒白礬半菉豆許敷之若血出不止燒髮灰摻之或同猪脂塗之

含腮

小兒初生時腮內如米豆大一小瘡次日漸大蝕破腮頰故名含腮若不早治破透難療

二金散用雞內金鬱金各等分研細末先用鹽湯洗淨吹之

痄腮

兒初生兩腮腫硬有核或在一邊名曰痄腮因妊恣食厚味或鬱怒不解以致鬱熱在內兒受之以成此證不治恐成腮癰

敷痄腮法桑柴灰少許入雄雞冠血叁肆滴加鹽滷壹匙和勻頻搽患處

又方皂角貳兩去核天南星貳錢生用糯米壹合爲細末薑汁調敷

又方芙蓉葉不拘多少搗敷之以帛紮定一日一

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

換。

神驗方。以赤小豆爲細末。新汲水調敷赤腫處。乾則再敷。

大全方。大黃末加薑汁少許敷之。空頂透氣。

又方。霜後絲瓜煅存性。猪膽汁調敷。

又方。黃柏、鉛粉、各等分。研勻。涼水調敷。

又方。染坊靛花頻敷之。

又方。腴皂同沙糖搗敷。紙蓋留頂出氣。

又方。猪膽汁入生薑汁少許和勻。磨陳京墨敷之。

又方。扁柏葉搗汁。調蚯蚓泥搽上。

又方。用百合壹兩、大貝母、山芝蔴根去皮、元明粉、各壹錢、銀硃柒分、白麵少許。同搗敷。

螳螂子

大生要旨曰。邇年來吳越間。新產月內小兒。有口噤不乳。啼聲難出。兩腮腫硬。名謂螳螂子。熟諳穩婆將利刃於口內兩腮剖開。撿出堅光惡肉。形頗肖桑螵蛸。傷處據云搽以胎骨珍珠散。兒便能乳而愈。若割治少遲時刻。則腫延喉鼻。不可救矣。亦有不諳割壞者。余實目睹。考之方書。從無此說。詢之幼科專家。亦盡茫然。舍刀法竟無方藥。不知病始何時。割自何人。因病可傷生。爲害甚速。附識於此。以俟知者。徐靈胎曰。自古無螳螂子之病。凡小兒蒸變之候。每有口內

Do Not Copy East Asian Library Princeton University Gest Collection

微腫。惡乳之時。名曰妬乳。不治自愈。或不能坐視。以藥塗口亦易愈。近日濱海妖婦。造割螳螂子之法。以騙人取利。强者幸愈。弱者多死。受其害者甚多也。蓋小兒兩頰頤內。有內外皮兩層。中空處有脂膜一塊。人人皆然。割去之法。妖婦以此惑人。人見果有螳螂子者。遂相信不疑。死而不悔。深可憐憫。今爲之大聲疾呼。愼勿被其愚而受其害也。徐氏此說。實爲近理。閱外科全生集。已有治法。依方施治。無不效者。烏用割爲。愼之戒之。

搽口方。青黛壹錢。元明粉叁錢。硼砂壹錢。薄荷伍分。氷片壹分。共研細末。和勻擦兩頤內。日用四五次立愈。

全生集。用生地黃伍錢。大黃壹錢。陳酒浸。取出。共搗爛。塗兒足心。男左女右。用絹縛好。乾卽易。愈乃止。

爛眼

胎中蘊熱。生後毒熱上攻於目。以致痛癢難睜。胞邊赤爛。此名爛眼。

簡易備驗方。小紅棗貳箇去核。入明礬裝滿。濕紙包裹。火煨。候礬化。去紙。同黃連壹錢。水壹鍾。煎半鍾。去渣澄清。將薄綿紙浮藥水上。取紙上清水洗。每洗一次。必易一紙。

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

又方。杏仁叁粒。去皮尖搗爛。加銅綠黃豆大壹塊。爲末和勻。將新青絹包此一味。用井水壹酒盞。浸片時。待水有綠色。不時洗眼。至一二日後自愈。須先用皮硝煎水洗過。再用此方洗之。

衛生要訣。用猪膽汁和鹽點之。

又方。桑葉紙卷燒煙薰鼻。

生地黃湯爛眼、赤眼、血眼。皆宜服此方。見目不開

赤眼

兒初生赤眼。此胎熱也。或因洗浴不潔。穢汁浸眼背中。至長不痊。名胎赤眼。

心鑑方。胡黃連末。茶調敷手足心。

眞金散。黃連、黃柏、當歸、赤芍、杏仁。用乳汁浸一宿。曬乾爲極細末。用生地黃汁調點之。更用荆芥煎湯溫洗。

普濟方。羊肝切薄片。井水浸貼。

又方。小兒吐出蛔蟲。貳條。磁蓋盛之。紙封口。埋濕地五日。取出化爲水。磁瓶收貯。每日用銅筯點之。

聖濟方。銅綠壹分。蜜半兩。於蚌殼相和。每夜臥時。水洗眼。炙熱點之。能斷根。

古今錄驗方。淡竹瀝點之。或入人乳效。

小品方。人乳浸黃柏點之。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

濟急仙方。杏仁壓油壹合。食鹽壹錢。入石器中。以柳枝壹握緊束。研至色黑。以熟艾壹團。安碗內燒烘之。令氣透火盡即成。每點少許入兩眥。甚妙。

本事方。大黃、白礬、各等分爲末。同冷水調作罨子。貼眼立效。

血眼

初生艱難。血浸眦睫。遂濺滲其睛。以致瞳人不見。或上下弦爛。

全幼心鑑。杏仁貳枚。去皮尖嚼。乳汁叁伍匙。入膩粉少許。蒸熟絹包頻點。重者加黃連、樸硝。

大全方。治兒百日內乳嗽不愈。以致血脈貫瞳。兩眶紫黑。或眼白珠紅赤如血。亦名血眼。當用生地黑豆共研成膏。掩於眼上。則眶黑自消。血隨淚出自愈。

血淚

小兒雙目流血。乃胎火胎熱所致。宜涼肝導赤。兼以鯽魚煨湯喂之。自效。

涼肝導赤湯。生地黃叁錢。丹皮貳錢。澤瀉、赤茯苓、炒山梔、人中黃、赤芍、木通各壹錢。燈心念寸爲引。水煎服。

活幼新書。兒目濇不開。或出血者。方見目不開

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

鼻塞鼻乾鼻涕鼻齆

小兒初生忽然鼻塞不能吮乳開口呼吸者或因乳母夜睡鼻息吹兒顖門或因風寒外入停滯鼻間則成鼻塞或火升熱鬱則成鼻乾或津液不收則多涕濃涕結聚則成鼻齆

葱薑貼法葱頭柒枚生薑壹片共搗爛攤紙上置掌中合待溫貼於顖門其邪即解揭去後仍用絹緞寸餘塗以麵糊仍貼顖門永無傷風之患

通關散香附子川芎荊芥穗細辛葉猪牙皂角殭蠶各等分入葱白搗成膏用紅綿攤貼顖門

葱涎膏全葱研爛將猪牙皂角爲末和匀成膏貼顖門得效方天南星炮爲末水調貼顖門手熨之

聖惠方零陵香壹兩羊髓叁兩銚內慢火熬成膏去滓日摩背上三四次

外臺秘要醍醐叁合木香零陵香各肆分湯煎成膏以塗顖上并塞鼻中

大全方通草北細辛各等分研末以綿裹藥如棗核大納入鼻中一日二次以上治鼻塞

普濟方治鼻乾用黃米粉生礬各壹兩每以壹錢調貼顖上日二次

又方治鼻流濃涕兼治鼻乾枯礬血餘灰等分爲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

末。青魚膽汁拌爲餅。陰乾研細吹鼻中。

簡易備驗方。治鼻齆。瓜蒂、藜蘆、各壹分。皂角半分、麝香少許。爲細末。頻吹之。

聖惠方。治鼻齆。有熱者。龍腦半錢。瓜蒂拾肆箇。赤小豆叁拾粒。黃連叁大莖。去鬚。共研末。吹鼻中。

膚裂血出

或受胎熱。或過溫煖。內熱外洩也。

尊生書。以唾津磨鐵繡敷之。卽止。

肚皮青黑

小兒百晬內。忽然肚皮青黑。乃氣血失養。風寒乘之。危惡之候也。百晬外亦有此證。

簡易備驗方。以好燒酒和胡粉敷之。胡粉卽婦人搽面之鉛粉也

保幼大全。大青爲末。納口中。以無灰酒送下。

灸法。灸臍左右上下各半寸。并鳩尾骨壹寸。凡五處各叁壯。

遍身腫泡

小兒初生。遍身發泡如魚脬。光如水晶。破則成水。流滲又生者。胎毒也。

急救方。蜜陀僧研末摻壓之。內服蘇合丸。見大治方

體如水晶

初生小兒。胸腹忽然如水晶色。臟腑皆見。俗名蝦蟇

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瘟

大生要旨。熨法。取大蝦蟇陸隻。將四脚紮起。以蝦蟇肚皮在水晶色處。撫摩多次。置兒臍上。再用第貳隻。如前法。更換陸隻。其病卽痊。蝦蟇眼皮內有蟾酥。須防其迸出射人。以絹遮其眼額。用畢將蝦蟇放野池邊。不可害其生也。

遍體如鱗

芽兒皮膚。如蛇皮鱗甲之狀。由於氣血否澁。亦曰胎垢。又曰蛇體

保幼大全。用白殭蠶去絲嘴爲末。煎湯浴之。一如蛇脫。

腎縮入腹

一臘之內。腎縮入腹。乃初生受寒所致。

聖惠方。用吳茱萸、硫黃各半兩。同大蒜研塗其腹。仍以蛇牀子煙薰之。

陰囊腫墜

初生陰囊光腫。墜下不收。有皮潰而核欲墜者。

小品必效方。用紫蘇爲末。患處濕則乾摻之。乾則香油調塗之。神效。

大小便出血

兒生一臘。大小便出血。乃胎中受母蘊熱之氣所致。

全幼心鑑。生地黃汁伍柒匙。無灰酒半匙。蜜半匙。

Gest Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

和服。

簡易備驗方。生蒲黃、油頭髮燒灰、各壹錢爲末。或生地黃汁。或米飲調服。

又方。治大便出血。鼈頭壹枚。炙令黃黑爲末。米飲下。

又方。治小便出血。小甘草壹錢。炙黑研末。生地黃汁調服之。

手拳不展

小兒所受肝氣怯弱。致筋脈攣縮。兩手伸展無力也。薏苡丹。用薏苡仁。湯浸去皮研細。當歸酒洗焙。秦艽、防風、棗仁炒、羌活、各等分。共爲細末。如龍眼大。每服壹粒。以荊芥湯入麝香少許。化下。

衛生要訣。用性急子（即鳳仙子也）爲末。酒煎洗一日。次日以當歸鈎藤水煎洗。如法互易。

又方。用鳥雀爪燒灰。酒調搽手心。

腳拳不展 附足指向後

兒在胞。母臟腑有積冷。或爲風邪所乘。生後血氣未榮。故腳指拳縮不展。或因母娠時。因病不能行步。日惟盤坐。子母一氣相通。形隨氣化。故亦如是。

必效方。海桐皮、當歸、人參、牛膝酒炒、牡丹皮、熟地黃、補骨脂、獨活、各等分。共爲末。和勻。每服壹錢。用葱白叁寸。薑壹片。煎湯調服。

Eastern Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

衞生要訣。用牛膝叁觔。黃酒拾伍觔。煎叁炷香。日以酒洗足。

又方。用轎夫韈底燒灰。每日酒調服之。

大生要旨。治足指向後。用軟綿捲如棍子。紮兒膝後灣內。再用木瓜湯。常常洗熨之。日久筋長舒展。則自能伸也。

胎毒

胎毒者。非尋常瘡癬比也。父母楊梅蘊毒所遺。或房術熱藥所感。中於先天有生之初。身現紅點。或因熱湯洗浴。烘薰衣物。外熱觸動。內毒暴發。忽然頭面腹背手足等處。斑爛膿血。最難救治。若早治得宜。可保十之三四。切勿惟從外治。致毒內攻。卒成不救也。

外科正宗。治小兒受父母霉毒。赤剝斑爛。以土茯苓熬濃汁。調人中黃末。每日數次。共服錢許爲妙。用後用幼科良方外搽法。治之宜早。遲則遍身皆瘡。百不一治矣。

清涼膏 見初生無皮

陳遠公治法。小兒初生。或半歲。或一二歲。胎受惡毒。身發大瘡。內治用金銀花貳兩。生甘草、天花粉、黃蘗、錦地羅、各叁錢。人參貳錢。水煎服貳劑。外治用蝸牛、生甘草、兒茶、樟腦、黃丹、水粉、枯礬、各叁錢。冰片、輕粉、各壹錢。地龍糞伍錢。麝香叁

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

分共爲細末麻油調敷輕者單用煎方重者內外合治無不可救也（按煎方分兩宜酌減）

幼科良方內用眞西黃叁分硃砂水飛雄黃各柒分乳香去油沒藥去油各伍分麝香壹分山慈姑壹錢共爲末蜜丸重叁分金銀花湯每日調服壹丸取愈外用搽方白蘆甘石煅過淬入黃連汁內叁次童便內肆次壹兩赤石脂煅壹兩紫甘草皮燒灰存性兒茶各伍錢黃柏將猪膽汁塗炙柒次柒錢眞萊豆粉炒叁錢氷片伍分共研細用蔴油入雞蛋黃壹枚煎黑去滓候冷調搽取愈

大全方以鼈甲煅存性研細麻油調敷

又方兒茶伍錢焙研犍猪膽汁調勻煎滚冷定將瘡用甘草湯洗淨敷之

秘方鮮半邊蓮搗汁掃上以渣煎湯洗之

又方以愼火草搗汁搽之

胎瘡

小兒胎瘡因娠婦飲食之毒七情之火兒受其氣發而爲瘡或靨或片頭面腹背四肢發無定所雖較胎毒爲輕然乳母必當戒發物當忌慾後乳子不然非易言愈也

湯氏方春用柳條荆芥夏用棗葉槐枝秋冬用苦

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

參煎湯洗胎瘡癬

尊生書乳母服藥方苦參貳錢羌活捌分甘草肆分連翹防風荆芥牛蒡子金銀花各壹錢共和水煎服十劑

簡易備驗方生甘草金銀花各壹兩眞牛黃壹錢爲末每服貳叁分乳汁調下

得效方黃芩黃連白礬俱生用雄黃各伍錢松香貳錢爲末瘡甚加銅綠貳錢乾摻患處或用香油調敷之疥瘡宜加枯礬叁錢

尊生書不拘何處以桐油調胡粉塗之

又方用大黃捌兩甘草肆兩當歸貳兩樸硝貳兩共研濃汁以青布作小彩二件藥汁煮收入陰乾早晚換服再煮以愈爲度

經驗良方治胎瘡滿頭用水邊烏桕樹根曬研入雄黃末少許香油調搽

外臺秘要以葵根燒末敷之

必效方松香貳兩蛤粉伍錢青黛貳錢半爲末用柏燭油調敷或乾摻之或加輕粉枯礬各叁錢

胎癬

胎中受毒落草受風致生妳癬或起眉端或生頭頂延至遍身早治易愈

保幼大全用藁本煎湯浴之并以浣衣又方以殭

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

蠶不拘多少去嘴研末煎湯浴之

直指方以猪脂和輕粉抹之

千金方蛇牀子杵末和猪脂塗之

聖惠方先以葱鹽湯洗淨用桑木蛀屑燒存性入輕粉等分香油和敷之

外臺秘要用蟾酥燒灰猪脂和敷

儒門事親用白膠香黃柏輕粉等分爲末羊骨髓和敷

奇方纂類先用粗碗一隻以厚綿紙糊口刺眼一二十將細米糠壹合高堆在紙上中開一窩將炭火種放在內燃著糠候燒勿至紙卽去糠取碗內煙油用麻絲刮破瓣搽之

文蛤散治搔癢不絕者用文蛤肆兩輕粉伍錢點紅川椒貳兩先將文蛤打碎入鍋內炒黃色次下川椒同炒黑色煙起爲度入磁器封口存性次日入輕粉研爲細末香油調搽

烏雲膏用松香貳兩硫黃壹兩研勻香油拌如糊攤毛青布上半指厚捲緊成條用線密紮再用香油泡一日取出刮去浮油以火點著一頭朝下用碗接之布灰陸續翦去將滴下油浸冷水中一宿出火毒搽之

紅絲瘡

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University

紅絲瘡者。雖非丹胗。其毒實同。多生於兩手中指上。男左女右。則尤甚也。其狀但一水泡。清澄光瑩。如小雞頭大。其底下濈濈然數十小鍼孔。不癢不痛。都無妨礙。邊旁有一絲脈如紅絲。隱隱在皮裏。其行甚速。循臂而上。過肘則危。至心則死。人多不知此病。芽兒患此害命。父母尚以爲死於急驚。豈不寃哉。有此症者。急以鍼迎頭挑斷出血。病者知痛則可救。若挑至骨亦無生血者不治。

救急良方。挑破出血後。或挖耳塞封之。或嚼白梅封之。或用葱白搗爛敷之。加綿紙覆之。或嚼浮萍草敷之。絲即不行而愈。

聖惠方。急就其泡上。灼艾數十壯。仍於絲上數處。挑斷得生血乃生。

猴疳瘡

猴疳者。狀如圓癬色紅。從臀而起。漸及遍身。四圍皮脫。中露赤肉。若猴之狀。乃胎中毒邪。畜於腎臟而發。不急治必死。此證切忌洗浴。只用軟綿帛蘸甘草湯揩淨用藥。

醫通方。大川連、生甘草、各陸分。乳香、沒藥、並炙、雄黃水飛、各肆分。青黛研淨。硃砂水飛、各分半。西牛黃壹分。各爲細末。和勻。每服壹分。伍釐。蜜調燈心湯下。日三服。夜二服。外用淨青黛貳錢。黃

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

柏微炒閉口連翹炒黑、人中白、火煅醋淬、各壹錢、土貝母去心、炒褐色、伍錢、共爲末、和勻臨用入西牛黃、氷片各伍分、麻油調敷神效按用蟹殼瓦上炙黑橄欖核燒存性等分研末加氷片少許將甘草湯拭淨雞子清調塗屢試神效

二粉散 菉豆粉壹兩、標硃壹錢、氷片叁分、輕粉壹分、伍釐、共爲細末、將金汁調鵞毛蘸敷上如無金汁、雪水亦可、或用燈心甘草湯亦可

胎瘤

兒初生頭上胸乳間腫起、大如饅頭、小如梅李、此胎中蘊熱、更兼血淤凝滯而成、須候小兒滿月以外、方可用鍼刺破、放出赤豆汁或膿汁、其腫即消、若滿月後生者、必待膿鼓熟透、再鍼、內服五福化毒丹方見大治背窩

小兒初生、背上有大孔窩一二箇、其內有膜、完護臟腑者、得生、如無膜露見臟腑者、即死無救、如有膜者、以補中益氣湯與產母服之、兒自能長完

補中益氣湯 用人參、黃芪、各捌分、白朮、甘草、陳皮、各伍分、升麻、柴胡、各叁分、當歸伍分、水煎服

溼尻瘡

初生小兒、手足頤下、頰肢窩腿丫內、濕熱之氣、蘊積溼爛成瘡、此乃乳母看顧不周所致、不可用他藥、只用伏龍肝一味、不拘多少、研細乾摻、以紙隔之

East Asian Library, Princeton University and the Gest Collection
DO NOT COPY

大治方

青蒿丸。治小兒百病。白露節前。取青蒿莖內青蟲柒條。飛淨硃砂壹錢。輕粉伍分。研不見星。同蟲研極爛。丸如黍米大。每服柒丸。百晬以外服拾肆丸。將人乳研開。塗兒口中。與乳過下。

紫霜丸。代赭石壹兩。火煅醋淬三五次。研細末。赤石脂壹兩。杏仁陸拾粒。去皮尖研。巴豆叁拾粒。去油膜。共爲末。飯丸如麻子大。日服三丸。開水下。

黑白散。黑丑。白丑。俱半生半炒。大黃、檳榔、陳皮、各伍錢。甘草叁錢。元明粉貳錢。除檳榔不見火。餘五味焙研細。合檳榔末、元明粉、和勻。每服伍分。蜜湯調服。

蘇合香丸。蘇合香油伍錢。入安息香內。安息香壹兩。另爲末。用無灰酒半觔。熬膏。白檀香、青木香、丁香、沉香、蓽撥、香附子、訶子煨取肉、烏犀尖鎊、硃砂、各壹兩。薰薩香、片腦、各伍錢。麝香、柒錢半。共爲末。入安息香膏。煉蜜和劑如芡實大。用開水下。

琥珀抱龍丸。眞琥珀、天竺黃、檀香細剉、人參、白茯苓、各壹兩。粉草叁兩去節。枳殼、枳實、麪炒、各壹兩。硃砂伍錢飛。陳膽星壹兩。山藥壹觔。金箔百

Fast Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

片。研極細。新汲水爲丸。硃砂爲衣。梧子大。每服壹丸薄荷湯下。

保嬰易知錄下終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library