PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

C101/1815
V.T

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

附方　　閻孝忠

余家幼稚多疾率用錢氏方訣取效如神因復研究諸法有得于心如驚痟等錢仲陽之未悉者今見於下并以仲陽傳附卷末

小兒急慢驚古書無之惟曰陰陽癇所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類是也陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可悞也急驚由有熱熱卽生風又或因驚而發則目上目瞤涎潮搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起卽了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱藥壹貳服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

直訣中麝香圓鎮心圓抱龍圓辰砂圓及至寶丹紫雪之類候驚勢已定須臾以藥下其痰勢直訣中利驚圓軟金丹桃枝圓之類或用大黃朴硝等藥利下痰熱心神安甯即愈慢驚得於大病之餘吐瀉之後或悞取轉致脾胃虛損風邪乘之凡小兒吐瀉不止必成慢驚宜速治似搐而不甚搐此名瘈瘲似睡而精神慢四肢與口中氣皆冷睡露睛或胃痛而啼哭如鵝聲此證已危蓋脾胃虛損故也

凡小兒吐瀉當溫補之余每用理中圓以溫其中以五苓散導其逆五苓散最治小兒吐連與數服兼用異功散等溫藥調理之往往便愈若已虛損當速生其胃氣宜與附子理中圓研金液丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效服至貳叁兩無害候胃氣已生手足漸暖陰退陽回然猶瘈瘲即減金液丹壹貳分增青州白圓子壹貳分同研如上服以意詳之漸減金液丹加白圓子兼用異功散羌活膏溫白圓鉤藤飲子之類調理至安依此治之仍頻與粥雖至危者往往死中得生拾救捌玖

金液丹治小兒吐瀉虛極最妙沈存中良方論金液丹云親見小兒吐利劇氣已絕服之復活者數人眞不妄也須多服方驗

驚風或洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜煎錢氏白术散使滿意取足飲之彌多彌好

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

凡小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐但扶持不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脉或致手足拘攣

治急慢驚世人多用壹藥有性温性涼不可泛用宜審別之又治慢驚藥宜去龍腦縱須合用必以温藥爲佐或少用之

凡小兒實熱疎轉後如無虛證不可妄温補熱必隨生

治小兒驚風痰熱堅癖能不用水銀輕粉甚便如不得已用之僅去疾卽止蓋腸胃易傷亦損口齒

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致悞也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐食宜以藥下之

小兒耳冷骯冷手足乍冷乍熱面赤時嗽嚏驚悸此瘡疹欲發也未能辨認間服升麻葛根湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡荽酒黃蘗膏暑月煩躁食後與白虎湯玉露散熱盛與紫雪咽痛或生瘡與甘桔湯甘露飲子餘依錢氏說大人同

小兒多因愛惜過當往往叁兩歲未與飲食致脾胃虛弱平生多病自半年以後宜煎陳米稀粥取粥面時時與之拾月以後漸與稠粥爛飯以助中氣

Gest Asian Library DO NOT COPY and the Gest Collection Princeton University Library

自然易養少病惟忌生冷油膩甜物等

小兒治法大槩與大人同惟劑料小耳如升麻葛根湯惺惺散等雖人皆知之倉卒亦難檢今並載于下錢氏已有方者今不復錄

升麻葛根湯治傷寒温疫風熱壯熱頭痛肢體痛瘡疹已發未發並宜服之

乾葛細剉　升麻　芍藥

甘草剉炙各等分

右同爲麄末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞量大小與之温服無時

惺惺散治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和

桔梗　細辛去葉　人參切去頂焙

甘草剉炒　白朮　白茯苓去皮

括蔞根各壹兩

右同爲細末每服貳錢水壹盞入薄荷伍葉煎至柒分温服不拘時如要和氣入生薑伍片同煎壹法用防風壹分用川芎壹分

消毒散治瘡疹未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈去痰治咽痛

牛蒡子貳兩炒　甘草半兩剉炒　荊芥穗壹分

右同爲麄末每服叁錢水壹盞半煎至壹盞温服不拘時

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黃蘗膏治瘡疹已出用此塗面次用胡荽酒

黃蘗去麄皮壹兩　甘草肆兩　新菉豆壹兩半

右同爲細末生油調從耳前至眼輪並厚塗之日叁兩次如早用瘡不上面縱有亦少

胡荽酒

胡荽細切肆兩以好酒貳盞煎壹兩沸入胡荽再煎少時用物合定放冷

右每吸壹兩口微噴從頂至足勻遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡疹出快瘡疹忌外人及穢觸之物雖不可受風冷然亦不可擁遏常令衣服得中并虛涼處坐臥

治瘡疹出不快及倒擫四聖散

紫草茸　枳殼麩炒去穰秤　木通剉　甘草剉炒　黃耆切焙等分

右同爲麄末每服壹錢水壹中盞煎捌分温服無時

又方藍根散

板藍根壹兩　甘草叁分剉炒

右同爲細末每服半錢或壹錢取雄雞冠血叁兩點同温酒少許食後同調下貳方無證勿服

治瘡疹倒擫黑陷

人牙燒存性研入麝香少許

右每服叁錢温酒少許調下無時

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

又方

小豬兒尾尖取血叁伍點研入生龍腦少許

右新水調下食後

治伏熱在心昏瞀不省或悞服熱藥搐熱冒昧不知人及瘡疹倒擫黑陷

生梅花腦子研半字或壹字

右取新殺豬心壹箇取心中血同研作大圓用新汲水少許化下未省再服如瘡疹陷伏者温酒化下

甘露飲子治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搖

生乾地黃焙秤　熟乾地黃焙秤　天門冬

麥門冬各去心焙秤　枇杷葉去毛　黃芩去心

石斛去苗　枳殼麩炒去穰　甘草剉炒

山茵陳葉

右各等分爲麄末每服貳錢水壹盞煎捌分食後温服牙齒動搖牙齦腫熱含嗽渫并服

白虎湯解暑毒煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴

知母壹兩半焙乾秤　甘草半兩剉炒　石膏肆兩

白粳米捌錢

右同爲麄末每服叁錢水壹盞煎至捌分食後温冷隨意服氣虛人加人參少許同煎

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

瘡疹太盛宜服此調肝散令不入眼

生犀剉取末壹分　龍膽草半錢　黃耆半兩切

大黃去皮貳錢　石膏半兩　桑白皮自採焙乾

鉤藤鉤子　麻黃去節各壹分　括蔞去皮

甘草炙各等分

右爲麄末每服貳錢水壹盞煎半盞食後時時温服少許

治瘡疹入眼

馬勃半兩　皁角子拾肆箇　蛇皮半兩

右入小罐子內鹽泥固濟燒存性研細温酒調下壹貳錢食後服

又方治瘡疹入眼成翳

括蔞根半兩　蛇皮貳錢

右同爲細末用羊子肝壹箇批開入藥末貳錢麻纏定米泔煑熟頻與食之未能食肝令乳母多食

又方

蟬殼末

右用水煎羊子肝湯調服貳叁錢

凡痘瘡才欲著痂即用酥或面油不住潤之可揭即揭去若不潤及遲揭瘡痂硬即隱成瘢痕

治口瘡

大天南星去皮只取中心如龍眼大爲細末

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右用醋調塗腳心

治癚耳

白礬火飛壹錢　麝香壹字

坯子烟脂染烟脂也壹錢

右同研匀每用少許先用綿裹杖子揩淨摻之

治蓄熱在中身熱狂躁昏迷不食

豆豉半兩　大梔子仁染箇搥破

右共用水叁盞煎至貳盞看多少服之無時或吐或不吐立效

治蟲咬心痛欲絕

五靈脂末貳錢七　白礬火飛柒錢七

右同研每服壹貳錢水壹盞煎伍分溫服無時當吐出蟲

治脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痰

齊州半夏湯浸柒次切焙壹兩　陳粟米叁分陳粳米亦得

右㕮咀每服叁錢水壹大盞半生薑拾片同煎至捌分食前溫熱服

治外腎腫硬成疝

乾蚯蚓爲細末

右用唾調塗常避風冷濕地

小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內弔鉤藤膏

沒藥研　好乳香水中坐乳鉢研細秤

木香　薑黃各肆錢　鼈子仁拾貳箇

右先將下叁味同爲細末次研入上貳味煉蜜和成劑收之每壹歲兒可服半皁子大餘以意加減煎鉤藤湯化下無時次用魏香散

魏香散

蓬莪朮半兩　眞阿魏壹錢

右先用温水化阿魏浸蓬莪朮壹晝夜焙乾爲細末每服壹字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

地黃散治心肝壅熱目赤腫痛生赤脉或白膜遍睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

生乾地黃切焙秤　熟乾地黃切焙秤　黃連去鬚壹錢　木通壹錢半

當歸去蘆頭切焙秤各壹分　甘草壹錢半剉炒　防風去蘆頭焙

元參半錢　生犀末　蟬殼去土

羌活　穀精草　白蒺藜去尖

木賊　大黃去皮取實者剉略炒壹錢

沙苑蒺藜各壹錢

右爲細末每服壹字或半錢量大小加減煎羊肝湯食後調下日叁夜壹忌口將息亦治大人

治熱痢下血

黃蘗去皮半兩　赤芍藥肆錢

右同爲細末飯和圓麻子大每服壹貳拾圓食前

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

米飲下大者加圓數

治心氣不足伍陸歲不能言菖蒲圓

石菖蒲貳錢　丹參貳錢　人參切去頂焙半兩

赤石脂叁錢　天門冬去心焙秤　麥門冬去心焙秤各壹兩

右同爲細末煉蜜圓菉豆大或麻子大温水下伍柒圓至壹貳拾圓不計時日叁肆服久服取效又有病後腎虛不語者宜兼服錢氏地黃圓

雞頭圓治諸病後不語

雄雞頭壹箇炙　鳴蟬叁箇　大黃壹兩取實處濕紙裹煨熟

甘草壹兩剉炒　木通半兩　當歸去蘆頭切焙叁分

黃耆切焙　川芎　遠志去心

麥門冬去心焙各叁分　人參切去頂焙半兩

右同爲細末煉蜜圓小豆大平旦米飲下伍圓空心日叁肆服兒大者加之久服取效雞蟬貳物宜求死者用之不可旋殺孫眞人所謂殺生求生去生更遠不可不知也

治腎虛或病後筋骨弱伍陸歲不能行宜補益肝腎

羚羊角圓

羚羊角尖細而節密者是剉取末　生乾地黃焙秤

虎脛骨敲破塗酥炙黃　酸棗仁去皮秤炒　白茯苓各半兩

桂去皮取有味處不見火　防風去蘆頭切焙　當歸同上

黃耆切焙各壹分

右同爲細末煉蜜和成劑每服壹皁子大兒大者加之食前温水化下日叁肆服取效

治驚風中風口眼喎斜語不正手足偏廢不舉全蝎散

全蝎去毒炒　殭蠶直者炒　甘草

赤芍藥　桂枝不見火　麻黄去節

川芎　黄芩去心各叁錢　天麻陸錢

大天南星湯浸柒次去皮臍切焙叁錢

右爲麄末每服叁錢水壹盞半薑柒片煎柒分温服無時量大小與之日叁肆服忌羊肉

和中散和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛忌食

人參切去頂焙　白茯苓　白术

甘草剉炒　乾葛剉　黄耆切焙

白褊豆炒　藿香葉各等分

右爲細末每服叁錢水壹盞乾棗貳箇去核薑伍片煎捌分食前温服

紫蘇子散治欬逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣或呵氣未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

紫蘇子　訶子去核秤　蘿蔔子

杏仁去皮尖麩炒　木香　人參切去鬚各叁兩

青橘皮　甘草剉炒各壹兩半

右爲細末每服壹錢水壹小盞入生薑叁片煎至

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

伍分去滓不計時候温服量大小加減

赤石脂散治痢後虛氣下推出肛門不入

眞赤石脂揀去土　伏龍肝各等分

右爲細末每用半錢傅腸頭上頻用

蘖墨散治斷臍後爲水濕所傷或裹袍濕氣傷於臍中或解脫風冷所乘故令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜速療之

黃蘖炒　釜下墨　亂髮燒各等分

右爲細末每用少許傅之

至寶丹治諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並宜服之

生烏犀屑　生玳瑁屑　琥珀研

朱砂細研水飛　雄黃已上各壹兩研細水飛

金箔伍拾片壹半爲衣　銀箔伍拾片研

麝香壹分研　牛黃半兩研

安悉香壹兩半爲末以無灰酒飛過濾淨去砂石約取壹兩慢火熬成膏

右生犀玳瑁搗羅爲細末研入餘藥令勻將安悉香膏以重湯煑凝成和搜爲劑如乾卽入少熟蜜盛不津器中旋圓如桐子大貳歲兒服兩圓人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不語中惡氣絕中諸物毒中熱暗風產後血運死胎不下並用童子小便壹合生薑自然汁叁伍滴同温過化

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DOC NOT COPY

下伍圓立效

紫雲治驚癇百病煩熱涎厥及傷寒胃熱發斑一切熱毒喉痺腫痛又治瘡疹毒氣上攻咽喉水漿不下

黃金拾兩　寒水石　磁石

滑石　石膏各肆兩捌錢並搗碎

已上用水伍升煮至肆升去滓入下項藥

元參壹兩陸錢搗碎　木香搗碎　羚羊角屑

犀角屑　沈香各半兩搗碎　升麻壹兩陸錢搗碎

丁香壹錢搗碎　甘草捌錢炙剉

已上捌味入前藥汁中再煮取壹升伍合去滓入下項藥

硝石叁兩壹錢芒硝亦得　朴硝壹斤精者

已上貳味入前汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有柒合投在木盆中半日欲凝入下項藥

朱砂叁錢飛研　麝香當門子壹錢壹字研

已上貳味入前藥中攪勻寒之兩日

右件成紫色霜雪每服壹字至半錢冷水調下大小以意加減咽喉危急病捻少許乾嚥立效又治大人腳氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒厲卒死溫瘧五尸五疰大能解諸藥毒每服壹錢至貳錢冷水調下並食後服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
NOT COPY

理中圓治吐利不渴米穀不化手足厥冷

人參去蘆剉　白术剉　乾薑炮　甘草炙剉各壹兩

右爲末煉蜜和圓雞黃大每服壹圓水壹大盞化開煎及柒分連滓放温服小兒分爲叁服大小以意加減食前

五苓散治霍亂吐瀉躁渴飲水小便不利

澤瀉貳兩半剉　木豬苓去皮剉壹兩半　官桂去皮壹兩　白茯苓壹兩半剉　白术壹兩半剉

右爲細末每服壹錢温湯調下渴躁新水調服大小以意加減不以時候

附子理中圓治脾胃寒弱風冷相乘心痛霍亂吐利轉筋

人參去蘆剉　白术剉　乾薑炮　甘草炙剉　黑附子炮去皮臍各壹兩

右爲細末煉蜜和壹兩作拾圓每服壹圓水壹中盞化開煎及柒分稍熱服食前小兒分作叁兩服大小以意加減

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精神昏塞多睡露睛口鼻氣涼欲成慢驚風者又治大人陽虛陰盛身冷脉微自汗吐利小便不禁

舶上硫黃拾兩先飛煉去砂石秤研爲細末用砂合子盛令捌分滿水和赤石脂封

縫鹽泥固濟曬乾露地先埋壹水罐子盛水滿坐合子在上又以泥固濟訖常以叁斤火養叁日叁夜足加頂火壹煆成候冷取藥

右以柳木搥乳鉢內研爲細末每服貳錢生薑米飲調下大小以意加減多服取效大人藥末壹兩蒸餅壹兩水浸去水脉和圓桐子大曬乾每服伍拾圓至百圓米飲下並空心連併服

又方 范文正宅

硫黃 不以多少淡黃通明者爲上飛煉去砂石研爲細末用有蓋砂罐子壹箇取水中田字草或益母草搗淤土成泥更入紙筋同搗固濟罐子貴不破曬乾盛硫黃末在內可不滿兩指於露地深畫十字放罐子在中心使底下通透四面用炭約肆伍斤勻火簇不蓋罐子頂時時揭覷候化爲汁速去四面火用濕土埋壹宿次日取出於北蔭下不見日氣處撅壹坑子約壹貳尺將罐子去蓋倒埋壹宿次日取出和罐入湯內煑伍拾沸漉出取藥

右以柳木搥乳鉢內研如粉麪相似小兒因吐瀉之後變成慢驚風者每服壹貳錢生薑米飲調下併服取效大人陰證傷寒脉微欲絕以水浸無鹽蒸餅和圓桐子大曬乾每服伍拾圓或百圓米飲下並空心服

青州白圓子治小兒驚風大人諸風

半夏柒兩生　天南星叁兩生

白附子貳兩生　川烏頭半兩生去皮臍

右搗羅爲細末以生絹袋盛用井花水擺未出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋擺盡爲度

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

放磁盆中日曝夜露至曉棄水別用井花水攪又
曝至來日早再換新水攪如此春伍日夏叁日秋
柒日冬拾日壹法肆時只浸壹宿去水曝乾後如玉片研細
以糯米粉煎粥清圓菉豆大每服叁伍圓薄荷湯
下大人每服貳拾圓生薑湯下癱瘓風温酒下並
不以時候服

小柴胡湯治傷寒温熱病身熱惡風頭痛項强四肢
煩疼往來寒熱嘔噦痰實中暑瘧病並宜服

柴胡去蘆捌錢　半夏湯洗切焙貳錢半　黃芩去心
人參去蘆　甘草炙剉各叁錢

右爲麄末每叁錢水壹盞半生薑伍片棗壹枚擘
破同煎及捌分濾去滓放温分作叁兩服大小以
意加減並不以時候日叁夜貳

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

錢仲陽傳

河閒劉跂撰

錢乙字仲陽上世錢塘人與吳越王有屬俶納土曾祖贇隨以北因家于鄆父顥善鍼醫然嗜酒喜游一旦匿姓名東游海上不復返乙時三歲母前亡父同產姑嫁醫呂氏哀其孤收養爲子稍長讀書從呂君問醫呂將歿乃告以家世乙號泣請往跡父凡五六返乃得所在又積數歲乃迎以歸是時乙年三十餘鄉人驚嘆感慨爲泣下多賦詩詠其事後七年父以壽終喪葬如禮其事呂君猶事父呂君歿無嗣爲之收葬行服嫁其孤女歲時祭享皆與親等乙始以顱

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

顯方著山東元豐中長公主女有疾召使視之有功奏授翰林醫學賜緋明年皇子儀國公病瘈瘲國醫未能治長公主朝因言錢乙起草野有異能立召入進黃土湯而愈神宗皇帝召見褒諭且問黃土所以愈疾狀乙對曰以土勝水木得其平則風自止且諸醫所治垂愈小臣適當其愈天子悅其對擢太醫丞賜紫衣金魚自是戚里貴室逮士庶之家願致之無虛日其論醫諸老宿莫能持難俄以病免哲宗皇帝復召宿直禁中久之復辭疾賜告遂不復起乙本有羸疾性簡易嗜酒疾屢攻自以意治之輒愈最後得病憊甚乃嘆曰此所謂周痺也周痺入臟者死吾其已夫已而曰吾能移之使病在末因自製藥日夜飲之人莫見其方居亡何左手足攣不能用乃喜曰可矣又使所親登東山視菟絲所生秉火燭其下火滅處劚之果得茯苓其大如斗因以法噉之閱月而盡繇此雖偏廢而氣骨堅悍如無疾者退居里舍杜門不冠屨坐臥一榻上時時閱史書雜說客至酌酒劇談意欲之適則使二僕夫輿之出沒閭巷人或邀致之不肯往也病者日造門或扶攜襁負纍纍滿前近自鄰井遠或百數十里皆授之藥致謝而去初長公主女病泄痢將殆乙方醉曰當發疹而愈駙馬都尉以爲不然怒責之不對而退明日疹果出尉喜以詩

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

謝之廣親宗室子病診之曰此可無藥而愈顧其幼曰此兒旦夕暴病驚人後三日過午無恙其家恚曰幼何疾醫貪利動人乃如此明日果發癇甚急復召乙治之三日愈問何以無疾而知曰火急直視心與肝俱受邪過午者心與肝所用時當更也宗室王子病嘔泄醫以藥溫之加喘乙曰病本中熱脾且傷柰何以剛劑燥之將不得前後溲與石膏湯王與醫皆不信謝罷乙曰毋庸復召我後二日果來召適有故不時往王疑且怒使人十數輩趣之至曰固石膏湯證也竟如言而效有士病嗽面青而光其氣哽哽乙曰肝乘肺此逆候若秋得之可治今春不可治其家祈哀强之與藥明日曰吾藥再瀉肝而不少卻三補肺而益虛又加脣白法當三日死然安穀者過期不安穀者不及期今尚能粥居五日而絕有娠婦得疾醫言胎且墮乙曰娠者五臟傳養率六旬乃更能候其月偏補之何必墮已而子母皆得全又乳婦因大恐而病病雖愈目張不得瞑人不能曉以問乙乙曰煑郁李酒飲之使醉則愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽衡不下惟郁李去結隨酒入膽結去膽下目則能瞑矣如言而效一日過所善翁聞兒嗁愕曰何等兒聲翁曰吾家孿生二男子乙曰謹視之過百日乃可保翁不懌居月餘皆斃乙爲方博達不名

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一師所治種種皆通非但小兒醫也于書無不闚他人靳靳守古獨度越縱舍卒與法合尤邃本草多識物理辨正闕誤人或得異藥或持疑事問之必爲言出生本末物色名貌退而考之皆中末年攣痺浸劇其嗜酒喜寒食皆不肯禁自診知不可爲召親戚訣別易衣待盡享年八十二終于家所著書有傷寒論指微五卷嬰孺論百篇一子早世二孫今現爲醫

劉跂曰乙非獨其醫可稱也其篤行似儒其奇節似俠術盛行而身隱約又類夫有道者數謂余言曩學六元五運夜宿東平王冢巔觀氣象至逾月不寐今老且死事誠有不在書者肯以三十日暇從我當相授余笑謝弗能是後遂不復言嗚呼斯人也如欲復得之難哉没後余聞其所治驗尤衆東州人人能言之掇其章章者著之篇異時史家序方術之士其將有攷焉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do NOT COPY

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library