PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷一

DO NOT C
East Asian Library an
Princeton Un

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/2535
v.3

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

欽使留公遠駐藏中六年來徵是集並因詔
地向無醫藥劄飭照集中所需物料
恙為購備齊全陸續附郵馳遞以便

叙

癸卯冬余刻禾藥良方一集意在便
取携而廣施濟也三年以来行之頗
效求者益多

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

給求濟衆未知果能一一經驗否也而
是書固已不脛而走矣夫良工備物
待用無遺吉人爲善惟日不足前編
祇就余遊篋所藏彙成一卷門類不
多挨疤而求尚冀缺略因又網羅舊
集採擇新知所得加三倍於前方俱
著驗而理有可信者選訂閱一寒暑
始付剞劂是編原因便於行篋而設
故凡諸大方仍畧而弗錄行初志貽
畫一也集成爰復敘而識之
乾隆五十一年冬至月桂舟王詰拄
書於四川藩署怡情育物之堂

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

子藥員方續集總目

卷一

傷寒附同傷寒辨證方

中風

類中風

傷風

痙病

痺病

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

癆病
腳氣
內傷
虛損
痿痹
自汗盜汗
卷二
失血
消渴
神病
癲狂癇症
氣病
遺精濁帶
痰飲
欬嗽喘吼
腫脹

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瘧疾
霍亂
噎膈翻胃
嘔吐噦
卷三
瀉症
痢症
黃疸
積聚
疝症
頭痛眩暈
目症
耳症
牙齒
卷四
唇口舌

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

咽喉
肩背胸脇
心腹諸痛
腰痛
小便閉癃遺尿不禁
大便燥結
卷五
婦科
胎前諸症
生育
産後
乳症
前陰
卷六
小兒初生
幼科雜症

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

卷七

外科　頭面項背腰五部

外科　眼鼻耳口唇齒舌喉胸乳十部

卷八

外科　下臀股膝脛足六部

卷九

外科　發無定處

外科雜治跌打損傷及砲子箭頭竹刺諸

物入肉湯燙火燒蟲蛇禽獸咬傷并驟馬汗

涎入瘡一切中毒急救各方均載此卷

卷十

外科　嬰兒

外科　總治

附奇症并家常宜知方

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方續集卷一

傷寒 附同傷寒辟瘟法

傷寒汗逆日夜不止寒氣攻胃也 胡椒三十粒打碎麝香五分酒一鍾煎半鍾熱服

一方 畢澄茄高良薑各等分爲末每服二錢水一碗煎十沸入酢少許服之良

傷寒汗下後結胸者 栀椰二兩酒一盞煎半盞分二服服之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

傷寒下後痞滿乃陰病下早而成痞　梹榔枳實各等分爲末每服二錢黃連煎湯下

傷寒熱病　馬梹榔用井華水每一枚用水一口嚼下數枚卽清其熱

傷寒口乾　用生藕汁生地黃汁童便各半盞煎温服

傷寒發斑狂燥熱極　急呑黃雞生雞蛋一枚速妙

傷寒脫陽大茴香末以生薑自然汁調敷臍上再用大茴香末入益元散服之

傷寒陽毒熱盛攻心昏逆者　以夏氷一塊置膻中穴卽愈穴在兩乳間陷中卽是須仰面取之方得

傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷者　以青羖羊溺一升和鹽豉搗漬

傷寒時毒攻手足腫痛欲斷　以水牛肉裹之腫消痛止

傷寒後嘔噦　野葡萄藤卽蘡薁　搗汁飲之良　並治

Digital Copy and the Rights Belong to East Asian Library Princeton University

一切噦逆兼能止渴去腸胃積垢利小便

傷寒食復病後過食難消復生煩熱 用麴一餅煮汁飲之孕婦忌服

傷寒勞復病後勞役復生煩熱 抱出雞蛋殼熬令黃黑爲末熱湯和一合服汗出卽愈

傷寒發汗不出 以火煆地用水洒之乾桃葉厚三寸席卧温覆取汗傅粉極燥卽瘥麥麩鹽砂皆可如此法用

病後勞復或因梳頭或因食物復發 取洗手足水飲之神效

同傷寒

疫氣瘟病 以水獺肉煮汁服之卽不傳染

時行熱狂 臘月以紅沙糖入瓶內密封窖糞坑中臨症絞汁服之甚妙

辟穰瘟疫 揀白馬骨絳袋盛佩男左女右

一方 取赤馬蹄絳袋盛佩男左女右

一方 臘月除夜以小豆川椒各七七粒投井中勿令人知能却瘟疫及一切病症

East Asian Library and the Princeton University Library Digitized by Google

一方 元旦以大麻子三七粒投井中勿令人知

一方 冬至日取赤雄雞作臘至立春日煮食至盡勿分他人

一方 明雄黃末菜油調搽兩鼻孔早晨飲雄黃酒一杯

一方 黑豆一撮暗投井中或缸內勿令人知

一方 入病人家先用麻油搽兩鼻孔出則撚紙捻挑鼻取嚏不患傳染

辟瘟吉祥如意香 蒼朮二觔甘松一兩白檀香五錢研末煮紅棗肉爲丸如龍眼大黃丹爲衣晒乾焚之

一方 以艾灶密燒床之四角勿令人知

一方 病人衣服以甑上蒸過他人衣着不患傳染

辟四季時疫 以貫仲一個浸水缸中日飲其水不患時疫

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

中風是症先宜取嚏開噤吹鼻探吐

卒中不省取嚏法 通關散即南星皂角細辛薄荷
生半夏等分爲末吹鼻中有嚏可治無嚏多死

卒中口噤軟噤法 開關散即烏梅肉氷片生南星
各等分爲末擦牙軟之即開

卒中不省薰鼻法 用巳豆油紙捲皂角末燒烟薰
鼻自省

卒中口噤難言解語法 取竈尿點在舌下言語自

East Asian Library
Do NOT COPY
Princeton University
Gest Collection
Library

易

卒中口噤難開湯藥難下者　用開關散調如麪茶含在不病人口內用筆管或葦管插入病人鼻孔使氣連藥吹之其藥自能入咽不可用金器撬之恐傷其齒

中風痰涎壅盛無汗表實者　用三聖散卽防風蔾蘆瓜蒂等分爲末服之取吐　有汗裏實者　用瓜蒂散卽瓜蒂熬黃赤小豆等分另爲末每取錢大一匙以香豉一合熬湯七合煮作稀糜去渣取汁和散溫頓服之不吐者少加服得快吐卽止勿再過服致傷胃氣或加全蠍二方乃吐之輕劑也

中風痰涎壅盛重者　五元散卽蔾蘆赤小豆白礬皂角胆礬爲末服之取吐　或用巴礬丸卽巴豆枯白礬爲丸服之取吐二方乃吐之重劑也

中風腹滿便閉神昏口噤結痰不下者乃風邪中藏府之閉症也

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

奪命散卽巴豆白芷半夏藶蔍生南星等分爲末
服之取吐卽愈亦治尸厥氣實兼痰
卒中不省口眼喎斜半身不遂四肢厥冷六脉沉伏
寒盛而氣實者不問經絡藏府皆可治之　三生飲卽生南星
一兩生川烏生附子俱去皮臍各五錢爲末每服五錢
薑煎服若氣虛者每服加人參五錢虛極將脫者
水大倍之方不致倒戈之患也並治痰厥氣厥
卒中痰湧喎斜癱瘓氣實者不問經絡藏府素有痰飲之人卽宜用之
青州白丸子卽半夏水浸至生衣七日南星白附
子各二兩川烏去皮臍五錢俱生爲末袋盛水擺
出粉再濾再擺以盡爲度磁盆盛貯日晒夜露春
五夏三秋七冬十日糯米爲丸痰盛薑湯下癱瘓
酒下又爲治小兒驚痰妙藥薄荷湯下
宣吐風痰　連殼蝦米半觔入葱薑醬煮汁先喫蝦
後喫汁緊束肚腹以雞翎探引取吐
卒中不省　先以麝香二錢研末入清油和勻灌之

Do not copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

通竅卽甦後免語蹇癡瘋之症

一方 防風荊芥各一兩升麻五錢生薑三片水二盞煎一盞以半盞將絲瓜子仁研取漿水以半盞和勻灌之如手足麻癢以羌活煎湯洗之

一方 生白礬三錢研細末生薑搗汁調灌卽醒

中風頭眩 烏驢頭肉一枚如常治法入豉汁煮食良

口眼喎斜 巴豆去油一錢研末麝香二錢用棉花一塊放病人手掌上中留一孔入二藥末貼掌心以錫壺盛滾水放在面上熱卽熨之喎左熨右喎右熨左壺冷卽換正卽去之

一方 黃鱔魚血同麝香少許左喎塗右右喎塗左正卽去之

一方 水牛鼻不拘乾濕以火炙熟如前法熨之俟口喎 丹雞冠血塗頰正卽洗去如前法塗之

Digitized by the Gest Collection
Princeton University
East Asian Library

一方 生鹿肉割片同生薑搗貼正卽洗之貼如前法

風症喎僻骨疼煩燥 烏驢皮焙去毛如常治淨蒸熟入豉汁中和五味煮食之

風症煩熱皮膚癢癢 醍醐卽酥上如油者 四兩每用温酒和半匙服之每日一服

心肺風熱手足痺不隨筋脉五緩恍惚煩燥 熊肉一斛切入豉汁中和葱薑椒鹽作腌臘空腹食之自愈

類中風與眞中風相似但無口眼喎斜偏廢不仁不用等形尸厥脉動無氣乃正氣暴爲邪氣閉塞故靜而似死及卒死皆爲尸厥也　菖蒲屑吹兩鼻孔中仍以桂屑着舌下即活如不活即剔本人左角髮方寸燒末酒和灌令入喉即起髮乃血餘血乃心生用燒則發其陽酒行氣血剔本人者取一氣相通也

卒死壯熱爲陽厥府病也　礬石半觔以水一斗半煮消以漬脚令沒踝自然熱退人醒

卒死目閉爲陰厥藏病也急着人騎牛臨患人之面用薤搗汁灌耳中吹皂角末於鼻內立效騎牛臨面蓋厥邪之法也

卒死口張身反亦陰厥藏病急灸手足兩爪後十四壯畢飲以五毒諸膏散藥要有巴豆灸手足甲後以通外陽法也

卒死四肢不收失便亦陰厥藏病馬屎一升水三斗煮二斗以洗之又取牛稀糞名牛洞一升温酒灌口中灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯卽瘥馬屎乃取吐灸乃通外陽法也

卒然昏死卽尸厥也以大豆二七粒用雞子白并酒和吞之

一方羚羊角作末蜜調服飲新汲水三升甚佳

卒死臘月收雄狐胆臨症急以温水灌入喉中卽活移時則不及矣

East Asian Library and the Gest Collection
Digitized by Princeton University Library
DO NOT COPY

卧忽不省乃中魘也 切勿以火照之火照則殺人但唾面痛嚙其踵及大趾中際即活以犀角爲枕即不魘

一方 青牛蹄甲或馬蹄甲臨人頭上即活

惡風入腹 用鯉魚長一尺五寸者以尿浸一宿平旦以木飽從頭貫至尾炙火炙熟去皮空心頓食切忌用鹽醋

卒中五尸 生猪脂一雞子大苦酒一升煮汁灌喉中即活

驚怖卒死 温酒灌之即醒

中惡客忤卒死 韭菜一把烏梅二七個吳茱萸炒半升以水一斗煮之將病人櫛置於中煮三沸櫛浮者生沉者死煮取三升去渣分數次飲之

卒中山嵐瘴氣頭身重痛或昏甚良 屠牛角磨水服之便泄浮腫

一方 羚羊角末水服一錢即愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

一方及中惡客忤　麝香三分研細末醋和灌之卽醒廣利方

鬼擊卒死　吹醋少許入鼻中卽醒

中惡卒死　斷猪尾取血飲之并縛豚枕之卽活

一方　薤白作汁灌鼻中卽醒韭汁亦可肘後方

一方　紅雞肝及血塗面上以灰圍四旁立起

一方及驚忤　雄雞冠血入筆管中吹鼻內卽起

一方　鷹屎白燒灰酒服方寸匕（卽數分）勿令本人知之

卒中惡毒風邪而死或昏亂不識人　羚羊角燒末酒調服之

卒中惡症　取虎皮燒灰飲之或繫衣服甚驗

中惡卒死或先病痛或卧而忽絕　取白雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口外以竹筒吹其下部急則易入氣通卽活也

中惡卒死或吐利不止不知是何病症無論大人小兒　用馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁亦可此方散法也赤白馬糞

East Asian Library Princeton University NO COPY Under the Gest Collection

俱可用

中暑卒死或昏眩煩悶欲絶　大蒜一握道上熱土搗爛以涼水和飲一碗卽醒

一方　用熱土圍臍將熱尿灌於中間卽活

中風中暑中氣中毒惡乾霍亂一切卒暴之病　生薑汁與童便服之立可解散蓋薑能開痰下氣童便降火也

小兒卒死而吐利不知何症　犬屎一丸絞汁灌之卽愈無

濕者水煮乾者取汁

卒然昏厥四肢不舉　用瓜蒂散方見類中核痰者用作湯數鍾飲一鍾隨用指探吐不吐再飲通快卽止若因感受寒風者以薑作湯探吐之尙因過飽或緣憫怒氣塞胸中者以鹽作湯探吐之卽愈

長途中暑昏憒不省蒸蒸自汗而垢喘渴壯熱心煩或兼嘔瀉中陽暑也　初中不省急以熱物熨臍蒜汁合水灌之卽醒繼服辰砂益元散神效

Not a Digital Copy
Courtesy of the East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

辟惡瘧疹
家用　胡荽懸掛壁間能辟邪惡

傷風宜分氣虛氣實寒邪傷肺熱邪入腦
發散寒邪　胡椒丁香各七粒碾碎以葱白搗膏和
塗兩手心合掌握定束於兩大腿內側溫覆取汗
即愈

一切風寒　神白散白芷一兩甘草五錢淡豉五十
粒薑三片葱白三寸水煎服取汗忌婦人窺探并
雞犬并宜至誠乃效

一方　葱白一握淡豉一升名葱豉湯　肘後方　傷寒

初起頭痛身熱亦宜此二方以代麻黃加阿膠治胎動

傷風有汗　白朮防風各二兩炙甘草一兩分二服水煎服之

虛傷風兼內傷　香附紫蘇各二錢陳皮去白一錢甘草七分加薑蔥煎服

熱邪入腦而成鼻淵鼻流濁涕也症見目眩頭疼濁涕不止鼻中塞熱甚至孔熱而痛及其腦者　蒼耳散即蒼耳子炒去刺研破一兩加辛夷三錢白芷薄荷各一錢爲末以蔥白三莖煎湯沖服以散熱邪自愈

鼻淵日久熱深鼻孔成瘡而痛　以豬胆汁調氷硼散敷之

鼻淵日久　奇授藿香九藿香連枝葉八兩研細末雄猪胆汁和九梧子大每服五錢食後蒼耳子湯下或黃酒送下

齆鼻不通　乾薑末蜜調塞鼻中即愈

齆鼻作臭　雄雞腎一對與脖前肉等分入豉七粒

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Digitized by Google

焙研以雞子清和作餅安鼻前引蟲出忌婦人雞犬見之

鼽鼻不通 內生瘜肉 北細辛爲末吹少許入鼻曰二次

一方 氷片爲末點之瘜肉自化並治耳聾

散寒發汗 胡荽初起無藥 飲百沸湯酸薑水揉肚探吐汗出卽已密煖房中以熱湯澡浴亦發散之一法

痙病 症見項背強直手足反張剛痙無汗柔痙有汗剛實柔虛虛宜補正爲主實宜去邪爲主

風痙項強身急 取活鼠去五臟乘熱貼之卽瘥

產後搐搦強直 乃因去血過多風邪乘虛入藏與破傷風同不可誤作中風而治

魚鰾膠一兩以螺粉炒焦爲末分三服煎蟬脫湯下其驗不可發汗

產後風痙 角弓反張口噤攣搐五緩六急手足麻痺頭暈眼眩嘔吐煩悶惡血不下等症宜

產寶方小黑豆一升炒令極熟投清酒三升令熱

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

飲其汁自半鍾至一鍾得微汗身潤則風邪除矣
如無前症産後亦宜飲之能逐敗血散結除痛免
疾

産後風痙身體强直　黑荆芥揚爲末入童便調勻
熱服口噤者挑齒灌之或灌鼻中神效并治産後
血暈名華陀愈風散忌風

發痙因破傷風襲角弓反張牙噤項强　雄鼠一頭和尾燒灰以臘
脂和敷甚妙

痺病因風寒濕三氣雜合而成風勝爲行痺寒甚爲痛痺濕甚爲着痺又有五痺之名皮脉肌肉骨也久痺邪入於藏又有肺心脾肝腎五痺之名也更有腸痺胞痺三焦痺胃痺冷痺熱痺種種名色再有周痺痺症同脉痺患有定處脉痺則左右相移也近言痛風流火歷節白虎諸症皆行痺之俗名也

風寒濕痺五緩六急　常食烏骨母雞即愈

濕痺風痺風痺即行痺其痛流走濕痺即着痺其痛重着　用烏龜肉和五味煮食之以微瀉爲效

一方　生薑搗汁和黃明膠熬膏貼之甚妙

East Asian Library, Princeton University © Knight Cox Collection

風寒濕痺　醍醐即酥上油二兩温酒每服下一匙甚效

行痺歷節疼痛　黑驢骨煮湯浴之

一方　虎脛骨酒炙三兩沒藥七兩去油爲末每服三錢温酒下日三服

一方　歷節走痛　虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛置二斗於清酒中浸五宿隨性飲之甚妙

一方　熊骨煮湯洗浴之

一方　牛皮膠一兩薑汁半盃同熬成膏攤紙上熱貼之冷即易神效一方加乳香

白虎風痛　即行痺痛見晝靜夜劇　虎脛骨塗酥炙黃黑色附子炮製去皮各一兩爲末每服二錢酒下日二服

一方　三年醯醋五升煎五沸再入葱白三升煎一沸濾出以布染水乘熱裹之痛止爲度

痛風癱瘓　亦行痺也　紫荊皮炒肉桂不見火草烏炒小回炒甘草炒各等分爲細末和勻每服一錢臥時用好陳酒送下避風痛輕者三四十服甚者五

六十服自愈

筋骨急痛爲寒勝新痛多寒若久痛則熱　虎骨和通草煮汁空肚服半升覆卧少時汗出爲效切忌熱食損齒小兒不可與食恐齒不生

筋攣骨節疼痛屈而不伸筋痺也　松節散茯神心木一兩乳香一錢石器內炒研每服二錢木瓜湯下

骨節疼痛亦筋痺也并治肌痺　白芥子爲末醋研敷之凡風腫毒氣亦可敷之

筋骨疼痛亦筋痺也　鼈一個取肉分作四脚每用一脚人天花粉枸杞子各二錢二分雄黃五分麝香五分槐花三錢水一碗煎服

一方　鹿角燒存性爲末須極細每以酒服二錢日二服

肌痺肌肉頑木不知痛癢　駱駝峰脂卽背上肉鞍內油名曰峰子以火炙熱摩之取熱氣透內自愈血治風瘡惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮及腕損筋骨

East Asian Library Boston University Princeton University Library

面上木痺亦屬肌痺生牛皮膠化開和桂末厚塗一二分良甚

脚底木硬亦屬肌痺生牛皮膠以生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之

周痺患有定處痛無歇止或上及下或上及下駱駝肉鞍肉脂鍊淨一觔入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服其症內不在藏腑而外未發於皮獨居分肉之間乃眞氣不周之故也

一方兼見緩急偏廢（即數分）薏苡仁十五兩大附子炮製十枚爲末每服方寸七日二服治痿躄更妙孕婦忌服

心痺心痛或心煩悸嗌乾噫氣有時而恐（即叭病脈痺復感於邪而致也）取白狗心血和蜀椒末爲丸梧子大每服五丸日五服

骨肉疼痛額角紅腫不可忍芸薹菜葉搗敷隨手而愈

腰脚肢腿疼痛不能履地以葡萄根及藤煎湯淋洗即愈

諸風脚膝骨中疼痛以鹿蹄肉同豉汁

East Asian Library Collection
Do not copy or circulate
Property of the University Library

五味煮食之甚妙

一切風毒骨節疼痛

更佳

骨中一切風症　黑驢皮膠煎食之卽止酒服黑驢毛一觔炒黃投酒一斗漬三日空心細飲令醉煖卧取汗明日如前再飲之自愈忌陳倉米麪

風痺　採經霜桑葉煎湯洗手足卽愈

風歷頑痺腰膝疼痛　傳信方海桐皮薏苡仁各二兩牛膝川芎羌活地骨皮五加皮各一兩甘草五錢生地十兩酒二斗浸之旱中晚飲常令醺醺自愈是方藥味不宜增減

風冷氣痺　以百沸湯淋洗脚至膝厚覆取汗取其助陽氣行經絡耳

痿病 痿有心肝脾肺腎五症皆因肺熱而生症見皮毛焦痿弱痺病則通身肢節疼痛也痿症不可用風藥以痿多虛痺多實

丈夫脚冷不能行走並不隨人者 醇酒三斗水三斗入甕中灰火温之漬脚至膝常着温火勿令冷三日方止自愈

諸痿 蒼朮黄柏爲末服之爲二妙散加牛膝爲三妙散

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
CC-0. In Copyright COPY

脚氣此乃內有濕熱外感風寒相合爲病發時則往來寒熱而似傷寒火盛則兩脚腿痛腫其熱如火寒盛則不腫不熱而痛名曰乾脚氣濕盛則重腫表實宜汗裏實宜下濕盛宜逐寒濕宜消中兼溫寒虛宜補濕熱分虛實其中又有名鶴膝風者即兩膝腫大疼痛膝上至髀膝下脛足枯細但存皮骨狀若鶴之也有病風之名者症同鶴膝風病後得

脚氣疼痛屬寒

帛裹之取汗永不再發

寒濕脚氣 牛皮膠一塊經切麪炒成珠研末每服以羊角一副燒爲末熱酒調塗以

一錢酒下其痛立止

一方 以麋皮作鞾鞮永除其患麋皮亦妙

一方 川椒二三升疎布囊盛之日以腳踏并煎湯洗足卽自瘥也花椒葉亦可洗之

脚氣壅痛 壅者衝上也 以沙牛尿一盞磨棬榔一枚空心煖服

脚氣疼痛 熊肉半觔切入豉汁中和蒸薑鹽作臛臘空心食之並治風痺五緩筋骨

脚氣痺弱 水牛乳或黃牛乳五升硫黃三兩煎厭三升每服三合羊乳亦可

軟脚氣 豺狗皮熟之纏裹患處卽瘥

風毒脚氣痛腫而熱 猪肝和生膾食之取利

脚氣濕盛重腫 腊濕餅子卽黑白丑頭末甘遂末各五錢蕎麥麪一兩五錢水和作餅每以三錢煮熟空心茶清服逐之

脚氣衝心 症見嘔吐喘滿若目額皆黑恍惚讝妄則難痊也 棬榔爲末以

Do Not Copy
Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

內傷勞役傷元氣宜補有熱中寒中濕熱暑熱火鬱之分飲食傷胃府宜消有飲食失節過於温涼之不一

上氣喘嗽煩熱食卽吐逆白沙糖薑汁等分相和漫煎二十沸每嚥半匙取效

過食脯腊筋痛悶絶酸漿水煮入少許鷹屎和食卽愈

過食瓜菓停滯不化以生熟湯飲之卽解以口中如酒菓氣味爲效

過食菱角腹脹　煖熟薑酒仍燒菱角服之卽消

過食荔枝　發熱煩渴口乾齒衄血　飲蜜漿一杯卽解

一方　致醉而煩熱者　卽以荔枝殼浸水飲之解

食氷太過而患脾疾百藥不效者　以氷煎大理中九服之卽愈　此楊介治宋徽宗之方取治受病之源也

脾弱不食　大豆黃二升大麻子三升熬香爲末每服二合飯下日四五服孕婦忌之

脾胃虛冷　乾薑以漿水煮透取出焙乾搗末作粥爲丸梧子大每三五十丸白湯下

脾胃虛冷腹滿刺痛　黃肥狗肉半觔用水同鹽豉煮粥頻食一兩

脾胃虛弱飲食難化無力肌瘦　用乾薑炒研四兩以白餳切塊水浴過入鐵銚溶水和丸梧子大每空心米飲下三十丸

脾胃虛弱水穀不清噫氣吞酸吐食及霍亂泄瀉膿血臍腹疼痛裏急頻併不思飲

Do not copy
Princeton University
East Asian Library and the Gest Collection

食諸症　象肉四兩炒肉豆蔻炮只殼炒各一兩柯子肉炒甘草炙各二兩乾薑五錢炮共爲末每服二錢水一盞煎八分和滓熱服食前每日三服

脾胃虛弱惡心不欲飲食　虎肉半觔切以蒸椒醬（開口）調炙熟空食如熱食則損齒

脾胃虛熱　猪脾同陳橘紅人參生薑蔥白陳米煮羹食之

脾虛胸膈不快不進飲食　用蓽澄茄爲末薑汁和神曲爲丸梧子大每薑湯下七十丸日二服

久患吞酸諸藥不效　用魚膾（鮮活魚薄切洗淨血腥沃以蒜虀薑醋五味而食是也）食之卽愈勿夜食及飲冷水

食卽汗出（乃脾胃虛也）　猪肝一具薄切瓦上焙乾爲末煮白粥絹絞汁衆手爲丸梧子大空心服下四五十丸日五次

食後善嘔（卽數分）　鹿角燒末二兩人參一兩爲末薑湯服方寸匕日三次

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
No copy

消食酒糯米諸積　陳米麴研末酒服立愈

酒積面黃鼓脹　以猪項肉一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨乾食之酒下卽愈

中酒嘔吐煩亂　煮赤小豆汁徐徐飲之卽愈

酒後暴熱　冬至後第三戌日爲臘收取是日雪溫服之

諸果成積　麝香一錢生桂末一兩飯和丸菉豆大大人十五丸小兒七丸白湯下

醋心吐水　檳榔四兩橘皮一兩爲末每服方寸匕空心蜜湯調下

嘔吐痰水　白檳榔一顆烘熟橘皮二錢五分炙爲末一盞煎半盞溫服

腹中緊脹　白糖以酒三升煮服之不過一服卽愈

好食茶葉　每日食榧子七枚以愈爲度

磨麪食殺三蟲　野灰藿菜子作飯食之卽愈

壯胃健脾　白羊肉三觔切碎粱米二升同煮下五

East Asian Library Princeton University Do Not Copy Digitized by the Internet Archive Collection

味作粥食

健脾能食　猪舌和五味煮汁食之

補脾　臘月以黃牛脾淡煮日食一度卽健運矣

健脾進食飲酒不醉　乾葛粉白蔻仁砂仁丁香各五錢甘草百藥煎各一錢木瓜四兩炒鹽一兩爲末不能飲者温酒調服一錢卽能飲名醉鄉寶屑

病後胃弱不能飲食　蓮肉膏蓮肉糠米俱炒各四兩白苓二兩共爲末白糖調作膏每五六匙白滾

湯下

脾胃虛弱久服益精神悅顏色　太和膏淮山藥芡實蓮肉白苓各二兩早米糯米各半升入白糖蒸餅常服極妙二方無論大人小兒俱可用之

酒多致病　長壽仙人柳晒乾爲末每服一錢温酒調下

汗出不滴腰脚瘦怯並耳聾者　米醋浸荆三稜夏四日冬六日爲丸醋湯調下二錢卽瘥

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

肚腹脹滿飲食如常乃濕熱生蟲之象勿作水鼓治　石榴桂樹東引根皮梹榔各五錢空心服瀉下怪血卽愈此夏成方也

酒菓過度積熱極脾多食多飲小便頻數非消渴也　麝香當門子以酒濡作十許丸棘枸子煎湯吞之卽愈

傷粽成積　神麯炒爲末少加木香鹽湯下數日口中聞酒香其積卽散

腹脹有水食者宜之　蔓菁子搗研濾汁飲之或吐或利腹中自寬得汗愈

DO Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

虛損陰陽氣血榮衛精神骨髓津液俱不足爲虛外而皮膚肉筋骨內而肺心脾肚腎消損爲損日久不愈復因陽虛外感於寒陰虛而生內熱或因飲食勞倦而成五勞七傷六極也五勞者心肝脾肺腎也七傷者恐懼傷精怵惕思慮傷神喜樂無極傷魄悲哀動中傷魂憂愁不已傷意盛怒不止傷志勞倦過度傷氣六極者筋極肉極血極骨極精極氣極也

補益虛損　甘枸杞和羊肉作羹以粳煮粥入葱豉五味食之甚妙

一方　烏毛骨雄雞一隻治淨五味煮極爛食之如

DO NOT COPY
Property of the Gest Collection
East Asian Library
Princeton University Library

生反損人

一方　水芝丹蓮子半升酒浸三宿以公猪肚一個洗淨入蓮在內縫定煮熟取出晒乾爲末酒煮米糊丸梧子大每服五十丸食前温酒送下如小便頻數下焦眞氣虛弱者以醋糊爲丸服之

潤肺氣助五臟生津液虛損人心肺燥熱要法　白沙糖取堅白成塊者和棗肉巨勝子二末爲丸噙之

虛勞不眠　乾薑爲末煎湯服三錢取微汗良

虛勞口乾　青羊脂一雞子大醋酒半觔棗七枚漬七日食之立愈

虛勞尿精　法製鹿角白膠二兩爲末酒二升和温服

虛勞尿血　鹿角白膠三兩炙水二升煮一升分四次服之

虛勞白濁　青羖羊脊骨炙爲末酒服方寸七日三服　即數分

East Asian Library Princeton University Do Not Copy and the Gest Collection

腎虛陰痿身體羸瘦精力衰少用豬腎獖音樊卽豬也一對切片枸杞葉半觔以豉汁一盞同椒鹽煮羹食之

虛勞腎損夢遺精滑溺白濁韭菜子爲末空心温酒調服卽愈

腎虛精竭羊腎一對切於豉汁中以五味采揉作羹粥食之

盜汗遺精法製鹿角白膠霜二兩生龍骨炒牡蠣煆各一兩爲末酒糊九梧子大每鹽湯下四十九

陽痿便數面色無光鹿茸酒煖鹿茸酥炙一兩切片山藥末一兩絹袋裹置酒中七日開瓶日飲三杯將茸烘作丸服之但須節慾爲妙

夢遺便溏牡蠣粉醋糊爲丸桐子大每用米飲下三十丸

男婦虛勞咳唾膿血以津符子產雲南口外緬甸地方每日啖十枚一日勿間斷自愈治肺癆肺痿同方

肺痿咳唾膿血苡仁十兩杵破水三升煎一升酒

First Asian Digital Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

少許服之

肺痿咳嗽傷中脉絶　鹿髓煎鹿茸生地汁各七合

酥蜜各一兩杏仁桃仁各三兩去皮炒酒一升同

搗取汁先煎杏桃地黃至減半再入鹿髓酥蜜煎

如稀餳退火氣每舍一匙嚥下日三次

肺損嘔血開胃止嘔　阿膠炒二錢木香一錢糯米

一合半爲末每服一錢百沸湯點服日一服

肺痿吐血　鹿血和酒服即止

勞損風濕　黑牛髓或黃牛髓羊脂各二勫白蜜汁

薑汁酥油各三升煎三上三下令成膏隨意以温

酒和服之

勞傷虛冷　肥白羊肉一腿蜜蓋煮爛絞取汁服並

食肉

令勞及臟虛冷泄久滑及赤白帶下　猪子肝一葉薄批

搵着煨熟訶子末炙之再搵再炙盡末半兩空腹

細嚼陳米飲送下

Digital Copy Courtesy of the East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

骨蒸虛冷　白毛羊肉一觔山藥一觔各煮爛研如泥以米煮粥食之

思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸　龍眼肉酸棗仁炒黃耆炙白朮焙茯神各一兩木香五錢炙甘草二錢五分咬咀每服五錢薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾服亦名歸脾湯

心下怔忡夜多惡夢健忘　每日空心食海梧子出林邑十數枚月餘自愈

骨虛勞極　鹿角二兩炙牛膝酒浸焙一兩五錢爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

虛損勞傷　羊腎一枚治淨米一升水一斗煮九升服日三服

精血耗涸　鹿茸去毛酒蒸當歸酒浸各一兩焙爲末烏梅肉煮爛搗丸梧子大每米飲服五十丸

久患寒熱經年不愈　十一月內令病人坐石槽中平旦用冷水灌至百數冷顫欲死良久冷汗出以

粉撲之即愈此華陀治一婦人之奇方也

憤患冷疾　冬月冰雪時令病人解衣坐石上取新汲水從頭洗之盡一百斛定俟背下有熱氣時覺不可忍爲驗永不再發此徐嗣伯治大將房伯玉之妙方也

陰血不足　補陰丸用龜下甲酒炙地黃各六兩黃柏鹽水浸炒知母酒炒各四兩石器爲末以猪脊髓和丸梧子大每服百丸空心溫酒下一方去地黃加五味炒一兩

勞傷吐咯血　水牛髓一枚塗紙上陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一觔香油四兩熬乾爲末每空心燒酒服二錢七分

肺痿吐血　黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調下

上氣虛乏欬逆勞熱　以猪獾肉和五味煮食神妙

心虛煩熱少睡多渴　小麥作飯食之

East Asian Library Princeton University Digitized by Google

瘈瘲瘵久病虛弱即成瘈氣血兩敗爲瘵形壯能食不瀉者可治形衰不食溏瀉者主死是症久則有腹生惡蟲身死後多遭傳染名爲傳尸瘈

天炙瘈瘵　八月朔日清旦收取百草頭上露水點膏盲穴最爲神妙

一方　每逢癸亥日以艾炙兩腰眼各七壯內服青麟丸自愈

瘈瘲累年　日煮鰿魚食之卽愈　鰿魚卽桂魚也

一方　白鱔魚任意煮食之

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瘧瘵失血　龜肉和蔥椒醬油煮食補陰降火治虛瘧失血咯血咳嗽寒熱累用經驗六甲日不可食猪肉菰米瓜蒟不可合食

瘧痢　黃狗頭骨和乾薑莛茗炒見烟爲丸空心白飲服十九極效　久痢同方

傳尸瘧及童子瘧症　猫屎須撿房上晒乾色白者多收之以土焙極乾火煨研粉每晨服二錢黃糖拌食不可間斷屢效良方

追取瘧蟲　臘月取白兔屎四十九粒兔屎名明月砂硇砂如兔屎大四十九粒爲末生蜜丸梧子大月望前以水浸甘草一夜五更初取汁送下七丸有蟲下急鉗入油鍋內煎殺三日不下再服以下爲度方名明月丹

一方　水獺足爲末酒服可殺其蟲如前法除之獺肉及肝並可

一方　取黑貓肝一具生晒研末每於朔望五更時

酒調服之亦如前法殺蟲自愈

骨蒸癆熱　採青蒿葉以童便和搗取汁熬膏每日以白飲送二錢自愈

一方（日晡潮熱）　秦艽柴胡各一兩甘草五錢爲末每服二錢聖惠方

傳屍癆　危氏神授丸川椒炒出汗（開口）爲末米飲下三錢昔有人患是症遇異人傳此方服至二劑吐出蟲如蛇而安脯胃素弱者忌服

癆瘵　猪腎一對童便二分酒一分瓦罐煨熟五更食如此服至一月卽愈

傳屍癆　獺肝先獺肝烘乾爲末水服二錢日三服以瘥爲度

癆瘵　多煮饅魚食之自愈亦治蟲心痛多吐冷氣上攻滿悶

Do Not Copy
East Asian Library
Princeton University
Digitized by the Internet Archive Collection

自汗盜汗無因汗出曰自汗睡則汗出覺則汗止曰盜汗自汗汗出惡寒爲表陽虛蒸熱汗出不惡爲裏陽實盜汗有心虛不固心火傷陰之分

自汗盜汗　每夜卧時帶飢吃蒸餅一枚不過數日即止

虛汗盜汗　浮小麥帶皮文武火炒爲末每服二錢五分米飲下日三服或煎湯代茶飲之

盜汗　椒目（閇口）微炒碾細用五分生猪上唇煎湯一合睡時調服極效椒目能行水又治水蠱也

自汗不止　糯米龍骨牡蠣各等分爲粉撲之卽止

斂汗　麻黃根牡蠣粟米或糯米各等分爲粉袋盛撲之或入煎劑

盜汗　五棓子焙研細末以自已溲口水調敷臍上

神效鄭贊襄方

汗出不止服固表藥而不效者　酸棗仁炒研同生地白芍北味麥冬竹葉龍眼肉煎服卽止

夜汗不止衣被皆透多年不能瘥者　採帶露桑葉焙乾爲末每日空心米飲下二錢數日卽愈

East Asian Library, Princeton University
Do NOT Copy
Digitized by Google Collection

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
Princeton Theological Seminary Library

童便薑汁温酒調服

脚氣總治方　防己煎服自愈　屬濕則腫加苡仁蒼朮木瓜木通屬熱則痛加黃柏香附木香屬風加羌活蕙蘚屬痰加竹瀝南星活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加胆草總以防己爲主藥

寒濕脚氣熟艾炙入襪內穿之自不發丹田氣弱臍腹冷者用以裝袋兜臍腹甚妙

二方　才公昏前舅姑以利早晚

三升煮分二服若一服得以快利即停後服

脚氣　赤小豆袋盛朝夕踐踏之自愈

一方　常以鯽魚作膾食之良並治上氣

早晚痞結　舅舅不知不早痞結

方劍綱自有不早成痞之症切

但仍不識姑故书記之

此条恐係錯出脚氣仍安脾是仍支部位先著了戴門又記

Donor Copy at the Gest Collection
East Asian Library
Princeton University Library

童便薑汁温酒調服

脚氣總治方　防己煎服自愈　屬濕則腫加苡仁

蒼朮木瓜木通屬熱則痛加黃柏香附木香屬風

加羌活蕃薤屬痰加竹瀝南星活血加四物大便

秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂

枝威靈仙痛連脇加胆草總以防己爲主藥

寒濕脚氣　艾炙入襪內穿之自不發丹田氣弱

臍腹冷者用以裝袋兜臍腹甚妙

一方　甘松香煎湯洗即愈

風毒脚氣　桑枝一升細剉炒香水三升熬至二升

一日服盡名桑枝煎

一方早晚痞結脇塊如石昏困且死者　杉木湯杉木節一升橘葉

一升無葉以皮代大腹檳榔七枚連子搥碎童便

三升煮分二服若一服得以快利即停後服

脚氣　赤小豆袋盛朝夕踐踏之自愈

一方　常以鯽魚作膾食之良並治上氣

Do Not Copy. East Asian Library Princeton University Collection