PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷二

DO NOT CIRCULATE
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/2535
v.4

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方續集卷二

失血

九竅一齊出血曰大衄鼻血曰鼻衄鼻血如泉曰腦衄耳出血曰耳衄目出血曰目衄皮膚出血曰肌衄齒牙出血曰齒衄又曰牙宣若從口出爲內衄有嗽血唾血咯血欬血嘔血吐血又有溺血淋血又有肺癰咳吐膿血及腸風下血臟毒下血臟毒血多濁腸風血多清

大衄不止　阿膠炙二兩蒲黃炒黑五錢每服二錢水二盞生地汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳自愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

九竅出血不止　新汲水隨左右洗足卽止

一方　用冷水噀面卽止

一方　新汲水浸紙貼顖門上以熨斗熨之立止

鼻衄　醋和胡粉半棗許服之

一方　用醋和土塗陰囊乾卽易之

一方大蒜搗碎塗脚心止卽拂去取以引熱下行之意也

一方　黃鱓血滴數點於鼻中卽止

一方　海螵蛸同槐花末吹鼻中卽止

鼻衄不止　乾薑削尖煨塞鼻中卽止

一方　取老鴟鳥翅間大骨微炙研末吹鼻中卽止

一方　鯉魚鱗炒成灰每冷水服二錢甚效　普濟方

一方　牛耳垢車前子末等分和勻塞鼻中卽止

一方　白馬屎敷頭頂卽止

一方　黑驢屎燒灰吹鼻中卽止

一方　猬皮燒灰吹鼻中卽止

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方　藕節搗汁飲之并塗鼻中

鼻衄成碗　每早辰吞生雞蛋三四枚內加白芨細末三四分服至五七日永不再發忌燒酒炙煿等物

鼻衄垂危　以溺器中垢新瓦上烘乾研細五錢麝香少許用溫水一碗調勻緩緩服之

鼻衄時作　乾鹿血炒枯將酒酹先薰二三次仍用酒酹半盞服之

鼻中涕血　以三煉酥中精液灌鼻中日三夜一最良

鼻淵腦衄　藕節川芎焙研爲末每服二錢米飲下

腦衄　麝香水片胎髮灰各一錢爲末吹鼻中三兩次即愈

牙宣露痛　絲瓜根藤臨用時火煆存性研末擦之

海上方

一切吐血　四聖飲生地熟地側柏葉藕節各四錢

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

水煎服

一方　菜豆一升頭伏天將白布爲袋以豆裝入縫口入遠年糞窖內浸七日取出二伏天連袋繫於長流水中漂七日不可着地恐生豆芽三伏天將豆日晒夜露七日去袋入砂罐內煮爛每日早晚用白蜜一鍾豆半鍾和勻煮汁送下極妙

吐血不止　黑乾薑爲末童便調服二錢卽愈

一方　阿膠炒二兩蒲黃炒黑六合生地黃三升水五升煮三升分服

吐血成斗命在頃刻　藕汁一碗韭菜汁一碗側柏葉汁一碗俱澄淸末髮灰五錢攪衆末三錢入瓶內重湯煮一炷香取出待溫入童便一杯黃酒半杯對之頻頻溫服去柏葉末攪衆末亦可

吐血色似鵝鴨肝　日久不止　用生犀角生桔梗爲末酒服二錢

吐血咳嗽　寶珠山茶花瓦上焙黑色調紅糖日服

East Asia Library University of California Berkeley Collection

不拘多少

一方　寶珠山茶十朶紅花五錢白芨一兩紅棗四兩水煎一碗服之渣再服紅棗不拘時亦取食之

吐血喘咳　青羖羊角炙灰二枚桂末二兩爲末每服一匕糯米飲下日三服

卒然吐血　海螵蛸末米飲下一錢神效

一方　先食蒸餅兩三個以榧子爲末白湯服三錢日三服

一方　雙荷散藕節荷蒂各七個以蜜少許搗爛用水二鍾煎至八分去滓溫服或爲末丸服之亦可

勞心吐血　蓮子心七個糯米二十粒爲末酒服此臨安張上舍方也

吐下血不止　煮芫荽汁服下

嘔血不止　魚鰾膠長八寸廣二寸炙黃刮二錢以甘蔗節三十五個取汁調下

咯血　用新棉燒灰五分好酒送下

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

下血不止　水獺肝一副煮熟入五味食之

大便下血　羊血煮熟醋食最妙

一方　先用海螵蛸炙黃去皮研末每服一錢木賊湯下後服猪臟黃連丸

一方　黃牛角胎一具煆末煮豉汁每服二錢日三服

一方　藕節晒乾研末人參白蜜煎湯調服二錢日二服

一方　勢薺搗汁大半鍾好酒半鍾空心温服日三服

一方　南棗十枚槐米一両同煎去米食棗日三次即愈

一方腸風　火漆三錢研細末以豆腐皮分包三十包白滚水送下至重三服即愈

腸風下血　生炭三錢只殼燒存性研極細每服三錢米飲下

NOT COPY
Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　百合花中子酒炒微赤研末白湯送下

一方　猬皮炙末飲服方寸匕（即數分）

一方　霜後乾絲瓜燒存性爲末空心酒服二錢

一方　皂角樹上木耳瓦焙乾爲末每服一錢温酒下

一方　活鯽魚一大尾去腸留鱗入五棓子末塡滿泥固煆存性爲末酒服一錢或飯丸日三服或用硫黃一兩同上法煆服亦良

一方　西瓜子殼煎水服之自愈

一方　生柿子二個竹刀切去蒂核以棉花子塞入柿內仍葢好瓦上煆存性研細末米飲熱調服重者三服全愈

一方　烏梅七個熱猪血半觔仝煮好食去梅不用鹽重者不過三服即愈

一方　陳棕毛煆灰椿皮白榆皮青皮桑白皮俱生用各五錢煎湯沖服即愈

Do NOT copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　鴨蛋一觔炒熟去殼常吃自愈

一方　蕨菜花焙爲末每服二錢米湯下

腸風下血（因勞傷者）　野猪外腎連皮燒存性研末米飲服之

腸風下血（因酒毒者）　大田螺五個燒至殼白肉乾研末作一服熱酒下

一方　米麴一塊濕紙包煨爲末空心米湯服二錢神效

一方　酒煮鯽魚常食最妙

酒痢便血腹痛（或如魚腦五色者）　乾絲瓜一枚連皮燒研空心酒服二錢一法煨熟食之

下血不止其勢危篤　絲瓜燒存性槐花減半爲末每空心米飲服二錢

積年下血　野猪頭骨一枚桑枝（向西者）一握附子一枚同入甑內煆過爲末每服二錢粥飲空心服

風冷下血脫肛疼痛　野狸（即果狸野貓也）一隻治淨大瓶

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

盛之泥固火煆存性取研末入麝香二錢食前米飲服二錢

溺血　小麥麩炒香以肥猪肉蘸食之

一方　萵苣菜搗敷臍上卽愈　小便不通同方敷之卽通

失血湧吐因飽食用力或因持重努傷脉絡　芎歸飲當歸二兩或三兩酒浸洗撫芎一兩微炒水三碗酒一碗半煎至八分分二次服之取其引血歸經　並治跌撲墮打而傷脉絡令人大吐者二症中如有瘀血或加大黃下之或加桃仁紅花破之或加鬱金黃酒行之審症酌加其應甚速

齒衄牙縫出血　醋浸竹茹含之竹茹功能清肺涼胃

大腸下血屬風熱　柿乾燒灰以飲服二錢卽愈

鼻衄　以白茅根搗汁服之卽止　亦治血淋及撲損瘀血

一方　以壯婦頭髮燒灰吹鼻中卽止

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

舌上出血 舌衄也 以油頭髮煆末茅根湯服之

一切失血 括樓仁去油炒香酒服一錢取其降火

瀉者切忌之

咯血 青黛飛淨合杏仁研置柹餅中煨食卽愈名

聖餅子

便血尿血 地骨皮鮮者搗汁服之

鼻衄實火者 山梔炒極黑爲末白湯沖服一錢

舌衄 槐花炒研摻之

遠年下血 櫻櫚燒存性側柏卷柏俱燒存性等分

爲丸服下並可煎服

齒衄不止 醋浸竹茹含之卽愈

吐血衄血 荷葉末熬香服崩淋損傷産瘀同方

鼻衄 百草霜水調塗之紅見黑卽止以水制火也

吐血衄血 韮菜汁童便服並治損傷血瘀

欬血 胸中哽噎怵怵如蟲行者 猪獾子膏油入酒和服或下或

吐或自消也

East Asia Library Princeton University NOT COPY The Gest Collection

一方　駱駝屎乾研末吹鼻中卽止

消渴上消屬肺飲多小便如常中消屬胃飲多小便短赤下消屬腎飲多小便渾濁三消不可皆以熱論亦有屬寒者也飲多尿少而渾赤者屬熱是火盛耗水而渾也飲少尿多而清白者屬寒是火虛不能耗水也是症便鞭脉大能食爲胃實熱下之尚可醫治若不能食濕多舌色白滑者久則變爲水腫泄瀉熱多舌色紫乾者久則發爲瘡疽而死也

消渴　以李根白皮煮汁飲之

一方　水牛鼻同石燕煮汁服之

消渴飲水　苡仁煮粥飲并仁食之

一方　金豆丸白扁豆浸去皮爲末以天花粉汁同

East Asian Library Book COPY
Princeton University Library
Gest Collection

蜜和丸梧子大金箔爲衣每服二三十丸天花粉汁下日二服忌炙煿酒色服後用滋腎藥服之

一方 乾生薑末一兩以鯽魚胆汁和丸梧子大每服七丸米飲下

一方 鰌魚十頭陰乾去頭尾燒灰乾荷葉等分爲末每服一錢新汲水調下日三服名沃焦散

一方 麝香當門子酒和作十餘丸枳椇子煎湯送下葢麝香敗酒壞果枳椇子亦敗酒也

一方 鯽魚一枚去腸留鱗以茶葉塡滿紙包煨熟食之不過數枚卽愈

一方 用浮石蛤蚧蟬蛻等分爲末以鯽魚胆七枚調服三錢

一方 取燖母湯濾淨一碗飲之勿令病人知之

消渴飲水無度 用燖雄雞水濾淨澄淸服之不過一雞之水卽愈

一方 白花鴿子一只切作小片以上酥煎之含咽

East Asian Library, Princeton University
Not Copyright Collection

自愈

消渴不止　大冬瓜一枚去皮埋濕地中一月取出破開以瓜中清水日日飲之或燒熟絞汁飲之

一方　臘月採取白兎頭骨煮汁俟渴即服之

一方　乾冬瓜子麥冬黃連各二兩水煎飲之冬瓜黃葉俱治此候不論新葉乾葉不拘新久之患皆能治之

一方　冬瓜瓤乾者一兩水煎服苗葉亦可用

消渴便短赤濁　羊肉二脚瓠子六枚薑汁拌白蜜二兩同鹽葱炒食

腎消尿數　鹿角一具炙搗爲末以温酒每服方寸（即數分）七日二服

一方　黃母雞治淨煮汁冷飲并作羹食肉自愈

腎消尿多（心脾中熱下焦虛冷）　水牛乳羊乳每飲三四合良

熱中消渴（羸瘦小便不禁）　白兎骨和大麥苗煮汁服之極效

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

消渴羸瘦　白兎一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠去滓澄冷渴時卽飲之不過二兎瘥愈

多年消渴　以牝驢骨煮汁服之極驗

消渴久變水腫渴而且煩小便少者　冬瓜白瓤水煮汁淡飲之神效

老人消渴　鹿頭一個去毛煮爛和五味空心食以汁嚥之

消渴骨蒸　大冬瓜一枚去瓤入黃連末鋪滿安甕內待瓜消盡同爲丸梧子大每服三四十丸仍煎冬瓜湯下

消渴　芭蕉根搗汁飲之

一方　土瓜根搗汁飲之

一方　白兎屎澄汁冷飲卽愈海上方

一方　繰繭絲湯飲之卽止取其能抑心火也

消渴上消　紫背浮萍搗汁服之

上熱消渴　以甘枸杞日以湯泡飲之代茶方也

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

一方中下消 以經霜帶露桑葉泡湯代茶飲之

消渴腹中有蟲耗其津液者 取苦練根白皮濃煎加麝香少許服之蟲下渴止

一方 買極好雪梨每日食一枚以顏貌腴澤症愈爲度梨乾者泡湯和滓食之與萊菔相間收藏則不爛

一方 萊菔子搗汁服之

神病神者五臟所藏之七神即心藏神脾藏意與智肺藏魄肝藏魂腎藏精與志出七情亦由五藏而生即心生喜肝生怒脾生憂思肺生悲腎生恐也氣和則志達故生喜笑氣暴則志憤故生恚怒繫心不解散故生憂思淒心則哀苦故生悲心內生恐懼故欲人作伴外觸非常事物故一聞響動即自驚駭也神傷心虛諸邪相乘即如驚悸怔忡健忘恍惚失志傷神與夫氣怯膽弱恐畏不敢獨卧等病是也

心昏多忘 白牛馬猪雞各心乾之爲末每酒服方即數分寸匕日三七則智慧日生患痢者勿食食則痞悶加甚

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

清心甯神　用蓮子肉於沙盆中擦去赤皮去心爲末入龍腦點湯服之

睡卧譫語　以靈床果子即先亡坐上祭果食之即止

化痰定驚安神　五月五日午時有兩急伐竹節中水曰神水飲之甚妙

鎮心安神益好顏色　硃砂服之

心藏燥熱悲傷歌笑狀若神靈　大棗十枚小麥一升甘草一兩爲末每服一兩白湯下仲景方

心虛病笑不能休止　鹽煆赤煎沸飲之以水制火取其既濟之義

DO NOT COPY East Asian Library Princeton University Library Collection

癲狂癇症 癲疾始發志意不樂甚則精神呆癡言語不倫而睡如平時以邪併於陰也狂疾始發多怒不卧甚則兇狂欲殺目直詈罵不識親疎而夜多不寐以邪併於陽也癇疾發時則吐涎神昏卒倒無知口噤抽搐時之多寡不等而省後居起飲食皆如平人癇有雞馬牛羊猪五者之分言病狀偶類是也其實不離乎痰火氣驚四者而已幾症治法皆同

癲狂癇三症初起多痰者 治法先以三聖散吐之若風盛有痰者用青州白丸子服之二方俱載中風門

East Asian Library Copy
Princeton University Library

癇病灸法　發時以艾炷灸百會穴（穴在頭頂正中）不拘壯數以甦爲止再發再灸以愈爲度

癇病去痰法　發時用皂角汁灌鼻內其風痰即從鼻口中涕唾而出如甦後涎痰不止以鹽湯服之自止

狂症（多因驚憂痰血塞於心竅所致）　白金丸鬱金七兩白礬三兩米餬爲丸隨早晚俱可服之每一二錢白湯下形氣虛者勿服

癲狂不語目不識人　以驢脂和酒服三升良

癲狂鬼魅　以多年喜鵲巢燒水服仍呼祟物名號即愈　中蠱毒同方

癲狂風盛痰多　茶葉梔子各一兩煎濃汁一碗服之良久探吐痰涎痰去病愈

癲癇熱盛有痰　蚯蚓去泥入葱管中化爲水飲之甚驗或去泥以鹽塗之化爲水亦良

癲癇瘈瘲　鴟頭三枚鉛丹一觔爲末蜜丸梧子大

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

每酒服三丸日三服

癲疾驚癇　猪心血調硃砂末服之　卒中惡死同

方

癇症　以象齒屑炒黃研末飲服

心熱氣癇　黑驢乳煖服三合日二次

驚癇恍惚或語言不倫歌哭不休　茺子核生交趾合浦間七枚燒末即數分入硃砂少許薑湯下方寸匕自愈

驚癇恍惚語言錯亂　狐肉及五臟治淨入豉汁煮熟入五味作羹或作粥食羹中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙名狐肉羹

風痰恍惚心煩腹痛或時悶絕復甦　青羖羊角犀角微炒爲末隨時溫酒服一錢自不復發

斷除風痰　邕州風貍腦酒浸服之即永不發

癲狂　靈苑辰砂散辰砂一兩飛淨乳香去油棗仁炒各五錢酒下恣飲沈醉聽睡一二日勿輕驚醒驚醒則不可治或加人參一兩名甯志膏

Eastasian Library Collection Princeton University

每酒服三九日三服

癲疾驚癇　猪心血調硃砂末服之　卒中惡死同方

癇症　以象齒屑炒黃研末飲服

心熱氣癇　黑驢乳煖服三合日二次

驚癇恍惚或語言不倫歌哭不休　蔄子核生交趾合浦間七枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸匕即數分自愈

驚癇恍惚語言錯亂　狐肉及五臟治淨入豉汁煮熟入五味作羹或作粥食羹中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙名狐肉羹

風痰恍惚心煩腹痛或時悶絕復甦　青羖羊角犀角微炒爲末隨時溫酒服一錢自不復發

斷除風痰　邕州風貍腦酒浸服之即永不發

癲狂　靈苑辰砂散辰砂一兩飛淨乳香去油棗仁炒各五錢酒下恣飲沈醉聽睡一二日勿輕驚醒驚醒則不可治或加人參一兩名甯志膏

East Asian Library Collection
Princeton University

狂症不愈　以桃花令病人日日食之自瘥取能清痰逐瘀也

邪祟發狂或悲或泣　麤紙燒灰酒水任下

氣病人身以氣爲主氣盛則强虛則衰順則平逆則病爲病有九寒則氣收而成寒症炅則氣泄而成暑症炅者火也喜極氣散而患暴脫勞極氣耗而患脾虛勞倦思甚氣結而患鬱氣悲甚氣消而患諸虛恐則氣下而患畏懼怯弱怒則氣逆上患嘔血下患飧泄驚則氣亂而患心動不安怔忡諸症凡此諸病壯者易愈弱者不能速痊也

氣痛走注　釅醋拌小麥麩皮炒熱袋盛熨之（即數分）

氣逆煩滿　青羯羊角燒灰研末服方寸匕（即數分）即愈

血氣逆煩　羚羊角燒末服方寸匕（即數分）

三焦滯氣　陳米麪炒萊菔子炒等分爲末每服三

錢水煎入麝香少許服孕婦忌之

暴逆氣上　嚼生薑兩三片屢驗

積垢作痛　皂角樹上木耳泡湯飲之微泄爲效未已再服

膈氣疼痛　壁上陳白螺螄燒灰研末每服一錢酒下甚效

抑結不散　龜下甲酒炙五兩側柏葉炒一兩五錢香附童便浸炒三兩爲末酒糊丸梧子大每空心温酒服一百丸

下一切氣二便壅塞不通也　用大鱧魚一頭即七星魚開肚入胡椒末五錢大蒜片三顆縫合同小豆一升煮熟下蘿蔔三五顆葱一握俱切碎煮熟空腹食之至飽并飲其汁至夜洩出惡氣無限也五日更一作

氣滯腹脹手背脚膝疼痛　大麥醋糟炒熱布裹熨之三兩換當愈

腹中脹滿　棉裹煨薑納下部冷即易之

First Asian Library and the Peer Collection Princeton University Library

大小便閉鼓脹氣促　八角茴香七個大麻仁五錢爲末
生薑葱白三七根同研煎湯調五苓散服之
血上逆心煩悶刺痛　水牛角燒末酒服方寸匕即數分
呃逆不止　荔枝七個連皮核燒存性爲末白湯調
下立止
病後呃逆不止　刀豆子燒存性白湯調服二錢即
止取其下氣歸元而噫自止也
驚病心氣實者　鎮心丹即硃砂龍齒等分爲末猪心血
爲丸茨蕒大每服三丸麥冬湯下
一切呃逆　柿蒂丁香等分爲末生薑湯服之即止

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

遺精濁帶 不夢而遺乃心腎虛弱也因夢而後遺乃二火煽動不固也又有精出不止陽强不倒名爲强中乃因過服房術補藥或貪淫過慾而成也若不急治虛極必死即不死亦必患消渴大癰也濁帶之症赤多屬熱久則亦有寒者白多屬寒久則亦有熱者不可以赤定屬熱白定屬寒一概而論若屬濕熱必苦精竅窘痛倘屬虛寒則多見頭疼喘嗽痰壅氣逆也

腎虛遺精 黃明膠二兩研末以酒二碗化服日三服

夢遺 黃狗鼻梁骨燒灰研末卧時酒服一錢

Best Asian Library Copy
Princeton University Library and the Gest Collection

一方　蓮子心一撮爲末入辰砂一分每服一錢白湯下日二服

遺精　荷葉爲末酒服二錢

夢遺精滑　金櫻子茨實等分爲丸不拘時空心服

名水陸二仙膏

腎虛精滑　五倍子一兩炒茯苓二兩爲丸白湯或鹽湯下

遺精白濁下元虛冷者　白果蓮米俱去心糯米各五錢胡椒一錢爲末烏雞一隻治淨裝各末入腹煮熟空心食之赤白帶下同方

陽虛陰痿精寒而滑　以山獺陰莖酒磨少許服之

陰痿　鯉魚胆雄雞肝各一枚爲末雀卵爲丸小豆大每呑一丸

赤白帶下　冬葵花子空心酒調末服之赤治赤白治白

一方　魚縹膠三尺燒黃研末同雞蛋煎餅好酒食之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　煉臘猪脂三合酒五合煎沸頓服

一方　常炙猪腎食之

一方　母猪毛燒灰三錢以黑豆一碗好酒一碗半煮至一碗調服卽愈　崩中同方

一方　馬毛二兩花椒二兩開口和搓成團入灰火中過一宿取出碾末酒下一錢白毛治白帶青毛治赤帶

一方　用雞冠花擂爛每早沖酒酹去渣飲之赤用紅花白用白花

白濁白帶　分清丸芡實粉白芩粉黃蠟化蜜和丸梧子大每服百丸鹽湯下

一方　陳冬瓜仁炒爲末空心飲服五錢婦人白帶同方

白濁　生半夏一兩爲末雞子清爲丸桐子大每服二錢空心白滚水送下重者三料全愈

赤白帶下　白扁豆炒爲末每米飲服二錢

濁帶不止　黃狗頭骨燒灰爲細末每酒服一錢日三服

心虛赤濁　蓮子六一湯蓮肉去心六兩炙甘草一兩爲末每服一錢燈心湯下

遺精白濁　蓮米去心龍骨煆益智仁去皮膜微炒各等分爲末每服二錢空心米飲下

一方　蓮肉白苓等分爲末白湯調服

便數遺精因思慮勞役過度損傷心氣者　秋石白苓芡實蓮肉各二兩爲末蒸棗和丸梧子大每服三十丸空心鹽湯下名四精丸

强陰益精能令有子　枸杞酒蒸兎絲酒洗各八兩五味酒蒸覆盆酒洗去蒂各二兩車前二兩搗如泥蜜和爲丸梧子大每塩湯下三錢慣遺洩者車前易蓮子甚妙

帶下熱濕於內者　地骨皮一觔生地五觔酒煮每日飲之

East Asian Library Collection
Princeton University Library

陰痿羸瘦　經驗方猪腎同枸杞葉豉汁入葱椒鹽開口作羹食之

痰飲　清稀爲飲稠濁爲痰其痰稠濁爲熱痰屬心清稀爲寒痰屬腎少而粘連難出爲燥痰屬肺多則易出爲濕痰屬脾搐搦眩暈爲風痰屬肝也　飲留於膈則膈上痰滿嘔吐痰涎爲伏飲留於肺則喘欬面腫難卧爲支飲留於肢體則身體重痛爲溢飲留於脇則欬嗽引脇疼痛爲懸飲留於腸胃則人忽瘦痰涎有聲爲痰飲凡飲留於胷肺則喘滿短氣而渴飲留於膈下則心下悸或背心寒也

痰涎爲害　梹榔爲末白湯下每服一錢

上焦痰熱　藕汁梨汁各半盞和服

風痰　萊菔子生用以水研末服之取吐即愈

East Asian Library Copy
Prince of the Gest Collection
Princeton University Library

膈上伏飲　甘遂麪裹煨熟甘草等分煎服此取相反以成功之法也

飲留膈下頭疼背寒嘔酸不食　吳仙丹茯苓吳茱萸湯泡七次等分蜜丸梧子大每白湯或薑湯下三錢諸方無及於此也

暑月因怒病呃舉身跳動昏不知人乃痰因怒鬱於上膈也　參蘆五錢以逆流煎服取其大吐頑痰令睡多時即愈其人汗甚亦無驚形氣虛者勿服性燥味厚多怒之人易患此症

欬嗽喘吼有聲無痰爲欬有痰無聲爲嗽有聲有痰爲咳嗽其症或爲風寒外感或爲痰熱傷肺致氣上逆而然或爲久嗽傷肺成勞皆不外乎風寒火鬱燥飲積熱虛寒種種爲患用藥者或虛或實屬氣屬血不可不審也　喘急者呼吸氣促哮吼者喘急而更喉中有聲也實邪作喘者氣粗胷滿不能布息若兼熱則更見痰稠便鞕也虛邪作喘者氣乏息微不能續息若兼寒則更見清稀痰涎也

寒熱欬嗽初起者　燒生薑一塊含嚥之

冷氣欬嗽　乾生薑熱酒調服五分或飴糖沖服

寒痰欬嗽　燒酒四兩猪脂白蜜香油茶末各四兩

East Asian Library Digital Collection
Rare Book COPY
Ohio State University Library

同浸酒內煮成一處每日挑食以茶下之取效

咳嗽面腫夜不能寐　蛤粉五錢青黛五分研極細

末白滚水和酸虀菜一羹匙調藥二錢並滴香油

四五點服之

欬嗽　鯽魚骨燒灰研末飲服

上氣欬逆　猪肉切作鎚子猪脂蒸熟食之

一方　猪肪即猪油之凝者臘月收淨肪　四兩煮白沸切片和醬

醋食之

一方　獾骨燒存性研末每酒服三合日三服以愈

爲度

卒得欬嗽　猪腎二枚乾薑三兩水七升煎二升稍

取汁服

一方　驢脂煉熟和酒等分服之良

一方　烏雄雞一隻治淨酒浸半日飲之

肺虛欬嗽　猪肺一具以竹刀切片麻油炒熟同粥

食之

Do NOT COPY East Asian Library Princeton University Library and the Gest Collection

肺虛嗽血　猪肺煮熟蘸苡仁末食之

肺燥欬嗽　松子仁一兩胡桃仁二兩研膏和熟蜜五錢收之每服二錢食後沸湯點服

欬嗽不止　生薑五兩飴糖半升水煎熟食服三四次即效

一方　黃明膠炙研末每服一錢人參末一錢薄豉湯二盞葱白少許煎沸嗽時温呷三五口

久嗽不瘥　猪腎二枚入椒開口四七粒煮啖之

一方　阿膠炒人參各二兩爲末每服二錢豉湯一盞入葱白少許煎服日三次

遠年欬嗽　白羊脛三具大棗百枚酒五升漬七日飲之

一方即二三十年者　生龜三枚治如食法去腸以水五升煮取三升浸麴釀秫米四升如常飲令盡永不發

一方　生龜一枚着炊中令人溺之浸至三日燒研以醇酒一升和末如乾飯頓服須臾大吐嗽至囊

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

出則愈小兒減半

久患欬嗽噫氣　生薑汁半合蜜一匙煎溫日服三服即愈

老嗽　臘月臘日取八哥一隻治淨五味醃炙食之或作羹或作散蜜丸服之

老人久嗽　夜卧後用連皮核桃仁三箇生薑三片細嚼嚥畢飲熱水一二口頃刻再如法嚼嚥飲水即愈

化痰止嗽　絲瓜燒存性爲末棗肉和丸彈子大每服一丸溫酒化下

痰喘欬嗽　多年陳白蜆壳燒存性爲極細末以米飲調服一錢日三飲

卒嗽不止　白蜆壳燒搗爲細末以熟米飲調服一錢日三服聖惠方

一方　白蜆壳同屋上白螺壳燒存性搗爲丸酒服方寸匕即數分

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

肺熱嗽　欵冬花燒烟以竹筒吸鼻中每次少許以愈爲度

肺熱咳嗽痰血　百合欵冬花揀淨以甘草水浸等分爲末蜜丸梧子大每服三錢白湯下名百花膏

欬逆上氣　杏仁連皮炒研蜜和爲膏含嚥自愈

肺熱久嗽身如火炙嘔逆口渴瘦將成勞者　枇杷葉蜜炙欵冬花甘草水浸紫菀去頭鬚蜜浸焙乾杏仁去皮尖桑白皮蜜炙木通各等分大黃酒蒸減半爲末蜜丸櫻桃大每食後夜卧各含化一丸效驗如神

氣嗽痰喘欬吐膿血　萊菔子炒研末煎湯服之

老人痰嗽喘滿懶食　白芥子去脇下皮裏膜外之痰　紫蘇子開痰降氣白芥主痰紫蘇主氣萊菔主食各微炒研末看病所主爲君點湯服之

痰嗽面腫不能寐　蚌殼煆粉少加青黛以淡薑水如麻油數點調服其驗如神

肺虛欬嗽　蜜和薑汁服之良　治痢同方

哮喘不止風熱在上膈者　瓜蔕七枚爲末調飲服取吐膠痰即愈

肺風喘促　透明阿膠切炒以紫蘇烏梅肉焙研等分水煎服

痰喘　人參和連皮胡桃煎湯服之即愈神效

諸喘不止　椒目（隔口）炒碾二錢白湯調服用至二三服效後當隨痰火用藥

痰喘咳嗽不能睡卧（兼停飲也）　好茶末一兩白殭蠶一兩薑汁炒去絲放碗內蓋定傾沸湯一小盞卧時再添湯點服

上氣喘促時有欬嗽　茶子百合等分爲末蜜丸梧子大每服七丸新汲水下

喘嗽哮吼　糯米泔水少許磨茶子滴鼻中令吸入口服之口咬竹筒少頃涎出如線不過二三次痊愈屢驗小兒同方

年久哮吼　黃雞雞蛋略敲損浸尿缸中三四日煮

食之卽愈

鹽吼痰喘　烏臼皮去粗皮搗汁和麪作餅烙熟食之

寒痰氣喘　青陳皮一片展開入巴豆一個麻紮定火上燒存性研末薑汁和酒一鍾呷服

久近痰嗽自胷膈下塞停飲至於藏府　二母散知母鹽水炒貝母去心爲末巴豆三十粒去油合勻每服一字用薑三片一面蘸藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一回其嗽立止弱者去巴豆

鬼疰欬嗽　以桃仁煮粥食之自愈

黃昏咳嗽火嗽也　五倍子炒北五味等分煎湯飲之

心下伏熱及煩滿欬逆　雞子白生吞之

咳嗽失音火鬱也　雪梨搗汁頻服自愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

腫脹 此症皆因內傷七情外感六氣或飲食先節與勞役過度則邪正相攻榮衛失和之所致也其脹有脉脹日久則成單腹脹有盧脹日久則成氣鼓脹單鼓二脹有屬氣屬血之分又有腸覃石瘕二症皆係女病男子則爲疝症也詳在疝症並婦科又有水脹之症內有石水風水之分上腫爲風水下腫爲石水石水屬陰邪乃寒水所結風水屬陽邪乃熱濕所凝也

浮腫脹滿 氣鼓也 **猪肝一具洗切着葱豉薑椒炙食之或單煮羹食亦可**

浮腫脹滿不食 **猪脊肉一觔煮熟切片以生蒜薤**

NOT COPY
First Asian Library, Bodleian and the Gest Collection
Princeton University Library

拌食之

水腫脹滿小便澁者　水牛肉一觔蒸極熟以薑醋空心食之

一方　水牛蹄一具去毛煮汁作羹切食之或以水牛尾條切煮熟拌醋食或生肉拌醋食之

一方　肥犬肉五觔熟蒸空腹食之

氣腫濕腫濕即水也　海蛤海帶海藻海螵蛸海昆布鳧茨荔枝殼各治淨等分爲末以流水沖服日二服每一二錢

一方　多煮野鴨食之即愈

氣水鼓脹　白狗或黑狗肉切和米煮粥空心食之

水腫脹滿　椒目開口少許搗如膏每酒服方寸匕即數分

一方　青頭雄鴨煮汁飲之厚蓋取汗上腫者方宜汗或和米並五味熟煮作粥食亦良

一方　白鴨一隻治淨以豉半升同椒薑入鴨腹中縫定蒸熟食之開口

East Asian Library and the Princeton University Library Collection
DO NOT COPY

一方　赤尾鯉魚一觔破開不見水及鹽以生礬五錢研末入腹內火紙包裹外用黃泥包好放竈內煨熟取出去紙送粥食頭者上消食身尾者下消須一口食盡屢試經驗

一方　海蛤杏仁漢防已棗肉各二兩葶藶六兩爲末陳米餬和爲丸梧子大每服十丸至利水爲妙

一方　田螺一佪車前草葉一片獨頭蒜一佪合搗作餅貼臍上俟一時其水隨二便出之則愈

一方　木油樹根皮晒乾爲末和枯白礬等分每服一錢空心白滾水調服

一方　黃瓜一佪破開連子以醋煮一半至爛空心全食之須臾下水也以上四方皆石水症藥

石水腫症（少腹及腿足皆腫而脹）　赤小豆煮汁用鯉魚作羹食子濕水從小便而出卽愈

一方　大鯉魚一尾醋三升煮乾食一日一作

一方　大鯉魚一尾赤小豆一升水二斗煮食汁一

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

頓服盡當見下利爲愈　妊娠水腫同方

風水腫症面及手足皆腫也　以驢脂和鹽塗之

一方　蔓椒一名猪椒氣臭如狗彘生雲中山谷枝葉煎如汁熬如餳狀每空心服一匙日三服　賊風攣急同方

一方身面皆腫　黃母雞雞子黃白相和塗腫處乾再上

解毒同方

風石二水腫症　生猪肝一具細切醋洗入蒜醋食之勿用鹽

水腫喘急屬陰分　郁李仁二兩以水濾汁煮苡仁飯每日食二次自愈

水腫發熱屬陽分　海蛤木通猪苓澤瀉滑石黃葵子桑白皮各一錢燈心三分水煎服日二服

水脹日久不瘥垂死者　獾子肉或獾大腸作羹食之甚良

風水虛脹　取水獺一頭去皮連五臟及頭骨炙爲末水服方寸匕數分七日二服十日瘥若冷氣虛脹者不

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

宜爲其性寒耳

十種水氣垂死者　鱧魚一觔即七星魚俗云火柴頭魚是也治淨煮汁和冬瓜葱白作羹食之

水腫不愈　黑驢脂絞汁每食五合良

卒患水腫　鯽魚三尾去腸留鱗以商陸以花白者之根方可用黑豆湯浸蒸赤小豆等分塡滿扎定用水三升煮糜去魚食豆飲汁二日一作不過三次小便利病自愈

黃腫腹脹　亞腰甜壺蘆連子燒存性每服一個食前溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效

大腹鼓脹體寒者　鸕鷀肉燒存性爲末米飲服之立愈取其利水也

身腫攻心　生猪油以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖一日二次

水腫危急屬熱　冬瓜不拘多少任意喫之神效無雙

水腫屬熱屬濕者　甘遂末傅腫處仍煎甘草湯服之其

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

腫立消若因熱與毒者亦效蓋藉其相反以立功也

水腫便澁　赤花商陸三分搗貼臍上小便利腫自消卽去之

水腫屬暑熱者　香薷熬膏服之取利小便

水腫　冬葵子榆皮去粗皮等分煎服取利

水病足腫　葱子煮湯漬之日三五度卽愈

脾濕腫滿　伐木丸蒼朮二觔米泔浸黃酒麪麯四兩炒絳礬一觔卽皂礬炒赤者醋拌晒乾入瓶火煆爲末醋糊丸酒下不必忌鹽後亦不發但病愈後卽不宜服多能致瀉也張三丰傳方

腫滿便閉腹堅如石腿裂出水飲食下咽上嘔下閉皆因奉養太過所致　黃柏知母各一兩酒洗焙研桂一錢爲引水疊成丸梧子大每服二百丸以小便如刀刺火燒溺出如流爲效名滋腎丸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瘧疾 四時瘧疾皆因風寒外束暑邪內伏之故也一日一作其邪淺間一日一作或間二三日一作及間數日一作其邪深晝作邪淺夜作邪深病欲已則夜轉爲晝病若進則晝轉爲夜又有晏作早作者乃邪與衛氣會合有早晏也瘧有風寒溫瘴飲食久虛勞痰及瘧母三陰瘧鬼瘧之名瘧疾忌雞魚豆腐麵食羹湯熱粥熱物

却瘧痢百病 立秋日五更取井華水長幼各飲一杯可免一切病症

寒熱瘧疾 秋後霜一錢熱酒服之卽愈

一方 生薑四兩搗自然汁一杯露一宿於發日五

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

更面北立飲卽止未止再服

一方　苦參細末醋糊爲丸梧子大不論三日或一日一發待三次後臨發五更時以向東桃柳枝各截長一寸冲滚水一碗先薰兩太陽少刻用此湯泡丸藥三錢服之卽止

虛寒瘧疾　黃狗肉煮臛入五味食之

脾寒瘧疾　乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一盞煎至七分服之

瘴瘧發熱連胷背者　大茴香子搗汁服之

勞瘧瘴瘧　野狐肝一具陰乾重五日五更初向北斗下受氣爲末粳米爲丸菉豆大每用一丸緋帛裹繫手之中指男繫左手指女繫右手指

三日一瘧　白朮一觔龜板一觔首烏四兩水熬成珠下蜜熬膏晚間挑二三匙調下極效

一方久不愈者　必思荅產回部田地中三枚酒一盞煎半飲之卽愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

諸瘧不止　夜明砂淨末每以冷茶服一錢立效

久瘧不愈　雞子黃和常山末爲丸竹葉湯服

一方　白朮土炒爲末每服二錢酒調服十劑除根

脾寒瘧方

多年瘧疾　以驢脂和烏梅爲丸於未發時服二十

丸神效

寒熱鬼瘧發作無時　臘月採房上乾白貓屎以泥封固

燒存性收之臨時以水和服

一方　雄狐胆一佪硃砂飛淨砒霜各五錢阿魏麝

香黃丹菉豆粉各一分爲末五月五日午時以黍

角尖和丸梧子大空心及發前時冷醋湯服二十

丸忌熱物

斷瘧擦法　魚腥草一握搗爛絹包周身摩擦俟得

睡有汗卽愈臨發之一時作之

截瘧膏　斑蝥一佪研末放膏藥上發日貼印堂中

卽止

Eastasian Library and the Rest Collection Princeton University Library

痰瘧不眠乃陽盛陰虛之故也　半夏湯服之卽愈其法以半夏生末一升取遠流水八升將夏揚至萬餘遍澄清五升煮之一法用葦薪火以桃米一升半夏淨粉五合炊至一升去渣飲汁一日三次以安爲度

瘧痢　鼈肉煮作羹加生薑沙糖食之不用鹽醬名鼈糖湯

寒熱瘴瘧　草豆蔻麪裹煨熟淨仁知母鹽水炒等分煎服取其一陰一陽之義也

瘧痢不止　龜殼燒存性研末酒服方寸匕卽數分

辟瘧法　五月五日午時取黑羊糞每粒分爲二丸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Digital Copy

霍亂是症乃因風寒暑邪食水雜揉爲患亂於腸胃清濁相干發時則揮霍變亂生於倉卒心腹大痛上吐下瀉也若心腹大痛吐瀉不出則爲乾霍亂又名絞腸痧如更舌卷囊縮卵陰入腹則難治也因暑則多吐濕則多瀉暑熱甚者宜安神清熱寒極肢厥脉伏者宜温之是症最忌熱飲藥湯

霍亂吐瀉　飲新汲水一碗仍以水一盆浸兩足立止忌食熱物奇妙便方

一方　酸漿水煎乾薑屑呷之

一方　白扁豆香薷各一升水六升煎一升分服中

暑者宜之

一方　白兎骨煮汁服之

一方　生藕搗汁服之

一方　胡椒三十粒以飲吞之

一方　胡椒四十九粒菉豆一百四十九粒研勻木瓜湯服一錢神效

一方　鹽醋同煎服甚良

一方　菉豆四十九粒胡椒七粒水煎服若渴即用新汲水沖服極效

乾霍亂　透明生白礬研三錢熱滾水新涼水各半盞調勻俟温服之立止此藥或水陸二路及深夜荒郊遇此患者用之可作仙丹

一方　食鹽一兩用熱水調灌入口鹽氣到痛即止如痛甚以手拍病人膝灣有紫黑點用針刺去黑血即愈

一方　飛鹽四五錢調童便三飲而三吐之即愈

Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　馬屎研汁飲之立愈

一方　槟榔末五錢童便半盞水一盞煎服

一方　蕎麵炒焦爲末温熱沖服

一方痛脹欲死　地漿水五盞飲之卽愈切忌米飲

一方甚至不能納食服藥病在垂急者　先飲生熟湯數口卽定自可納食服藥也

一方煩脹欲死　好醋三升飲之

一方乾嘔不止　薤子煎汁服之

一方　生薑五兩牛兒屎一升水四升煎二升分二服卽止

霍亂轉筋中暑　白扁豆爲末好米醋和服用豆葉亦可

一方因中寒手足拘急痛不可忍甚至陰囊入腹者　雞屎白一味爲末取方寸匕以水六合和勻温服

一方　用故綿浸米醋中甑蒸熟裹之冷卽易裹勿停自止

一方入腹欲死　生薑三兩搗酒一升煮三兩沸仍以薑搗貼痛處

一方　嚼大蒜令爛涼水送下

霍亂煩渴　藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲之

霍亂煩悶　茶末一錢煎水調乾薑末一錢服之即安

霍亂症後惡心嘔噦　葡萄根及藤葉煮汁飲之

時氣煩渴　生藕汁一盞生蜜一合和勻細服

熱渴煩悶　地漿水一盞飲之即愈

卒然煩熱　鴨肉和葱豉煮汁飲之立止

中暑吐瀉　滑石飛淨三錢爲末井水調服

霍亂吐瀉　蘆稷米煎湯溫服神效

素慣轉筋　青羊毛醋煮裹脚數次即不發

一方　默呼木瓜名或寫木瓜二字皆愈或煮木瓜汁飲之

熱悶煩渴不可解者　新汲水浸青衣互熨之妙著

Dr. Ashish Nimbury and the Gest Collection Princeton University Library

汗出蜜和飲之

暑消後預防霍亂及熱病　暑後以香薷代茶冷飲數次甚妙

噎膈翻胃　胃之上口爲賁門賁門熱結乾枯故不能納物爲噎膈小腸之上口爲幽門幽門熱結乾枯故不放食入反出爲翻胃也二症日久則大腸傳導路狹故魄門自應燥濇難行也若更見胷痛如刺胃腕傷也便如羊糞津液枯也吐沫嘔血血液不行皆逆候也總之是症多難療治耳

五噎膈氣　煩悶吐逆不納飲食　蘆筍根日日煎濃湯飲之甚效金匱方

一方　黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之俟其下糞淘洗米粟令淨煮粥入薤白一握泡熟去薤入

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

沉香末三錢食之

一方　狼喉靨日乾爲末每用五分入飯内食之甚妙

一方　畢澄茄白豆蔻等分爲末乾舐之

一方　白鵝毛燒灰酒服

一方　水老鴉頭燒灰研酒服

一方　水老鴉啄銜口中便安

一方　鴞鳥未生毛者一對用黃泥封固臍煆存性爲末每用一匙温酒服

噎膈不通　羚羊角屑爲極細末飲服方寸匕（節數分）並以屑摩喉管

一方　野貓頭骨炒爲末酒服

翻胃吐食　以柿餅每日同飯吃勿飲茶湯自愈奇妙方也

一方　猬肉去淨骨炙黃食亦可煮汁飲之

一方　家貓胎衣燒灰入硃砂末少許壓舌下甚妙

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　生虎肚一個勿洗存滓穢新瓦固煆存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神妙食膈者方可用之

一方　以反毛雞一隻煮爛去骨入人參當歸食鹽各五錢再同煮爛食之至盡此乃迷類之義也

一方　抱出雞子殼爲末酒服二錢即愈

一方　石蓮肉爲末入肉豆蔻煨去油少許米湯調服

一方　青羖羊胲子即腹中積塊草也　煆存性每一觔入棗肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下

一方及藥物難下者　白水牛喉一條去兩頭節并筋膜及如阿膠黑片　收俟乾時用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡爲度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效

一方　胡椒醋浸日乾如此七日爲末酒糊丸梧子

DO NOT COPY
Rust Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

大每服三四十丸醋湯下

一方　胡椒七錢五分煨薑一兩水煎分二服

一方　胡椒半夏湯泡等分爲末薑汁糊丸梧子大每薑湯下三十丸

一方及吐出黑汁諸藥不愈者　畢澄茄爲末米糊丸梧子大每薑湯下三四十丸日一服愈後服平胃散數十帖自無後虞

一方屬熱者　眞蛤粉每服二錢搗生薑汁一盞再入米醋同調送下

一方　黃蜆即螺螄黃者并田螺殼俱須在泥中者等分炒成白灰每二兩白梅肉四枚搗和丸再入砂盒子內蓋定泥固煅存性研細末每服二錢人參砂仁湯下或陳倉米湯亦可

一方　田螺洗淨水養待吐出泥澄取晒乾爲丸梧子大每服三十丸霍香湯下爛亮研服亦可或以田螺燒研水服俱效

一方　烏雄雞一隻治淨入胡荽子半觔於腹內烹食食二隻即愈

一方　鯉魚一頭童便浸一夜　爲末同米粥食之

一方　大鯽魚去腸留鱗入綠礬末令滿泥固煅存性研末每米飲服一錢日二服

一方食下即吐　陳粟米爲粉水丸桐子大每九丸煮爛吞之日服三五次即效或煮入醋中細吞之

一方　大鯽魚一枚去腸留鱗切大蒜片塡滿紙包十重泥封晒半乾炭火煨熟取肉和平胃散末一兩杵丸梧子大蜜封每三十丸米飲下

一方或食下即吐或朝食暮吐暮食朝吐　羅晃子出廣西者其皮七層肌如橄欖出橫州者其皮九層故又名九層皮菓七分七服完爲度即愈

翻胃吐痰　柳樹上蕈五七個煎服之即驗

虛冷翻胃　白毛羊肉去脂煮熟作片以蒜薤空腹

食之立驗

一方反胃　虎脂半觔清油一觔瓦瓶浸一月蜜封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服以瘥爲度油盡再添

噎膈反胃大便燥結　生羊乳時時嚥之並服四物湯神效人乳勿用

一方　糯米和牛涎拌小丸煮熟食之

一方　虎肚傍小肚名惡貫　陰陽瓦焙乾研末一錢五分楂樹上黃形如香蕈取下剉末一錢以黃酒頓服

一方　老薑一觔切片棉布包入厠內浸七日取出洗浸晒乾爲末每服五分酒調服

一方　核桃肉水浸去皮搗爛如泥合陳大麥麪煮成稠糊每日食之俟十餘日其症漸好方可少進粥　調理全愈

一方清潤乾燥之方　五汁飲蘆錐葧薺甘蔗竹瀝薑汁等

Fast Asian Library Do Not Copy
Princeton University Library

分飲之

一方清利熱結之方　大黃湯大黃切片以薑汁炙至黑黃色量人强弱每服二三錢加陳倉米一撮葱二莖煎去滓服

一方形氣虛寒者　以四君六君或理中湯內加丁沉水煎温服

一方便秘壅遏者　只壳厚朴大黃人參甘草藿香木香當歸檳榔桃仁大麻仁等分蜜丸服之自瘥名利腸丸

一方吐逆不止　汞硫丸汞一分硫二分研如墨以老酒薑汁服之次日取下穢物服飲藥湯則不吐也

噎膈　黃花地丁草根搗汁酒和服之

一方　昆布微洗去鹹味含之嚥汁

翻胃　竹瀝和米煮粥食之

一方　甘蔗汁薑汁和服梅師方嘔噦同方

一方　牛乳韭汁薑汁和勻細細温服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方　取驢尿服二合吐稍減再服二合自漸不吐緩緩以粥食之即漸愈

卒噎　祀竈飯取一粒食之即下

嘔吐噦嘔者有物有聲吐者有物無聲噦者無物有聲即乾嘔也是症若見面色青手甲黑中痛不止肢冷不回則爲凶症初吐切不可下下則轉逆有氣盛氣虛熱盛寒盛燥盛之分墜吐化滯之法遇是症者宜詳之

嘔逆不止　眞火酒一杯新汲井水一杯和服甚妙

霍亂亦治

一方　生薑一兩醋漿二合銀器煎收四合連滓呷之並能殺腹內長蟲

一方　竈心土一塊如核桃大煎水去渣澄清服之

嘔噦不止　以水獺骨煮汁服之即止

心痞嘔噦心下痞滿也　生薑半觔水三升煮一升半夏五合水五升取汁同煮一升半分二服

乾嘔厥逆　頻嚼生薑嘔家聖藥也

卒然乾噦　雞子黃生吞數枚良

天行嘔逆　黃雞雞子一枚水煮三五沸冷水浸少頃吞之

噦逆不止　石蓮肉六枚炒赤黃色研末冷熱水各半盞和服便止乾霍亂同方

病後嘔逆　青羖羊肝作羹淡食之不過三度即不嘔矣

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

吐血咯血　黃明膠一兩切片炙黃新棉一兩燒研合勻每服一錢食後米飲服日再服

一切肺病欬吐膿血不止　好酥五十觔煉三遍當出醍醐（即酥上油也）每服一合日三服以瘥爲度

肺破出血或嗽血不止　黃明膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即愈

肺癰咯血　苡仁三合搗爛水二大盞煎一盞入酒少許分二服服之立效或以猪肺蘸苡仁末服之亦治痿瘡咳吐膿血

醇苦酒即好陳醋也

雲谿注

胸痛悶者　醇苦酒煮苡仁令濃有血當吐出即愈

肺癰咳唾膿血腥臭（不問膿成未成）　柘木耳（即柘黃）研末同百草霜二錢陳米餬丸梧子大米飲下三十丸其效甚捷

衄血一月不止　刺青羊血熱飲之即瘥

一方　黃明膠盪軟貼山根至髮際即止

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

吐血咯血　黃明膠一兩切片炙黃新棉一兩燒研合勻每服一錢食後米飲服日再服

一切肺病欬吐膿血不止　好酥五十觔煉三遍當出醍醐（即酥上油也）每服一合日三服以瘥爲度

肺破出血或嗽血不止　黃明膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即愈

肺癰咯血　苡仁三合搗爛水二大盞煎一盞入酒少許分二服服之立效或以猪肺蘸苡仁末服之亦治痿瘡咳吐膿血

肺癰咳唾不休心胸痛悶者　醇苦酒煮苡仁令濃微濕炖服肺中有血當吐出即愈

肺癰咳唾膿血腥臭（不問膿成未成）　柘木耳（即柘黃）研末同百草霜二錢陳米餬丸梧子大米飲下三十丸其效甚捷

衄血一月不止　刺青羊血熱飲之即瘥

一方　黃明膠盪軟貼山根至髮際即止

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library