PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷五

East Asian Library
Princeton Un
DO NOT CO

C116/2535
V. T.

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

婦科 婦人經水調勻何患不育如不調則血有紫黑黃白淡紅淺白癥塊諸形或稠粘臭穢或清澈臭腥之氣甚至內潰而見五色似乎膿血及臟腑敗氣或先期或後期或經行發熱時熱或寒熱身痛或腹痛或吐瀉或錯妄吐衄或過多兼時下白帶或患血滯血虧血枯諸般經閉或經閉嗽久成勞及五色帶下崩漏癥瘕積痞癖血蠱症形

月經不調 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服之即安虛者或加辰砂末五分

經血妄行或吐或衄或血崩也　魚膠切炒新棉燒灰每用二錢米飲調下卽愈

經行不止　牡蠣煆研成粉以米醋摶成團再煆研醋調艾末熬膏爲丸桐子大醋湯下四五十丸

一方　阿膠蛤粉炒焦爲末酒服二錢

一方　瑞蓮散陳蓮蓬殼燒存性研末每服二錢熱酒下不止爲經崩

崩漏經血忽然大下不止爲經崩經行之後淋漓不止爲經漏　木耳半觔炒見烟爲末二錢一分頭髮灰三分共二錢四分以應二十四氣好酒調服少出汗

一方或白帶　以壇燒灰酒服二錢白用白壇紅用紅壇如兼見者紅白俱用

崩血　鯽魚一個長五寸者去腸入血竭乳香在內棉包燒存性研末每二錢熱酒調下

一方　勃薺一歲一個燒存性研末酒服之

一方　陳年蒸餅燒存性米飲服二錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Boston College

一方 腹中疼痛 毛鼈殼燒灰米飲服一錢

一方 蟹殼煆槐花香附醋浸炒各等分研末每服三錢黃酒調加童便送下至重者三服卽愈

一方 不止者 老絲瓜燒灰棕櫚燒灰等分鹽酒下或

鹽湯下

一方 不止者 蓮房荊芥穗各燒存性等分爲末每米飲服二錢

赤崩白帶 淡菜燒熟飽食一頓卽愈

一方 取馬鬃毛卽馬項上毛也燒灰酒服赤用赤馬毛白用白馬毛

一方 及諸氣疼痛欲絕 以鹿血和酒飲之立愈

一方 椒目炒研細每溫酒服一鈎數分 以水牛角胎燒灰飲服日二次

崩血及赤白帶下

積年漏下不斷困篤者 以喜鵲重巢中柴燒灰研末飲卽數分

服方寸七日三服一月取效

經閉 苡仁根一兩水煎服數次卽愈

Estasian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

一方　乾絲瓜一個爲末同白鴿血調成餅晒乾研末每服二錢空心酒下但須先服四物湯三服

一方　白馬駒胎衣煆存性爲末入麝香少許空腹時用新汲水下三錢不過二服卽通

一方　野貓陰莖燒灰東流水服之男子陰癨同方

一方　茶清一瓶入沙糖少許露一宿服之

一方　數月不行而積之血與濕化而成白物時時自下宜先去濕　明礬煆三分杏仁一分爲末煉蜜丸棗核大納入陰中卽愈甚者再納之神效

室女經閉其人素弱難　澤蘭葉湯澤蘭葉三兩當歸白芍各一兩甘草五錢爲粗末每服五錢以水二盞煎一盞溫服兼服柏子仁丸柏子仁炒去油另研牛膝酒洗卷柏各五錢澤蘭葉續斷各二兩熟地三兩五錢蜜丸梧子大每空心米飲下三十丸

一方　雄鼠屎一兩炒研空心溫酒二錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do not copy

經斷復來已過七七經水復來屬血熱也　黃芩心末二兩醋和爲九溫酒下

五色帶下　白馬左懸蹄燒灰酒服方寸匕日三服

室女白帶　鹿茸酒蒸焙二兩金色狗脊製白斂製各一兩爲末用艾煎湯糯米糊丸梧子大每溫酒下五十丸日二服

婦人帶下　白羊腥一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之必死

一方　臘月收存白兔皮燒烟盡爲末酒服方寸匕數分

以瘥爲度

卒然赤白帶下　以李根白皮炙黃煎湯飲之日二服卽愈

白帶滑數虛冷者　鹿角屑炒黃爲末酒服二錢

血氣疼痛　紅麴擂酒服之良產後惡露不盡同方

孕婦忌服

血氣刺痛　荔枝核燒存性五錢香附炒一兩爲末

Eastasian Library Princeton University
NOT OCR'd
Gest Collection

每服一錢鹽湯或米飲下

一方 紅藍花一兩以酒一大升煎至減半頓服一半未止再服取其通經行血也

乾血氣痛 絲瓜一枚燒存性空心溫酒服

崩血不止 諸藥不效須防滑脫 地榆苦酒煎地榆一兩醋煎露一宿次早溫服立止止後隨症調治之

帶下 屬濕熱少腹脹痛汚水連綿 導水丸牽牛頭末滑石水飛黃芩川大黃生用等分爲末蒸餅作丸量虛實服

一方 屬寒濕少腹冷痛黑水不止 萬安丸牽牛頭末胡椒木香小茴香焙各等分爲末水泛爲丸量虛實服

一方 或因瘀血所結或瘡瘍濃出及白濁白淫者 威喜丸白茯苓四兩去皮作塊用豬苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出晒乾去豬苓以茯苓爲末用黃臘四兩煉化爲丸彈子大空心細嚼滿口生津徐徐咽服以小便清爲度忌米醋只喫糠醋忌動氣

血滯經閉 茜草一兩煎服神驗

Estate Printed Copy Property of the Estate Library, University of the East Collection

月經逆行逆行者吐衄也　鬱金末和韭汁薑汁童便量人虛實服之

卒然崩血　黃芩一兩水煎入酒少許服之

經水不調　條芩酒炒白朮土炒各一兩當歸酒浸洗八錢白芍酒炒七錢爲末酒糊作丸如黃豆大每二十五丸經水前一日服四五服

經閉及赤白帶崩漏　或産後積血癥瘕腹痞並男子骨蒸潮熱諸症腸風下血五淋五勞七傷小兒無極丸錦紋大黃一觔分四分一分以童便一盞食鹽二錢浸一日晒乾一分以醋酒一碗浸一日切晒再以巴豆二十五粒同炒去豆一分以紅花四兩泡水一碗浸一日切晒一分以當歸八兩入淡醋一碗同浸一日去歸切晒各依法製共爲細末煉蜜丸梧子大每五十丸空腹温酒下取下惡物爲驗未下再服此藥宜太癸合之乃武當高士孫碧雲方也

經水不調　或前後或多少及胎前不安産後惡血不下兼治冷熱虛勞腰脊骨節煩痛並寒疝

East Asian Library Princeton University
Digitized by Google and the Gest Collection

痛引陰中自汗欲死　明理方丹參洗淨切晒爲末每服二錢温酒調下常服功倍四物

白帶不止因濕熱者　槐花牡蠣煆過等分爲末每酒調服二錢

崩血或下血　槐花一兩棕灰五錢白鹽一錢水三鍾煎至減半服之

崩血不止　槐花三兩黃芩二兩爲末每服五錢酒一碗銅秤錘一枚以桑柴火燒紅浸入酒內調服

漏血不止　槐花燒存性研末每服二錢食前用温酒送下

白帶　松香五兩酒二觔煮乾木臼杵細酒糊丸梧子大每服二三十丸取效

令婦有子　二月丁亥日取杏花桃花陰乾爲末戊子和井華水服方寸匕（即數分）七日三服

一方　楮罟子出廣西浸好酒內三日取飲每日飲二次百日當主懷孕

一方　立春日所下雨水是日夫婦淸旦虔取各飲一杯可以有孕取其資始發育萬物之義也

令婦產男　採虎鼻懸門中一年取下作屑熬與婦飲便生男兒但勿令人及婦知之知則不驗

轉女成男　明徹丹砂重三五兩者令孕婦佩之良

月經壅滯臍腹疼痛　當歸元胡各等分爲粗末每服三錢加生薑三片水煎服名元歸散

臍腹疼痛不省人事者　木通去皮爲藥炒五靈脂炒各等分㕮咀每服五錢醋水各半盞煎七分溫服

種子奇方　不但種子且無小產產後諸症　香附砂鍋內醋煮熟水洗焙末一勫當歸身酒洗焙末十兩鹿角刮去粗皮爲末三兩綿紙墊鐵鍋內火炒末二兩和勻醋爲丸每服三錢早晚各一服白湯下一月後入房即孕名歸附丸

婦人常服却病方　神仙附益丸香附一勫童便浸淨露一宿晒乾透水洗再如此三次用益母草十二兩洗烘爲末再用香附四

East Asian Library Princeton University
Gest Collection

雨艾葉一兩煮汁加醋大半共爲糊丸梧子大每
日百丸空心下　此方能治婦人百病生育之功
如神胎前産後俱服神妙無比藥雖不貴而功效
倍常眞仙方也宜常服之

白帶　雞子一枚頭開一孔放硫黃末五六分用紙
封好外用濕紙重重包裹火內煨熟空心燒酒送
下連進三枚卽愈

一方　雞子一枚頭開小孔入白礬末一錢五分辰
砂末五分用紙重重包裹醋浸濕火內煨透帶微
烟存性去紙將蛋殼爲末加麝香五釐分二服
每早熱黃酒調服卽愈重者再服一蛋無不痊矣

赤白帶下　白朮五錢白芍二錢車前子一錢雞冠
花三錢白帶用赤花赤帶用白花水煎服神效

經行不止　側柏葉白芍藥各等分水煎半冲酒服

經閉　厚朴炙三兩桃仁紅花各三錢水煎一碗空
心二次服三貼卽通

Digitized by Google
East Asian Library and the Gest Collection
University Library

崩血不止　陳年舊棕燒灰存性每服三錢酒下

一方　好桂心不拘多少瓦上煆存性空心米飲服三錢神效

婦女血厥平居並無疾苦忽然目閉口噤如死狀或微知人事眩冒移時方醒是卽血厥乃因出汗過多血少陽氣獨上以致氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方醒　白薇當歸各一兩人參五錢甘草一錢五分每服五錢水二盞煎半溫服

崩血血餘四兩絲瓜灰四兩好酒送下

血熱妄行　荷葉艾葉側柏葉生地黃俱生用各等分搗爲丸雞子大每服水二鍾煎八分服

胎前諸症　婦人受孕卽宜分房靜養則不生相火不受胎毒謹戒飲食五味則脾胃調和母之氣血易生子之形成必育內調七情外避風寒起居安順不持重用力不安逸多睡不登高涉險刻保胎元不致有犯則母無病子亦安生育亦順不然則百患隨之矣胎前不愼有惡阻胞阻子種子滿子煩子懸子癇子嗽轉胞子淋激經胎漏胎動不安小產墮胎子死腹中胎痿不長子瘖藏燥鬼胎等症其餘胎前傷寒食瘧痢霍亂泄瀉與男子雜症門中參治之

胞阻　卽妊娠腹腰疼痛

鹿角截五寸長燒赤投一升酒中卽數分又燒又浸如此數次研細末空心服方寸匕

Digitized by the Gest Collection
East Asian Library
University Library
Online COPY

一方 更兼內熱大小便閉 用蜂蜜芒硝煎化服之以二便通爲驗經曰有故無隕是也名蜜硝煎

胎上逼心 以葡萄根及藤葉煎汁飲之卽安

胎動不安 阿膠炙研末二兩香豉一升葱白一升水三升煮取一升入膠化服

一方 腰痛下血 阿膠炒二兩熟艾葉二兩葱白一升水四升煮一升分服

一方 因數慣傷胎下血不止者 鯉魚一尾治淨阿膠炒一兩糯米二合水二升入葱薑橘皮鹽各少許煮臞食之

五七日見效

一方 腹痛下黃水 陳糯米一合黃芪川芎各五錢水一升煎至八分作二次溫服胎漏下黃汁或如豆汁同方但黃芪須二兩川芎一兩

胎漏 卽妊娠無故下血也 血出人門腹不痛 卽數分 豆醬二升去汁取豆炒研酒服方寸匕日三服

一方 童子雞一隻去毛臟塞生嫩黃芪在腹內縫

好用沙鍋盛雞宰鐵鍋內不用水以稻草在鍋底
緩緩燒熟將雞肉淡喫之黃芪烘乾研末每黃酒
服五錢俟用三隻全愈

一方　蓮房燒研麪糊丸梧子大每服百丸湯酒隨
下日二服

妊娠尿血　尿與血同出也尿血出尿孔亦不痛　豆醬一大碗乾生地
爲末每服一錢米飲下

一方　阿膠炒黃爲末食前粥飲下三錢

一方　屬膀胱熱也　四物湯加血餘白茅根煎服以涼之

妊娠下血　阿膠三兩炙爲末酒一升半煎化服之

一方　阿膠二兩炒爲末生地黃半觔搗汁入清酒二升分三服

一方　黃明膠二兩酒煮化頓服

一方　生鹿角屑當歸各五錢水三盞煎至減半頓服二服卽愈

一方　初胎至四五個月下血者　取葱白一大把煎湯飲之卽安胎前諸症

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY © Princeton Theses Collection

下血皆屬胎漏也

妊娠血痢 阿膠二兩酒一升半煮至一升頓服

一方久痢不愈者 龜甲一枚醋炙爲末米飲服一錢日二服取效產後下痢不止者亦宜之

妊娠感寒 鯉魚頭燒灰爲末酒服方寸匕即數分

一方 大鯽魚一頭燒灰酒服方寸匕若無汗腹中緩痛者以醋服取汗即數分

妊娠瘧疾 夜明沙末三錢空心温酒服

一方 端午日午時用大蒜頭黄丹和爲丸桐子大臨症令患者清晨早向東南方服四丸無根水下

胎痿不長 鯉魚肉同鹽棗煮汁服

子啼 孕婦腹中或有鐘聲或兒在腹中啼哭爲子啼 黄連煎黄連一味煎湯調空房中鼠穴内土服之自愈

臟燥 孕婦無故時時傷悲哀痛象若神靈憑依爲臟燥 甘麥大棗湯甘草三兩小麥一升大棗十枚以水六升煮取三升分

East Asian Library
Property of CUP
Princeton Gest Collection

三次温服此方亦能補脾虛

胎傷欲墮症因跌撲築墮 益母丸五月五日或六月

六日採益母草陰乾以石器碾爲細末煉蜜丸如

彈子大每用一丸入童便好酒各半杯研化以川

芎當歸煎湯沖服

墮胎腹痛下血不止 羚羊角燒灰三錢豆淋酒下

若面黃唇白者則宜服獨參湯

墮胎腹痛因中毒藥者 生白扁豆去皮爲末米飲服方

數分寸匕煎濃汁飲亦可

墮胎血瘀不下狂悶寒熱脹痛 生鹿角屑一鍾爲細末以

香豉湯服一錢日三服須臾血下卽安亦治子死

腹中湯中加葱白

子死腹中不下 取伏龍肝水調三錢服之其土當於

兒頭戴出博救方

一方胞衣亦不下血上沖心 雀麥一把水五升煮二升温服

亦治産難

一方　麝香當門子一枚桂心末二錢温酒服卽下

一方　雄鼠屎二七枚水三升煮一升取汁作粥食之卽下

一方　濕黃牛糞隔腹上卽下

一方　烏骨母雞一隻去毛以水三升煮至二升去雞用帛蘸汁摩臍下自出　卽數分

一方　夜明沙燒灰酒服方寸匕卽下

一方　月未足者　大豆煮醋服三升立便分解未下再服

妊娠小便不通因伏飲者　萊菔子炒爲末燈心湯下產寶方

孕中有癰　玆仁煮汁頻頻飲之

妊娠少腹痛尿澁乃膀胱水病熱甚也　導赤散生地三錢木通二錢甘草稍一錢燈心一團煎服

死胎不下　丹砂一兩水煎和酒研服卽下

一方　用珍珠末一兩苦酒調服卽下胞衣不下用之亦良

DO NOT COPY
Property of the Yes Collection
East Asian Library
Princeton University Library

轉胞症見飲食如常但煩不能臥不得小便是也　血餘一團燒灰酒服

立通

托胎不墜　慣墜胎者受孕一兩月以此方托之　杜仲八兩糯米煎湯浸透炒斷絲續斷二兩酒浸淮山藥六兩乳蒸爲糊丸或棗肉爲丸米飲下亦治胎漏

子死腹中　榆白皮煮汁服之立下

子煩　孕婦別無他症惟時時心煩爲胎熱乘心　產乳方以竹瀝汁不拘多少細服卽止梅師方加茯苓煎

驗胎法　婦人經過三月用川芎末空心熱湯調一匙服腹中微動者是胎不動者卽知經閉也

死胎不下　麝香一錢水研服立下

固胎法　常以四五年老母雞治取清湯煮粥食之

永免墮胎　銀苧酒苧麻根二兩剉碎紋如

胎漏　或下黃汁或如豆汁甚多者

銀五兩清酒一盞以水二大盞煎至一大盞去渣分二次溫服

East Asian Library Princeton University Library Rare Books Collection

預防難產臨產一月方服之　乳香去油五錢枳殼一兩爲末蜜丸每服三十九

妊娠傷寒護胎法　井底泥青黛伏龍肝爲末攪勻塗孕婦臍中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

死胎不下未足月者　川芎三錢當歸益母草各五錢爲末調勻服夏月加大黃三錢麝香五分冬月加肉桂三錢麝香五分或再加丹參五錢更妙

妊娠胎動已見黃水者　乾荷葉蒂二枚炙研糯米泔水調服即安

妊娠血痢　白芍三錢條芩一錢五分地榆白朮各八分甘草水煎服二服即愈

妊娠浮腫先自兩足漸至喘悶足趾出水乃素有風氣或冲動血脉並非水腫也宜服後二方

香附陳皮甘草烏藥天仙藤微炒洗各等分焙末每服三錢水一盞薑三片木瓜紫蘇各三分煎七分空心日三服腫消即止

一方　羌活蘿蔔子同炒香去子取活爲末每服三

錢溫酒調下每日一服五服立愈皆驗方也

死胎不下　用芒硝二錢童便温酒調服立下

生育　孕婦房內四時俱要寒温適中太熱太寒均非得宜夏須清涼勿令炎熱以致産母中暑暈迷倘有其事不妨少與涼水以解之冬須温煖勿令寒冷以致血凝難當多備火爐使産母腰背下身就火烘之穩婆本不可少之人然須先擇老成歷練明白經事者無故切勿令其先使試水探漿等事手法房中人多語聲喧嘩以致産母心氣虛怯産時困乏名曰驚生須急摒去只留服役一二人使寂靜而無嘈雜則母心始安胎亦帖靜如至八九個月或腹內疼痛痛定仍然如常名曰試胎宜服養血安胎之藥若月數已足腹痛或作或止而腰不痛者名曰弄胎二者皆非正産之時不宜躁擾憂疑惟宜靜待其時將至臨産坐草不宜太早如兒身未順帖可寬待倘使産母用力太早往往逼胎不正多至

Gest Library COPY
Courtesy of the Gest Collection
Princeton University Library

橫倒悔遲之憂既至臨產腹內如覺動轉疼痛亦須安詳切勿驚慌惟舒體仰臥或時時緩步容兒身轉如兒頭頂正當產門穀道挺出胞漿大下腹腰重痛中指中節或本節跳動方爲正產之時方可臨盆是時用力送兒自然順生矣生育時有交骨不開盤腸難產等症臨症者宜詳審其因而治之

交骨難開　開骨散當歸二兩或三兩川芎二兩敗龜板酷炙一具油髮一團燒存性須用生過子女婦人之髮爲末合勻每服五錢水一盞酒半盞煎八分乘熱沖服未效再服若氣血不足加人參寒

加薑桂熱加黃芪汗加桂枝揩加荆穗以意消息加減其效如神（髮灰燒末化者服之恐偶滲入肺管用時務將末化之髮去淨爲要）

預防難產及血氣痛　有妊時取海馬雌雄成對帶於身邊（雄者青色雌者黃色）臨時燒末飲之並以手握之即易產

一方　以水獺皮毛令產母帶之即易產

一方　馬齒莧同馬齒煮食臨產易下忌鱉肉

一方　葵花葉煮汁飲之葉黃莖赤者不堪用不可與鯉魚忝米同食葵花心亦不可食

一方 冬葵子 秋種經冬至春始結子者 取一二合杵破水煮服

一方 取雄鼠燒灰研末井華水服方寸匕日三服 即數分

一方 臨產時細嚼馬檳榔數枚井華水送下須臾

立產再以四枚去殼兩手各握二枚神效然此藥

婦人不宜常食恐冷子宮絕孕

難產 取蓮花一辦上書人字吞之即易產

一方 採人面子 出海南及廣中 令產婦手握一枚單日用

右手雙日用左手握之即下

一方 七月七日取不落水猪心一個帶血用乳香

不去油不拘多少拌勻搗丸每丸約三錢二三分

硃砂爲衣俟乾錫瓶封固臨期令婦面東以滾湯

調服一丸即下亦名開骨散橫生倒生用之實驗

一方 新鮮黃牛糞三錢百草霜三錢 茅草燒鍋者佳 生漆

渣三錢靈仙三錢用無灰酒煎一二滾或煎至一

茶杯或半杯服之立產

一方 金毛狗脊半個燒去毛打碎煎水服自順速

East Asian Library Princeton University Gest Collection

一方　取臘月白兔血以蒸餅染之紙裹陰乾爲末
每服二錢乳香湯下

一方　臘月取白兔腦子一個攤紙上夾勻陰乾剪
作符子於面上書生字一個候產母痛極時用釵
股夾定燈上燒灰煎丁香酒調下

一方　臘月採白兔頭骨收之臨症連毛燒灰酒服

一方　眞兔毫敗筆頭三個金箔三片以蠟和丸燒
灰酒服二錢

一方　羚羊角一枚削尖上末酒服方寸匕催之

一方　以騾蹄燒灰入麝香少許酒服一錢即下

一方　取郎君子一個或一對令產婦手握之則兒
即下極驗此物產南海有雌雄狀似杏仁亦難得
之物若置醋中即兩相盤旋不能已

一方　白雄雞雞距子燒灰酒冲服即易產

一方　用龜甲燒末酒服方寸匕即下

一方　水衣先破不即產者　魚鰾膠五寸燒存性爲末溫酒服

一方　經日不下者　鹿糞乾濕各三錢研末薑湯調服

難產及胞衣不下　以雞子白生吞之

難產及胞衣不下　癍血　臘月收白兔毛臨症燒灰酒服方寸匕極效

難產攻心脹欲死者　即數分

或子死腹中及胞衣不下者　採必思答產回部見忽必烈飲膳正要集中

難產酒煎服之即下

一方　以慈菇搗汁一升服之即下

盤腸產　腸乾不上諸藥不效　以磨刀水少許潤腸煎好磁石水一盃溫服自然收上此乃扁鵲神方

一方　以萆麻子仁搗爛貼產婦頭頂心處俟腸收上急以水先淨內服大補氣血藥加以升提之味預防暈迷

孕婦將產急取井華水服半升屢驗滑胎易產

難產催生　醯漿和水少許頓服即易產

外臺方大麥芽一升炒研末和蜜一升服之神驗

難產及子死腹中　以蟹爪煎湯服之即下

橫生倒生　手先出爲橫生又爲覓鹽生足先出爲倒生皆孕婦將產錯用努力所致也

East Asian Library Princeton University Digital Copy Courtesy of the Princeton University Library

手先出者急令產母仰臥略以鹽半分塗兒手心仍以香油抹之輕輕送入推上扶直待兒之身轉頭正然後服芎歸湯以助精力如渴則以蜜半小盞香油半小盞入滾水化開飲之可以潤燥滑胎令其易產饑則食以稀粥令其中氣不乏審是兒欲來方扶挾產母起身用力送之兒即生矣如送手入後兒轉快則不必服藥足先出亦如上治法死胎不下以平胃散一兩投朴硝五錢煎三五沸溫服其胎即化水而下切勿輕易用刀動傷兩命

盤腸生 未產腸先出也并有產後腸仍不收 急將淨盆盛溫水遇寒天則用熱水少入香油養潤待兒并胞衣下時令產母略略仰臥自己吸氣上升并令穩婆以香油塗手徐徐送入

一方 以半夏爲末搐鼻中其腸自上

一方 以麻油潤火紙撚點火吹滅將烟熏產母鼻

中腸自上

East Asian Library and the Gest Collection Digital Copy Princeton University Library

一方 灶心土一錢爲末酒送下仍以酒調搽母臍
中卽產

一方 酒娘麻油蜂蜜童便雞子白各半盞煎温服
卽下

一方 經日不下者 眞雲母粉五錢温酒調服卽產

產後 丹溪曰胎前當以清熱養血爲主產後宜以大補氣血爲主雖有雜症從未治之蓋恐後之學者不善用之多有風寒未解瘀血未盡妄施補劑反致大害不可不察也產後有胞衣不下致大害不可不察也產後不絕頭疼心胃痛腹痛少腹痛脇痛腰痛偏身痛腹中塊痛筋攣傷食嘔吐胞逆氣喘浮腫發熱寒熱自汗頭汗中風痙病痰癍抽搐不語驚悸恍惚妄言見鬼發狂虛煩發渴咳嗽衄血痢疾瘧疾疾蓐勞虛羸血崩大便秘結小便淋閉及頻數不禁淋漓大便出血敗血成癰種種形症臨症者不可拘泥一偏當合形症脉三者詳審

胞衣不下 蓮房酒煎服之卽下蓮蒂亦可是症多

因血入衣中爲血所脹故不得下治之稍緩則脹滿冲心疼痛喘急多屬難治

一方　奪命散沒藥血竭各等分研細未兒纔產下即用童便甜酒各半盃煎一兩沸調下二分良久再服其惡血自隨胞衣而下自免上衝心胸且免諸疾

一方　以洗兒水一盞與飲之即下勿令產母知之

一方　以草紙燒烟熏產母鼻令氣內納即下

一方　以滾水一鍾磨好墨一二匙沖服即下或以酒磨更妙

一方　以萆麻子仁四十九粒搗塗右脚心衣下速洗之

一方　令產母將自己頭髮填入口中作嘔即下

一方　黑牛糞略焙帶潤以布裹之束於腹上即下

一方　以酒和臘生豬脂能凝者爲脂煎服之多服爲佳

一方　生豬脂一兩水一盞煎五七沸服之即下

East Asian Library
Princeton University
Do Not Copy
Gest Collection

一方　生鹿角屑三錢爲末薑湯調服速驗

一方　急以水入醋少許嗅而卽下神效

玉門腫痛因初產傷重玉門腫痛者　濃煎甘草湯洗之其腫自平如玉門不閉則爲氣血不足所致宜大補湯

預防血暈　荆芥穗微炒爲末三錢俟兒一產下卽用童便入温水調服或豆淋酒調服名華陀愈風散虛者加人參五錢

血暈產後或因去血過多面唇色白或因惡露不盡面青色赤俱宜　川乾漆燒熏及用火燒鐵釘醋淬時時熏之自醒

一方因去血過多血脫而暈者　清魂散澤蘭二錢人參二錢川芎五錢荆芥穗微炒一兩炙甘草二錢共爲末温酒熱湯各半盞調一錢灌之下咽眼卽開氣定卽醒血瘀者以佛手散服之

一方血瘀　清酒一升和生地黄汁煎服

一方因血瘀者　魚鰾膠燒存性酒和童便調服三五錢其效如神

East Asian Library Princeton University Gest Collection

一方 因血瘀者 鹿角屑一段燒存性出火毒爲末酒調灌下卽愈

迷痧脹 卽產時昏迷也 產婦頭頂中必有紅髮三根急用烏鴉糞母猪糞各一兩滾水冲和澄清去渣並速將頭頂紅髮用銀針挑下以火煆入糞水內温服卽醒

血暈 因血瘀者 苧麻皮與產婦作枕枕之

惡露不下 皆因產後風冷相干以致氣滯血凝而不行腹中脹痛宜攻之 以酒下螃蟹立通

一方 取雞子一枚入醋一半攪服

一方 大黑豆熬令烟盡酒淋服

一方 蒲黃生用五靈脂研末酒飛去砂石生用各等分爲末童便與酒各半盞調服

一方 巴蕉根搗汁飲之

惡露不絕 卽產後污血日久不斷時時淋滴乃因瘀行未盡停留腹內隨化隨行者 以臘月猪取白兔頭骨連毛燒灰酒冲服若因衝任

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Columbia University Library

虛損血不收攝者又當用大補氣血之藥也

心胃痛因風冷寒凝氣血滯澁者 生薑五兩水八升煎服

一方 新羊血一盞飲之三兩次即止中風血暈欲死熱飲一升即活

一方 血上攻心刺痛欲死 取撙母猪湯温飲一大盞即愈

一方 以藕煮汁隨意温飲之梅師方

血滯腹痛及吐血崩中帶下

一方 血滯者 鯉魚鱗燒灰酒冲服

以兔頭炙熟摩腹間即止

一方 黃犬頭骨燒灰酒服二錢甚效

一方 瘀血未盡以致作痛 鹿角屑燒灰研極細末豉汁服方寸七日三服 數分 即

一方 血滯者 苧麻皮安產婦腹上即安

一方 產後胞寒者 以香桂散服之即佛手散加桂心等分酒調服

少腹痛產後蓄水作痛症見小便不利淋滴脹痛 馬齒莧搗汁三合煎沸入蜜一合攪勻服之產寶方

East Asian Library, Princeton University
DONATED to the Digital Princeton Collection
CC-NC-SA Creative Commons Non-Commercial Share-Alike

兒枕痛 產後少腹微痛乃血塊未盡惡露積於太陰也 用山查煮汁以沙糖調服

一方 以蟹殼燒灰酒沖服

腹中塊痛 因新產之後風冷乘虛而入以致瘀血凝結者 大茴香二十七枚雨前陳茶一撮白糖一撮辮葱頭三莖胡桃三枚水酒各半碗煎八分服之卽愈

產後呃逆 皆因氣血兩傷脾胃虛寒中焦之氣逆而不順所致 丁香豆蔻散丁香白豆蔻伏龍肝各等分爲末生薑湯點服或用桃仁吳黃煎湯沖服如不止以參附湯大補之若見發熱面赤小便紅乃屬熱實也宜用茹橘飲

竹茹橘紅各三錢柿乾一枚水薑煎服

一方 呃逆煩亂 取柿餅一個煮汁熱飲

產後氣喘 乃極危之症 如因惡露不行敗血攻肺而喘則面色紫黑屬實症奪命散下之瘀去喘止方見胞衣不下若面色淡白則屬虛症也 用二味參蘇飲人參一兩爲末以蘇木二兩煎湯沖服

氣分浮腫症見輕虛浮腫心胸脹滿因素有水飲所致也　枳术湯枳實炒白术土炒各二兩水煎分服

虛汗　小麥麩牡蠣等分爲末以猪肉汁調服二錢日二服

一方　猪肝薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸匕（即數分）

產後悶亂口乾腹痛因血氣上攻也　梅師方生藕汁三升飲之

一方　藕汁生地黃汁童便等分煎服

產後寒熱心悶極脹　自病青羖羊角燒灰酒服方寸匕（即數分）即愈

產後煩悶汗出不識人　羚羊角燒灰爲末東流水服方寸匕（即數分）若因敗血冲心者加芍藥枳實等分炒研末飲下

產後煩熱不食　白犬骨燒灰研末水服方寸匕（即數分）

產後痙瘛抽搐或頭身强直乃因去血過多風入於臟與破傷風同不可遂作中風而治

魚鰾膠一兩以螺粉炒焦去粉爲末分三服煎蟬
湯調服甚效

產後中風角弓反張口噤攣搐五緩六急手足麻痺
頭暈眼眩嘔吐煩悶惡血不下等症俱宜
產寶方小黑豆一升炒令極熟乘熱投清酒三
升令熱飲自半鍾至一鍾得微汗身潤則風邪自
除矣如無前症產後飲之亦能逐敗血散結氣除
痛免疾

產後虛羸 煮黃母雞取汁煎藥服黃者土色雌老
者坤象味甘歸脾氣溫益胃故所治皆脾胃之病
也

產後咳逆嘔吐心沖目運 石蓮子一兩五錢白茯
一兩丁香五錢爲末每以米飲三錢

產後血崩或因暴怒或因停瘀者 蓮房五個香附二兩各燒
存性爲末每服二錢米飲下日二服

產後肉線不收 卽腸脫也 老薑連皮三觔搗爛入麻油
二觔拌勻炒乾以熟絹五尺折作方結令人輕輕

Do Not Copy. East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

盛起肉線使之屈曲三圍納入產戶乃以絹袋盛薑就近藁之冷則更換温至一日一夜縮入大半二日乃盡入也是症亦屬陰挺之候

產後發狂　羊心一具益母草二兩童便浸同煮服

汁甚效

產後痢疾有餘之症

一方　血痢作渴屬熱　蓮薏即蓮米中心　生研末米飲服二錢

一方　人患渴痢津液枯竭口舌乾燥　冬瓜一枚以黃土泥裹四肢浮腫口

厚五寸煨熟絞汁飲之傷寒痢渴同方

一方　虛症滑脫　以米醋煮雞子黃食之

一方　痛下不止　肉豆蔻五個麪包煨至焦黃色乳香沒藥各二錢去淨油爲末入酒炒白芍湯內加砂糖

六七匙和勻頓熱服

產後虛悶　阿膠炒枳殼炒各一兩滑石飛過二錢五分共爲末蜜丸梧子大每五十九温水下取效

產後痢疾　蒼耳子葉搗汁服之聖惠方

Not Digitized Collection
East Asian Library
Princeton University

皆血分之病亦從其類也

胞衣不下　荷葉剉碎水煎濃汁服之卽下神效

産後中風　荆芥薄荷等分研末童便冲酒服神效

子腸不收　新鮮鯽魚煮焙研細一半搽腸一半酒服卽時收上

玉門不閉　吳茱萸兔絲子各一兩五錢蛇床子一兩硫黃四兩每用四錢水一碗煎湯頻洗自愈

乳症　婦人乳汁不行不脹痛者乃因去血過多血少不行也若脹痛者乃因瘀血停留氣脉壅滯也乳汁自湧者卽産後乳汁自湧不止乃氣血大虛非大補不可若少壯者見之又當酌審也又有乳癰之症乃乳房忽然紅腫硬痛增寒壯熱頭痛日久成癰潰則難治初起宜消毒寒熱宜解散成膿穿後或潰後宜培補日久不斂宜大補爲主也吹乳乳巖妒乳乳懸皆婦不通係兒吹所致當早消之久則成癰也乳巖者初起乳內結核如圍棋子不腫不痛且不痒但堅硬不散綿纏數年則從內潰破嵌空玲瓏洞竅深陷有如洞岩皆緣抑鬱不伸或性急多怒傷損肝脾所致其症甚克如不謹戒七情遠葷味解鬱怒多難痊愈也妒乳者卽乳頭慢生小瘡疼痛也乳懸一症乃因

Do not COPY
Harvard the Gest Collection
University Library

產後瘀血上攻兩乳忽然細長下垂過腹也

乳汁不行因瘀血停留者 赤小豆汁煮飲之卽下

一方 萵苣菜煎酒服之

一方 母猪蹄一具水二斗煮至六升飲之或加通草六分

一方 狗蹄肉煮汁服之

一方 羊肉六兩麞肉八兩鼠肉五兩作臛啖之

一方 水牛皮作羹食之不過兩日乳下無限氣壯

人尤效

一方 以麞肉或鼠肉一物作羹食均勿令婦知

一方 絲瓜連子燒存性研酒服二錢被覆取汗

其乳自下

一方 因去血過多者 四物湯加花粉王不留行木通猪蹄煮汁飲之其乳如泉

一方 穿山甲七片炒研王不留行三錢猪蹄同煮

NOT COPY
Digitized by the Harvest Collection
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方 二母散知母貝母牡蠣等分爲細末每用猪蹄湯調服三錢

一方 因瘀血停留者 白丁香王不留行花粉漏蘆殭蠶以猪蹄煎湯服之名湧泉散

乳汁自湧 產後食少乳多欲回其乳者 免懷散歸尾紅花赤芍牛膝各一錢煎服

一方 產後無兒食乳欲斷乳者 麥芽煎麥芽三兩水煎作茶飲

一方 產後乳汁暴下不止者乃氣血大虛宜 大補湯倍用參芪

一方 無兒食乳欲回乳者 神曲炒研爲末酒服二錢日二服

乳汁清少 用死鼠一枚燒灰酒服方寸匕 方寸匕即數分 七勿令乳婦知之

乳癌初起 雄鼠屎七枚研末同搗爛慈白温酒服取汗即散吹乳初起同方

一方 初起腫痛作寒熱 取蕪菁即蘿蔔苗也 去土不必洗淨用鹽少許搗和封乳患處熱即換之冬用根代一切瘡疽皆可搗敷之醋調敷禿瘡

DO NOT Copyright Collection
Fast Asian Library
Princeton University Library

一方初起者 黃牛齒一個燒存性研末酒調服

一方初起者 煮蒲公英苗飲之及封之立消

一方已成者 新濕鼠屎黃連大黃各等分爲末以黍米粥清和塗四邊即散

一方潰爛者 貓兒腹下毛相鍋內煅存性搽之

乳癰初發即乳癌症 黃明膠以濃醋化塗立消

乳癌初起 蒲公英金銀花俱須新鮮等分水煎入酒服搗敷亦良

乳癰及乳巖 敗龜板煅存性每服三錢糖拌酒下盡量飲之立消或用燒酒研服

乳癌不論已未破一服即愈 用栝蔞兩個穿山甲酥炙每栝蔞一個用一錢人弱者只用五分粉甘草六錢每個分藥一半搥一孔將藥裝入瓜內用好酒二觔水二觔同煮至一大碗臨臥熱服渣搗爛再用酒水各一觔煎連服將渣乘熱敷滿乳用布捆住蓋被出汗無不立愈

Digitized by Asian Medical Documentation Service
Not to be reproduced without permission of the Chinese Medicine Collection
Rush Rhees Library, University of Rochester

一方 並治吹乳　葱連根搗爛炒熟鋪患處上用瓦罐盛火熨葱上一時葱蒸熟出汗即愈或以葱搗爛炒熟敷之冷即換再炒敷上登時立消此奇穩妙方也

一方 初起者　澤蘭一兩青皮三錢白芨五錢橘葉三十片水煎加酒半盞冲服立效

一方 未結即散已結即潰　橘香散麝香一分陳皮去白五錢研末酒服二錢被蓋出汗即愈

一方 初起日者立消　活鯽魚一尾連頭骨生搗極爛香臘糟一團再研勻敷上一日後消小即去不消再貼屢驗第一方

吹乳 即乳管結核不散不早治之日久成瘡　栝蔞散栝蔞實乳香沒藥當歸甘草酒熬服即散服後不散加皂角刺膿成即潰未成即消外用南星半夏殭蠶白芷皂角刺草烏爲末以葱汁合蜜調勻敷之

一方　芸薹子搗爛敷之

Digitized by Harvard-Yenching Institute Library
Gift of Thomas Asan Library Collection
Princeton University
DO NOT COPY

一方發熱寒者　生猪脂冷水浸楊熱即易立效

一方硬痛不止　五月五日收黃鱔皮燒灰空心温服

一方掀痛難忍　鹿角屑炒黃爲末酒服三錢令汗出仍以頭梳梳之立止

一方韭菜地中蚯蚓糞二錢慈子一錢共爲細末醋調敷乾即易之三次即愈

乳巖未潰　以青皮甘草等分爲末煎濃薑湯常常服之外用木香生地搗餅貼患處以熱器熨之仍常服十六味流氣飲謹戒七情動腥怒氣如已潰爛又宜十全八珍歸脾等劑培補其氣血爲主也

乳巖初起　不腫不痛不痒但堅硬不散　堅硬結核相去乳頭甚遠者先用蒜塾於核上用艾灸三四壯以知疼爲度如平時覺發寒即用新蒲公英連梗葉搗爛加酒糟等分搗如泥敷至數次即止若不發寒反覺熱者即用蚯蚓泥　即兩後積水處蚓行所遺之泥加酒醋調敷立效其核若與乳頭較近切忌灸之

Not Copy Right
Chan Ahan Library
Pineta University
Digital Heritage Collection

乳癰　鮮山藥搗爛塗之外用綿紙蓋定上用絹縛
緊日易二次

妒乳　即乳頭忽生細小瘡痛也　鹿角散　鹿角甘草各等分爲末
雞子黃調銅器內炙乾敷之內服清熱涼血藥
一方　榆白皮爲末和陳醋滓調塗日六七次

乳懸　即產後瘀血上攻兩乳細長下垂過腹痛不可忍是也　川芎當歸各二
勉以半勉劑　末入瓦器內　水煎不拘時服其餘勉半劑
大塊用香爐慢火燒烟安病人面前棹下令烟氣

不絕須口鼻及病乳常吸烟氣以乳上爲度如縮
而仍不復舊用冷水磨萆麻子一粒於頭頂心塗
片時收即去之

欲令回乳　生炒麥芽各一兩入小雞腹內重湯久
炖去芽食雞食二三隻外用青菜葅葉拍軟貼乳
斷兒吮乳　斷兒之乳須滿三週早則令兒氣血不足　畫眉膏山梔三枚
炒存性雄黃辰砂各少許爲末入生麻油輕粉各
少許候兒睡抹兩眉醒來即不食未效再抹之

前陰婦女前陰有陰腫陰痛陰痒陰挺陰瘡陰痔陰冷陰吹及交接出血諸症陰腫即痃癖也其症子戶腫脹墜痛及兩疼痛有因心肝二經火盛濕熱下流有因中氣素虛下陷所致也陰痛又名小嫁痛其症陰戶痛極往往手足不能伸屈由鬱熱傷肝脾濕熱下注所致也陰痒者多因濕熱生蟲陰戶痒痛甚則肢體倦怠小便淋漓也陰挺即癲疝也其症陰中突出一物如蛇或如菌如雞冠或因胞絡傷損或因分娩用力太過或因氣虛下陷及熱濕下注所致屬熱者必腫痛小便赤數屬虛者必重墜小便清長也陰瘡又名蠶瘡其症多因七情鬱火傷損肝脾之氣血凝氣滯以致濕熱下注久而生蟲蟲蝕成瘡膿水淋漓有若蟲行其中或有少腹脹悶溺赤頻數食少體倦內熱晡熱經候不調赤白

For Non-Commercial Use Only
Courtesy of the Gest Collection
Princeton University Library

帶下種種兼症見之或腫疼或重墜潰爛出水而痛宜逐細審治之陰痔俗名茄子疾是症陰中有肉突出流黃水者易治流白水者難治症有虛實之分陰冷一症皆因風寒乘虛客於藏久之血凝氣滯多變他症且難於受孕宜早治之陰吹者陰中時時氣出有聲如穀道轉失氣狀乃由穀氣實胃氣下泄之故亦有虛實之分交接出血者言每於交接轉出血皆因傷損心脾也

陰腫重墜因氣虛下陷也　用防風三錢蘄艾一團大戟一錢熬湯熏洗更以枳實廣皮爲末炒熱騰之內服補中湯其腫自消而痛自定也或用秦艽六錢石菖蒲當歸各三錢葱白五個水二鍾煎一鍾食前服

一方　以新馬鞭草搗汁塗之此治濕熱下流之方與氣虛下陷者不同也

陰痛又名小戶嫁痛症　以四物湯末一料合乳香搗餅納陰中內服逍遙散加丹梔其痛卽止

一方　以海螵蛸燒存性酒冲服亦治陰蝕腫痛

一方或陰痒　以蛇床子同白礬煎湯洗之

East Asian Library Princeton University
Do Not Copy
Digitized by the Internet Archive Collection

陰痒　鯽魚骨燒灰敷數次卽愈亦治陰蝕

一方　以生黃豆曛爛塗之　汗出

一方　桃仁雄黃膏桃仁五錢研膏雄黃末三錢二味研勻用雞肫肝切片蘸藥納戶中其蟲卽鑽入肝內吮食俟痒止卽將肝提出內服逍遙或龍膽瀉肝湯卽愈　陰挺氣虛下陷

蜘蛛蘆爲末用猪脂調敷內服補中加青皮梔子自

愈

一方　鯽魚頭燒灰研服仍以油調搽之亦治脫肛

陰蝕　又名齲瘡陰戶外生疙瘩內生小蟲作痒　生雄雞肝切片納入陰中引蟲出盡卽瘥

一方　肥猪肉煮汁洗之不過七八次卽瘥男子陰蝕亦治之

一方　光粉炒黃雞雞子裝稀絹裹納陰中引蟲出盡卽愈

East Asian Library Princeton University DO NOT COPY Property of the University Library

一方 以水牛肝納入陰戶引蟲出盡卽愈

一方 以貓頭燒灰服之

一方 及陰症諸瘡 鯽魚炙爲末和油塗之能殺蟲止痛

一方 狼牙草煎湯洗之如瘡深洗不可及以草四兩水四升煮至半升用綿纏筋如繭形浸湯懸陰內一日四遍蓋取其寒能勝熱苦能殺蟲也

陰脫 陰戶開而不閉痛痒出水由產後得者 用荊芥枳殼訶子文蛤大劑煎湯薰洗內服補中湯加北味醋炒白芍服之卽愈其薰方如遇因憂思太過而成者亦宜用之內宜服逍遙歸脾等劑俱加柴梔芍丹服之

陰挺 陳石灰熬黃水泡澄清溫洗數次卽愈

陰脫 煎羊脂頻塗之神效

陰痔 俗名茄子疾 以烏頭燒存性用醯醋熬薰內服逍遙或補中歸脾等劑量其虛實酌而行之

陰冷 用遠志乾薑蛇床子吳茱萸研細末綿裹納陰中一日二次換溫名溫中坐藥宜多服桂附地

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黃丸自不艱於受孕矣

一方（陰戶掣痛少腹惡寒）蛇床子散蛇床子末一味用白粉少許水和勻如棗大綿裹納戶中每日溫之

陰吹　膏髮煎婦人頭髮一團用猪膏熬化服之小便利則愈虛甚者以十全湯加升柴以升提之

交接出血　千金方桂心釜底墨等分共爲末酒服（卽數分）方寸匕或用歸脾湯加伏龍肝煎服之

DO NOT COPY
East Asian Library and the GES Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

T COPY
and the Gest Collection
iversity Library

一方 以潔淨器盛所出之腸濃煎黃芪湯浸之腸即上此法最佳收後再服大劑補中湯更妙或因產母用力太早兒并胞衣下後膀胱墜出產戶者亦同前法徐徐送入收後宜服安內臟藥

逆產催生 催生如神散百草霜取釜底心者白芷不見火各爲末等分每服三錢以童便米醋調和如膏加沸湯下或童便酒煎進二服此方大能固血潤血

一切難產 益母草酒煎濃汁加童便一大杯服之生半夏白蘞等分爲細末急以無灰酒調服一錢神驗之極

一方 順生散用婦人舊頭繩一條燒灰服之虛者加參服之

難產或遇一兩日夜不能生下或橫生倒生及胎衣不下 生半夏白蘞等分爲細末急以無灰酒調服一錢神驗之極

一方 順生散用婦人舊頭繩一條燒灰服之虛者加參服之

湖南鮑雲韶云余幼時管服二劑之後連生二女一男一女一男皆順產無難產之苦而下壓生產西國法以此方營時不須按產婦腹上可揮也宜詳審也要

以手指口而亡以此方救人多知之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Not Copyrighted

一方 以潔淨器盛所出之腸濃煎黃芪湯浸之腸即上此法最佳收後再服大劑補中湯更妙或因產母用力太早兒并胞衣下後膀胱壅出產戶者亦同前法徐徐送入收後宜服安內臟藥

逆產催生 催生如神散百草霜取釜底心者白芷不見火各爲末等分每服三錢以童便米醋調和如膏加沸湯下或童便酒煎進二服此方大能固血潤血

一切難產 益母草酒煎濃汁加童便一大杯服之

難產或遇一兩日夜不能生下或橫生倒生及胎衣不下 生半夏白蘞等分爲細末急以無灰酒調服一錢神驗之極

一方 順生散用婦人舊頭繩一條燒灰服之盡者加參服之

一方三兩日不下者 眞金箔十張溫水研勻再添溫水半盞先令產婦坐令一婦用兩手將大指按產婦兩肩穴服下其胎即下矣

East Asian Library, Princeton University
Not copyrighted and the Gest Collection

產後血暈原因產後即臥以故惡血上衝
凝擬用大寬格令人扶住產婦坐於其上或將枕頭墊高或將寬格下側
庶可引血下行行　高明酌之　讀識

玉門不閉　蛇牀子炒熱熨之

產後口渴氣喘面赤有斑大便泄用行經利水之藥不效者　杜牛膝一名地松濃煎膏飲以下血小便通利為愈此乃破血之劑也

用之者勿忽之

血暈因血瘀者　蘇木煮汁服或加乳香去油酒調服

一方　以火淬醋令婦聞其氣自醒

一方　以五靈脂半炒半生水調服一錢

血氣攻心潮熱作渴　百草霜二錢紅花三錢為末童便一鍾好酒半鍾沖服立止

產後却病　新產時即取烏骨雄雞煮極爛取汁作粳米粥與食自無百病

一方　以烏骨母雞治淨和五味炒香投酒二升封一宿取飲令產母肥白或再加炒芝麻入酒中極妙酒少量加之烏色屬水肥象屬陰故烏雞所治

Digitized by the East Asian Library and the Gest Collection at Princeton University
Non-commercial use only

產後血暈垂死者　紅花數十觔煮湯寢婦於上熏之湯冷再加不過半日卽蘇

玉門不閉　蛇牀子炒熱熨之

產後口渴氣喘面赤有斑大便泄用行經利水之藥不效者　杜牛膝一名地松濃煎令婦閉其氣自醒

前膏飲以下血小便通利爲愈此乃破血之劑也用之者勿忽之

血暈因血癈者　蘇木煮汁服或加乳香去油酒調服

一方　以火淬醋令婦聞其氣自醒

一方　以五靈脂半炒半生水調服一錢

血氣攻心潮熱作渴　百草霜二錢紅花三錢爲末童便一鍾好酒半鍾沖服立止

產後却病　新產時卽取烏骨雄雞煮極爛取汁作粳米粥與食自無百病

一方　以烏骨母雞治淨和五味炒香投酒二升封一宿取飲令產母肥白或再加炒芝麻入酒中極妙酒少量加之烏色屬水肥象屬陰故烏雞所治

Digitized by the East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University