PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷六

DO NOT C
East Asian Library an
Princeton Un

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/2535
v.8

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方續集卷六

小兒初生

有拭口斷臍浴兒藏衣剃頭諸法症有不啼不乳眼不開吐不止不大小便二便不通肛門內合噤口撮口臍濕臍瘡臍突臍風天釣內釣盤腸氣目爛懸癰重齦鵝口吐舌弄舌重舌木舌吐乳夜啼胎黃胎赤赤遊風初生無皮變蒸急驚風慢驚風慢脾風等症用藥施方最宜詳慎庶不致誤

拭口 小兒初生口中自多不潔 速用軟棉裹指拭口令淨隨以臙脂蘸茶清擦口齒舌頰自免諸病臙脂法

下胎毒 不論四時虛實俱宜 用粉甘草一節水煎濃汁以棉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

纏指蘸汁令兒吮之則胎毒自解矣甘草法

一方看兒有胎熱者　用黃連搥碎湯浸出汗時時以少許滴兒口中以臍糞下爲度其毒自清矣黃連法

一方胎熱便閉者　硃砂一大豆許研細水飛過煉蜜調勺乳汁化服最佳稟氣弱者不宜用之砂蜜法

一方怯弱之兒或值冬月以此解之　用豆豉煎取濃汁與兒吮至三五口其毒自開矣豆豉法

一方　韭菜汁少許灌之卽吐惡血永無疾病

一方落地卽用之　橄欖一個燒灰硃砂末五分和勻嚼生芝麻一口吐唾和二藥絹包如棗核大安兒口中待咂一個時辰方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾及出痘稀少也

一方初生三日宜去驚邪辟惡氣　以牛黃一豆許赤蜜如棗核許研勻棉蘸令兒吮之一日吮盡

一方　俟臍帶自脫卽用帶置新瓦上以灰火四圍燒至烟將盡放土上用磁杯蓋一時辰研末預將

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

辰砂研末水飛晒乾如帶重一錢加辰砂五分用生地當歸煎汁調前末抹兒上腭間及母乳頭上以一日內服盡次日大便遺下穢濁則終不患瘡瘡及諸疾生一子則得一子矣名延生第一方

拭口　每日夜將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白點即以細針挑破取桑樹內汁濾清塗之永無驚風撮口之患慈幼外編方

斷臍法　嬰兒生下先用剪刀向火烘熱剪斷臍帶以六寸為主　短則傷臟長則損肌斷訖次用火器繞臍帶烙之又用預備烙臍餅子即豆豉黃蠟等分麝香少許先以豉香研勻鎔蠟量臍大小捻為餅子貼臍上以防風邪外入隨用細熟艾一塊圍臍帶用軟絹封裹之以避尿濕風邪

三朝灸臍法　用麪和水成薄餅置兒腹穿臍帶於麪上將艾火灸臍帶近臍處或三五炷須下帳避風灸畢仍將臍帶紮好聽其自落至七日方脫者

East Asian Library / Rd the Gest Collection / Princeton University Library / DO NOT COPY

元氣足也

裹臍法　用白練揉軟方四寸新棉厚半寸與帛等合之緩急得中急則令兒吐不可輕解解時閉戶下帳冬間用火令帳內溫煖仍以溫粉敷之若臍不乾或用枯礬五錢龍骨黃丹各一錢麝香少許爲末敷之或用亂髮燒灰敷之或用黃柏末敷之俱好千金論方

三朝浴兒法須擇無風處浴之適可而止不可久在水中冬恐受寒夏恐傷熱　以桃槐桑梅柳五枝熬湯加入猪胆洗之能去污穢滋肌膚免生瘡疾

一方能解惡氣去瘡疥驚風驚癇鬼疰却一切病症　以虎頭骨煎湯浴之脛骨更妙

一方　用苡仁葉煎湯浴之無病

除夜浴兒　七八月或三伏或中秋日剪壺蘆鬚如環子脚者陰乾於除夜煮湯浴之則可免出痘

藏胎衣法　用新瓶一個將胎衣裝入以青布裹瓶

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

口擇向陽高燥地方天德月空方位處掘地三尺埋之若不嚴密於兒不利　天德卽正丁二坤三壬四辛五乾六甲七癸八艮九丙十乙十一巽十二庚方是也　月空卽正三五七九十一六佪月單月在丙壬二方二四六八十十二六佪月雙月在甲庚二方是也居家者不可不知

彌月剃頭方須於密室溫處剃之爲其氣血未盈寒風易入剃後　用杏仁三枚研細入薄荷三葉再同研將麻油滴三四點合膩粉拌勻搽頭上能避風邪免生瘡癤熱毒

不啼俗名草迷　急以葱莖輕輕擊背氣通則出聲矣如無葱以手輕擊之亦可遇夏或灌冷水少許

一方其氣欲絕者　急以綿裹抱懷中未可斷臍將臍帶且置炭火上烘之仍作大紙條蘸芝麻油點着於臍帶上往來遍燎之使火氣入臍內則臍中溫煖更用熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴斷臍切記之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方 用石菖蒲搗生汁入口即活赤水元珠

一方恐係肛門爲脂皮閉塞 急用簪通開自能出聲

一方即看喉間恐生懸癰或前腭上有一泡 用棉裹長針微露鋒刺破以帛拭去惡血勿令嚥下即能通氣吮乳

熏臍帶法兒方離腹或值天寒氣爲寒閉聲不能出 急用棉絮裹抱於懷中且勿斷臍用紙撚蘸油點火於臍帶下往來熏之令熱氣入腹則寒得溫散氣得煖通啼聲自出矣

初生不乳 慈白寸許破開以乳汁同入磁器內煎三四沸灌下

一方兒生後因腹中臍糞未下致兒腹滿氣短嘔吐不能食乳 以一撿金爲細末用少許合蜜水調服

一方兼見鼻塞不通 用三煉酥中精液二合木香零陵香各四分煎成膏塗頭上并塞鼻中甚良

一方或因剪刀股裹緊吃乳不下 用獨蒜切薄片放在兩腿以艾灸之如哭即好不哭無救

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

眼不開由胎中受熱也　熊胆黃連各少許煎水洗之一日七八次其目自開如三日又宜服四物加甘草花粉服之

吐不止脫胎後因便秘腹中穢惡不淨令兒腹滿所致　以一捻金爲末少許飲服之若因感寒及受熱者切勿與之

不小便胎熱流於下也　導赤散生地木通生草燈心竹葉水煎服加黃連滑石赤苓更妙

一方熱甚者　豆豉膏淡豆豉一勺田螺十九個葱一大束搗爛用芭蕉汁調貼臍上內服導赤散

不大便又名鎖肚皆在胎受熱毒氣滯肛門所致其兒必面赤腹脹不乳多啼　先用硃蜜法藥治之如不應以一捻金量兒與之卽令婦人溫水漱口吸咂兒之前後心手足心并臍心共七處以皮見紅赤色爲度須臾大便自通亦治二便不通

不小便　大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分四服卽通便通卽能乳若臍四圍有青黑色及口

East Asian Library and the Rest Collection Princeton University Library

一方七日內面赤喘急啼聲不出卽名撮口臍風看齒齦上有小泡如粟米狀　急以溫水蘸青軟帛畏指擦破卽愈

一方　用殭蠶四枚去絲嘴炒爲末蜜調敷唇內卽愈

愈奇效

臍瘡皆因尿濕浸臍以致煩赤成瘡　金黃散川連二錢五分胡粉龍骨煅各一錢研細末敷之

一方　蠟猴猪頭肉燒灰敷之

臍突卽臍忽腫赤虛大光浮是也乃兒腹中蘊熱無所發瀉頻頻伸引睡卧不甯努脹其氣沖入臍間而成　二豆散赤小豆不去皮豆豉南星去皮臍白蘞各一錢爲細末用五分芭蕉汁調敷臍之四旁日二次內服消毒藥再忌寒涼之品

一方　猪頰車骨中髓十二銖杏仁五錢研敷之

臍瘡　海螵蛸燕脂爲末油調搽之

臍風是症皆因斷臍後乳母不愼以致水濕風冷之氣入於兒臍中令兒臍腫多啼面赤喘急不乳急用艾燒灰塡臍中卽愈

一方　全蠍一個去翅足酒炙麝香一分爲細末金

East Asia Library Princeton University Collection

器煎湯沖服卽愈

撮口發驚　甘草生用二錢五分水一盞煎六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中自愈

天鈎眼目上翻手足瘈瘲爪甲色青症似驚風但目多仰視較之驚風稍異　用蟬蛻以漿水煮一日晒乾爲末每用一字冷水調下

灸臍風法　兒生七日若有臍風肚腹必發青筋一道行至肚却生兩盆待行至心則不治必詳視其青筋初起連照青筋頭上灸三壯或行至兩盆亦照兩盆頭盡處各灸三壯青筋自消而風去矣

臍瘡　伏龍肝研末敷之

盤腸風皆由寒邪所搏肝腎居下故痛時曲腰不乳緊蹙雙眉　乳香沒藥俱去油等分爲末木香磨水煎沸調末一錢服效外用熨臍法淡豆豉生薑切碎各二錢葱白五莖食鹽一兩同炒熟置臍上熨之

目爛胞邊赤爛痛痒難睜　燈心蘸烏雄雞胆點之內服生地黃湯卽四物湯加花粉甘草

目赤　青羖羊肝切薄片井水浸貼以愈爲度

懸瘟（即喉裏上腭腫起如蘆笋盛水之狀）　以綿纏長針留鋒刺之瀉出毒黃赤汁如未消來日再刺刺後以鹽湯拭口冰片朴硝各一字（即二分五厘）爲極細末蜜調少許鵝翎蘸藥搽口中即愈亦治重齦

鵝口（滿口白屑如鵝之口自內生出可治自外生入不可治）　用食草白鵝所下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鵝糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之立效

一方　雞內金爲末和人乳服五分

一方（或重舌）　海螵蛸同雞子黃塗之

一方　甘草黃連各一錢煎濃以帛裹指入口中拭去以不復生爲度自不復發

一方　黃丹爲細末竹瀝調塗口中洗之其白點即落一日洗三次再以辰砂益元散燈心湯下神效

白膜裹舌（即鵝口也）　先將舌輕刮出血以白礬少許敷之否則發驚

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY Gest Collection

舌瘡飲乳不得　白礬和雞子置醋中塗兒足底二七口即愈永不復發

懸癰喉舌腫塞疼痛　五棓子殭蠶甘草等分爲末以白梅去核搗丸彈子大噙嚥其癰自破外科秘寶

鵝口　先用髮蘸井水拭口次以保命散即白礬燒灰硃砂水飛各二錢五分馬牙硝五錢研細末以白鵝糞水攪取汁塗舌與口角上內服清熱瀉肝火藥

吐舌其舌伸長而收緩面紅煩燥口渴尿赤　木通生地黃連生甘草等分燈心作引煎服即愈名保心導赤湯亦治弄舌木舌急驚心經有熱

重舌舌上近舌根處腫似舌形　露蜂房燒灰酒和敷舌下數次即愈

一方　三家屠猪肉切指大摩舌上兒立止啼

一方　鹿角生末塗舌下日三次

一方及口瘡　鯽魚頭燒灰研末飲服如頭瘡以末搽

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

之目翳洗之

鵝口　地龍擂水塗之立愈

目澁（月內目閉不開或腫或羞明或出血各慢肝風）　甘草一節以猪胆汁炙爲末每用米泔水調少許灌之

木舌（兒舌滿腫不能轉動）　鮮鯽魚切片貼之頻換取效或鯉魚片貼之以帛繫之亦妙

一方　川消散朴硝五分眞紫雪二分白鹽一分爲極細末以竹瀝調敷舌上內服瀉心導赤湯（方見吐舌）

一方　百草霜芒硝滑石爲末酒調敷之

臍瘡　蠐螬（卽俗云老木蟲）研末敷之不過數次卽愈

口瘡　葧臍燒存性研末摻之

一方　青羊脂煎苡仁根塗之無苡仁卽以乳細濾入口含之數次卽愈

一方　青羊鬚燒灰和油敷之並治蠼螋尿瘡

流涎　鹿角屑末米飲服一字（一字卽二分五厘）

吐乳（因寒而吐者面色青白糞清多沫手足指冷）　白蔻砂仁各十四粒

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

生炙甘草各二錢爲末常摻入兒口中卽止若直出不停者以炒麥芽三錢橘紅一錢丁香三分水煎服立止危氏得效方

夜啼但啼別無他症　硃砂書甲寅二字貼床頭卽止

一方　蟬花散蟬蛻不拘多少下半截研細末每以少許煎薄荷湯調下

一方　以豺狗皮和狼屎中骨頭燒灰等分水服少許卽止

一方　白馬骨燒灰敷乳頭令兒吮之卽止

一方　赤馬懸蹄燒灰敷乳頭令兒吮之卽止

一方　青牛蹄甲研末貼臍上卽止

一方　牛屎一塊安席下勿令婦知

一方　取母猪窠中草密安席下勿令婦知

一方　以白雄雞左右翅硬毛安席下勿令婦知

一方　以紅雞冠血塗兒臍中男用雌女用雄

一方　因心經有熱症見面赤唇紅身腹俱熱小便不利煩燥多啼者　導赤散服之

Est. Asian Library, Rare Book Collection, Princeton University Library

方見不小便

一方狀似邪祟　牛黃一豆許乳汁化服仍以硃筆密於兒臍下寫一田字即止屢驗形色虛者勿用黃

一方凡在一百二十日內者　蟬蛻四十九個用下半截爲末分四服鉤藤湯下

驚啼　蟬蛻二十個去翅足入硃砂末一字即二分五厘密調吮之

日啼不止兒在月內者　牛黃神砂飛各五釐爲極細末塗兒舌上立止

夜啼　用燈花燒灰塗乳頭令兒吮之或用燈花四五九捻爛以燈心湯化下

一方　雞糞塗兒臍中極妙男雌女雄

一方　用井邊草或雞窠中草安席下勿令婦知

胎黃偏身面目皆黃其色如金乃兒在胎受母熱毒之故　眞牛黃一豆許入蜜調成膏乳汁化開時時滴兒口中若形色虛者宜忌之亦治驚癇嚼舌迷悶仰目

月內胎驚　母猪乳同牛乳硃砂少許抹口甚效

赤遊風皮膚赤熱而腫色若丹塗遊走不定行於徧身若歸心腹則逆　川山甲炒炙血餘煆等分爲末每服五分輕者三分黑糖拌百滾湯送下外用千脚泥一兩晒乾或烘加珍珠三分同研細菜油調敷卽愈

一方　野葡萄根搗如泥塗之

一方兒在百日之外者　外用砭血法及敷藥先以口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將筋頭劈開夾住用線縛定兩指輕撮筋梢令磁鋒對聚血處再用筋一根頻擊刺出毒血砭後毒甚者用敷藥卽黃蘗炒生草烏各爲末等分用漱日水調敷頻以漱口水潤之若毒輕者砭之卽不敷恐作痛也如患在頭者勿用砭法祇宜用針倒挑患處出毒血則愈

一方兒在百日之內者　外治法用生猪肉切片貼於赤腫處數數更換自愈或用赤小豆不拘多少研細末

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

用雞子清調塗乾則再塗兒在百日內外俱宜內服清熱解毒藥

一方　竈心土不拘多少雞子清調至得宜敷之

一方　船底青苔爲末調敷

初生無皮（因月分未足生育太早遍體浸漬紅軟而光面白肢冷者）　用撲粉法

用早稻白粳米作粉時時撲之肌膚自生

一方（因遺毒傳染或上或下或下半身赤爛甚至色帶紫黑者）　用未經水濕成塊石灰四兩用水泡之沒指半許露一宿面上有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多寡對小磨麻油亦如之以順攪成膏爲度用雞翎搽之自愈

臍中出汁（赤腫潰爛）　赤石脂煆研末敷之立愈獨行方

三朝哺兒法（兒生三日應開腹助穀神壯胃氣）　用粟米煮熟研如乳煮與兒一大豆許飲之甚佳且與少乳之兒甚便不可合他物及雜藥同食

一法　以晚陳粳米煮粥如乳量食之兒稍長則合

DO NOT COPY
East Asian Library, Gest Collection
Princeton University Library

芡實煮粥食之香粳米更佳

急慢驚風 一見搐搦必神氣昏憒皆由痰壅氣塞壅結胸中而致急用 通關散

生半夏皂角細辛薄荷各等分爲細末用筆管吹鼻內少許有嚏主可治無嚏主不治其搐以男左手女右手男大指在外女大指在內爲順反則爲逆治者宜切記之如有嚏及指順者則審表裏虛實隨症治之

急驚風 暴發壯熱煩急面紅唇赤痰壅氣促牙關緊急二便秘濇 遠年白螺殼燒灰入麝香少許水調灌之此治熱極生風之藥

一方 因熱極者 熱牛糞用麻布擣汁一盞入當門眞麝少許攪勻灌之立愈

急慢驚風 急驚形症已見前條慢驚發則緩緩搐搦時作時止面色淡黃或青白相兼身溫和昏睡眼合或睡卧露睛脉來遲緩神氣慘慘大便青色急驚陽症屬有餘慢驚半陰半陽症屬不足也 一半硃砂一半雪 即冰片各一兩爲細末 其功全在青蒿節 節內蟲名向南蟲秋末收取蟲汁爲丸如菉豆大每歲一粒 任他死去亦還魂服時須用生人血 即母乳也用以調服無乳用鈎藤煎濃湯服之

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一方 一錢硃砂七分雪即冰片 七個殭蠶去絲嘴薑汁製三個全蠍去頭足焙乾爲末 不拘急慢與驚風皆能治之調服時須用蜜與血乳也兒小者分三服

一方 先用白鳳仙花根汁半盞服下即用方頭蚱蜢焙乾研末滾水調下即愈

驚風 以五苓散服之會世榮方

一方急慢皆治 用杜牛膝一名地菘 取汁澄清入好酒灌之即醒仍以醋拌渣敷項下即愈

慢驚風 代赭石五分煆紅醋淬水飛爲末冬瓜仁湯調下

驚熱 血餘洗淨入罐封固煆存性爲末合雞子黃煎汁服之

一方 牛黃一豆許杏仁竹瀝薑汁各一合和勻服

驚啼發歇不定 臘月縛母猪繩燒灰水服少許其驗如神

一方 麝香一字即二分五厘清水調服日三服

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

驚哭　燈心裝青竹筒中拷實乾泥塞口籠糠內煨一夜取出悶隱存性每服三五分薄荷湯下神驗

胎驚　鎮驚散硃砂水飛五分牛黃五釐麝香少許猪乳汁調稀服之

卒驚　丹雄雞冠血少許滴口中甚妙

驚風不醒　白毛烏骨雄雞血抹唇上卽醒

驚後瞳斜　阿膠米炒成珠人參各一錢水一盞煎七分日再服卽愈

魅症卽邪祟也　以紅紗袋盛夜明砂佩之

一方及驚癇等症　白馬眼與兒母帶之

客忤聞異　以牛涎令兒吮之或以牛鼻中津水和水少許灌之

一方　黑驢膊上旋毛一彈方圓同乳汁煎服

一切癇症有陰陽驚痰食風諸癇　青羖羊肝一具薄切水洗和五味醬食之永不再發

一方　青羖羊角燒存性以酒服少許卽愈

East Asian Library Princeton University Proof Copy

牛癎　以六畜齒燒灰水灌之牛齒更佳

馬癎　白馬齒水磨服之以上四方大人並可治之

卒癎　刺白犬血一升合之並塗身上

驚癎吐舌急叫面色乍紅乍白悚惕不安如人捕狀乃偶被驚邪所觸而致　犀角磨濃水服之立效爲末亦可亦治驚熱

一方　五月五日取猪齒臨症燒灰服之

一方及天釣　棉蘸母猪乳汁吮之大人猪雞癎及鬼毒去來寒熱五癃亦治之

一方　以竹瀝化熊胆兩豆許服之去心中涎痰良

一方或客忤項强欲絶者　以熟水研麝香少許和乳汁塗兒口中取效醋調亦可取其鎮心安神則驚自止

一方眼目上視手足搐搦角弓反張者　用人面子出海南及廣中核燒灰服之神效

一方　丹雄雞腦髓燒灰酒服

小兒毛髮焦枯睡中自語欲發驚候者　牛黃六分硃砂五分同研細以犀角磨汁調服分二次

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

辟驚癇　雁自脫落翎毛令兒佩之

中惡卒死　雄黃水飛研末同桃樹枝煎湯調灌立生

卒死不知何病　狗糞一丸絞汁灌之卽活

客忤　以黃丹飛淨蜜和灌之

一方　赤白陀僧燒紅研粉水調灌少許

驚癇及夜啼　虎睛爲末竹瀝調服

驚疳膚如鱗甲皆由氣血不足也亦名胎垢　殭蠶煎湯浴之

胎赤風眼　槐枝如馬鞭大長二寸作火棒烙之

胎瘡　水邊烏臼根晒研入雄黃末少許敷之

臍瘡　急用大草紙燒灰敷之則不致變風癇或加枯礬或再加龍骨燒灰等分入麝香少許撒之

臍風小兒初生身皮紅狀如湯潑與胎赤相似若焮赤者　以煆石膏研細敷之不焮赤者用粳米粉敷之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

幼科雜症

脾疳 面黃消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞鞕乳食懶進睡卧喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥粘 乾黃土爲末濃煎黃連汁和成餅服之立愈此治小兒好喫泥土之方

一方 好吃泥土或茶葉生米及布疋等物 綠礬土炒紅棗去皮核飯上蒸熟和勻濕紙包煨研末每服五分酒下或爲丸服如面黃加茵陳爲丸每服三四十丸淡湯下

一方 好食土者 綠礬煆過以猪胆汁爲丸菉豆大量兒

Est Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

大小服之

疳痢亦脾疳也煩熱毛焦鼻口燎痛皮膚枯槁四肢癱軟時時下痢或紅或白腹中窘疼 青黛水飛淨仍以水調服甚效不論强弱皆治

一方及神不安 以虎胆研水服之亦治驚癇

一方 以光粉炒黃雞子食之

諸疳下痢 以豺狗皮煮汁飲之或燒灰酒服亦治腹中蟲痛

一方 臘月採白兎頭骨燒灰水服

一方 臘月採白兎屎炒五錢乾蝦蟆一枚燒灰爲末綿裹如蓮子大納下部日三易之

諸疳羸瘦 熊胆史君子爲末等分研勻盛磁器內蒸餅爲丸麻子大每米飲下二十丸

蛔疳黃瘦 公猪肚釀黃糯米即糯粟蒸搗爲丸服之大人男婦一切虛弱勞熱虛損並可用此服之葢猪水畜也胃屬土故方藥用補虛以胃治胃也

疳瘦不長肌肉 以獾肉和五味煮食大能肥健

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

諸疳　以野猪胆水研棗許服之日二次

一方　明雄五分黃丹七分爲細末每服一分四釐以雞肝一具男用雌女用雄先將肝入碗內蒸熟取入藥末搗爛和勻用熱黃酒沖入五更時服藥分八次服完其病卽愈

一方　五穀蟲史君子肉各一兩不拘時服卽茶酒粥飯俱可同食病深者二料卽愈

一方面黃腹脹形瘦髮立食無飢飽　牡蠣一兩炭火煆紅用好醋一碗將蠣入於醋內浸之如此燒浸七次研細末放冷地三日出火氣用未經落水雞軟肝一具以竹刀剖碎撒蠣粉於肝上蒸熟食之不用鹽並忌茶每歲用蠣粉一分其效如神

疳蟲蝕齒　雄黃葶藶等分爲末取獵月猪脂溶以槐枝綿裹枝頭點藥烙之四五枝卽愈

疳蟲蝕口　文蛤燒灰以臘猪脂和塗之取效

疳疾目盲眼疳也　猪肝二三兩用竹刀切開將威靈

East Asian Library Princeton University
NOT COPY Hidden Gest Collection

仙二錢焙爲末塞肝內將箬札好入飯鍋底飯熟取出去藥食肝三服痊愈

諸疳寒熱及腹大貪眠者 採雄鼠去臟黃泥裹定燒熟取骨取肉和五味豉汁作羹食之亦治哺露疳

腦疳鼻痒毛髮作穗黃瘦者 鯽魚胆汁滴鼻中三五日甚效

無辜疳其症頭項生瘡或項內有核如彈按之轉動軟而不疼其中有蟲如米粉若不速治則蝕蝕臟腑便利膿血身體羸瘦面黃發熱 夜明沙水淘去灰土惡氣取細沙晒乾搗熬爲末拌飯與食之

牙疳齦肉赤爛疼痛口臭血出甚則牙枯脫落穿腮蝕唇則爲危急之症 急以苦竹筍入鹽燒灰研水搽之

一方 大鯽魚一尾去腸留鱗入當歸末泥固燒存性入蝦過鹽和勻日日搽之

一方腫痛不止 青羖羊肝一具煮熟蘸赤石末任意食之自愈

眼疳及脾疳 穀精草爲末雞軟肝一具同酒漿飯上蒸熟去藥食肝日日常服凡小兒目盲垂死者立

East Asian Library Princeton University Gest Collection

愈或加小青草亦妙

疳熱　黃連五兩入猪肚蒸爛飯丸米飲下仍服調血清心藥佐之葢小兒之病非疳即熱也

腦疳　以蟾酥和乳滴少許入鼻中良

小兒羸瘦　甘草二兩炙焦爲末蜜丸菉豆大每温水下五丸日二服

一切疳疾　雞軟肝一具竹刀剖開摻入飛淨雄黃末三分先將穀精草一撮貯飯碗底再用海粉一片置草上次入肝於粉上用酒漬一時飯鍋上蒸熟濾去草餘俱服之即愈不愈再服無不愈者雞肝男用雄女用雌此方治眼疳目盲其效更速

嘔吐夾驚吐或痰飲吐　黃丹細研小棗肉和丸芡實大白湯送下或加硃砂白礬等分和丸每丸針穿一孔臨用時仍以針穿燒研末服之

上吐下瀉　巴豆一枚針穿燈上燒過並用黃蠟一豆許燈上燒滴入水中同杵爲丸黍米大每服五

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

七丸白湯下

吐瀉慢驚小兒或因誤服冷藥吐瀉以致脾虛生風痰嗽慢驚　天南星一個去臍重八九錢者佳入黃土坑深三寸以炭火五觔煆赤再入好酒半盞安南星在內浸半時許仍架炭三條在上俟發裂取出剖片再炒熟爲末次用煨熟明天麻一錢研末麝香一字和勻如三歲之兒每用半錢以生薑防風煎湯下亦治久嗽惡心

受寒吐瀉不早治之多成慢驚　小丁香陳皮等分水煎服

傷乳吐吐出乳片身熱面黃肚腹臌脹宜用　香附二兩製神麯炒麥芽炒各一兩陳皮八錢縮砂仁炒炙甘草各五錢爲細末滴水爲丸粟米大量兒大小服之薑湯化下神效

吐症夾驚因食時被驚所致其症頻吐青涎身體發熱心神煩燥睡卧不甯　丁香二十一粒蠟梢去毒四十九條薑製半夏三個爲細末煮棗肉爲丸黍米大每服七丸金器煎湯化服

East Asian Library Princeton University Library Rare Book Collection

停滯實吐 兒素壯實偶然停滯胸腹脹滿二便閉澁痞硬疼痛口渴思飲 芒硝生

軍枳實麩炒生甘草厚朴薑炒入生薑水煎服

寒吐 多因兒傷生冷或乳母貪涼與乳所致其候朝食暮吐不化不臭不酸四肢逆冷面唇色白

白薑二錢陳皮一兩炙甘草一錢爲細末每服一錢溫棗湯調服寒甚者以理中湯加丁香吳萸

噦症 有聲無物爲噦即乾嘔也 鹿角粉大豆末等分和乳調塗乳上飲之

小兒水瀉 王瓜葉晒乾爲末米飲下

一方 水牛乳二合薑汁一合入銀器內文火煎五六沸量兒與服

瀉痢 土木別一個母丁香四粒麝香一分研末以津爲丸芡實大納臍中外用膏藥貼牢立止

痢病 雞子一個煮二三沸取起去白用黃研碎以薑汁半鐘和勻與兒服之忌食茶神效

熱吐 因兒過食煎煿或母過食厚味以致小兒熱積胃中食入即吐口渴飲冷吐酸身熱唇赤小便赤 清膈散蟬蛻五十個去泥沙翅足滑石一兩

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library

爲末每用二錢水一盞入蜜調服

脾瀉不止　紅棗二十枚去核以官粉入棗內用陰陽瓦焙乾去棗爲末量兒大小飲調服

赤白痢　官粉一兩雞子清和炙焦爲末分數次白湯調服

泄瀉不止　棗肉搗爛入白礬煆黃丹炒等分粳米飯爲丸彈子大每丸穿一孔臨用燈上燒存性爲末米飲下一丸

下痢　巴豆一錢煨熟去油百草霜二錢研末飛麪煮糊丸黍米大每服五七丸白湯下

水瀉　巴豆一枚針頭上燒存性蠟和作丸倒流水服

火瀉　瀉時暴注下迫腹痛心煩口渴瀉多黃水小便赤色　玉露散寒水石石膏各一兩甘草生用三錢爲細末量大小溫湯隨時調服俟熱清再用四苓引以燈心水煎服卽愈

熱痢　裏熱也其症腹中窘痛頻頻下痢尿短色紅舌赤唇焦喜飲冷水　葵花葉炙

Fast Asian Library Copy
Not to Get Collection
Princeton University Library

過煮食之

一方　嫩黃瓜同蜜食十餘枚卽愈

渴痢　冬瓜汁飲之

火瀉　雞子白生吞之

滯下痢　牟牛角胎燒灰水服方寸匕卽數分

一方赤白　鹿角灰髮灰等分水服三錢日二服

洞注下痢　鹿角燒灰水調服

白痢似魚腦爲寒痢　白鴨熱血滾酒沖服卽止

久痢不愈　石榴皮煮蛋食之皮蛋更妙

一方　黃犬頭骨燒灰白湯下

滯下痢　用蜜擂芝麻滾水調服

一方　羚羊角中骨燒未飲服方寸匕卽數分

刮腸痢不能飲食卽噤口痢　精猪肉一兩薄切炙香以膩粉末五分鋪上食之或置鼻頭聞香自然欲食也

一方　五穀蟲水洗淨瓦上焙黃爲末黑糖拌勻新汲水送下卽愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　活蝦蟆一隻搗爛入麝香六分研勻貼臍上
用布束裝半日即能下飲食兩日全愈二方大人
亦治

水瀉　渣肉末三錢白糖三錢拌勻溫熱水空心調
服重者不過三服即愈并治霍亂吐瀉

水瀉即痢疾　大蒜五個火灰煨熟食之一日二次重
者不過二日必愈神驗二方大人男婦並治

熱痢　黃連黃柏秦皮白頭翁等分水煎服或香連
丸米飲下

噤口痢　人參川連薑炒蓮肉各等分爲細末米飲
調下即愈

四時感冒風寒初起者　慈白連鬚五根生搗汁沖
開水服取微汗大人沖酒服

蝦蟆瘟即時行感冒寒熱咳嗽　以金線田雞搗汁水調空腹
炖飲極效

時疫不染　蒼朮三錢三分三釐米泔水浸切片甘草一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

六分六釐川芎八錢五分乾葛一錢二分六釐薑三片連根葱白三莖水二碗煎八分已病者愈未病者不致傳染大小皆治

停食傷寒　陳香糟六兩生薑四兩水菖蒲根四兩鹽二兩共搗熱爲餅敷胸前痛處火熨之內响即去如口渴任喫茶水待大便下惡物即愈大小皆治見單方全集

辟惡去疫　狐尾燒灰熏之雄狐屎或頭骨亦可

辟除惡魅　虎爪并指骨或毛繫兒臂中邪魅遠去

辟一切邪惡　以狼牙佩之

一方　臘月取雄鼠燒之

一方　以狼皮置枕則邪惡不敢近身此法最良

一方　以虎爪蟹爪赤砂雄黃爲末松脂和丸每於正旦焚之則室中一切邪氣永除

瘟疫此症邪氣皆由口鼻而入其症在裏宜攻　大黃四兩皂角二兩爲末水丸每服一錢量兒大小與之用無根水下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

傷暑吐瀉昏迷不省　採背陰側柏葉如手掌大三枝入井水三盞搗以絹絞汁新蜜三茶匙和勻灌之即活經驗方

暑風因暑熱攻肝內生風病手足搐搦狀似驚風煩渴身熱有汗二便黃赤急宜　香薷黃連扁豆炒厚朴薑炒羌活燈心引水煎服以先疏其風再以玉露散服之以清其熱自愈勿作驚癇治之玉露散見前火瀉

霍亂　以牛涎灌一合即愈

瘧疾　雞內金燒存性男用雌女用雄母乳調服即二分五厘

一方　鹿角生研為末先於發時以乳調一字服之

小兒邪瘧　以麝香研墨書去邪辟惡四字於額上其瘧即愈

瘧疾不止　硃砂五分砒霜一豆大代赭石五塊醋煆用紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末油調一分塗鼻尖上及眉心四肢神效

瘧母　青黃散青黛澄去灰土雄黃水飛等分為末

每歲一分空心及夜淡醋湯調下塊消瘧止

咳嗽　生薑四兩煎湯浴之

熱嗽　甘草二兩猪胆汁浸五宿炙研末蜜丸菉豆

大食後薄荷湯下名涼膈丸

吼喘　活鯽魚七個以器盛之令兒自便尿養之待

紅煨熟食之

痰喘　巴豆一粒杵爛棉裹塞鼻男左女右痰即下

鹽喘痰喘　烏臼皮去粗皮搗汁和瓦麪作餅烙熟

食之即愈

寒痰氣喘　青橘皮一片展開入巴豆一粒麻紮緊火上燒存性研末

薑汁和酒服之大人亦治之

失音不語　蝦蟆胆點舌尖上立效

停痰喘急不得卧　南蘇子炒苦葶藶子微炒各等分

爲細末蒸棗肉爲丸麻子大每服五丸至七丸淡

薑湯下極驗名蘇葶丸

暴喘即馬脾風也其症胸高氣促肺脹喘滿兩脇搧動陷下作坑鼻竅搧張神氣悶亂初起

Estasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

急用五虎湯蜜炒麻黃杏仁炒去皮尖生甘草石膏研末細茶各等分生薑水煎臨用藥沖石膏服之繼以一捻金下之倘得氣開其喘自止如兒在百日內見此病者多不救

痰吼日久不愈 海螵蛸末米飲服一錢甚驗

寒疝因兒過食生冷或卧濕地以致陰結氣滯日久復爲風冷所束水濕所傷故發時囊冷結硬牽引少腹作痛初得時兼見表症者以 桂枝赤芍炙草烏頭炮等分入生薑水煎服如寒甚者用金鈴子肉一兩吳茱萸五錢爲細末酒煮麪糊爲丸麻子大每服數丸鹽湯下極效

濕熱感寒疝因兒過食厚味濕熱下行入囊復爲風寒所束而成發時囊縱紅腫常常刺痛 烏頭炮梔子炒等分用順流水入薑汁煎服

胎疝因兒母啼泣過傷氣結不散蘊於胞中令兒生下胞硬腫痛 川練子肉酒蒸焙乾爲末一歲一分淡薑湯下

陰腫乃濕熱風冷二氣相搏氣不得通故結聚而腫大或蟲蟻所吹因風多痒濕多墜熱多疼 蟬蛻五錢煎水洗仍服五苓散即愈

一方　狐陰莖炙爲末空心酒服良

一方　硼砂一分水研塗之大有功效

一方　因風熱者外腎焮赤腫痛日夜啼哭不數日退皮如雞子殼狀　老杉木燒灰入膩粉清油調敷神效

小腸氣　受症之因亦與疝氣同發時少腹脹控睪丸有引腰而痛有痛而衝心之分痛衝心痛者失笑散五靈脂蒲黃膈紙炒元胡醋炒各等分爲細末每服一二錢水酒調下

蟲痛　因腹中蟲動不安故痛其候面色乍赤乍青時痛時止時吐清水當以安蟲爲主勿妄攻下也新患蟲痛以錢氏安蟲散胡粉炒黃鶴蝨炒黃枯白礬川練肉去皮核各二錢五分米飲調下痛時服之如久不愈者用加減理中湯去甘草加川椒是也

一方　日久身體羸瘦　生猪膏服之

黃疸　腸黃症　是症陰陽二症皆因久鬱濕熱而致其候遍體皆黃甚則深黃而如烟熏之狀腸黃則面紅口渴尿赤色亮身熱乃脾家濕熱之故陽黃表實者宜發汗　茵陳麻黃湯茵陳蒿麻黃等分水煎加黃酒少許服之

陽黃裏實二便秘濇腹滿　茵陳六兩梔子十四枚剖川大黃生二兩燈心引水煎量兒與服若無上之表裏二症則惟以利小便爲主以五苓散加茵陳燈心水煎服水利病愈

陰黃口不渴面色暗黃身冷如冰乃脾腎寒熱之故　脾濕陰黃理中湯加茵陳服之

一方腎寒陰黃　製附片乾薑茵陳炙草等分水煎服

風水浮腫其腫在頭面肩背至腰即止症因風起法宜發汗　絲瓜燈草葱白等分煎濃汁服并洗之

食乳不化肚腹腫脹　推車蟲一個取上半截焙乾研末人乳調送即愈

一方腹脹煩悶欲死　燒鼠二枚爲末日服二錢白湯下

腹脹　胡粉鹽熬色變摩腹上即愈

發熱病後虛熱者　以白蜜一合攪黃雞雞子三顆服之立見功效

一方　以醋煮雞子黃食之煩熱煎食

East Asian Library Collection
Princeton University Library

熱渴裏熱表寒　蓮實二十枚炒浮萍二錢五分生薑少許水煎分二服

飲乳不快形似喉閉　犀牛角燒灰塗乳上嚥下卽瘥

咽喉閉痛　鯉魚胆二七枚和竈底土塗咽喉立效

中水　以麝香如豆大三枚奶汁調分三四服服之

瘧疾壯熱驚癎　以李樹葉煎湯浴之甚驗

癥疾卽癖也　麞肉二兩切焙蜀椒三百枚炒同搗末以雞子白和丸小豆大每服二三丸白湯下

一方　鼠肉去骨煮汁作粥食之

癖疾　全蠍三枚去頭足土鼈三個去足大桑黃一個同焙乾芝蔴一撮銅杓內炒爲末好建糖調五更時服酒送下

一方　鼈甲一錢醋炙全蠍三隻去頭足新瓦上焙乾雄黃二分研細末芝蔴一撮畧炒白糖拌五更時送下十歲服十服二十歲服二十服卽愈

一方大人男婦並治　紅蓼花子又名水紅花每日清晨生服三

錢白湯下多服自消驗甚

一方　用醋碟一個朴消裝滿雄黃末蓋面綿紙糊口以針刺孔合定疾上將袱細緊三日卽消

冷汗　五棓子爲末以人乳調塞鼻中卽止

表虛自汗不止不發熱不惡寒　黃芪蜜炙防風白朮土炒各等分水煎卽愈

嘈雜不甯腹中有蟲也　清油和猪血食之立效

衄血乃熱傷陽絡也此症鼻中出血乾燥身熱不渴但苦頭疼無論有汗無汗　取壯實人頭髮陰陽瓦煆成灰放在地上去火性研細末吹入鼻中卽止

一方　黑梔子末吹鼻卽止

尿血　甘草梢一兩二錢水六合蒸煎二合一歲兒一日服盡

大便下血初起有臟毒腸風之分皆因小兒過食肥甘所致先血後糞血色黯濁爲臟毒多腫痛先糞後血血色鮮清爲腸風不腫不痛　俱宜用大黃皂刺湯皂刺生軍各等分量兒大小年歲及虛實酌其多少

水酒煎服

脫肛多因久患瀉痢所致　以葱湯熏洗令軟送上

一方　以五棓子末敷後以棉帛托入或煎湯洗之

一方　以鱉頭燒存性香油調敷即收

一方　用鮮蚌肉敷之立刻縮上

一方　魚腥草搗如泥先以朴硝水洗過用芭蕉托住藥坐之自入

一方　冬瓜藤煎湯洗之

一方　小螺螄一二升鋪桶內坐之少頃即收

一方　訶子赤石脂龍骨煆各等分爲細末臘茶調敷和藥搽腸頭上綿帛揉入奇效

肛腫翻脫肛腫便難翻脫不還　乾地蟠龍一兩略去土焙風化朴硝二錢爲細末和勻每以二錢至三錢肛門濕潤者乾塗乾燥者用清油調塗先用荆芥生葱煎水候溫洗浴輕與拭乾然後敷藥皂刺大黃湯方見小兒便血

解顱即頤大骨之縫不合是也其人面色皖白形體瘦弱目多白睛悲愁少笑　螃蠏肉白芨搗塗以合爲度但是症猶花木無根內當多服補腎扶元之方庶幾轉危而安也

一方　猪牙車骨煎取水敷之三日即合

一方　黃犬頭骨炙爲末雞子白和塗之

一方　黑驢頭骨燒灰和油塗之即合

一方　黑驢懸蹄燒灰和油塗之以合爲度

一方　雄鼠腦同鼠肝搗爛塗之即合

一方　封頤散柏子仁防風天南星各四兩爲細末每用一錢以猪胆汁調勻攤在緋絹帛上看頤大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯潤之內服滋陰補氣之藥

龜背因兒生早被客風吹入脊膂遂致傴僂曲折背高如龜往往爲終身痼疾　取龜尿點兒骨節上須頻頻點之勿自厭煩或以灸法用艾灸肺俞心俞膈俞三穴各三五壯亦可見效

頤陷　雄黃二錢川烏附子生各五錢爲細末用生

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

葱和根葉細切杵爛入前藥末同煎作成膏每早空心貼頤處內服補氣藥

脫肛　以龜血塗之即收

肛門翻脫係大腸蘊熱者　以五棓子老葱頭朴硝煎湯洗之立收

骨蒸潮熱食減瘦弱陽明有熱也　秦艽炙草各一兩每服一二錢或加薄荷

牙疳　人中白研末擦之立效

痘科　痘症初起大抵與傷寒相似其候發熱不時驚悸口鼻氣粗兩眼發挺惟中指耳獨冷耳後有紅筋之爲驗也症之順逆與險自始至終只以形色分之形之順者痘始出時頂尖根圓起脹時漸綻充肥成漿時根紅斂束痘殼完固結痂時痂如螺殼先後循次脫落是也形之逆者痘始出時隱如蚊咬或如熱痱寒粟蠶種起脹時平頂不突板實不綻成漿時殼軟皮薄甚至痒塲結痂時痂落如麩潰爛粘臭是也色之順者痘始出時色如桃紅而漸加滋潤起服時頂漸放白根紅光潤生漿時白而漸黃蒼而湻厚結痂時蒼如粟殼是也色之逆者痘始出時色即淡白乾紫晦而不亮起脹時頂色灰滯根血散漫或地脚深紅生漿時灰乾不潤或漿薄清稀結痂時色如麩白是也痂落之後疤痕顏色

總以紅潤凸起爲順若淡白黑紫平凹無突起之狀皆爲逆也形色既明順逆可法

解毒免痘稀痘　每至除夜以白鴿子煮炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘稀少

一方　白鴿蛋一對入竹筒封置厠中半月取出以蛋白和辰砂三錢爲丸如菉豆大每三十丸以赤黑菉三豆煮湯下使毒從大小便出永不出痘即出亦稀

一方　陰陽二血丸鹿血兎血各以青紙盛置灰上晒乾乳香沒藥各一兩雄黃黃連各五錢硃砂麝香各一錢爲末煉蜜丸菉豆大每服十丸空心酒下兒小者減半服之未出者可免已出者則稀

一方　臘月取白兎頭煎湯浴之令小兒清熱去毒出痘稀疎

一方　除夕黃昏時用大烏魚即七星魚一尾小者二三尾煎湯密室烘煖浴兒遍身七竅俱到不可嫌腥以水洗去若不信只留一手足不洗遇出痘時則

Dr. Nick COPY
First Asian Library and the Rest Collection
Princeton University Library

未洗處偏多此異人所傳方也

一方　大寒日早用雞子七枚裝麻布口袋內浸廁中七日第八日早取出埋土內七日至立春日早取出於砂鍋內煮熟令兒隨意食之此日忌飲茶多者能少少者可免屢效

一方　赤豆黑豆菉豆各一兩研末入新竹筒中削皮留節鑿孔入藥杉木塞緊用蠟封固臘月浸廁中一月取出風乾每藥一兩配梅花片三錢每服一錢霜後絲瓜藤煎湯下稀痘神效朱禹功仙方

一方　保嬰靈丹眞劈砂一錢麝香五釐萆麻子三十六粒去皮殼肥大者佳三味或午節或七夕或重九打成膏分作十三股塗小兒頭頂心兩手心兩足心兩臂灣兩腿灣兩脇肋前後心共十三穴塗如象棋大不可使藥有餘亦不可洗去聽其自落塗過多次可免出痘

一方　解毒護童膏金銀花一觔用水入銅器內煎

至渣無苦味爲度粉草四兩用水煎至渣無甜味爲度去渣以二水沖勻用文武火慢煎約十碗至三四碗入米白糖收成膏埋土內一日出火氣每早以百沸湯沖一鍾付兒食之則一切瘡毒不生併可稀痘若初出痘後煎服此膏則遺毒皆盡勝多吃胡桃也

一方　金銀花揀淨七兩六安茶四兩愈陳者佳共爲粗末衝湯代茶每日飲數次終身不出天花雖出亦稀神異

一方　用眞麻油燉水豆腐於春分秋分前後半月早與小兒食之此方驗者甚多勿以平易輕視

痘瘡不出　採未經出土冬筍煮粥食卽有生發之意也

一方　酒煎芫荽俟酒沸勿令洩氣候冷去渣微微從頂以下噴之惟頭面勿噴卽出

一方　荔枝肉浸酒飲并食之忌生冷

痘瘡不快　老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性入硃砂研末蜜水調服甚妙或沙糖水調服初出或未出多者可少少者令免

已出不起　狗蠅七枚搗爛和酒娘服即日發起紅潤可觀冬日取蠅在狗耳內

痘出無漿心不爽快　以荔枝殼煎湯飲之

黑陷乃心熱血凝也　生玳瑁生犀角同磨汁一合入猪心血少許紫草湯五匙和勻温服紅潤起發

一方　臘月鶚鳥頭一二枚燒灰酒服當即起發

一方　牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸胭脂取汁調搽即起

一方因出不快而黑陷者　人牙末煆一錢猜猪血調服

一方因服涼藥而血澁倒陷者　人牙末煆一錢麝香酒調服

一方頂陷漿滯不起　水楊柳枝煎湯浴之內服助氣血藥

倒靨　橄欖核磨汁服之

一方垂危者　家猫牙同人牙猪牙犬牙燒灰等分研

Dr. Yan Fas Asian Library and Princeton University Library Collection

末蜜水服一字即二分五厘即發起

一方　白犬或黑犬飼以生粟米候下屎取來洗淨爲末臨症時入麝香少許以新汲水調服二錢神效

黑陷　用猪第二番血一匙調冰片少許新汲水調服或半酒半水温服取利一二次痘即紅活

倒靨　猪齒燒灰水服一錢

痘瘡潰爛　臘月黃牛屎燒取白灰敷之或卧之痂即易落而無瘢痕

一方　海螵蛸研末敷之

一方　身無完膚膿水浸淫沾黏衣服用茶葉揀去梗入滚水一煠即撈起再揀去梗濕鋪床上上隔草紙令兒卧之一夜膿乾甚效

痘潰難靨　牆上白螺螄殼洗淨煆研摻之

一方　牆上多年爛茅草白茅草尤妙洗焙爲末摻之取其性塞解毒又多受霜雪能燥濕也水痘變瘡摻

之亦效

痘瘡潰爛　用麥麩裝褥卧之性涼而軟此誠妙法

痘瘡不收　象牙屑銅銚內炒黃紅色爲末每服七八分或一錢白水下

痘痂不落　以羊脛骨髓煉一兩輕粉一錢和成膏塗之可去痂滅瘢

一方　沙糖調新汲水一盃服之白湯調亦可日二服神妙

免痘疤瘢痕　生白蜆即白扁螺螄浸水洗之

一方洗瘢法　白羊脛二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以猪蹄湯洗之

痘瘡入目　白狗血濾淨點之

一方　防風穀精草白蒺藜去刺炒研等分爲末每日食後服二錢五分米泔水調下

痘後兩目痒腫　蛔蟲自然汁搽數次即愈

痘後目翳　以白鱔血少許點之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

一方　水煮水螺螄常食之甚佳

一方　石決明火煆水飛過穀精草等分爲細末以猪肝蘸食自愈

一方　乘臘月採白兎屎日乾爲末臨症每服二錢茶下卽安

痘瘡入目　浮萍陰乾爲末三錢羊肝半個竹刀切碎搗爛共汁和勻空心調服清茶過口傷目者數服自愈小兒減半

一方或生瘴翳　蟬蛻洗淨白菊等分爲末每服二錢蜜湯調服數服痊愈

痘毒斷不可開刀　用羯羊糞以新瓦磨光洗淨置糞於中上下以瓦覆定文武火炙燥烟盡存性取出爲末麻油調敷神效

一方　鵝肉蒸熟淡喫之其毒自消若潰爛不愈剝泥蛤蟆皮貼上卽愈蟆音哲

一方　大蚌一個取肉用黃泥四圍封固火煨至紅

Do NOT COPY
Gest Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

色取蚌肉存性研末油調敷立愈

一方 以哺雛雞蛋殼細研麻油調搽神效

痘毒入心痘瘡始有白泡忽搐入腹紫黑無膿 鬱金一兩甘草二錢五分煮乾焙研末入水片五分每用一錢加猪血五七滴新汲水下

痘疔 用甘蔗滓晒乾以眞香油點燈燒成灰以津液調匀銀針挑破點上立效或加珍珠末油燕脂調搽更效

一方 紫草三錢雄黃一錢爲末以燕脂汁調匀銀簪挑破點之極妙

一方注命疔生兩足心腫硬如錢如豆如椒有紫筋直透足股用銀針挑之去淨血即用 田螺水點之次用偵火草菉豆浸脹搗爛敷

一方忘汲疔生於眼沿邊如封蛤頰熱而紫宜以銀針挑破用 燕脂嚼汁點之兼以蒲公英煎湯洗之

一方蒙虎疔生於耳內於成膿之時宜挑破 拔疳散硇砂白礬硃砂食鹽用鐵鏽刀燒紅將礬鹽放刀上煅過各等分擇丁日午時研細

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

末收臨症搽之化堅搜根

一方 燕窩疔生於腋下腫硬而赤譫語如疔在左腿則右體之痘沉伏失色在右亦如左宜挑去根

以拔疔散搽之內服消毒藥

一方 透腸疔生肛門旁在六七日腫硬如錐亦急挑之 先用銀花防風煎湯洗之次用輕粉珍珠氷片白蘞末塗之內服解毒湯即愈

痘風瘡 先發細瘡作痒次延成片脂水漸長浸淫宜 密陀僧滑石各二兩白芷五錢研細末乾用白蜜調搽如濕則乾撒之須避風戒口名滲濕救苦散

一方 黃豆燒黑研末香油調塗

痘疳 雄黃牛糞尖燒灰存性爲末每一錢加氷片二分研細末敷之立愈

痘時鎮邪 取胡荽懸掛床側或門閾間可辟邪

預解痘毒 兔血丸臘月八日取生兔血和蕎麪加雄黃四五分和丸菉豆大初生小兒乳汁送下二三丸週身發出紅點則免出痘即出亦稀

Dr. Neil Cobb Collection
Fast Asian Library and the Gest Library
Princeton University

痘黶　荷葉殭蠶等分爲末胡荽湯下

痘瘡生瘜　燒雞尾毛和酒敷之

疹症　疹有瘙疹癮疹溫疹蓋痘疹皆非正疹惟痳疹爲正也痳疹初起多有咳嗽噴嚏鼻流清涕眼泪汪汪兩胞浮腫身體漸熱二三日或四五日始見點於皮膚之上形如痳粒色若桃花間有類於痘大者惟見形之後形尖稀疎漸次稠密有顆粒而無根暈微起泛而不生漿大異於痘也雖云較痘稍輕而變化則速始終調治俱宜留神總之初起宜先表發透澈最忌寒涼已出時當用清利收散後貴於養血兼雜症者則隨症參治之溫疹症見傷寒也若發於未痘之先爲瘙疹月內爲爛衣瘡百日內爲百日瘡發則遍身紅點如粟米之狀乃兒在母腹受熱所致調攝謹愼自能速愈痘方愈而疹隨出爲蓋痘疹發則徧身出疹色赤作痒始如粟米漸成雲片因痘後餘毒未盡更兼恣意飲食外受風寒

Copy and the Gest Collection
Princeton University Library

之所致宜疎風清熱爲主至疹出多痒色紅赤隱於皮膚中爲癮疹乃心火灼於肺金更兼外受風濕而成治宜先散風濕後清熱毒斯得其法皆非痲疹稟諸胎元毒也

疹發不出 名悶疹 櫻桃四五觔入磁瓶內密封埋土中過兩三個月俱化爲水遇此症危急者取此汁一杯略溫灌下垂死回生經驗無比不可忽視有志仁人多預製以濟人功德不小

一方 喘嗽悶亂 赤檉柳葉 一名西河柳 風乾爲末水調服四錢立效或鮮者煎湯服五六錢亦妙兒之頂門必有紅筋紅瘰急挑破即出

一方 西河柳煎湯去渣半溫用芫荽蘸水擦之但勿洗頭面並忌夜間洗之蓋痧疹晝發而夜斂也乳母並兒仍以西河柳煎湯飲之更妙

痧疹後痢 西河柳爲末四錢砂糖調服

癮疹 鯉魚皮燒灰水調服

一方 及疥癬疔腫 槐葉煎湯熏洗之

一方 心下迷悶 巴豆五十粒去皮水七升煎二升以帛

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

染拭之隨手而愈

疹後生翳　以黃鱔魚血點少許即退

癮疹　蟬蛻薄荷等分爲末酒調服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

T COPY
and the Gest Collection
f University Library

撮口即臍風又名撮口臍風又名七日風在初生七日內而發也因在母腹受飲食熱毒釀成心肝脾三經之火最為惡症純是火毒人謂傷於風濕非也下方用犀角羚羊最為對症又後九頁灸臍風法不亞仙丹如未現青筋細看臍上有一紅珠如不見用手摸之必有一珠用墨丘定取皂角邊上之筋快手丘燃在珠上燒一兩下或灯草丘火亦可必然大哭而安可無一失此救臍風第一良方與灸青筋之法功效相同若用別法恐致悞事悔不可追

鮑雲韶補注

猪爭酒少許入口自愈

撮口口撮如囊不能吮食舌强面色黃赤乃心脾之熱受自胎中而然也其症為危侯如氣高痰盛

辰砂殭蠶散辰砂五分殭蠶一錢直者佳去絲嘴薑炒蛇脫皮一錢炒麝香五分為末用蜜調敷唇口

一方鯽魚燒研酒調少許灌之仍掐手足兒一歲半仍以魚網洗水灌之

一方是症必先大便熱生犀角及羚羊角磨水和蜜汁飲之即效急則用大黃甘草各二錢煎服

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

撮者不可救也

噤口 百日內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭白虫 薄切生猪脂搽之

一方 身熱吐沫 取東行牛口中涎塗口中及頤上自愈

亦治小兒流涎

一方 及重舌出涎 烏驢乳猪乳各二升煎一升五合服之即愈

七日口噤 牛黃爲末以淡竹瀝化一匙灌之更以猪乳滴少許入口即愈

撮口 口撮如囊不能吮食舌强面色黃赤乃心脾之熱受自胎中而然也其症爲危侯如氣高痰盛

辰砂殭蠶散辰砂五分殭蠶一錢直者佳去絲嘴薑炒蛇脫皮一錢炒麝香五分爲末用蜜調敷唇口

一方 鯽魚燒研酒調少許灌之仍掐手足兒一歲半仍以魚網洗水灌之

一方 是症必先大便熱 生犀角及羚羊角磨水和蜜汁飲之即效急則用大黃甘草各二錢煎服

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library