PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷七

DO NOT CO
East Asian Library and
Princeton Univ

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/2535
v.9

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

外科　頭面項背腰五部

腦發疽一名勇疽生於太陽穴初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面目浮腫七日不潰火毒攻睛腐爛損目若至十一日針出黃膿乃吉黑血爲凶　臘月採白兎頭搗爛入瓶內密封愈久愈佳遇是症初起速用塗帛上厚封之熱痛即如氷也頻換取瘥乃止並塗發背及一切癰疽熱癤惡瘡

油風俗名鬼剃頭毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮痒如蟲行　銅青一錢白芷

East Asian Library, Princeton University
Gest Collection
NOT A COPY

一錢爲細末麻油調敷若年久不愈宜鍼砭其光亮出紫血毛髮可生

一方　貓兒毛燒灰以貓膏和敷之

白屑風 初生髮內延及面目耳項燥痒日久飛起白屑脫去又生燥痒難當　黃犬骨燒灰淋汁沐之

一方　以豹頭骨燒灰淋汁洗之

肥瘡 卽禿瘡初起也又名錢癬肥生於小兒頭面騷痒不疼　猪牙車骨中髓和臘粉成劑入火中煨香取出研細末先以溫鹽水洗淨敷之小兒頭瘡及疳瘡并治

一方　巴豆仁三枚連油杵成泥以生絹包搽日一二次三日全愈

一方　輕粉飛丹雄黃白礬等分研末入葱管內兩頭紮好煨過加龜板灰少許研細菜油調抹立效

禿瘡 卽肥瘡日久延漫成片髮焦脫落又名癩頭瘡　先以艾葉鴿糞煎湯洗淨瘡痂再用猪肉湯洗之隨用躑躅花油卽躑躅花根四兩搗爛用菜油一碗煤枯去渣加黃蠟

East Asian Library, Princeton University
Do Not Copy
Gest Collection

少許布濾候冷以青布蘸搽曰三次簞帽戴之勿令見風則風散癢止髮生久搽甚效

一方 及疥瘡 生石膏一兩硫黃五錢生白礬五錢人言四分生猪油一兩搗爛夏布包裹頻塗之卽效

一方 生炭燒紅投沸湯中温洗一二次其瘡立愈

一方 油煎胡荽敷之

一方 鯽魚燒灰醬汁和塗

一方 鯽魚去腸皂礬燒研搽之

一方 大鯽魚去腸入亂髮塡滿燒研入雄黃末二錢先以薑水洗拭後方將前藥用生油調搽

一方 白鴿屎研末敷先以醋泔洗淨後敷亦可燒研摻之

一方 先將瘡洗刮令淨隨以猪胛乘熱裹之當引蟲出卽愈

一方 象肉燒灰和油塗之

一方 新破猪肚勿洗熱楊之須臾蟲出如不盡再

East Asian Library Digest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

作神妙方也

一方 以羊肉如作脯法炙香熱搗數次即愈

一方 生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗曰二次數曰即愈

一方 白牡馬肉煮汁洗之並治小兒一切頭瘡

一方 以新熟牛屎厚封之或燒灰封之能滅瘢痕

一方 以虎骨爲末油調敷之或以虎骨膏煎化塗之

一方 不生頭髮 以熊腦髓摩上能去風生髮或以熊脂敷上亦妙

一方 鼠屎瓦上煅存性同輕粉麻油調塗

一方 並治疥癬 猬脂塗之能以殺蟲

一方 初起者即肥瘡 大黃蒲黃雌黃雄黃各一兩煅蝦蟆衣二大張四黃末入衣內再套一衣晒乾爲細末醋調頻搽之

一方 皂礬川練子燒研末油調塗之

Estate of Gest Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

一方 皂礬一兩淡豆豉一兩炒黑臘二錢研勻油調敷之

一方 松油五錢猪油一兩熬搽一日一次取效

一方 松樹蒼皮入豆豉爲末油調塗之

一方 鴿屎新瓦焙乾存性爲末麻油調搽三次卽愈如瘡靨堆起先用淸水泔水同葱椒煎湯洗之

一方 牛皮破鞋底一兩白礬雄黃各五錢舊毡三錢共燒爲細末以猪油加麪調勻連搽三次卽愈

並治黃水臁腿瘡風癬疥癩海上方

一方 以黃柏研末敷之

一方 以山豆根爲末麻油調敷立效亦敷蛇犬蜘蛛咬傷

一方 以生芝麻生嚼敷之

一方 蕪菁子爲末以醋調敷

一方 以馬齒莧燒灰塗或煎膏塗之俱良

赤禿髮落 臘月取母猪尾燒灰和猪脂塗之

East Asian Library Digital Copy Not to Be Copied Princeton University Gest Collection

一方 牛角羊角燒灰等分和猪脂調塗

一方 以白犬乳頻塗之甚良

一方 以赤馬皮白馬皮燒灰和臘猪脂敷之甚效

一方 膿出不止 以晝開夜合白馬懸蹄燒灰生油調塗即愈

小兒頭瘡 鯽魚長四寸一枚去腸附子一枚去皮研末塡入炙焦研末敷再搗蒜封之

一方 龜甲燒灰敷之

一方 野外久乾牛屎不壞者燒灰入輕粉和麻油敷之神效

一方 白馬骨燒灰醋和敷身上瘡同方

一方 水磨槟榔晒乾取粉和生油塗之

一方 田螺燒存性清油調塗

一方 海螵蛸白膠末各二錢輕粉五分爲末先以油將爛處洗淨後搽前藥末二三次即愈

頭瘡生瘡 白鴿屎五合醋煮三沸杵爛敷之日三

NOT COPY Do Not Copy East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

次甚驗

一方 雞子黃炒出油和元粉敷之大人小兒皆治

小兒眉瘡 卽奶癬瘡也 黑驢屎燒灰油調塗之立效

一方 小麥麪炒黑研末酒調塗

頭耳諸瘡 肥皂煅存性一錢枯白礬一分研勻香油調搽眉瘡燕窩瘡並治

蠟栗頭瘡 肥皂去子填入沙糖並巴豆二枚紮定鹽泥固臍燒存性入檳榔輕粉五七分研勻香油

調搽

一方 酒肉店中油透陳竹燈臺一個劈碎裝磁瓶內口上用舊髮書鐵絲覆瓶上倒轉下再用一空瓶以此瓶合於下瓶口上用火煅之其汁溜下取以

抹瘡神效

一方 以花椒煎湯或苦參湯洗淨用猪骨髓或黃

火珠瘡 其瘡如珠始於髮中相染不已亦有傷命者 用生蘿蔔搗爛將

連末搽之

醋浸敷患處卽愈

螻蛄癰生兒頭上俗名貉貓未破如曲蟺拱頭破後
螻蛄形似螻蛄串穴有因受胎毒者或因受暑熱
者其癌執小根堅破後出膿堅硬不退癌口收斂
越時復發本毒未罷他處又生甚屬纏綿難斂

皮底舊鞋去泥淨燒存性研末菜油調敷其膿
自出屢試有效

一方 屋內倒掛烟塵以猪胆汁調敷

一方 用磁器搥碎如粉以雞子油調敷

一方 百草霜研末菜油調圍立效

一方 銅靑一兩松香五錢葱三根草麻仁六十粒
搗爛成膏靑布攤貼

一方 日久不愈瘡口周圍作瘡抓破
津水相延成片形類黃水瘡者 化銅舊鑵子

一個研細末香油調敷自能滲濕祛風瘡口易斂

頭上軟癰 大芋子搗如泥敷之卽乾

一方 牆上小白螺螄殼燒灰入倒掛塵等分油調
塗之

一方 銅綠不拘多少研細末用柏油熬化布攤成

膏貼之立消

一方 翠玉膏逼明瀝青八兩銅綠二兩麻油三錢
雄猪膽汁三個先將溶瀝青等藥後下麻油熬至軟
硬合宜取傾水中扯抜器盛每用緋帛攤貼不須
再換

銳毒生在耳後一寸三分高骨後初如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤軟諸瘡疼痛倍增若紅腫速潰者順堅硬黑陷者逆左耳後見之爲天疽俱危症也務宜急治之遲則無救此方男女大小皆救

大天南星煆存性爲末醋塗三次即愈

一方 大黃一兩青木香三錢薑黃梹榔各三錢共爲末蜜調貼中留一孔甚效

一方 金銀花歸尾赤芍連翹殭蠶大力子元參等分接服兩大劑即愈

腮毒 大黃末薑汁和勻周圍搽轉止露一頭不日即愈也

面上毒瘡初起者 急尋水蜈蚣一二條 用醬少許共搗塗紙上貼之即退紙上留小孔出氣極效

East Asian Library Digital Collection Princeton University DO NOT COPY Property of the Gest Library

小兒耳邊腮腫　五棓子濕紙包一個燒灰存性研末雞子白調糊遍敷立效

肺熱面瘡　苦絲瓜牙皂並燒灰等分油調搽之

面上風瘡　鹿角尖磨酒塗之

疙腮　赤小豆爲末以苧根和調雞子白調稀即愈搗則不粘

瘡疽並敷

腦疽有透腦侵腦二疽之分透腦生於百會穴前顖門穴前侵腦生於透腦疽前側下五處穴皆險症也　槐花子蒂干千頭子即掃箒子各等分水煎通口温服加蟾酥少許尤妙治疔瘡更效偏正對口亦名正腦疽偏腦疽此方並治之

燕窩瘡生於下頦俗名羊鬍子瘡　碧玉散黃柏末紅棗肉各五錢研細末香油調搽內服平胃散加芩連生薑引

一方　鼠屎研末香油搽即愈

雀斑生於面上其色淡黃碎點無數由火鬱血分風邪外搏而發　時珍玉容散

猪牙皂角紫背浮萍白梅肉甜櫻桃枚各一兩焙乾鴈屎白三錢共研細末每早晚用少許在手

East Asian Library at Princeton University
Digital Collection
Not Copy

心內水調濃搓面上良久以温水洗面至七八日後其斑皆沒神效

一方及黎黑斑點　苦酒浸木常常拭之

面上黑痣形如衛點小者如黍大者如豆北皮膚高起一層有自幼生者有中年生者

巴豆一錢石灰炒八言各一錢酒米五分炒研點之

一方每夜以煖酸漿水洗面用布揩赤再以白檀香磨汁塗之

一方人生惡肉　黃豆稭燒灰入豆油炒點之即去

一方羚羊胆牛胆各一枚醋二升同煮三沸頻塗

一方巴豆七粒石灰等分為末以糯米用伏未中鹹水浸之候米爛將痣用針撥破米膏點之三日勿洗其痣自落

黧黑斑點　一名黧黑斑初起色如塵垢日久黑似煤形枯暗不澤大小不一小者如粟粒赤豆大者似蓮子芡實或長或斜或圓與膚相平婦女多有之

一方及酒皶鼻令人悅顏色　冬月間新生雞子取白酒漬之

East Asian Library Princeton University Not Copyright the Gest Collection Do Not Copy

密封七日取出每夜塗面最良

一方 鹿角尖磨濃汁厚厚塗之神效

一方 李子仁去皮細研以雞子白和如稀餳塗之至旦以漿水洗去後塗胡粉不過五六日見效但須忌見風

一方 冬瓜藤煎洗之亦洗疥瘡

一方 以米醋浸黃雞子候至壞時敷之

一方 鷹屎白二分胡粉二分蜜和封之

一方 冬瓜練即瓠瓜洗之且能悅澤白皙

一方 密陀僧爲末以陳醋浸敷之隨手而愈每年一次並治癜風

一方 密陀僧六錢雄黃三錢硫黃三錢先以薑搽斑上次用藥末搽之次日即焦永不再發並治癜風

對口 亦名腦疽有偏正之名正者易治偏者難治皮厚難破爲腦疽皮薄易破爲腦瘡宜別之

貓頭骨燒存性研末每服三五錢酒下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

一方　熱雞冠血頻頻塗之取效爲度

一方　偏對口及一切色白陰毒初起　活鯽魚一個生山藥一段樣長用白糖二錢同搗極爛敷上乘消卽去並治瘰癧初起如婦人乳癌初起用臘糟同搗敷上立消

一方　甘蔗渣焙燥研末白狗屎焙燥研末和勻用竹管將稀絹包一頭入藥飾在膏藥上貼之卽垂危者亦愈

一方　初起者　桃葉尖九個搗爛摻入卽愈

一方　用抱小雞窩中母雞熱屎取塗之

一方　鮮茄蒂七個鮮首烏輕粉各等分水二鍾煎八分一服出膿再服收口

一方　猪苦胆剖開碗盛其汁塗完卽瘥　男用雄女用母

一方　天茄　卽白牽牛葉帶莖子採之同生薑三片搗敷早晚一換三日全愈

瘰癧小者爲瘰大者爲癧名色甚多項前爲瘿瘰項後爲瀝瘰左右兩側形軟遇怒卽腫爲氣癧堅硬筋縮爲筋癧若連綿如貫珠者卽爲瘰癧又有馬刀子母重臺蛇盤鎖項蜂窩惠袋燕窩瓜藤瘰

East Asian Library, Princeton University
Do NOT Copy
Property of the Gest Collection

瘍流注單窠蓮子門門及風石鼠瘡鼠瘡卽俗之鼠瘡形名各異受病固不外痰濕風熱氣毒而成然必兼恚怒忿鬱幽滯謀慮不遂而致者也

初起成塊未破者將麪揑成薄條照瘡大小略離患處作圈圍着再用新鋤於土內取出槐樹根上白皮數條照麪皮作圈放趄皮上用艾作小灸放栗子中心灸之內略覺痛卽拂去艾灸另灸每日如此三遍麪圈不必動槐皮要換三次連灸三日卽消

瘰癧初起未破以前疎滯止痛要方

白膠香海螵蛸降眞香心無主氣者佳各等分研末溫水調稠薄紙攤貼神效

瘰癧不拘已破未破並久近者

四十九個土茯苓三勭共煎湯當茶飲忌牛肉屢

花粉苦參各五錢皂角

驗奇方

一方 枇杷葉一勭去毛梗炙焙燥爲末水白糖一勭拌勻不拘時服白湯過口服完卽愈

一方 未破卽消已潰爛牽至兩肩胸膛茄子大及連年不愈者 沈香五錢芫花炒三錢月季花卽月月紅用二錢碎剉入大鯉魚腹中魚須

Digitized by Google
East Asian Library
Princeton University
Do NOT Process
Princeton University Library

放尿內遊死者就以魚腸封固酒水各一碗煮熟服之卽愈

瘰癧內消驗方　鼠糞七錢大楓子仁五錢巴豆三錢共搗入大鯽魚肚內用紙包縛再用黃泥封固如法煆煉俟烟盡取出冷定研細未米糊丸菉豆大每空心黃酒下二錢十日全消神效

一方　雞蛋一枚頭開小孔採綠萼梅花將開者七朵入蛋內封好煮熟去花食蛋如此七枚全愈

諸般瘰癧未成者能消已成者能潰　定粉磨刀石泥三稜莪朮塗患處用此消堅尤速李泉龍泉散

一方　已潰者能生肌長肉未潰者則能消散　以雞蛋微開一孔用川貝母心七條入內仍以紙封固飯上蒸熟食之每日飯後食一枚二十餘日定能全愈

一方　內消　斑蝥七個粘米炒去足翅　黑丑炒一錢荊芥炒黑一錢各爲末夏枯草煎湯調服以下出之物如

膿血爲驗

一方 白鴿屎炒研末飯和丸梧子大每三五十九米飲下

一方 無論蟻瘻蜂瘻瘰癧惡瘡猬心肝燒灰酒服一錢

癧串革麻肉嫩松香各等分搥萬餘下攤青絹上貼之卽愈

瘰癧鼠瘻 貓眼睛燒灰井華水服方寸匕日三服 卽數分

或以貓舌生研敷之

一方 以貓口中涎將癧刺破塗之

一方 或已潰者 以狐頭骨同野貓頭骨燒灰敷之

瘰癧腫痛 久不瘥者 野貓頭蹄骨以酥炙黃爲末每日空服米飲下一錢七分

鼠瘻瘰癧 猪膏醃生地黃煎六七沸塗之

一方 及鬼疰毒氣在皮中如針刺者 兎頭皮燒灰白水調服

癧瘻潰爛 用貓腦紙上陰乾同莽草等分爲末納孔中甚效

East Asian Library Digital Collection Princeton University Library

一方 臘月貓屎以陰陽瓦合鹽泥封固煅過研末油調塗之

一方 雄鼠一枚亂髮一雞子大以三歲臘猪脂煎令消盡以一半塗之一半酒服

一方 新鼠屎一百粒收密器中五六十日杵碎敷之神效

一方 田螺連肉燒存性香油調搽

一方 土牆上白螺螄殼爲末日日搽之

一方 汁出不止 白鴨脂調半夏末敷之

瘰癧多年不愈 貓頭蝙蝠各一個俱撒上黑豆同燒存性爲末摻之乾則以油調搽內服五香連翹湯取效

瘰癧潰久不斂 乾薑爲末薑汁打糊作丸劑以黃丹爲衣每日隨瘡大小入藥以追膿盡肉生口合爲度如不合以葱汁調大黃末搽之卽愈

乳癌 潰爛幾見臟腑 土鼈樹子 經霜者炒川練不用 雄鼠屎露蜂房

East Asian Library Princeton University Do Not COPY Digital Collection

五更初即用溫酒調藥一錢或二三錢量强弱用之服後如小水未下惡物次早再用一服仍不行第三日五更初先喫白糯米粥再服一服更以燈心湯調琥珀末一錢以利下惡物爲愈如孔痛用青黛一錢以甘草湯調下其痛即止

瘰癧堅硬（難消難潰）整文蛤一個攢孔金頭蜈蚣一條研粗末裝文蛤內紙糊封口外再用紙糊七層晒乾麪麪拌炒以紙黑焦爲度去紙研極細末加麝香一分再研勻陳醋調稠溫敷堅硬核處外用薄紙蓋之每日一換神效

二方 貝母去心一錢薑棗引服效

三發背（上背又名脾肚發中背又名對心發下背又名對臍發上發在天柱骨之下中發與心相對下發正對臍上三症無論老少總以高腫紅活燄痛者爲順若漫腫塌陷焦枯紫黑者爲逆初起者不論虛實即宜隔蒜艾灸灸之則就患瘡頂當肉灸之至知痛爲效不知痛者則多灸麻氣虛故也以大化小移深居淺灸後用針當瘡頂點破一孔隨用扳

Digitized by the Harvard-Yenching Library
Do NOT COPY
Gest Library Princeton University

法務使毒氣內外疎通庶不致內攻如有兼症隨症參詳汗下雙解之法而治之潰後則與瘡疽瘡瘍同法治之

一方初起者　生薑一塊炭火炙一層刮一層爲末以猪胆汁調塗之

一方初起者　羊脂猪脂切片冷水浸貼熱則易之數日即癒亦治乳發

一方初起　以黃明膠四兩酒一碗重湯炖化隨意飲盡不飲者用白湯下之不致惡毒內攻

一方初起者　黃明膠新瓦上燒存性研末酒二碗服之神妙

一方欲潰不能者　穿山甲四片黃明膠炒存性研末以酒沖服

一方初起者　鹿角燒灰醋和塗之日五六易甚效

一方未潰或初起者　千歲子出交趾地方不拘多少搗爛如泥醋調塗之三次見效

East Asian Library, University of Toronto
Digitized by Google
Princeton University Library
Do not copy
Collection

火温候油熟將黜子投入油內用桃柳桑槐棗五
枝攪之候起珍珠花撈去渣用布濾淨復將油下
鍋慢慢將黃丹篩入油內仍用五枝不住手攪之
以滴水成珠爲度取出收貯用時勿用見火以重
湯炖化紅緞攤貼功效甚大

蛇蛻膏蜜蜂二十一個蛇蛻七
二方瘰癧潰後用 午前
之專消餘毒 端午前收者佳 用香油四兩將三藥入油
分半蜈蚣三條
內文武火煤枯撈去渣入定粉二兩用如飴粗桑
枚七條急攪候冷出火氣七日夜方用紙攤貼患
處極效

鈕扣風生於頭下天突穴之間起如粟米搔
癢無度抓破流水犯水則浸淫成片 輕者
用獨勝散芥菜花研細醋調敷之立能止癢消腫
一方 重者水硫散用白蘿蔔一個掏空以硫黃一
兩潮腦川椒生白礬各二錢研細末入蘿蔔內仍
用皮蓋定紙包三四層灰火內煨半時許待冷將
藥取出用熟猪脂油調稠搽之自愈

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University

上石疽又名小石癰生頸項兩旁形如桃李皮色如常堅硬如石譬痛不熱乃疲頑之症也

採二蠶桑葉滴下之水點之以愈爲度

一方氣虛者　外用葱蜂蜜搗泥敷貼內服養榮湯加

香附酒炒

發背及一切癰疽皆因熱毒者多症見眼花頭運口乾身熱四肢麻木背有紅暈者　槐花子一大把鐵鍋炒至錫色沖好酒一盞乘熱飲之一汗而愈如未退再服極效保壽堂屢驗方縱成膿亦無不驗

背毒未成　活蟾一隻繫放瘡上半日必昏憒即中水救其命再易一隻必跟蹌再易其蟾如舊則毒散矣累用極效勿輕視之

發背或搭手破爛者　生山藥一兩白糖霜四兩打爛塞入毒內不臭爛肉去則新肉自生初時日換三次三日後一日換一次煎甘草湯或猪蹄湯洗用軟鬣毛數根紮之洗去再敷待肉長滿方止

發背散血方　槐花菜豆粉各一勹同炒至象牙色

Property of the Gest Collection
East Asian Library
Princeton University

研勻細茶一兩煎一碗露一宿調末三錢敷之留頭勿犯婦人手極效

發背潰後去餘毒 眞定粉二兩麻油三兩慢火熬以柳木急攪至滴水成珠爲度再入白膠末少許置磁器中水浸兩日臨症攤貼中留一孔極妙

發背初起以石韋去黃毛炒爲末冷酒調服

發背潰爛黑毛黃牛糞多年者晒乾爲末入百草霜研細摻之

一方 雞肫黃皮同棉絮焙末搽之

三搭手 上搭生眷骨第三節傍開一寸半肺俞穴間左右同中搭生於眷骨第四節傍開三寸膏肓穴間一名龍疽下搭生於眷骨第四節傍開三寸盲門穴間 初起者以全蝎去頭足尾甲炙胡桃肉等分研細末酒冲服一二次即消

丹毒發生於背形如湯火所傷細瘡無數赤暈延開發時其渴非常由素服丹石剛劑所致

大甘草二觔搥碎河水浸一宿採取濃汁去盡筋渣再用絹濾過銀器內慢火熬成膏用磁罐收貯

研細末煉蜜爲丸彈子大日洗數次一月全愈

面上靨痕 并一切瘢痕 鷹屎白二錢以人乳和勻入窓少許塗面三四日卽光

面上白駁 似癬非癬皮漸生白無藥可治 鰻鱺魚脂火炙出一兩先拭駁上刮令燥疼後以油塗上不過三次卽愈

面上赶黯 及汗斑雀斑 紫背浮萍漢防己煎水洗或晒乾爲末擦之神效

黑痣 藜蘆五兩用滾水一大碗淋汁於銅器中外以湯煮如黑膏以針微撥破痣處點之不過二次卽脫

瘰癧結核 曰以山慈菇醋磨塗之

癧瘦 露蜂房炙研末猪脂和塗自愈

少年氣盛面上生瘡皰 以糜脂化開塗之

去靨痣並爛癧瘡惡肉 甜蕎麥稭卽麥藁皮也燒灰淋汁取鹽熬乾同石灰等分盛收點之最妙

滅諸瘢痕 春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩粉和

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

酥油敷之

一方 大雄鼠一枚以臘猪脂四兩煎至銷盡濾淨油日塗三五次先以布拭後塗並治赤遊風

外科 眼鼻耳口脣齒舌喉胸乳九部

眼胞菌毒生於眼之上下眼胞邊形如豆漸長垂出如菌堅凝不痛如經年不愈消之不應者

翠雲錠子即杭粉五兩銅綠黃連各一兩輕粉一錢爲細末用糯米百粒水一碗煎半碗去米再煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃蘸塗之但先當用軟綿紙蘸水潤眼皮菌毒處少頃用左手大脂甲墊於毒根右手持鈹針尖頭齊根切下然後敷藥其血即止內服清脾火藥忌海腥煎炒

DO NOT COPY
Property of the Gest Collection
East Asian Library
Columbia University Library

針眼生於眼皮毛睫間形如豆粒有尖如破後被風侵瘡口以致頭面浮腫目赤澁痛諸藥不效者

苧皮散川苧二兩青皮一兩爲末每服二錢菊花湯調服外用鹽湯洗淨以枯白礬末調雞子清敷之

一方用南星末同生地黃搗貼太陽穴自消

眼胞瘀核生於上下眼胞皮裏內外或如棗或如豆推之移動皮色如常硬腫不疼從眼皮裏潰破者多難斂

內用二陳湯加殭蠶炒川連研細末荷葉煮湯合先梧子大每服二錢白滾水送下外用生南星醋磨濃頻搽眼皮日數次淺者卽消日深者亦宜常塗令皮薄軟微微撥損以手指甲擠出白粉汁卽消後貼生肌膏藥

椒瘡粟瘡椒瘡生於眼胞之裏形如椒粒色赤形硬難消粟瘡形如黃米色黃形軟易愈二瘡若眼皮內有紅絲纏纍者乃血熱有餘也

以燈草刮瘡令血出卽愈

鼻淵鼻竅中時流黃色濁滯乃內因胆經之熱移於腦髓外因風寒凝結火邪而成

藿香連枝葉八兩研細末雄猪胆汁和先梧子大每服五錢食後蒼耳子湯下或黃酒送下

Courtesy of the Princeton University Library

一方 白芷一兩蒼耳子炒辛夷仁各二錢五分薄荷五分爲末葱茶清調服

控腦砂 一名腦漏乃鼻淵久而不愈鼻中淋漓腥穢血水頭眩虛暈而痛必係有蟲蝕腦也

天羅散 絲瓜藤近根處者燒存性爲末每用三錢食後黃酒送下

一方 用破瓢白雞冠花白螺螄殼等分燒灰加血竭麝香各五分以好酒洒濕熟艾和作餅貼頂門熨斗熨之以愈爲度

一方 熊胆湯化抹之並治鼻齆瘡

鼻齆瘡 多生小兒鼻翅兩旁色紫斑爛膿汁浸淫痒而不痛由風熱客於肺經所致 海螵蛸白芨各一錢(即五分)輕粉二字爲末搽之

一方 以牛皮草拳燒灰爲末搽之 即穿牛鼻草繩

鼻瘡 生於鼻竅內初覺燥痛瘡如粟粒甚則鼻外色紅微腫痛如火炙 杞竈飯燒灰研末塗之或用飯盆邊零飯燒灰研末敷之

一方 猪油調犬骨敷之

一方 馬拌繩燒灰摻之

East Asian Library and the Frederick Collection
Columbia University Library

一方 益母草燒灰一兩肥皂一兩共搗爲丸日洗三次十日後粉刺自然不生須忌酒薑則不發

鼻赤 亦酒皶鼻粉刺之屬也 硫黃皮硝等分研極細末臨卧擦之一月全愈

一方 陀僧二兩細末日擦之自愈

酒皶鼻 生於鼻準頭及鼻兩邊先紅後紫久變爲黑最爲纏綿 硫黃四兩裝入猪大腸頭內線紮定兩頭水煮三炷香取硫黃陰乾磁瓶收好用時加水片少許以指擦之每日數次自漸全愈

一方 以勃臍日日不時擦之自瘥

一方 日久不愈者 梔子仁九梔子仁研末黃蠟溶化和九彈子大每用一九茶清送下忌辛辣之物

一方 出膿血者 正月取鼠頭燒灰以臘月猪脂調敷

一方 水老鴉屎一合研末以臘月猪脂和勻每夜塗上至日洗之並治面上黑皯皻瘢疵

一方 當歸苦參各四兩爲末和勻酒糊丸桐子大

食後熬茶吞八十九藥盡卽愈

一方 蛇床子紅豆等分爲末早洗晚搽

一方 起非日久者 麻黃及根各二兩頭生酒將藥入酒內重湯煮三炷香露一宿早晚各飲三五杯至三五日出膿成瘡十餘日則膿盡膿盡則紅色退先黃後白而愈并以顛倒散敷之更妙方見粉刺鼻塞 苧麻仁三百粒大棗一枚搗勻綿裹塞日易一月全愈

粉刺皰瘡 胡粉水銀臘猪脂三味同研如泥夜間敷面勿洗三日卽瘥

酒皶鼻 蜜陀僧一兩研極細用人乳或蜜調如薄糊每夜略蒸待熱敷面次早洗去半月後面如玉鏡生光相傳楊貴妃所製方也

耳內黑疔 生耳竅暗處色黑形如椒目痒如錐刺痛有因服丹石熱藥積毒而成者 急服蟾酥丸汗之再用蟾酥丸水調濃滴耳竅內立效

Not to be copied
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

耳中生核大痛難忍　以燒酒滴入仰之半時即可箝出

耳疳震耳纏耳停耳風耳俱係耳內悶腫出膿但膿色不一而名亦異耳疳則出黑色臭膿震耳則出青膿纏耳則出白膿停耳則出黃膿俱由胃濕與肝火相兼而成惟風耳則出紅膿偏於肝經血熱　外俱宜醬茄自然油滴之侯膿浮用滴耳油時時滴之方即核桃仁研細擠油去渣得油一錢兌氷片二分每用少許滴耳內則腫消肌生自愈風耳內服四物加丹皮石菖蒲餘症內服清肺瀉肝諸藥

一方有蟲膿血不止　鯉魚膽三兩鯉魚腦一枚鯉魚腸一具烏麻子炒研一升同搗入器中微火炙腹布裹貼耳外以血蟲出盡為度即愈

一方　鯉魚腦和桂末搗勻棉裹塞耳內引蟲出則

愈驗方

一方有膿　石首魚即魚頭中石子鼈研末或燒存性研摻耳中

一方有膿及耳聾　海螵蛸五分即二分五厘同麝香一字為末以棉杖微微吹耳中

Do not copy. First Asian Library Chinese Collection University of Toronto

一方出汁　夜明沙二錢麝香一字爲末拭淨摻之

一方出膿　犬膽一枚枯礬一錢調勻棉裹塞耳內三

四次卽瘥

一方出汁　取鼠肝如棗核大乘熱塞之能引蟲出

一方膿出不止　水龍骨一錢硼砂五分爲末吹入耳門

上用棉塞之二服斷除名停耳丹

耳痺　龍骨麝末輕粉枯礬等分爲末吹入耳卽愈

耳疳及諸般耳症　用頭髮在新瓦上燒灰存性爲細末

羅過每灰一錢加氷片七釐研勻吹少許入耳內

卽愈極驗

一方　燕脂燒灰爲末加氷片少許吹之卽愈

耳衄耳竅中時流鮮血腎脈虛數者　生地麥冬去心各五錢水二

鍾煎八分食後服外用神塞充麝香一分生白礬

一錢沉香三分糯米五十粒研細末麵糊爲丸梧

子大每丸薄棉裹之如左耳出血塞右鼻右耳出

血塞左鼻兩耳出血塞兩鼻如鼻衄亦按耳衄法

Digitized by the East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

塞耳

耳痔耳蕈耳挺皆生耳內耳痔形如櫻桃或如羊奶挺形如棗核細條而長蕈形類初生時蘑菇頭大蒂小耳腎經相火胃經積火凝結而成微腫悶疼色紅皮破不當觸犯偶犯之痛引腦巔俱宜硇砂一錢輕粉雄黃各三分米片五釐研細末水調濃用穀草細梗咬毛蘸點患上內服清肝熱藥漸漸自愈

耳瘑眩目黑睢雞膽汁塗之日三次

旋耳瘡是瘡盛衰隨月盈虧故又名月蝕瘡生耳後縫間及耳摺上下如刀裂之狀色紅時津黃水由胆脾濕熱所致輕粉研隔紙微炒穿山甲炙鉛粉黃丹水飛過各三錢研極細香油調敷

一方龜甲燒灰敷之

一方烏雄雞腦日塗三次數日即愈

一方敗鼓皮掌大一片以苦酒三升漬一宿塗之或燒灰以豬脂調塗

一方虎頭骨二兩搗膏研末和豬脂一觔熬膏塗之即愈

Do Not Copy
East Asian Library
Princeton University
The Gest Collection

先以清米泔水漱口次用鑷尖將絲挑少許塞於
牙齦縫內日三易之再用手法去其黑腐總以內
見紅肉流鮮血者則爲吉也

一方 頑肉難脫堅硬腐爛
漸開以致穿腮破唇 青蓮膏青黛二錢乳香
輕粉各一錢麝香五分白砒一分爲細末用香油
調稠薄攤紙上用搥搥實陰乾收之每於卧時以
泔水漱淨口拭乾隨疳症大小煎膏藥貼之至曉
揭去再以泔水將口漱淨吐之至晚再貼見是症
者俱宜內服消疳解毒藥當謹忌食山藥栗子鵝
蟹甜辣等物稍犯必發身熱不退者亦主逆症

一方 白馬懸蹄燒灰入鹽少許摻之卽出其蟲

一方 黑貓頭燒灰酒服方寸匕 卽數分

一方 鮰魚一尾去腸入砒一分生地黃一兩紙包
燒存性入枯礬各麝香少許爲末摻之

一方 五棓子青黛枯礬等分爲末先以鹽水漱淨
隨以藥末摻之立效

East Asian Pharmacy Collection
Donated by Yuan and Margaret Liu
University Library

一方 銅青滑石杏仁等分爲末擦之卽愈

一方 透骨穿腮危症 生南星一個剜空入雄黃一塊麪裹燒候雄黃成汁以盃合定出火毒去麪爲末入麝少許拂瘡數日甚效經驗方

一方 青礬入鍋內炭火煆紅以醋拌勻如此三次爲末臨用時入麝香少許再研勻擦之卽愈

一方 蠶退紙燒存性入麝香枯礬各少許蜜和擦之立效

齒齦初起牙齦宣腫覺痛遇風痛甚常作歪日吸氣之狀牙齦腐孔時出臭膿久則齦齒宣露也

初起者用白馬懸蹄少許以棉裹之塞入膿孔內服清胃火藥甚效

紫舌脹由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬疼痛 宜用衣針紮筋頭上露鋒分許當舌刺數十針令血出 紅色者輕紫色者重隨以温水漱口搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳娥 自愈或內服瀉心火藥

痰包 生於舌下結硬如匏光軟如綿塞脹舌下有妨飲食言語一色黃木痛由火稽痰延流注而成

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

外用鹽泥固好以炭火煆紅待三炷香爲度候冷
開鑵取出入氷麝各一分共研細末臨用時先以
磁針刺破血菌用丹少許點之再以蒲黃蓋之良
舌衄　海螵蛸同蒲黃等分炒研細末塗之
喉癬　名天白蟻咽嗌乾燥初覺時癢次生苔癬色
暗木紅燥裂疼痛時吐臭涎妨碍飲食由過食
炙煿藥酒　用頭胎黃牛屎以新瓦洗淨蓋屎周
圍用文武火煆至烟盡存性取出研末將蘆管徐
吹入自愈

二方　氷片牛黃各一分膽礬三分硼砂八分山豆
根二錢雄黃兒茶各八分白梅去核三個共研細
末次將白梅搗入藥和勻光如龍眼大臨卧含口
內過夜卽消

一方　未潰者　白礬不拘多少研末用方磚一塊以火
上以磁盤覆蓋四面灰攤燒紅酒水於磚上將礬末布於磚
一日夜礬飛盤上掃下用二錢白霜梅去核二個
明雄山甲炙各一錢共研細以小筆管吹入喉內

名礬精散

Not Copyright Restricted
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方潰後腐爛痛 硼砂三錢人中白煆二錢黃連末一錢薄荷六分冰片五分青黛四分共研極細末吹入腐處俱宜內服清火解毒藥自痊

上腭瘡 又名懸瘡生於口中上腭形如紫葡萄更苦舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕寒熱大作不潰 急用燒鹽散食鹽火燒枯礬各等分研細末以筯頭蘸點患上日三五次其瘡自消

喉爛 槐花 牛膝兒茶黃連各一錢共為細末夏天西瓜水服冬天梨汁服丸如綠豆大每服三

丸神效

喉中結塊不通水食 百草霜蜜和丸莢子大水化一丸灌下甚者不過二丸

咽喉熱毒 諸藥不效丹溪云症係鼻生紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂至咽門而止是以飲食不入並非候症用 土牛膝根獨條肥大者搗碎入好醋三五滴打出汁滴入鼻中二三點即系斷珠破吐出瘀血立安

喉結 杏仁殼一個敲開以半個用蒜泥塗邊蓋手

外科　腹腋肋內癒肩臑臂手八部

臍癌初起腫大如瓜高突如鈴無紅無熱　急用蒜片塌患處以艾灸之則免潰時難治也

臍中出水不痛不腫唯癢甚時流黃水乃腸胃久積濕熱　用平胃散加黃連研細末每服二錢白滾水調服外用三妙散柳生蒼术生黃柏各等分為末乾撒之能止癢滲濕又能治濕癬以蔴蘇合油調搽甚效

少腹疽生於臍下一寸五分氣海或二寸關元或三寸丹田三穴皆由七情火鬱而生　初

起者急用艾灸腫頂七壯至三七壯以痛癢通徹爲度此症高腫紅活疼痛牽背易潰稠膿者易治若濕腫堅硬綿潰腐爛膿如水者多逆黯疔生腋下堅硬若釘癢而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩燥作嘔痛引半身甚至昏狂急採經行路上烏白根皮二尺許去皮搗爛敷之其餘按疔門治之

一方 黃牛脂和胡粉塗之日三度永瘥

狐臭

一方 三年醯醋和石灰敷之

一方 薑汁頻塗之自愈不發

一方 夜明沙和醋汁調敷之

一方 龍眼核六枚同胡椒二七枚研細俟汗出卽搽之自瘥

一方 細銅末四兩好醋泡一夜搽之日二次三四日卽愈不發

一方 猪精肉二大片入甘遂末一兩拌勻五更時挾腋下至天明用生甘草十一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在人跡稀少處便之恐穢氣傳人用

Not COPY and the est Collection
East Asian Library Princeton Univer

之二三次全愈虛者間日爲之

一方　田螺一個水浸三日將針挑開入巴豆一粒仍蓋之放磁碗內自然化水加膽礬麝香少許和勻五更用水搽兩腋搽完用枯礬蛤粉各五錢樟腦一錢共研末搽之永不再發

一方　鳳仙花不拘紅白搗成大丸挾於腋每日換三四次二日卽愈看腋下或有紅黑隧下用礦灰調水點之

一方　古錢十文鐵線穿上燒紅用米醋淬十次入麝香末調塗用薑汁頻洗

一方　石綠三錢輕粉一錢爲末濃醋調塗自愈

一方　大田螺一個入麝香三分日埋土內至夜取出露至四十九日備用先以墨塗腋下洗去視有墨點處卽係患孔以螺汁點之立愈

一方　大蜘蛛一個以黃泥赤石脂及鹽少許裹蜘蛛煅存性爲末入輕粉少許醋調臨卧塗之次早

East Asian Library
Princeton University
Do Not Copy
Beyond the Gest Collection

看有黑汁出數點立愈

一方 以自己小便乘熱洗之多次即愈

一方 伏龍肝爲末調水塗之

一方 銀爐灰一勫水浸七日薑三錢白草霜二錢將薑搗爛布盛入灰水內一晝夜取出換挾患處自愈

一方 陀僧二兩細辛一兩焙乾胆礬六錢明雄六錢枯礬二兩輕粉四錢爲末頻搽

一方 陀僧爲末油調搽之或以蒸熟熱饅頭劈開摻陀僧末挾腋下亦佳

淵疽 生於肋下初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膜透也 急宜灸陽陵穴二七壯其聲即止穴在膝膑骨外膝下一寸陷中蹲坐取之即得若疽在將潰尤未潰之際宜多服護膜散即白蠟白芨各等分爲細末輕劑一錢中劑二錢大劑三錢黃酒調服米湯亦可凡肋胸脇腰腹空軟之處如患瘡

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

瀉之若下不止飲冷水一盞則定

一方咯吐膿血兼午後身熱煩燥者宜　金鯉湯金色活鯉魚一尾重四兩者貝母二錢先將魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末摻入肚內線紮好以上白童便半大碗將魚浸之重湯炖煮以魚眼突出爲度少頃取出去鱗骨取淨肉浸入童便內炖熱肉與童便作二三次一日食盡一枚功效甚捷乃罕稀妙方也

一方洋糖二觔半牯猪肚一副杉木炭一分肉桂一分糯米七粒先將猪肚洗淨以諸藥裝入線縫好鍋煮一天每早割一塊水酒下只宜用牯猪肉肚肺及鯽魚餘葷俱戒二百二十天全愈屢效俱用醃芥菜澹水浸每於早未洗面時先冲水飲一鍾洗面後服前藥其菜水陳者尤佳亦飲壹百廿天

一方初起者即消日久者即生肉　元參半觔天冬四兩桔梗二兩炙草一兩水十碗煎至二碗再用蒲公英五錢金銀花五錢再煎一碗飯食後服之神效

East Asian Library Princeton University
Digitized by Harvard-Yenching Institute

一方　用日久齷齪竹油燈絡子一個連宿油膩燒灰存性爲末黃酒送下三錢卽愈極神效方也不可忽視

大小腸癰　俱由濕熱氣滯凝結而成或努力瘀血或產後敗瘀蓄積流注於二腸之中初起發熱惡風自汗身皮甲錯關元天樞二穴隱痛微腫按之腹內急痛大腸癰多大便墜腫小腸癰多小便澁滯脈俱遲緊是膿尙未成　宜大黃湯大黃炒牡丹皮消石研末芥子桃仁炒去皮尖　各等分剉碎每五錢水二鍾煎至一鍾去渣空心溫服以利下膿血爲度未利再服若小便閉澁仍宜是湯加琥珀末亦通利之自效此膿尙未成之驗方也

一方　瘡成日久不潰身皮甲錯內無積聚腹急腹痛身無熱而脈數者是腸內陰冷不能爲膿也

薏苡附子散附子炮二分敗醬五分薏以仁炒一錢爲末每服方寸匕以水二合煎之空心頓服卽數分

以小便利爲驗

一方　症見肚臍高突腹痛脹滿不食動轉側身則有水聲便淋刺痛爲癰膿已成也　薏苡湯薏苡仁栝蔞仁各三錢丹皮桃仁泥各二錢水

East Asian Library Princeton University
Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Princeton University Library

二鍾煎至一鍾不拘時服

小腸癕　五月五日收黃鱔頭蛇頭地龍頭燒灰酒調服神效

腸癕腹痛　白馬懸蹄燒灰和雞子白塗之卽扳去

毒氣

一方　蜈蚣七條新瓦焙乾研末陳酒下卽愈

一方　以黃犬血沖酒服二碗良

手發背　生於手背初起形如芒刺漸覺疼痛高腫紅活燉熱潰速爲癕若漫腫堅硬無紅無熱潰

遲爲疽　生炙甘草各五錢角刺二錢半土炒土貝五錢半夏一錢五分山甲二錢五分炒黑知母二錢五分加薑葱水酒煎服二劑卽愈

蛇頭疔　生於指頂尖自筋骨發出根深毒重初起小泡色紫疼痛堅硬如釘形　急宜內服蟾酥丸汗之外用雄黃散卽明雄三錢輕粉五分蟾酥二分冰片一分共研細末新汲水調濃重湯炖溫敷於患指用薄紙葢之日換三四次

一方　雞蛋一枚開指大一孔套指於中數枚卽愈

Digitized by the Gest Collection
Princeton University Library
Not to be reproduced

一方 及天蛇毒 白大蘿蔔一段挖空勿透勿破入雄黃末三分蒸半熟套指上卽愈

天蛇毒 俗名天蛇頭亦生於指頂尖自肌肉發出其毒稍輕初起悶腫無頭色紅痛如火燎之狀急宜內服蟾酥尤汗之外用雄黃二錢牡蠣煅四錢另研細共和一處再研勻蜜水調濃重湯炖溫塗於患指卽止痛消腫日敷五六次爲效

一方 蜈蚣一條雄黃三錢共研細末雞子清調搽卽愈

一方 猪胆一個入雄黃末五分蜈蚣五分套指上紮緊卽愈

繞指毒瘡 或生足指上者 以活田螺一枚生搗爛縛之

熱毒攻肢 手足腫痛欲脫 以水煮馬屎汁漬之

手指掣痛 豆醬清和蜜溫熱浸之愈乃止

熱毒攻手 腫痛欲脫 猪膏和羊屎塗之

手指腫痛 酸漿水入鹽少許熱漬之冷卽易之

指上瘡腫 及一切腫毒 獨頭大蒜一顆百合數葉和臘

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

糟敷之

蛇眼蛇背蛀節蛇腹四疔及泥鰍疽　五症初起俱宜速服蟾酥丸汗之外敷雄黃散方見蛇頭疔

代指　生指甲身內初起先腫燃熱疼痛應心宜用　甘草朴硝各五錢熬水浸洗卽瘥如痛仍不止三四日後指甲背面上微透一點黃白色此係內膿已成但無門潰出急用線針在指甲身就膿近處撚一小孔膿方得出隨手揑盡餘膿用黃柏薑黃黃連歸尾生地搗成膏貼之

一方　以猪膏和白蠟少敷之

癆指　生雞蛋一枚頂開一孔去黃用燒酒調雄黃細末三分裝入將指插入蛋內逾時膿出痛止

瘡瘡　生兩手及指掌中形如茱萸兩手對生亦有成時發極其疲頑難痊　鮒魚鮓批片貼或同桃葉搗敷更可殺蟲神效

一方　日久不愈蟲痒倍增　藜蘆膏藜蘆苦參各一兩猪脂油

Ess-Zsian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

八兩將藥煤枯濾去渣入松香一兩溶化開離火再加枯礬雄黃末各一兩攪勻候温塗之以瘥爲度

小兒瘡瘡　猪牙車骨年久者搥碎炙黃隨取出乘熱塗之

狐尿刺　一名狐狸刺由螳螂盛暑交媾精汁染於諸物乾久有毒人之手足誤觸之則成此患初起紅紫斑點肌膚乾燥悶腫煩痛不眠若時至十日後腐開則瘡口自寬　初起未潰時以蒲公英連根濃煎温洗若得鮮者搗汁塗之更妙內服黃連解毒湯卽愈若潰後按後總治潰瘍治之

一方　腫痛欲死　破烏毛雞揚之良效

鷲掌風　生於掌心中多由梅毒未盡又兼血燥復受風毒凝結而成初起紫白斑點疊起白皮堅硬且厚乾枯燥烈延反偏手亦有因脾胃有熱血燥生風血不榮養皮膚而成久則成癬難愈

二礬散　白礬皂礬各四兩兒茶五錢側柏葉八兩水十盆煎數滾聽用先以桐油搽患處再用紙撚桐油浸透火點向患處薰片時次用煎湯乘熱貯

DO NOT COPY
Property of the Princeton University Library
Fess Brant Collection

木桶內手架桶上以布將手連桶口蓋嚴湯氣薰
手勿令泄氣待微熱將湯傾入盆內蘸洗良久一
次卽愈七日切不可見水再以牛油柏油香油銀
硃各一兩官粉麝香研細各二錢先將三油火化
入黃蠟一兩溶化離火再下硃麝粉末攪勻成膏
搽患處火烘之以油乾滋潤爲度或內再服地黃
丸加祛風之藥自愈

一方白鴿屎雄雞屎炒研煎水日洗之

一方雄黃同山甲火燒薰之數次自愈乃呂祖法
也

一方眞艾四兩水四碗煮數滾入大瓦瓶內用麻
布二層蓋紮將手心放瓶口薰之如冷再熱再薰
無不應效

一方鴿子屎水龍骨各一兩常山一兩五錢爲末
將桐油搽掌上患處用藥薰之數次卽愈

一方猪胆一枚黃柏八分乳香五分煎猪油搽之

DO NOT COPY
First Asian Library
Princeton University
Rare Books and Special Collections

奇效

一方　槐皮大麥花椒骨皮艾葉鴿屎白芷煎湯先洗後薰每日數次愈或用猪蹄湯洗之亦妙

一方　硃砂明雄各一錢輕粉五分為細末用桐油調塗患處以微火烘一炷香為度年遠者五七次年近者二三次即愈驗方

一方　核桃大鉛彈子一個每日在手內搓弄搓熱將鉛彈子握緊晝夜不歇如此十餘日即愈但宜常用是法則不復發

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

T COPY
nd the Gest Collection
ersity Library

各三錢俱煅存性爲末每酒服三錢間三日一服
不數日膿盡收斂

鼠瘕　黑參漬酒日日飲之

一方已破出膿血者　白蘚皮煮汁服一劑當吐如鼠子卽
愈肘後方

瘰癧疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者　雞鳴散黑丑一兩胡粉一錢生大黃二錢朴硝炒成粉二錢共細末每服二錢雞鳴時井華水調服以二便通利爲度如未利再服之

疝痰寒瘕遶項而生無藁以蕎麥炒過去麥白殭蠶最毒每用七個去頭多用亦宜同炒過卽去取其氣味而已治疝毒人味多用四錢原本誤作二錢又脫臙脂蟾蠶石用五字方合熙雲祖注

此係古方劑并種種黑丑三於大米炒三旁添注去斑蠶石用五字方

先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再服一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do Not Copy

各三錢俱煅存性爲末每酒服三錢間三日一服不數日膿盡收斂

鼠瘺　黑參漬酒日日飲之

一方已破出膿血者　白蘚皮煮汁服一劑當吐如鼠子即愈附後方

瘰癧疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者　雞鳴散黑丑一兩胡粉一錢生大黃二錢朴硝炒成粉二錢共細末每服二錢雞鳴時井華水調服以二便通利爲度如未利再服之

風痰瘰癧遶項而生無寒熱者　海藻以蕎麥炒過去麥白殭蠶微去絲等分爲細末用白梅肉泡湯爲丸梧子大飯後或臨卧時每服六七十丸米湯送下忌魚腥厚味自愈

誤食毒物致成瘰癧　荆芥穗殭蠶炒去絲黑丑各二錢斑蝥二十八個去頭足翅大米炒爲末卧時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再服一錢

East Asian Library and the Princeton University Library Digital Collection

一方熱腫痛甚魚腥草搗塗之中留孔以洩熱毒卽易塗神效

一方及一切癰疽母猪蹄一隻通草六分綿裹煮羹食

一方已潰及腫毒雞嗉子及肫內黃皮焙研濕則乾搽

乾則油調搽

一方疼痛欲死冬瓜壹個去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已漸愈矣乃用膏藥貼之

一方及一切癰疽削瓜一大塊置瘡上熱則易之可去熱毒盡取其走而性急久病及陰虛者忌用

五雲膏又名銀黝丸枚膏方治瘰癧癥瘕仙丹又治各項有名無名瘡毒未破者即破而易收功心破者即拔膿生肌瘡中有骨者名曰骨疽湿腰痛腿足痛均有奇功此膏最能拔骨又治風氏方也 亂雲船記

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do NOT Copy

一方熱腫痛甚　魚腥草搗塗之中留孔以洩熱毒卽易塗神效

一方及一切癤疽　毋猪蹄一隻通草六分綿裹煮羹食

一方已潰及腫毒　雞嗉子及肫內黃皮焙研濕則乾搽

乾則油調搽

一方疼痛欲死　冬瓜壹個去頭合瘡上瓜爛截去更合之凡換四次矣乃用膏藥貼之

瓜未盡瘡已漸愈矣

一方及一切癤疽　削瓜一大塊置瘡上熱則易之可去熱毒益取其走而性急久病及陰虛者忌用

濕毒瘰癧漫腫疼痛皮色如常有日久將潰皮色透紅微熱痛甚　初腫者神攻散製烏頭嫩黃芪各等分研細末米醋調稠温敷腫處每日一換總不宜於寒涼藥

諸般瘰癧未潰者不辨肉色不問大小及日月深遠或有赤硬腫痛並皆貼之

馬刀瘰癧及鼠瘡已潰者　五雲膏銀黝子四兩搥碎黃丹八兩飛淨香油二十兩用砂鍋一口盛香油

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries

每服三錢無灰溫酒調下或白滾水亦可外用牛
肉薄片貼之

中石疽 皆由寒氣痰血凝結生腰胯之間纏綿難愈
其疽時覺木痛難消難潰堅硬如石皮色如
常 初起速用鮮商陸搗爛貼於患處隨用艾壯
當頂灸之以疽軟爲止內服行痰和血藥如潰後
以生肌長肉膏藥貼之自愈

纏腰火丹 俗名蛇串瘡又名白蛇纏腰色有乾濕紅
黃之異皆纍纍如珠形若不速治纏腰已
遍毒氣入臍令人臍腹悶嘔者則不救

蛇蛻一條燒灰存性厠坑

板上浮泥刮下同研細用童便調敷敷次一二日

一方 鍋臍灰將臭飯脚水調敷

一方 柏葉散側柏葉蚯蚓 韭菜地內 屎黃柏大黃各五錢雄黃赤小豆輕粉各三錢爲細末先將丹砲用針穿破方以前末敷之此不速治則多逆矣

黧黑斑黯及雀斑 白殭蠶二兩黑丑二兩細辛一兩

Princeton University Library Gest Collection

每服三錢無灰温酒調下或白滾水亦可外用牛
肉薄片貼之
中石疽皆由寒氣痰血凝結生腰胯之間纏綿難愈
其疽時覺木痛難消難潰堅硬如石皮色如
常　初起速用鮮商陸搗爛貼於患處隨用艾壯
當頂灸之以疽軟爲止內服行痰和血藥如潰後
以生肌長肉膏藥貼之自愈
纏腰火丹俗名蛇串瘡又名白蛇纏腰色有乾濕紅
黃之異皆纍纍如珠形若不速治纏腰已
遍毒氣入臍令人脹悶嘔者則不救　膨
蛇蜕一條燒灰存性厠坑

板上浮泥刮下同研細用童便調敷數次一二日
即愈
一方　白芨八錢水龍骨糞斑者佳共研末無根水調敷
一方　鍋臍灰將臭飯脚水調敷
一方　柏葉散側柏葉蚯蚓韮菜地內屎黃柏大黃各五
錢雄黃赤小豆輕粉各三錢爲細末先將丹砲用
針穿破方以前末敷之此不速治則多逆矣
黧黑皯黯及雀斑　白殭蠶二兩黑丑二兩細辛一兩

DO NOT COPY
Princeton University Library
Estus Smith Collection

一方 或鼻痔蟲蝕口鼻 牛骨犬骨燒灰臘猪脂和敷神效

一方 烏牛或黑牛耳垢敷之

一方 杏仁去皮尖搗爛以人乳和杏泥敷之

一方 陀僧白芷各一兩爲細末摻之

鼻痔生於鼻內形如石榴子漸大下垂色紫
數硬掌之窒鼻氣疑人氣息難通熱氣
水一日一次自愈

鼻中瘜肉惡肉也人之臭息是也 蟭螟一枚納青竹筒中油紙密封置厠坑內四十九日取出晒乾入麝香少許爲末塗之當化爲水也

一方 藜蘆三分雄黃一分蜜和日點三次勿點兩眸

肺風粉刺由肺經血熱而成發於面鼻起碎疙瘩形如黍屑色赤腫痛破出粉汁日久成白屑如黍

大黃硫黃等分研細末共合一處再研勻以涼水調敷名顛倒散內服清肺熱藥自愈

一方 或鼻疳蟲蝕口鼻 牛骨犬骨燒灰臘猪脂和敷神效

一方 烏牛或黑牛耳垢敷之

一方 杏仁去皮尖搗爛以人乳和杏泥敷之

一方 陀僧白芷各一兩爲細末摻之

鼻痔 生於鼻內形如石榴子漸大下垂色紫微硬撐塞鼻孔礙人氣息難通肺熱也 瓜蒂炒甘遂炒各四錢枯白礬五分爲末松香五分香油調和爲丸即以松香爲衣入鼻內點之即化臭水一日一次自愈

鼻中瘜肉 惡肉也人之臭息是也 蜣螂一枚納青竹筒中油紙密封置厠坑內四十九日取出晒乾入麝香少許爲末塗之當化爲水也

一方 藜蘆三分雄黃一分蜜和日點三次勿點兩眸

肺風粉刺 由肺經血熱而成發於面鼻起碎疙瘩形如黍色赤腫痛破出粉汁日久成白屑

大黃硫黃等分研細末共合一處再研勻以涼水調敷名顛倒散內服清肺熱藥自愈

East Asian Library Copy at the Princeton University Library

一方 白馬骨燒灰和油敷之並治小兒陰瘡

一方 望夜取白兔屎納蝦蟆腹中同燒爲末敷之

一方 以檳榔細末吹之

大人虛火口瘡 其色淡紅滿口白斑微黙甚者陷露齦蚊脉虛不渴 柳花散

黃柏末一兩青黛三錢肉桂二錢氷片二分各研細再合一處研勻每用少許搽患處內服四物加梔柏丹皮桂少許服之卽愈

大人實火口瘡 其色艷紅滿口爛斑甚者腮舌俱腫脉實口乾 赴筵散黃

芩黃連扈子生乾薑黃柏末細辛各等分共研細

鬚邊生癤 貓頭上毛同猪脛上毛各一把鼠屎一

或出手不意在窓外連打大鍬柄

閃斬一驚其舌目收 魏雲韶補注

牙根出血有風二三日不止而死者用豆腐渣數丸即止此時

注兎犬肉服六味地黃湯救劑方免復發此福建部刻

縣誌所載也 魏雲韶傳方

一方　白馬骨燒灰和油敷之並治小兒陰瘡

一方　望夜取白兔屎納蝦蟆腹中同燒爲末敷之

一方　以檳榔細末吹之

大人虛火口瘡　其色淡紅滿口白斑微黠甚者陷露齦蚊脉虛不渴　柳花散

黃柏末一兩青黛三錢肉桂二錢氷片二分各研細再合一處研勻每用少許搽患處內服四物加大人實火口瘡　其色艷紅滿口爛斑甚者腮舌俱腫脉實口乾　赴筵散黃芩黃連梔子生乾薑黃柏末細辛各等分共研細末每用少許搽患處吐去涎內服涼膈散方見諸書功效如神二火俱禁水漱

鬚邊生瘡　貓頭上毛同猪脛上毛各一把鼠屎一豆許燒灰研末油調敷之

牙齦　牙根出血非實熱者　小薊散小薊百草霜蒲黃微炒香附米醋浸晒乾各五錢研細末用搽牙上俟半刻時溫茶漱之內服滋陰降火或補氣藥隨症酌與

Digitized by the Harvard-Yenching Library
Digitized by Google
Copyright Google collection
East Asian Library
Princeton University

走馬牙疳 快火毒馬蓮剛敷蘆荟散者蓮膏此數方均有神

之功效甚强

牙生黑疔 生於旁邊牙縫腫起一粒形如栗米痛連腮項或兼痒破流血水疼痛異常俱屬腎經火毒 俱急用銀簪尖挑破見血爲度隨搽拔疔散方見瘡科再以蟾酥丸噙化徐徐嚥之遲治則逆走馬牙疳 多由癖疾積火或疹痘餘毒上攻最爲迅速總因積火熱毒所成牙根先腫後潰爛也 急用銀簪尖挑破見血爲度隨搽拔疔散方見瘡科再以蟾酥丸噙化徐徐嚥之遲治則逆

根松蘿茶煎濃汁乘熱以雞翎蘸洗患處去淨腐肉見流鮮血再敷此藥日敷三次若爛至咽喉以蘆筒吹之

一方 牙齦青紫漸腐甚至腮穿齒搖 外勢重者蘆薈散蘆薈一錢 用紅棗五枚去核每棗入言一分火燒存黃柏末五分入言五分用米泔水漱淨疳毒後敷此藥於性共研細末先用

堅硬及腐處如牙縫黑腐不盡及腐爛深坑藥不能到即用勒馬聽嚴絲即白砒末一分麝香末三分青綿撕碎青黛飛末各一兩用香油拌勻用時

之功效甚強

牙生黑疔 生於旁邊牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項或兼麻痒破流血水疼痛異常俱屬腎經火毒 **俱急用銀簪尖挑破見血為度隨擦拔疔散方見瘡科再以蟾酥丸噙化徐徐嚥之遲治則逆走馬牙疳** 多由癖疾積火或疹瘡餘毒上攻最為迅速總因積火熱毒而成牙齦作爛隨變黑色臭穢難聞 **外勢輕者溺白散溺垢須婦人桶中者火煆五錢白霜梅燒存性枯礬各二錢研細末先用韭菜根松蘿茶煎濃汁乘熱以雞翎蘸洗患處去淨腐肉見流鮮血再敷此藥日敷三次若爛至咽喉以蘆筒吹之**

一方 牙齦青紫漸腐甚至腮穿齒搖 外勢重者蘆薈散蘆薈一錢黃柏末五分用紅棗五枚去核每棗入言一分火燒存性共研細末先用米泔水漱淨疳毒後敷此藥於堅硬及腐處如牙縫黑腐不盡及腐爛深坑藥不能到即用勒馬聽嚼綠即白礬末一分麝香末三分青綿撕碎青黛飛末各一兩用香油拌勻用時

宜用立剪當包上剪破出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨後搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加黃連薄荷水二鍾薑三片煎八分食前服忌煎炒火酒卽愈

舌衄舌上忽生孔或小如針尖或大如筋頭色紫屬熱甚色黑則舌尖爛血出如泉勇由心火上

舌衄血出 此症有血流不止而死者一二錢并不覺苦異反有甜味可救性命此仙丹也

鮑雲翔傳方

沙側柏葉五錢外用必勝散螺青另研蒲黃各二錢炒共研細搽之後用温鹽湯漱口血自歸經而愈

痰核舌上生核强硬作痛乃心脾痰涎鬱熱也 宜用衣針點破搽氷硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加芩連薄荷卽愈

舌疳惡症也初起如豆次如菌故又名舌菌疼痛紅爛無皮朝輕暮重由心脾毒火所致 急用北庭丹番硇砂人中白各五分研上青苔研松塘雞矢各一錢用傾銀鑵子二個將藥裝入封嚴

宜用立剪當包上剪破出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨後搽冰硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加黃連薄荷水二鍾薑三片煎八分食前服忌煎炒火酒卽愈

舌衄舌上忽生孔或小如針尖或大如筋頭色紫屬熱甚如色黑則舌尖爛血出如泉湧由心火上炎以致血熱妄行升麻小薊根茜根各一兩三錢艾葉七錢五分寒水石三兩共研每三錢水一鍾煎七分澄去渣入生地汁一盞再煎二滾温服或加沙參柏葉五錢外用必勝散螺青另研蒲黃各二錢炒共研細搽之後用温鹽湯漱口血自歸經而愈

痰核舌上生核强硬作痛乃心脾痰涎鬱熱也宜用衣針點破搽冰硼散方見內科雜症咽喉乳蛾內服二陳加荅連薄荷卽愈

舌疳惡症也初起如豆次如菌故又名舌菌痰痛紅爛無皮朝輕暮重由心脾毒火所致急用北庭丹番硇砂人中白各五分元上青苔五松蕩雞矢各一錢用傾銀鑵子二個將藥裝入封嚴

一方潰後腐爛痛 硼砂三錢人中白煅二錢黃連末一錢薄荷六分冰片五分青黛四分共研極細末吹入腐處俱宜內服清火解毒藥自痊

上腭癌又名懸癌生於口中上腭形如紫葡萄更苦舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕寒熱大作潰不急用燒鹽散食鹽火燒枯礬各等分研細末以飯頭蘸點患上日三五次其癌自消

喉爛槐花牛膝兒茶黃連各一錢共爲細末夏天西瓜水服冬天梨汁服九如綠豆大每服三

九神效

喉中結塊不通水食 百草霜蜜和九莢子大水化一九灌下甚者不過二九

此方土牛膝根搗爛取汁滴入鼻中效驗如神立易尋採也

若飛者用之不效

取自然汁

喉結 杏仁殼一個敲開以半個用蒜泥塗邊蓋手

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University DO NOT Copy

腕窩上糊縶用艾於上灸之立愈結在左灸右手在右灸左手雙結灸左右手

喉卒癌腫　吞枚仁二枚甚良

乳發初起　乳房痲赤腫痛不治則成癌漏難治　鹿角磨濃汁塗之並服卽愈千金方

令人嗽去黃水卽散

酒皶鼻　凌霄花爲末和密陀僧唾調敷之甚驗

一方　亦可作面脂　藁本和白芷爲末日塗之夜塗頭髮

內次早梳之令垢滯俱盡

去頭白屑　側柏葉三片胡桃七個訶子五個消梨一個同搗爛用井水浸片時擦頭不生白屑

小兒燕口　口角生瘡也　亂油髮燒灰和猪脂調塗之

牙齒長出口外　艱於飲食爲髓溢　白朮爲末人乳拌蒸飲

East Asian Library and the Frost Collection
Do Not Copy
Property of the University of Pittsburgh

肺癰仙方 灰菜 即鵝腸菜有一種有刺莫食不效灰乃形若用之不效 煮食之 不用鹽 即愈

一人生肺癰吝沉將死諸洋人醫治不效中國一名醫用馬齒莧與食立刻清醒而愈洋人詫之詢其方神妙 莫聞藥敷胸祝之見馬齒莧粘米補瘡口方如此千方百方均不及此方治凡有肺病人及愛食煎炒厚味者常食此癰 鉅雲紹傳方

去核以水三鍾煎至一鍾服之 此癰膿未成之方也

一方 款有微熱煩滿胸中甲錯膿欲成者 千金薏苡湯薏苡二升苡仁炒冬瓜仁各半升桃仁五十粒 去皮尖炒研 水煎服

一方 吐膿腥臭形如米粥者 桔梗湯苦桔梗一兩生甘草二兩水煎服此方能排餘膿清熱解毒開提肺氣

一方 吐膿腥臭款而胸滿者 外臺桔梗白散苦桔梗貝母各三分 即五分 巴豆一分去皮熬研如脂為細末強者飲服半錢匕弱者減半病在膈上者吐膿病在膈下者

疽者俱宜多服護膜可免透膜之患

內發丹毒生於肋骨延及腰胯色赤如霞遊走如雲痛如火燎 急向赤腫週圍砭出紫黑血以瘦牛肉片貼之羊肉片亦可 乾再易貼以不乾爲度再用藍靛清汁時時敷之內服解毒諸藥自愈

脇漏出水不止 以烏牛耳垢敷之

肺癰症見口乾喘滿咽燥不渴胸中隱痛甚則肢腫唾稠黏黃痰兼臭穢膿血如氣壅喘滿難卧者葶藶大棗湯苦葶藶輕者五錢重者一兩大棗輕者五枚重者十枚去核以水三鍾煎至一鍾服之此癰膿未成之方也

一方 款有微熱煩滿胸中甲錯膿欲成者 千金葶藶湯葶藶二升苡仁炒冬瓜仁各半升桃仁五十粒去皮尖炒研 水煎服

一方 吐膿腥臭形如米粥者 桔梗湯苦桔梗一兩生甘草二兩水煎服此方能排餘膿清熱解毒開提肺氣

一方 吐膿腥臭款而胸滿者 外臺桔梗白散苦桔梗貝母各三分巴豆一分去皮熬研如脂爲細末強者飲服半錢匕弱者減半病在膈上者吐膿病在膈下者