PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷九

DO NOT COPY
East Asian Library and
Princeton Univ

C116/2535
v.11

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方 自高墜下瘀血衝心面青氣短者 取烏鴉右翅七片燒研末酒服當吐血便愈

一方 傷痛者 青羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦爲末每以熱酒下二錢仍搽痛處

一方 墜損疼痛 用故馬氊兩段酒五升鹽一抄煮熟裹之冷即易三五度即愈

一方 蹉跌損傷血瘀骨痛 生鹿角末酒服方寸匕日三服 即數分

一方 墜損嘔血不止乃血積心胃也 乾荷花爲末每酒服方寸匕 即數分

不藥良方續集卷九

外科 雜治

跌撲瘀血滯痛 白芥子和生薑研微煖塗之

一方 薑汁和酒調生麪塗之

一方 損傷者 乾冬瓜皮一兩黃明膠一兩剉炒存性研末每服五錢好酒熱服仍飲酒一瓶厚蓋取汗其痛即止一宿如初極效

一方 出血者 海螵蛸末敷之

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

一方自高墜下瘀血衝心面青氣短者　取烏鴉右翅七片燒研末酒服當吐血便愈

一方傷痛者　青羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦爲末每以熱酒下二錢仍搽痛處

一方墜損疼痛　用故馬氊兩段酒五升鹽一抄煮熟裹之冷卽易三五度卽愈

一方蹉跌損傷血瘀骨痛　生鹿角末酒服方寸七日三服卽數分

一方墜損嘔血不止乃血積心胃也　乾荷花爲末每酒服方寸七卽數分

一方墜馬血瘀積留胸腹吐血無數者　乾藕根爲末酒服方寸七卽數分

一方墜馬昏迷　急扶令伸足坐起用長手巾一條疊二寸餘寬橫勒於眉之上一指際其手巾兩頭同髮瓣背後着一人用左手緊緊搭住以右手輕輕頻振左膊則醒如仍不醒以一人立於受傷人之對面踢其脚心醒後或飲童便或飲黃酒扶令行走一二百步則無防矣

一方跌撲瘀血作痛垂危者　歸尾五錢熟大黃一兩桃仁二

East Asian Library Princeton University Library Do NOT COPY Gest Collection

十一粒共研細末雞鳴時熱黃酒調服至明取下瘀血即愈神效無比

一方損傷血出不止　頂好降眞香刮末研極細摻之即收口速妙若行路難覓以烟代之

一方脫損筋骨　駱駝肉鞍肉脂以火炙熟摩之取熱氣透內自愈凡頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮皆可摩之神驗

一方損傷瘀血在腹　白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七日即數分

三夜一則血化爲水也婦人血氣痛並治

一方從高墜下瘀血衝心欲死者　倉卒取藥不及擘開口以熱小便灌之韭菜汁亦可或卒墮壓倒打死將本人如僧打坐令一人將頭髮放低用半夏末吹入鼻中醒後以生薑汁眞麻油攪勻灌之再以乾荷葉燒灰熱小便調下三錢日進三服自愈

一方筋骨折傷　急取雄雞一隻刺血量患人酒量冲服痛立止神效

Photocopy East Asia Library Princeton University Gest Collection

一方 腦破骨折 蜜和葱白搗勻厚敷立效

一方 墜車落馬筋骨疼痛不止 元胡索爲末酒服二錢日進二服即愈

一方 跌撲折足 菉豆粉新銚內炒紫色井水調厚敷紙貼杉木紮定其效如神大士夢授神驗方

一方 折傷 骨碎補爲末粥和敷之

跌打損傷 取淨土蒸熟以布裹更互熨之勿大熱恐破肉雖血凝積氣絕欲死者亦效

一方 萊菔子生搗塗之并塗湯火傷

一方 跌打絕骨者 生地一觔瓜薑糟一觔生薑四兩炒熱罨傷打處冷則易之

一方 撲損瘀血積滯 生地汁三升酒升半煮服即愈

一方 折骨者 白芨爲末酒服三錢甚效

一方 腦破及手足骨或指頭破裂出血不止 葱白搗爛焙乾乘熱敷上外用絹帛封之立能定痛止血

一方 肌膚青腫 老黃大茄在枝上者一個切一指厚片

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

瓦上焙乾爲末臨睡酒調二錢服一夜即消

一方打撲傷損　龜血和酒飲仍搗生肉塗之

一方損骨　公雞一隻將毛退去餘全用　胡椒四兩生薑四觔合雞搗如泥用布緊捆於患處十餘日方開極驗

一方骨斷　金櫻子根去皮煎酒熱服渣敷患處立愈

奇效方

跌磕傷損　黃牛屎炒熱封之裹定神效

手足閃拗　生薑葱白搗爛和麩炒熱禽之

折傷筋骨　以牡鼠一枚搗敷患處三日一易甚驗

折損瘀痛或筋骨疼痛　鼠屎燒爲末猪脂和敷急裹之不過半日痛止

打傷青腫　炙猪肉搨之或以新開羊皮臥之即散猪肝貼亦可

一方　大豆黃即作醬生黃衣之豆也　爲末水和塗立效

打損瘀血留滯　飴糖熬焦酒服取下即免後患

一方　生薑葉一升當歸三錢爲末温酒服

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

傷目青腫　羊肉煮熟熨之卽退

多年傷損不瘥者　冬瓜子仁爲末溫酒服之

鼻擦破傷　貓兒頭上毛煎碎唾粘敷之

打撲折傷及凍瘡湯火傷　臘月取牡鼠以油煎化撈去渣再熬成膏貼之如湯火傷瘡入黃蠟在內則愈後無疤痕極妙

牙齒打動　蒺藜根燒灰敷之

接骨　跌撲骨離者接骨金丹菉豆粉炒成茶葛色乘熱同眞米醋濃調敷之先將鹽蒲包麻根煎湯吃一碗餘湯洗透患處方敷藥三日全愈

續筋　新採金沸草搗汁滴傷處渣敷其上俟半月後方開筋自續矣

一方　蟹殼三個燒存性研末冲酒盡量服後損骨中有嚮聲卽可全愈渣仍塗之乾蟹用燒酒服

一方指斷者　松香明礬各等分研末敷之裹好立效

一方　青牛蹄甲一具乳香沒藥各一錢爲末入甲

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

內燒灰黃米粉糊和成膏敷之

一方打損者　黃犬頭骨一個燒存性爲末熱醋調敷

煖臥神效

一方　取鷹骨及鴞鵰等骨燒灰每服二錢酒下在

上食後服在下食前服卽接如初葢鷙鳥之力在

骨故以骨治骨從其類也

一方折傷筋骨　螃蠏生搗炒罯之能續斷絕筋骨去殼

以肉同黃搗爛微炒入瘡中筋卽連也

一方骨斷粉碎者　五加皮四兩雄雞一隻重六兩黑者

更妙去毛連骨皮血同加皮搗爛敷上用布包好

貼一週時揭之切不可太過是時肉自完好仍用

加皮五兩酒煎服盡量飲醉睡爲妙

一方　半兩錢錢上止有半兩二字者　以火煆之入醋內淬數

次研極細末七釐甜瓜子火焙乾爲末七釐和勻

用生酒服下卽愈不宜多服多則旁長一骨矣神

驗

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

一方　大路旁牆脚下往來便溺處日久碎瓦片不拘多少拾來洗淨桑柴火煆好醋淬五七次至黃色以指捻成粉爲度研極細末每服二三錢好黃酒送下其朽骨自接痛即止不可以輕而忽之

一方令接而不知疼痛　鳳仙花根酒磨服半寸最多一寸然後揉托而上則不知痛但多服傷人以一寸爲度極驗秘方

鬬毆內傷墜壓者　酒和童便連灌三服即甦亦可煎服

滅打傷疤痕　用鷹屎二兩白殭蠶一兩五錢爲末蜜和敷之神效

一方　鷹屎白白附子各一兩爲末醋和敷日三五次滅痕乃止

金瘡金刃傷箭鏃傷或磁鋒刺傷　輕者皮肉破損血流不住以桃花散敷之方見前血箭

一方血出不止　葱白連根葉焙熟搗爛敷之冷即易簡

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

便奇方

一方 以黃犬頭骨燒灰敷之

一方傷損血出不已 稗子米搗敷或研末摻之即止

一方 葵花葉燒爲末敷之

一方金刃 生薑嚼爛敷之勿動次日即生肉甚妙

一方金刃 古石灰新石灰絲瓜根葉須初種纔放兩葉者各等分搗千餘下作餅陰乾爲末搽之止血定痛生肌神效

一方金刃 鵲烏絨毛貼之立愈鵲烏即天鵝

一方 五月五日取牡鼠同石灰搗如泥收之遇患敷之極效

一方惡心時作 白檳榔四兩橘皮一兩爲末每空心生蜜湯服二錢

一方刀傷 陳石灰不拘多少加韭菜汁搗勻晒乾研細再用雞蛋和勻瓦上焙乾研細搽之

一方金刃毆跌傷重者 玉珍散防風白芷白附子南星羌

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方 眞降香切片火上炙去油 荔枝核血竭各等分爲極細末敷患處卽止痛止癢不三日卽愈雖斷指亦能續也

一方 荔枝核燒存性爲細末塡瘡口一夜卽平復

一方 龍眼核去外黑殼爲極細末敷傷處立止血定痛神效

一方 龍骨末敷之血卽止

一方刀割斧砍夾剪鎗箭一切損傷 生半夏研細帶血敷上立止痛能收口生肌

一方刀傷 用圖書石滑石二末摻之切不可見水

一方刀傷 用刀刮青石末摻之

一方刀傷 大黃炒黑篩末摻之

一方刀傷 堅實細炭老松香各等分研篩細末以韭菜汁拌陰乾再篩研細末摻去韭亦可

一方出血不止 花蕊石形如硫黃有白班點者火煆七次 刮末敷之卽合且不作膿如箭頭入肉不出用以研末敷四圍

箭頭自出

一方（出血不止） 乘臘月以黃牛胆入陳石灰末陰乾臨症爲末敷之

一方（刀斧傷） 桑葉爲末乾貼之甚妙

一方 鮮藕生搗極爛罨之並敷傷折

箭鏃傷 陳臘肉（去皮骨搗爛） 入象牙人指甲各二錢爲末須極細拌肉內厚敷週圍卽如銳子打入肉以銀鑵入傷處其鉛自化仍從傷處隨水銀出神效仙方不可忽視

踢傷（或手足或面及擦破皮肉） 冬青葉同醋煮數沸略滴麻油少許取葉換貼自愈

箭頭入肉（鉗之不出） 解骨丸蜣蜋研雄黃研象牙末各等分和勻蜜丸黍米大納傷口處外用羊腎脂細嚼貼之覺癢忍之極癢箭頭漸冒撼動拔出卽以人尿洗之貼以生肌好膏藥日換貼之傷口自斂或單以象牙刮末水和敷之卽出

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library

中毒箭 交廣夷人用燋銅作箭鏃甚毒人若中之纔傷皮肉便悶膿沸爛而死 急飲金汁外亦用金汁抹之若無金汁速灌人糞並外敷之非此不能解也

中射菌 亦出交廣人若中之甚毒 急用葛氏方用藍靛汁一碗灌之外亦仍塗抹傷處

一方 用大豆並猪羊血內服外敷解毒亦效

箭鏃不出 搗鼠肝塗之或鼠腦搗爛厚厚塗之即出荊棘竹木入肉並塗治之

一方 用巴豆仁半個略熬與蜣蜋一個同研塗之須臾痛定微癢忍之待極癢不可忍便搖動拔出以黃連貫衆熬湯洗之石灰末敷之或生肌散敷亦妙

一方 白薇丹皮半夏等分爲末酒服

中毒箭 煮藕汁時時飲之以愈爲度

一方 以山獺骨研末以少許敷之

金瘡 採鮮劉寄奴草搗爛敷之立愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一方　急以自己小便淋患處口渴切不可飲水但食肥膩之物解渴若食薄粥則血沸而出必死

一方出血　五棓子降眞香等分炒末敷之皮肉自痊捷效

一方出血　龍骨煆二錢白礬半生半枯一兩五棓子半生半焙二兩乳香沒藥各三錢無名異一兩爲末乾摻不作膿不怕風立時止血定痛生肌如神

鐵針入肉　針入肉中無眼者不動有眼者隨氣遊走若走向心窩胸腫者險　急用烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調服一錢或二錢或醋調俱可外用神聖膏車脂輦油不拘多少研如膏調磁石末攤紙上如錢許貼之每日二換但患一二日者方可用之

諸鐵及雜物入肉　以象牙刮屑和水敷之如骨刺入肉以水煮白梅肉和象牙末調塗其骨自軟矣

諸刺入肉　軟淺者以針撥如硬深者當以　螻蛄搗塗之少時即出刺出仍痛再塗之即愈

Est Asian Library Yang Dhe Geet Collection Princeton University Library

惡刺瘡痛　李葉棗葉搗汁點之甚妙

蛇骨刺入肉痛甚者　用死鼠燒灰敷之

惡刺入肉　雄狐屎燒灰和臘月猪脂封之

竹木刺入眼　取蠐螬搗爛塗之

竹刺入肉　多年薰肉切片包裹之卽出

一方或竹或木　以烏雄雞肉生搗塗之卽出

一方　鹿角末燒灰爲末水和塗之久者不過一夕立出

針刺入肉　萆麻子搗爛敷之頻看刺出卽去藥恐弩出好肉也

諸刺入肉　烏梅嚼爛罨之卽出

竹木刺入肉　鮮牛膝搗爛罨之卽出縱瘡口已合刺猶自出

鐵針誤入咽喉無藥可施者　用舊笤籬煆存性研末每服三錢黃酒調服則針自化

一方　用飴糖一觔食盡自出

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

諸物刺喉中　以象齒磨水服之立出舊梳屑亦可

誤吞銅錢或鐵釘諸骨金銀　不能轉送覺墜者多食青菜

猪脂或羊脂自然送入大腸與糞同出甚效

一方鐵針　以蠶豆二合煮熟同韭菜食之自然大便

而出

一方　野苧麻根搗爛或含口中嚥汁其針自化

一方金銀銅鐵等項腹中作痛　以櫟柴炭燒紅急爲末煎湯服

之甚者刮末三錢井水調服未效再服亦治中水

銀輕粉毒

一方銅及鐵　羊脛骨燒灰爲末米飲下三錢諸骨骾

咽並服之

骨骾咽喉由嚥物急廹致骾妨碍飲食吐嚥刺痛宜急治之不可妄服凉藥若骨勢大者與飲食難下餓倒胃氣者俱屬難救　魚骨骾者急用河中養蓄活鴨

倒掛垂涎以磁碗接下令患人仰臥頻灌其骨盡

化若咽喉腫痛潰膿宜用冰硼散吹之

一方　獸骨硬者用狗一隻倒掛接涎如前法頻灌

DO NOT COPY
Best Asian Library and the Best Collection
Princeton University Library

其骨盡化若腫潰者亦用氷硼散吹之俱極效

一方魚骨鯁　取新汲水一盃令口向水張口取水氣骨當自下

一方諸骨　磁石火煆醋淬陳橘紅焙以多年酸漿水脚炒等分爲末另以漿水脚和丸芡子大每含嚥一丸

一方諸骨　七月七日取絲瓜根陰乾燒存性遇症每服二錢以原骨物煮湯服之

一方魚骨　鯉魚皮燒灰卽六七日不出者日二服卽效

一方魚骨　水老鴉嗉吞之或以羽燒灰水服五分

一方魚骨　水老鴉骨燒灰水服卽下或以鴉屎研水服方寸匕（卽數分）并以水和塗喉外卽化

一方獸骨　虎骨爲末水服方寸匕（卽數分）或象牙磨水吞之

一方獸骨　鹿角爲末含嚥津卽愈

一方魚骨　以水獺燒灰酒調服之或以獺骨含口中

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
The Gest Collection

卽下或以獺足煮汁服并以爪爬喉卽潛消俱神妙

一方　青果嚼汁嚥之

一方魚骾或食鱠成積及河豚魚毒　橄欖核磨汁服之自消用欖肉汁更妙

一方諸骨　以白雄雞足一隻燒灰水服

一方魚骨　默調鸕鷀不已便下

一方魚骾及魚骨入肉不出痛甚者以　翠鳥肉燒灰研末飲之或煮汁亦佳

一方諸骨　以白雄雞左右翮大毛各一枚燒灰水服

一方諸骨　海螵蛸陳橘紅炒等分爲末寒食麪和飴糖丸芡子大每用一丸含化嚥下

一方魚骨　白鴨脆胵內黃皮炙研末水服一錢卽愈取其消導也

一方諸骨　玉簪花爲末無花用根取汁好醋調服不可犯牙犯之卽落

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方魚骨 以大蒜納鼻中卽出

一方諸骨及竹木刺喉 以酒化鯇魚胆二枚卽浙湖林坪所蓄草魚

温呷取吐卽愈

一方諸鳥獸骨骾 鵰鳥屎燒灰酒服方寸匕卽下卽數分

一方諸骨及竹木刺喉 收鱖魚胆懸北簷下令乾每用一

皂子大煎酒温呷則骨物隨涎而出更服以吐爲

度隨量飲之無不出者蠡鯽胆皆治之

一方一切物骾 生鱓魚線縛其頭以尾先入鍋煮食之

立出

一方魚骨 鯉魚脊三十六鱗焙研凉水服之其刺自

跳出神效筆峰雜興方諸魚鱗燒灰服之亦效極

便方也

一方諸骨 鳳仙花子二十粒白滚水吞服卽下

一方諸骨 縮砂草果威靈仙清水砂糖共配煎接連

服下二三碗諸般骨骾化爲涎古仙方

一方竹木骨骾 萆麻子一兩凝水石二兩研勻以一捻

Eastasian Library and the Rest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

置舌根噙嚥自然不見

一方雞魚骨　苧麻根搗如泥作龍眼樣雞骨雞湯下

魚骨魚湯下

一方諸骨　以硼砂含之嚥汁自下鹹能軟堅也

一方諸骨　楮實子煎湯飲之楮實能以軟骨

誤吞頭髮繞喉　即以自巳亂髮燒灰白湯調下一

錢即愈髮灰須去盡渣爲要

食骾　鷹屎燒灰水服方寸匕即數分

桃李骾咽　白犬骨煮湯摩頂上即消

穀賊咽喉即穀芒也　以鵝涎灌之即愈或鴨涎和粳米

嚥下亦妙

杖瘡腫痛　小鼠同桑椹子入麻油中浸釀臨時取

塗甚效

一方及打損傷瘡風襲作痛者　白馬屎炒熱包熨五十遍極妙

一方肺損者　白芨爲末米飲日服取效

一方　元粉一兩赤石脂一兩水銀一分共爲末敷

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之神效

一方 久爛中有四五分深澤不能收口用此方摻之數日即愈 血竭一錢硃丹輕粉各二錢白古一錢爲末摻之一日夜其肉四圍生起兩日即平

一方 杖後即飲童便一碗以免血上攻心再用熱豆腐鋪在杖傷處其氣如蒸其腐即紫復易之令紫色散盡轉淡紅色爲度若杖瘡腫痛用雄黃二分陀僧一分研水調敷極妙

夾棍傷 大黃白蠟各四兩松香乳香各二兩沒藥骨碎補各一兩續斷五錢麝香二錢當歸敗龜板各三兩各爲細末猪板油三兩將白蠟松香乳末置銅鍋內同猪油化開再將各藥入油攪勻爲膏貼之第二日即可行走

一方 出署即宜治之 急用熱童便一盆將足浸之如便冷燒紅磚二塊淬之即熱直至童便面上浮起白油其傷盡出矣不痛不潰再用肥皂搗如泥入雞子

Est Asian Library of the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

清和勻罨患處以草紙包裹脚縛緊一夜不可動即效內用牛膝末調酒服或用歸尾川芎乳香獨活壁虱胡麻骨碎補紅花加皮各一錢生白酒一壺煎數沸盡量飲之避風寒厚被出汗立愈如骨傷加土鱉一枚

杖瘡　未杖先服三七一二錢則血不衝心杖後仍以三七數之能去瘀消腫易愈

破傷風　由破傷中肉風邪襲入經絡初起先發寒熱牙關緊急則身如角弓反張之狀口吐涎沫四肢抽搐無有寧時不省人事瘡口銹澁是症最宜早治有風在表在裏或半表裏之分當知汗下和三法審定用藥則不患有誤也如邪在表者其人寒熱拘急口噤咬牙用千里奔散用遠行路驟蹄心陰陽瓦煆存性研細每服三錢熱黃酒冲服次用蜈蚣星風散蜈蚣二條江鰾三錢南星防風各二錢或各二錢五分研細末每二錢黃酒調服日二服追盡臭汗自愈

一方　邪在裏者則驚而抽搐臟腑秘澁宜江鰾九天麻雄黃各一錢蜈蚣二條江鰾殭蠶炒野鴿糞炒各五分

Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

共研細末分兩分一分飯丸如桐子大硃砂爲衣一分加巴豆霜二分五釐飯丸如桐子大每硃砂藥二十丸加巴豆藥一丸二服加二丸白滾水送下至便利爲度再服硃砂藥病愈卽止

一方 邪在半表半裏頭汗多出而身無汗者不可發汗 宜榆丁散防風地榆紫花地丁馬齒莧各五錢共研細末每服三錢溫米湯調下以和解如頭身俱無汗者則宜羌活湯表之方見諸書

一方 身汗不止二便秘赤 大芎黃湯黃芩羌活大黃各二錢川芎一錢水煎服以微利爲度凡是症不論表裏半表半裏初起一二日間外治之法俱宜以灸法灸之令汗出其風邪方解若日數已多則禁灸之宜以羊尾油煮微熱絹包乘熱熨破處數換拔盡風邪未盡者次日再熨兼用漱口水洗之日敷玉眞散白附子南星白芷天麻羌活防風各一兩共研細末唾津調濃敷傷處如破傷風初起角弓反

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

張牙關緊急每用三錢熱童便調服立奏功效

一方先表太過臟腑雖和而自汗不止者　防風當歸湯防風當歸川芎生地各二錢五分水煎服

一方發表之後表熱不止者　小芎黃湯川芎三錢黃芩二錢生甘草五分水煎服奇效

一方潰後風侵手戰搖不已者　硃砂指甲散人手足指甲燒存性六錢硃砂南星獨活各二錢共研細末每熱黃酒調下四錢速效

一方邪在表者　糞堆內蠐螬蟲三枚舊草房上草內者亦可　將蟲脊背捉住揑之口吐黃水搽於瘡上覺麻身上汗出爲驗如病危急急滴蟲水於熱酒中飲之取汗即愈甚效

一方　烏魚頭風乾愈久愈妙臨用時以陰陽瓦焙乾存性爲極細末酒冲服立愈

一方攣搐不已　魚膠燒存性一兩麝香少許爲末每服二錢蘇木煎酒調下仍煮蘇木封口

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

一方 抽搐者 紅魚膠五錢炒焦蜈蚣一對炙研爲末以防風羌活川芎等分煎湯調服一錢

一方 速令婦人取無根水一盞即新汲水也入百草霜調捏作餅敷患處三五換神效

一方 寒熱垂死 蟬蛻四兩燒灰熱水調服即愈

一方 傷濕發痛强直如癇及撲跌打傷金刃傷皆治 南星防風等分爲末水調敷之水出爲妙仍以温酒調一錢已死心上温者熱童便調灌二錢

一方 全蟹蝥七釐小人三釐糯米炒焦一分三釐以上二味共爲末黃酒冲服即愈大能起死回生

一方 頭腫如斗或垂死者 鴿糞尖炒三錢白麥麪炒一兩天麻不拘分兩燒存性爲細末好黃酒調灌之立生

一方 用手足十指甲香油炒黃爲末黃酒冲服汗出即愈眞奇方也

一方 雄黃白芷等分爲末酒煎灌下即愈

湯燙火燒 好肉暴傷皮膚疼痛外起燎泡即挑出毒水使毒就輕傷輕易治重則防火毒熱氣

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

一方　以醋淋洗并以醋泥塗之甚妙且免疤痕

一方　以葵花葉搗碎敷之

一方　絲瓜葉焙研入辰砂一錢蜜調搽之生者搗敷一日卽好

一方　鰣魚蒸出油以油瓶盛埋土中遇症塗之良

一方及跌傷出血　海螵蛸研末敷之

一方　蛤粉油調塗之

一方已成瘡者　多年乾小白螺螄殼煆研細油調敷之

一方　猪胆調黃柏末敷之

一方　母猪毛燒灰和麻油調塗留竅出頭則無痕或加輕粉硼砂各少許

方　虎骨炙焦研末敷之或濕牛屎搗塗並妙

一方　牛皮膠水煎如糊冷掃患上卽愈

一方　鹿角膠水煎稠待冷塗之

一方　小鼠泥包燒研末菜油調塗

一方　死鼠頭以臘月猪脂煎令消盡敷且不作瘢

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

一方　老王瓜每個順劈兩瓣去子生大黃切片用瓦罐一個內裝王瓜一層加大黃一層以罐之大小裝滿爲度封收數月其瓜如醬臨症取塗痛隨止患卽愈速驗便方

一方　用磁瓶貯麻油採單瓣秋葵花浸油中年年採添瓶內花多添油泡之愈久愈妙臨症敷之刻見功効

一方　急搗蘿蔔汁或童便服之外用槐花炒研末油調敷立時止痛或爛用茶末敷如爛見骨者百花霜三錢輕粉一錢五分爲末麻油調搽神效如遍身燒爛者服童便後隨用好酒一二甕入浴缸內令患者浸酒中極重者亦不致死

一方　劉寄奴爲細末用桐油或菜油調敷其泡立消痛卽止頃刻結靨神驗

一方　圓眼殼燒灰爲末桐油調塗一二次卽愈

一方　犬骨煆成灰爲細末麻油調敷立愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　鐵銹花磨水塗之立愈

一方　白芨末油調敷之

一方　生大黃和醋搗調敷止痛無痕

一方　藠子音斗和蜜搗敷立效

一方　急以鹽末摻之可以護肉不壞再用藥敷良

一方　側柏葉搗爛水調塗立愈

一方　山茶花麻油調末塗之

一方　以好雪梨切片貼之

砲震手掌患腫者　即以自己熱肉熨之頓飯時即愈

火燒成瘡　免腹下毛貼之候毛落即瘥

凍瘡由觸犯嚴寒之氣傷及皮肉着凍以致氣血凝結肌肉硬腫殭木不知痛癢　即於着凍處墊衣揉搓令氣血流動次用涼水頻洗覺熱殭木處遍活如故則已揉搓二三次自愈

一方日久凍殭疙瘩不散者　用冰一塊絹包溻之以殭疙瘩化盡爲度二方乃從治之法也

一方或因暴凍即着熱或進煖屋或用火烘湯泡以致肉死損形輕則潰爛重則骨脫筋連者宜

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

急剪去筋　否則浸淫好肉初治宜養榮湯方見諸書加醋酒服之潰爛者外用潰瘍諸方治之

一方經年不愈者　獨勝膏六月初六十六二十六日用獨頭蒜杵爛日中晒熱塗之即於日中晒乾忌見水

一方足上者　以醋洗足研藕敷之

一方足上者　茄根連枯莖及葉煎湯洗之如潰爛燒灰敷之

一方耳上者　生薑自然汁熬膏塗之

一方手足凍者　老絲瓜燒存性和臘猪油調敷之

一方手足凍者　蟹殼燒存性蜜和塗之

一方足上者　鵝掌黃皮焙乾研末油調塗之或鴨腦塗之

一方　野雞腦子塗之

一方作癢者　啖猪肉嚼塗之

一方手足凍者　橄欖核燒研油調塗之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方足凍裂坼　蒸熟藕搗爛塗之

一方　鴿糞煎水洗之自愈

一方手足凍裂　鮮桂花一碗猪脂半觔同入碗內飯上蒸化貯罐內冬日搽之甚妙

一方　五棓子猪油搗成膏塡入裂處如耳凍用薑汁煎塗脚跟凍茄根煎湯洗之凍坼者以油臙脂烘熱敷之立效

一方　黃柏炙末耳凍酒炙足凍鹽炙乳調塗之

一方　陀僧爲末熟桐油調敷

一方耳上者　白蘞爲末同黃柏末油調塗之

預防凍瘡　於未至嚴寒時常用燒酒擦手臉烤乾即不凍

人齩傷人之牙齒食用炙煿之物漸潰有毒一受其傷則腫痛臭爛異於尋常　初齩時用童便浸傷處洗之去牙黃汚血貼蟾酥餅以萬應膏蓋之出微膿即愈若失治則爛痛發腫仍用童便浸洗次用麻油紙撚點火於患處薰之良

East Asian Library and the West Collection Princeton University Library

久插蟾酥條如傷口大作餅罨之萬應膏蓋之俟
腫消時用葱白二兩甘草五錢水煎日洗一次換
生肌藥敷之上以萬應膏蓋之口自收矣

一方　隨於齩後卽用童便洗之大糞塗之或浸指
在內如腫潰時以人中黃熬湯時洗較諸治法尤
覺神妙

一方潰爛者　龜板骨鱉肚骨各一片燒研油調塗之

一方　急嚼生白果塗之

熊虎及狼牙爪傷人皮肉成瘡者　初以葛根濃煎服一
二鍾外洗日十度或煮生鐵有味者洗之又用青
布急捲爲繩撚着納竹筒中注瘡口熏之出毒水
次宜獨窠栗子生嚼塗瘡口極效

虎傷成瘡　但飲酒常令大醉當吐毛出而愈

一方　內服生姜汁外仍以汁洗之用白礬末敷之

虎狼傷人　以乾薑末敷之

一方虎爪傷　刺猬脂日日敷之內服香油自愈

Est Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

虎傷成瘡　蠐螬搗爛塗之

虎咬傷　搗青松汁數斗頻頻飲之以渣敷咬傷處頻易取效

馬咬傷　用栗子嚼爛敷之如毒氣入裏心煩嘔悶馬齒莧煎湯飲之即效外用馬鞭子挽手及鞭穗煆灰存性研末猪脂搗合貼之俱效

一方　白馬屎和猪脂塗之

一方　毒氣入裏心煩嘔悶及諸瘡腫痛作熱者　鼠屎二七枚故馬鞭稍五寸同燒存性研末猪脂調敷奇驗

一方　及踏傷　急取童便敷之旬日即愈

一方　及剝驢馬被傷者

瘋犬齩傷　犬因五傷必致傷人九死一生之症也　而成瘋犬一經齩　初被齩時急就齩處刺令出血以口含漿水吮洗傷處並看患者頂心有紅髮一根速宜拔去自無患矣

一方　初被齩時即用砂燒酒壺兩個盛多半壺燒

DO NOT COPY
Ex Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

酒先以一壺上火令滾無聲傾去酒即按在瘡口拔出污黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡口輪流提拔以盡爲度其症立愈並拔去頭頂紅髮

一方　被齩時即以人尿洗之拭乾隨用核桃殼半邊以人糞塡滿罨患處着艾灸之殼焦糞乾再易灸至百壯以玉眞散方見破傷風唾津調敷次日再灸漸灸至三五百壯爲度於初灸時須急服扶危散

蟹螫去翅足加糯米同炒去米按日數用之如被齩已竟七日用七個十日用十個滑石水飛一兩雄黃一錢麝香二分共研細末每服一錢溫酒調下不飲酒者米湯下使惡物血片逐從小水中出即愈並拔去紅髮

一方　被傷後毒物血片堵塞莖中致小水滯澁若淋者用琥珀碧玉散滑石六兩甘草一兩琥珀五錢青黛八分共研細末每服三錢燈心煎湯調下則惡毒盡從小水中出矣並拔去紅髮爲妙

一方　被齩時即用豆豉研末香油調稠丸如彈子

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library

大常揩拭傷處掐開看豉丸內並有狗毛茸茸然此係毒氣已出易丸再揩至無茸毛方止甚效並拔去紅髮是症始終禁忌必當愼重終身忌食狗肉及蠶蛹赤豆百日內忌見麻物忌飲酒三年內忌食一切毒物及房事可常食杏仁以防其毒自無他患

一方 傷後治遲其毒入心煩亂腹脹口吐血沫者 用虎頭骨虎牙及脛骨爲末酒調二錢服之若發狂叫喚其聲似犬眼神露白屬逆不治

一方 及湯火傷未成瘡者急以 豆醬塗之頻頻取驗

一方 乾薑末水調二匙生薑汁服亦良並以薑汁熱熨之

一方 取本犬腦髓敷之後不復發或以犬肝並心腎搗塗之

一方 狼牙刮末水調服神效

一方 鼠屎二升燒灰以沙糖和敷奇驗

East Asian Library and Princeton University Library
DO NOT COPY
Collection

一方急於無風處揑去惡毒孔乾者用針刺之鹽湯洗淨搗葱貼上包好不可着風並急將頂上紅髮拔去以糯米一撮番木鱉半個切碎蟹螯七個去翅足若過一月加一個過兩日加兩個炒黃去蟹螯將糯米木鱉研末酒調服禁忌如前如服後腹內仍有犬聲再用木鱉一個蟹螯二十個如前泡製以黃連二錢甘草二錢煎服解之是症若至三月內誤聞鑼鼓聲復發難治矣大約七日一發若三七不發則可全免倘以疼止瘡合即謂已全而不治者多死此藥服愈後復發乃垂危之極候也急以雄黃五錢當門眞麝一分共研細酒調服之或可起死回生也

一方雄黃五分麝香二分半蟹螯七個去頭足同糯米炒用水酒煎空心熱服必俟腹疼便出惡物方愈如腹疼不止用甘草八分同鮮肉煎湯服之即止

一方蟹螯七個去頭足以糯米炒杏仁七粒去皮尖雄黃白芷各八分共爲細末黃酒送下毒從小便出即愈

一方利下之藥服後腹痛者以靛青或黃連水服之即解

惡犬齧傷　先以人尿洗淨傷毒隨以熱牛屎封之
即時痛止
一方　青草鵝糞搽之即愈
一方　刮肉店墩板上油膩炒沙糖敷之
貓咬傷　薄荷汁塗之立效
一方　雄鼠屎燒灰油和敷之
馬汗入瘡　症係潰瘡未合誤入馬汗之毒以致瘡口四旁忽復焮痛紫腫　急宜砭
腫處令出紫血以烏梅嚼爛塗之若腫悶發熱則
宜防毒入腹以致不救急用醋酒煎馬齒莧飲之
盡醉爲效但莧性寬滑凡瘡潰未合氣血未復而
又受以汗毒必量人壯弱用一兩或五錢切勿太
過
驢涎入瘡　是症與中馬汗同毒　宜用冬瓜片下青皮晒乾研
末敷之熬湯洗之毒甚者亦用馬齒莧酒飲之
馬汗入瘡　或馬毛入瘡　隨以新汲水浸之頻易水仍飲
好酒立愈

一方及蟲咬傷　魚腥草皺面草烟葉草決明等分杵爛敷之神效

一方蛇蟒毒　蕨根燒灰油調敷之

一方腹蛇傷　生薑末敷乾再易敷即愈

一方及蠍螫　乾薑雄黃等分爲末盛袋佩之遇有傷者即敷之便定

一方久潰不斂者　小茴搗末敷之

一方及蟲咬並瘡腫毒痛及罾毒箭等傷　以鹽研芋葉爲末敷之

一方及蟲咬傷　蒼鵝屎汁敷之

一方　鶚鳥嘴燒存性爲末一半酒服一半塗之

一方　烏牛或黑牛耳垢敷之

一方或狗咬　以猪耳垢塗之

一方及中牛肉毒　猪齒燒灰水服一錢或野猪齒亦可

一方　蒲公英搗爛貼之即愈

一方　野鼠屎燒灰油和敷之

一方　以田鼠屎研末猪油調塗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　葧薺葉搗爛敷之

一方　烟管燒熱滴油搽之百試百效或用泥蛉蛥搗爛敷之卽瘥

一方赤練蛇咬　先用活雞刀割一塊貼患處換貼二三塊自愈

一方　白芷末一兩水服下死者立生

一方爛入骨者　白芷末加胆礬麝香少許日日摻之

一方　穿山甲木香各一錢五分爲末酒送下

一方　全蝎二個研蜈蚣一條炙研末酒下卽愈此捕蛇師傳

一方　細辛白芷各五錢紅黃五分爲末每服二錢酒下卽效

一方　貝母三錢爲末酒調盡量飲醉須臾酒從傷處化水而出候水流盡隨將貝母渣敷之卽重亦可回生

一方　雞蛋三枚敲破蛋頭合在患處聽蛋內有聲

Do NOT COPY
Fist Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

變黑色再用一個合俟蛋內色變黃白不甚黑再一蛋合之自愈不疼矣極妙良方

一方　木香不拘多少水煎服效不可述

一方　天南星爲末水調箍之

蛇入七竅　割母猪尾血滴入即出

蜈蚣齩傷　取雄雞倒控少時以手蘸雞內口涎沫搽傷處其痛立止甚者生雞血熱飲之立效

一方及蜘蛛咬　醋磨生鐵敷之

一方　白鯗皮貼之

一方　以陽溝泥搽之或燈草燒灰搽之

一方　烏骨白毛雞屎白醋和塗之並治蚯蚓毒

一方及蟲蟻入耳　炙猪脂入耳掩少時自出

一方　以大蜘蛛一個對瘡待蜘蛛收盡毒氣即愈蜘蛛仍放水中毒亦解出即放之若中其毒以桑汁鹽蒜塗之神效

一方　以蚰蜒塗上即止

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方及蠍螫　白礬生半夏各等分好醋調和敷之疼即止毒即出而愈或爲錠子磨敷亦可

一方及蠍螫以下方八方並治蠍螫　燒鐵刀頭令赤置白礬於刀頭上化汁乘熱將礬汁滴於傷處立瘥

一方　用手指探入雞喉內取涎塗之立愈或將雞嘴對傷處吸之吸盡其毒雞自去亦效

一方　雞子一個輕敲一小孔合傷處立瘥

一方　用木梳齒內垢燈上燒油滴傷處立愈

一方　用人頭垢封傷甚驗

一方　用雞冠血塗之立止疼痛

一方　細嚼香附塗之立效

一方　五靈脂三錢炒令烟盡蒲黃炒二錢各爲末醋調塗之立愈

蜈蚣入腹　猪血灌之或飽食少頃即食桐油當吐出即愈

誤食蜈蚣　生雞蛋數枚取清傾碗中令吃之良久

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

索生油嚥之須臾大吐蛋清纏蜈蚣而出絕妙方

蠍螫　取大蝸牛一個搗爛塗之其痛立止一時不得即將螫處擠出毒水急用膏藥烤開熱貼之

一方　以新汲水浸青布冷搨之煖即易自愈

一方　先急飲清醋一二碗令毒不散隨用醋磨附子汁敷之

一方　海螵蛸一錢同白礬末二分吹鼻右吹左左吹右神驗

一方　黑驢耳垢塗之

一方　臘月收貓屎臨症水研塗之三五次即瘥

一方　苦李仁嚼爛塗之

一方　雄者螫人痛在一處雌者痛牽遍身　用井底泥敷之乾再易敷即愈

蠶齩　苧根搗汁塗之即愈

一方　成瘡者　蜜調麝香敷之

一方　或蟲及蜘蛛咬傷　野灰藿菜搗爛和油敷之牆樹下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

生者不可用

射工傷射工即樹間雜毛蟲又名瓦刺人觸着則能放毛射人初癢次痛勢如火燎久則外癢內痛骨肉皆爛諸藥罔效用豆豉清油搗敷之少時則毛出可見去豆豉用白芷煎湯洗之如肉已爛用海螵蛸末摻之即愈

一方以猪血飲之即解

蚯蚓傷即受蚯蚓之毒也有令人眉髯皆落狀如大麻風更異至夜蚓鳴於體中也用鹽湯頻頻洗之其毒自出

一方白鴨熱血塗之即愈或白鴨屎和雞子清調塗之更妙

天蛇瘡即草中花蜘蛛螫傷復被露水所侵而致其症生於肌膚似癩非癩以秦艽煎湯徐徐飲之外敷拔毒藥甚效

一方炮薑切片貼之

一方渾身生絲者牛乳常飲之自愈或以羊乳數碗飲之即時可解

一方黑驢尿下泥敷之

一方　大藍汁一碗入雄黃麝香少許點患處仍服其汁神異之極即至頭面腫痛垂危者兩日可愈

蟢蛛傷其蟲咬人亦有致死者　以桑柴灰煎取汁調白礬末敷之極效

蠼螋瘡一名多足蟲藏於壁間以尿射人若誤中其毒令人皮膚起燎漿水泡痛如火烙初如飯粒次如豆大急宜　用鹽湯綿搨瘡上數換即消甚者則毒延及遍身瘙癢無度宜二味拔毒散明雄白礬各等分爲末用茶清調化鵝翎蘸掃患處癢痛自止甚效

一方　醋和胡粉封之

一方　鹿角燒末苦酒調服

一方　烏雞翎燒灰雞子清調敷

蜂螫傷　新芋梗破開擦之

一方　蟹殼燒存性研末蜜湯調塗

一方　牛角胎燒灰醋和敷之或牛屎燒灰苦酒和敷亦妙

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
Collection

不藥良方續集卷九

外科　雜治

跌撲瘀血滯痛　白芥子和生薑研微煖塗之

一方　薑汁和酒調生麪塗之

一方損傷者　乾冬瓜皮一兩黃明膠一兩剉炒存性

一方者　海螵蛸末敷之

一方　竹帝口可浸濕貼之止血如神

雲韶傳方

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方續集卷九

外科　雜治

跌撲瘀血滯痛　白芥子和生薑研微煖塗之

一方　薑汁和酒調生麪塗之

一方損傷者　乾冬瓜皮一兩黃明膠一兩剉炒存性研末每服五錢好酒熱服仍飲酒一瓶厚蓋取汗其痛卽止一宿如初極效

一方出血者　海螵蛸末敷之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方　以酥油塗之

一方黃蜂螫　蚯蚓糞渣敷之

一方　小便洗淨拭乾用香油搽之或雄黃末或蜂房末搽之俱效

鐵胡蜂螫　取芋艿莽子磨汁搽患處即愈

鼠咬瘡痛　貓頭燒灰油調敷之以瘥爲度或以貓毛燒灰入麝香少許唾和封之貓鬚亦可或貓屎搽之俱有神效

一方鼷鼠咬者　野貓脂摩之

一方　盤蝥燒灰麝香少許津唾調塗或抹貓尿極效

水努射入　熊胆塗之更以雄黃同酒磨服即愈

諸蟲咬傷　生芝麻嚼塗即愈並塗小兒頭面諸瘡

狠烟入口　用醋少許飲之即解

蝸牛咬傷毒行遍身者　青蓼子煎水洗之立愈不可近陰

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

壁虎咬傷　以清水淋壁上取水注傷處自愈

諸蟲咬傷　薑汁先洗隨用二味拔毒散塗之方見蠷螋傷

抓瘡傷水腫痛難忍者　用耳垢封之一夕水盡出全愈

百蟲入耳如蠅蚊小蟲之類　以麻油數點滴入耳中蟲即死取出即瘥

一方如蚰蜒等物　以肉炙香置於耳旁蟲聞香氣自出

一方如在夜間暗入者　切勿驚惶响叫逼蟲內攻宜端坐點燈光向耳竅其蟲見光自出若使有人其蟲不出人皆旁避方效

一方飛鵝蝱蚊　滴豆醬清少許於耳中即可取蟲出

一方諸蟲　貓尿灌少許即出取貓尿法用蒜半個搽鼻即溺

一方百節蚰蜒或蚊蟲　以醋注入起行即出

一方諸蟲　薑汁少許滴耳中自出

一方諸蟲　萵苣搗汁滴入自出

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

一方諸蟲　五月五日取黃蟬頭燒灰研末臨用綿裹塞之立出

一方蚰蜒　萵苣葉乾者一分雄黃一分爲末糊丸如棗核大蘸生油塞耳中引出

一方諸蟲　取丹雄雞冠血滴入卽出

一方蚰蜒　生油調雞心血滴入卽出

一方蚰蜒　以白羊乳滴入卽化爲水

一方蚰蜒　以牛乳少許滴入卽出若入腹者飲乳一二升卽化爲水

一方蚰蜒及飛蟲　黑驢乳滴少許卽化爲水

一方諸小蟲　韭菜汁滴少許卽死取出

一方諸蟲　胆礬和醋灌入卽出

一方諸蟲　鱔魚頭燒灰研末綿裹塞之卽出

天絲入咽凡露地飲食有飛絲入上食之令人咽喉生瘡　急以白礬巴豆燒灰吹入卽愈

中百藥毒　甘草菉豆水煎俟凉時服之卽解並解

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一切食物牛馬金石等毒

一方服藥過多生出毒病頭腫如斗唇裂流血或心口飽悶或臍腹作痛者　黑小豆菉豆各半升煮汁飲並食豆寬愈

一方附子川烏天雄蜈蚣毒　馬料豆煎汁服之

一方皂礬毒　急取麪糊一鉢服之

一方相反藥毒　蠶退紙燒灰細研一錢冷水調下頻服取效爲度

一方硇硫及金銀丹石毒　菉豆粉細篩四兩黃泥篩四兩生雞清九枚共一處以浸豆水和卽解若有黑羊血用以吞之更妙凡服硇者不可仰臥恐毒流四肢難治愈後忌烟酒薑椒煎炒百日

一方信石毒　速取櫟間燕子窠用井水四大碗放水桶內將手攪調勻用夏布手巾如柞腐法篩去泥葉取所攪之水連灌二三碗自吐不吐再灌吐盡方醒

一方斷腸草毒　雞抱卵劈開以清油調勻灌之或服生

雞蛋三四枚或服熱羊血碗許總以吐盡爲度方醒也

一方鉛粉毒多因婦人打胎用之是物不惟不效每至欲死不能求生不得且生子多癡呆身體多瘡毒有誤服者　急搗蘿蔔汁飲之

一方花椒毒　口吐血沫身冷欲絕地漿水飲之卽解

掘得黃土有泉滲出謂之地漿水得黃土方可用之中野芋毒同方

一方野蕈毒　飲地漿水三四碗且解百毒

一方白果毒　麝香一分煎湯服之

一方砒石或烏啄　多飲新汲水得吐利卽解亦治蒙汗藥毒

一方砒霜毒　地漿法見花椒毒　調鉛粉服之卽解

一方砒霜毒　白扁豆生研新汲水絞汁飲之

一方藥物並一切魚肉果菜及諸菌熱毒煩悶者　取新汲水入控黃土坑內三尺爲度攪濁少頃取清水飲一升神妙

一方信石　薜荔一錢爲末清水一盞調服

一方砒霜毒　豆醬汁調水服卽解

一方輕粉毒口破者　以三年陳豆醬化水頻漱之

一方及瘋犬傷蒿苣毒　生薑汁飲之卽解

一方菌毒發笑不止　苦荼白礬調新汲水嚥下無不立愈

一方諸藥毒　用玳瑁甲磨水飲之卽解

一方野葛毒　白鴨熱血三二點飲之已死者入咽卽活及中生金生銀及銅鐵錫五金並丹石砒霜或諸蟲毒或溺水死者灌之卽活

一方鍾乳毒下利不止　食生猪肉則愈

一方及丹石與酒毒發　牛肚中脆卽百葉肚也　同肝作羹以薑醋食之

一方菌毒嘔吐　鮮金銀花根葉生食之立效乾者亦可

一方砒石毒　冬青子樹葉根皮搗爛取汁冷水和飲三碗卽解

一方諸毒下利不止　炮乾薑炒黃連各等分研細每錢二錢涼水調服

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Library collection

一方砒石毒欲死者　絲瓜根木槿葉研涼水吃二三碗立時即解

一方砒霜並一切毒藥垂死者　潔白白糖靛花淡豆豉生甘草各等分研勻冷水調灌立甦

一方砒霜及疔腫　烏臼不拘根皮枝葉搗汁多飲得大利患自愈也虛人忌用

中一切有毒食物及誤食毒物並丹石毒發如誤食宿食毒惡之物腹脹作霍亂　以鹽投生熟水中進一二升令吐盡痰食即愈

一方食黃鱔魚犯荊芥或中菌毒以致煩亂垂危者　地漿水取法見前花椒毒飲之

一方河豚毒消渴甚者　溺坑中水飲一小盞三度即愈

一方諸鳥肉毒　生白扁豆末冷水服之

一方六畜肉毒　白扁豆燒存性研塗乃以水服之

一方一切魚肉蔬菜葷毒　以豆醬清飲之並塗蛇蟲蜂螫

一方豆腐毒　萊菔子煎湯入消導藥服之即愈

Do Not Copy
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方雞子毒　飲醋少許卽消

一方魚毒　以冬瓜汁飲之

一方魚毒煩亂或成癥疾　以魚鱗燒灰水服二錢

一方花椒毒　白雄雞毛燒烟一錢吸之並水調毛灰服之卽解尾毛亦可

一方猪肝毒　生猪膏頓服一觔卽愈並解牛肉毒及中惡

一方馬肝漏脯藥菜諸毒　猪骨燒爲末水服方寸匕日三服卽數分

一方噉蛇中毒垂危　黃牛及水牛肚細切水一斗煮五升取汁卽瘥

一方牛肉作脹及中牛肉毒　以聖虀卽牛腸胃中未化草也煮汁服之卽數分

或嚼之或用狼牙燒灰水服方寸匕卽解

一方食牛肉致發心悶者　飲清酒卽解濁酒則更加悶痛

一方雞毒吐瀉不止　犀角末用新汲水調方寸匕卽瘥卽數分

一方野鳥肉毒　野貓頭骨燒灰水調服卽愈

一方馬肝毒　雄雞屎三七枚和水研服之或以人垢

取方寸匕服之取吐卽愈（卽數分）

一方蟹毒　生藕汁飲之卽解

一方菌毒　以蓮房水煎服之卽解

一方桐油毒　乾柿餅食之卽解

一方食鱉誤同莧菜致腹中生子鱉　白馬尿一碗服之三服則子鱉皆化爲水

一方自死六畜肉毒　黃柏搗末飲服方寸匕卽解或壁上黃土二錢水調服或飲人乳一碗極效（卽數分）

一方宿肉漏脯毒　燒犬屎酒服方寸匕或以人乳汁服之生韭汁亦可（卽數分）

一方忝米中藏乾脯或狸肉漏脯毒　大豆濃煎汁飲之亦治中菌野芋毒捷驗

一方馬肉毒欲死者　香豉二兩杏仁三兩同蒸一食頃杵爛服之日二服或煮蘆根飲之俱妙

一方食蛇并牛肉毒欲死者　飲人乳汁一升立愈或以米泔水洗頭飲一升卽愈

一方牛肉毒　甘草一味煮汁飲之

一方食犬馬肉滯不消心下墜或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下者　杏仁一升合皮蒸熟研爛用沸湯三升和勻取汁分三服利下兩三便大驗下利後服冷醋一碗則毒解思食

一方食被毒箭射死鳥獸肉毒　先以鹽汁服之次以大豆煮汁飲之即解不及者多死

一方食魚膾滯胃不化吐亦不出　以橘皮一兩大黃二兩朴硝二兩以水一大升煮至一小升頓服即消

一方食膾不消結爲癥病　馬鞭草搗汁飲之或以薑葉搗汁飲一升即消或用吐藥吐之

一方食魚後食毒兩種煩亂　橘皮濃煎汁服之即解

一方鯸鰊魚毒即河豚魚也　蘆根煮汁飲之即解

一方蟹毒　紫蘇煮汁飲三升即解或蘇子搗汁飲之或冬瓜汁飲三升食冬瓜亦可黑豆汁俱妙

一方菌毒悶亂狂笑垂危　以人糞汁飲一升即解

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方閉口椒毒　肉桂煎汁飲或食大蒜即解或以豆豉濃煎汁飲之取吐即解此方亦治食後惡心欲吐不吐以此吐之

一方鉤吻毒　薺苨八兩以水六升煮二升俟温分二服服之

一方莨菪毒令人狂亂狀如中風或吐血　甘草煮汁服之

一方芹菜毒手青腹滿痛不可忍名蛟龍病　粳米飴糖二三觔每日服兩度吐出如蜥蜴三五度即瘥

一方食苦瓠吐利不止　黍穰煮汁日常飲之

一方飲食中忽然煩悶不解何毒　以犀角熬湯飲之

一方牛肉毒　烏臼樹根皮酒煎同熱酒服或菊花連根搗汁酒服

一方鱉毒　飲藍汁數碗或靛清水亦可

一方黃鱔中誤入荆芥　地漿水取法見前花椒毒　服之即解

一方桐油毒　急飲熱酒即愈

一方鹽滷毒　生豆腐漿灌下再以鵝翎絞喉數次令

吐卽活

一方誤食螞蝗嗜芹菜者多得此患　空心食地漿水取法見前花椒毒少許自下

一方鹽滷毒　肥皂水灌下取吐如不盡飲熱豆漿三五碗卽愈

一方誤吞水蚯卽螞蝗成疾脹滿黃瘦者　牛血熱飲一二升次早化猪脂一升飲之卽下出也

中五蠱毒　以猪槽中水服之或白雞血飲之

一方　玳瑁磨汁服如避蠱毒則以生玳瑁佩之

一方腹痛　以猪肝一具蜜一升共煎作二十次服或爲丸服

一方下血　以乾羊皮燒灰服之或以生羊肺一具割開洗淨入雄黃麝香等分吞之

一方或下血如肝或吐血或心腹切痛如有物咬不卽治之食人五臟卽死欲知是蠱令患者吐水沉者是浮者非也　用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕須臾自呼蠱主之姓

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如指拇大以水一升酒三升煮二升服之當卽下蠱病愈

一方五種蠱　麝香雄黃等分爲末用生羊肝如指大以刀割開裹末吞之

一方　臘月採脩獾子乾屎泡以湯摩如雞子許空腹食之

一方並中惡　臘月採脩狐腸燒灰爲末臨用冷水服卽數分方寸匕卽愈

一方　燕屎三合炒獨蒜去皮十枚和搗爲丸梧子大每服三丸蠱當隨利而下

一方　先取炙甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨卽吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服若含甘草而不吐者非毒也

一方　毒在上者用升麻煎湯吐之在腹者用鬱金煎湯下之或合二味服之不吐則瀉活人甚捷

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方 一覺腹中不快即以生豆腐試之入口不聞腥氣此中毒也急以升麻濃煎連飲以手摳吐即愈極效

辟蠱 常以葶藶末服之則不患其暗中

免蛇蠱傷 採羚羊肉和五味炒熟投酒中經宿飲之可免中蠱

預防蠱毒 自年少時食貓肉則蠱不能害亦不患勞疰鼠瘍

服硫發瘡 醋和豉研膏敷之燥則易敷

硫黃毒發氣悶 新羊血熱服一合即解亦治砒石毒神效

中金銀銅鐵毒 白鴨屎絞汁服之即解

一方 烏骨白毛雄雞屎白水淋汁服之

乳石發動煩熱 白鴨屎一合湯一盞漬之澄清冷服即解

服丹石毒發下痢赤白日久不愈者 採獾子肉煮熟露一宿

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

空腹和醬食一頓卽瘥

一方 毒上衝目昏暗不能見物 採初生白兔肝一具入羊肝洗治食之羊肝明目因其氣有餘以補不足也兔肝能瀉熱蓋兔目瞭而性冷故也

中酒毒 菉豆粉盪皮水調服卽解

一方 白扁豆生嚼卽解並解河豚砒毒

一方 及一切魚毒或諸毒 以青菜生食或以急流水煮飲之

一方 燒酒毒 以氷一塊置膻中卽解

一方 燒酒毒火燒悶絕或受煤烟毒 白蘿蔔汁或熱尿灌之俱效

一方 以蔓青子根爲末服之

一方 酒醉不醒 田螺螄以葱豉煮汁飲之卽解

一方 燒酒醉死 急以新汲水漬髮外用帛浸濕貼胸膈仍細細灌之俟甦乃止

一方 燒酒毒 鍋蓋上氣水接服卽醒

斷酒法 蠐螬研末酒調服

一方 酒七升硃砂五錢瓶浸緊封安猪圈內任猪

East Asian Library Digitized by Google
Princeton University Library
Gest Collection

搖頭七日取出頓飲之

一方　以白犬乳加酒服之

一方　以黑驢胞衣研酒服方寸匕（即數分）

一方　水老鴨屎燒灰研末水服方寸匕（即數分）日一服

一方　老鷹毛煮汁飲之即止酒也

吃烟中毒　胡黃連合茶服之甚效

辟河豚魚毒　煮河豚時用橄欖在內不患中毒

預防飲食毒及諸毒　常煮甘草薺苨湯飲之則勿

碍一切食也

中煤炭毒（一時暈倒不救殺人）　急以新汲清水灌之立醒

誤吞金子　羊脛骨燒焦研末三錢米飲下從大便

出神效

誤吞鐵物　栗樹炭二塊將鐵錘搗極細砂糖和丸

服三錢立止

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

T COPY
and the Gest Collection
versity Library

腹破腸出好醋蒸熱用舊筆洗之洗一寸入一寸腸紙
腐爛亦能入然後用桑樹皮縫之百發百中
熱雲詔傳方

活天麻各等分研細末磁瓶收之無論兎傷每服
二錢温童便調服能受藥者定效嘔吐者難痊若
極冷令病人臥蓆上含汁噀之腸自漸入

一方刀斧損傷 白芨石膏煅等分為末摻之即可收口

一方及杖瘡 青松樹皮煅存性研末敷之

一方 揀剃下黑頭髮數觔洗淨油膩濾乾將鮮大
竹一段打空一節將髮裝入築極緊用木塞口黃
泥封固放微火灰內煅一夜存性打開髮即成粉
收貯磁罐內遇刀傷者敷之極其神驗

一方 半夏松香將香用新磚二塊火內燒極熱上下多襯紙中放松香壓二三次則
油盡如霜白油去不淨反令瘡疼 二味等分為極細末拌勻用以
敷之神驗無比

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

活天麻各等分研細末磁瓶收之無論兎傷每服二錢溫童便調服能受藥者定效嘔吐者難痊若刀傷肉破骨損即用藥摻敷忌口即驗此方屢用甚效凡爲民上者脩合濟人既可救傷者死亡併免兎於抵償亦一功德也

一方 腸出者 小麥五升水九升煮四升綿濾取汁待極冷令病人臥蓆上含汁噀之腸自漸入

一方 刀斧損傷 白芨石膏煆等分爲末摻之即可收口

一方 及杖瘡 青松樹皮煆存性研末敷之

一方 揀剃下黑頭髮數觔洗淨油膩濾乾將鮮大竹一段打空一節將髮裝入築極緊用木塞口黃泥封固放微火灰內煆一夜存性打開髮即成粉收貯磁罐內遇刀傷者敷之極其神驗

一方 半夏松香 將香用新磚二塊火內燒極熱上下多襯紙中放松香壓二三次則油盡如霜白油去不淨反令瘡疼 二味等分爲極細末拌勻用以敷之神驗無比

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

攻裏令人煩燥作嘔便秘甚則神昏悶絕始終禁用冷水及井泥浸塌傷處則不致轉成險逆之症

初起時即用冷燒酒一鍾於無意中望患者胸前清汁一碗加香油一碗以筯頭攪數百轉令其稠黏如糊用雞翎掃患處以解毒止痛並不致臭爛次以鷺粟膏即鷺粟花十五朵無花以葉代之香油四兩將花煠枯濾淨入白蠟三錢溶化傾盆內待將凝時入輕粉二錢攪勻炖水中令冷取出臨用時用抿脚挑膏手心中捺化搽上綿紙蓋好日換二次自然痛止膿生次日用軟帛挹淨腐皮再搽之時換生肌藥貼自愈第一要方

一方 以炭末入香油調塗立愈

一方 小麥炒黑研入膩粉油調塗之勿犯冷水

一方 饅頭餅燒存性研末油調遍敷之

一方 又論蠟燭油猪油牛油羊油隨用一樣要整塊共敷之三日即愈并無疤痕百方均又及此真簡便神妙也

鮑雲翔傳方

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

攻裏令人煩燥作嘔便秘甚則神昏悶絕始終禁用冷水及井泥浸塌傷處則不致轉成險逆之症

初起時即用冷燒酒一鍾於無意中望患者胸前一潑被吃一驚其氣必一吸一呵則內之熱毒隨呵而出矣如仍作煩者以新童便灌之外用清涼膏用水潑開石灰末一升加水四碗攪渾澄清取清汁一碗加香油一碗以筯頭攪數百轉令其稠黏如糊用雞翎掃患處以解毒止痛並不致臭爛次以鸎粟膏即鸎粟花十五朵無花以葉代之香油四兩將花煠枯濾淨入白蠟三錢溶化傾盆內待將凝時入輕粉二錢攪勻炖水中令冷取出臨用時用抿脚挑膏手心中捺化搽上綿紙蓋好日換二次自然痛止膿生次日用軟帛挹淨腐皮再搽之時換生肌藥貼自愈第一要方

一方　以炭末入香油調塗立愈

一方　小麥炒黑研入膩粉油調塗之勿犯冷水

一方　饅頭餅燒存性研末油調遍敷之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　白馬頭骨燒灰敷之出白汁卽愈

一方（毒氣攻心欲死者）　粟榦燒灰淋汁浸洗以瘡出白汁爲效

剝馬中毒（或被骨刺破垂危）　以馬腸中粟屎搗敷並用屎洗之或後以粟屎飲之速效

猪齩傷瘡　龜板燒灰研末香油調搽

蛇齩傷　卽時飲好醋一二碗使氣不隨血走以繩紮傷處兩頭若昏困用五靈脂五錢雄黃二錢五

毒蛇蜈蚣蠍子百項毒蟲咬傷極辣臭早烟油敷之毒攻心者服之有起死回生之功千方百方不及此

雲韶氏添註

一方　白扁豆花搗爛敷之立效或搗蒜敷之或苦茶亦可毒蟲沙蝨咬傷亦敷

一方　以酥油和血塗之

一方（及蜘蛛蜂蠍瘡毒）　暖酒淋洗日三次卽愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方　白馬頭骨燒灰敷之出白汁卽愈

一方毒氣攻心欲死者　粟蘇燒灰淋汁浸洗以瘡出白汁爲效

刺馬中毒或被骨刺破垂危　以馬腸中粟屎搗敷並用屎洗之或後以粟屎飲之速效

猪齧傷瘡　龜板燒灰研末香油調搽

蛇齧傷　卽時飲好醋一二碗使氣不隨血走以繩紮傷處兩頭若昏困用五靈脂五錢雄黃二錢五分共爲末酒調二錢灌之少時齧處出黃水水盡則腫消以雄黃末摻之口合而愈

一方　以兩刀於水中相摩飲其汁自愈

一方　以猪槽中水浸洗之

一方　白扁豆花搗爛敷之立效或搗蒜敷之或苦茶亦可毒蟲沙蟲咬傷亦敷

一方　以酥油和血塗之

一方及蜘蛛蜂螫瘡毒　暖酒淋洗日三次卽愈