PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷十

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/2535
v.12

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方續集卷十

外科　嬰兒部

赤遊丹毒小兒是症皆由胎毒所致欲發時先身熱啼叫驚搐不寧次生紅暈由小漸大其色如丹遊走無定起於背腹流散四肢者順起於四肢流入胸腹者逆或初生之後外以熱水洗浴兼以火烘衣物以致觸動內熱遂成此症　先宜砭出惡血看血色紅者輕紫者重黑者死次用牛羊肉徧貼紅暈處微乾再易貼俟肉片不乾復以藍靛敷之內服消毒犀角飲犀角鎊防風各一錢甘草生五分黃連生

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

三分水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之便秘加大黃三五分即安

一方　赤小豆爲末好醋調敷即效

一方患從起遊至陰頭赤腫出血者　鯽魚肉切五合赤小豆末二合搗勻入水和敷神效

胎癥瘡又名奶癬瘡生頭頂或眉端癢起白屑形如癬疥由胎中血熱落草受風纏綿是爲乾癥如誤用湯洗皮膚起粟瘙癢無度黃水浸淫延及徧身即成濕癥　乾者潤肌膏香油四兩奶酥油二兩當歸五錢紫草一錢將歸

草八二油內浸二日文火煠焦去渣加黃臘五錢溶化盡用布濾傾盆內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日擦二次如濕者用嫩黃柏頭末與滑石等分撒之痂過厚再以潤肌膏潤之神效內俱服消風導赤湯生地赤苓各一錢牛蒡炒研白蘚皮金銀花薄荷木通各五分黃連酒炒生甘草各三分燈心五十寸水煎徐徐服之

一方熱極者皮膚火熱紅暈成片遊走狀如火丹治忌收斂　亦以潤肌膏抹

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之內服發散化毒諸藥自愈若癢甚者不論濕乾
俱用烏雲膏松香末二兩硫黃末一兩研勻香油
拌如糊攤南青布上半指厚捲成條線紮之再用
香油泡一日取出刮去餘油以火點着一頭下用
粗碗接之布灰陸續剪去取所滴藥油浸冷水內
一宿出火毒抹患上乳母俱忌河海魚腥鷄鵝辛
辣動風發物緩緩自效
胎驚丹毒小兒過歲以上忽兩眼胞紅暈面色青黯
煩熱夜啼或面如胭脂乃屬伏熱在內散
發於外狀如水豆根脚微紅
出時延及頭項繼發丹毒
初起用四聖散木
賊秦皮紅棗燈心黃連各五錢研粗末每用二錢
水一鍾煎七分頻洗兩目餘皆同小兒赤遊丹毒
治之
一方患延胸乳痰喘抽搐乃火毒攻裏防轉驚風
急服五和湯生大黃
枳殼麩炒炙甘草各七錢五分赤芩當歸酒洗各
五錢共研粗末每服二錢水一鍾煎七分不拘時
服

Do NOT COPY East Asian Library Princeton University Gest Collection

滯熱丹毒 初起形如赤遊丹較之赤遊丹毒走緩慢因兒乳食過多不能運化蘊熱於中達於肌表而生發熱如舌有黃胎者宜服保和丸白面赤口酸等形

苓半夏製查肉神麯炒各一兩陳萊菔子炒連翹去心各五錢研細末粥丸加梧子大每服三十丸白滚水化下消其食滯餘同赤遊丹治法

一方 若兒唇焦便秘者一捻金爲細末每服一字二分五厘蜜水調下餘亦同赤遊丹治法如清利之後丹毒仍作者再服犀角散犀角升麻防已生山梔朴硝黃芩黃芪各一錢牛黃五分爲細末每服五分竹葉煎湯調下量兒加減用之不拘時服

火丹赤腫 蕎麪醋調糊敷之

一方 鯉魚血塗之或猪肉片貼之

一方 芸薹菜子搗爛敷之

一方 馬齒莧搗汁飲唾津敷之

各種火丹 皆胎中熱毒遠則五六日近則兩三日形雖不同總爲丹毒 如從頭腫起者名飛竈丹用葱汁塗之

East Asian Library NOT COPY Princeton University Gest Collection

急竈丹 從頭上起色紅腫痛 赤小豆和雞子清塗之

鬼火丹 從面上起色赤而腫 竈心土研雞子清塗之

天火丹 從背上起赤色點疱 桑白皮爲末羊脂調塗

天竈丹 從兩背起赤腫黃色 用柳木燒灰水調塗之

水丹 從兩脇虛腫處 用生鐵剉末猪糞調敷之

胡吹丹 從臍上起黃腫 用檳榔末米泔水調塗之

烟火丹 從兩手起赤白點 用猪槽下土麻油調塗之

野火丹 從兩足起赤腫 用乳香末羊脂調塗之

胡漏丹 從陰起黃腫 用屋漏處土羊脂調塗之

纏腰丹 腰生一紅絲若纏至臍則必死 兩邊生紅 用京墨磨濃和雄黃末塗之

冷丹 白色塊者 用薑皮一撮煎湯洗之

熱丹 紅色塊者 用紫背浮萍煎湯洗之

丹瘤 或生頦下如櫻桃突出色赤而光 棉羊腰子同朴硝研爛貼之立效或萆麻子研勻水和敷之大人同方

火丹 遍身紅腫 當歸赤芍甘草大黃等分爲粗末每服

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

三錢水半鍾煎三四分食後服

赤遊風忽然腫癢流汗不止是症至急救遲則死 雄黃五棓子等分爲細末醋調塗之

一方 用無名異爲末蜜汁調塗立消或鐵銹水塗之或新生荷葉搗爛入鹽少許塗之俱甚驗

垂癰上喉前上腭下垂如珠紅腫脹滿不能吮乳三四日後宜用針刺一二分放血 以冰硼散抹之方見諸書曰三次乳母忌血腥辣物

臍突兒臍突出赤腫虛大生後即腫宜清母子之熱不必敷治恐反爲害如在十日之外兒臍忽腫如吹不赤捻動微响或驚悸作啼者 內服白芍藥湯白芍酒炒一兩澤瀉五錢生甘草一錢二分肉桂採薄者刮去粗皮一錢研粗末每用二錢水一鍾煎四分空心頻服如臍下痛加鈎藤一錢生薑一片食鹽五釐外用外消散大黃牡礪炒各五錢朴硝二錢研細末用活田螺數十枚洗淨再以清水半盞養之過宿取田螺清水調藥敷於患處螺仍放水中勿害方效

陰腫即脫囊或因坐濕地寒凝或因叫怒閉結而成者 桃仁丸桃仁去皮

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

尖炒七錢五分白蒺藜炒去刺桂心丹皮各五錢黑丑頭末二錢五分研細蜜丸黍米大每服十丸黃酒送下外用立消散赤小豆風化消赤芍枳殼商陸各五錢俱不宜見火晒乾共研爲末用側柏葉煎湯候冷調敷立效

內弔亦陰腫症也因寒氣而得陰囊腫痛腹痛冷汗引縮二丸入腹痛止方出 宜烏梅散烏梅肉甘草半生半炙 元胡各五錢鈎藤乳香沒藥俱去淨油各二錢五分共搗粗末每服二錢水一鍾煎七分服外亦敷外消散立效或服後勻氣散亦炒

陰腫其莖全縮不見或不縮而陰囊腫光亮不燥不疼者乃肝腎氣虛也 宜勻氣散桔梗二錢炒陳皮去白一錢茴香炒砂仁炒各五錢炙甘草四分薑炭二分五釐共研細末每服五分或一錢白滾水調下或橘核湯調下外亦敷外消散

一方囊腫及四肢俱腫二便不利者 宜白牽牛散白牽牛半生半熟頭道末炙甘草橘紅白朮土炒桑白皮木通各等分

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

水煎服神效外亦敷外消散

女孩陰戶腫脹乃心熱相傳　宜導赤湯生地木通甘草

水煎服外亦敷外消散立效

陰腫爲蚯蚓吹者　雄鴨涎沫之卽消

一方發熱而腫　蚯蚓屎水調敷之

肛門作癢乃蟲蝕也兒之下唇必生小白瘡或耳之前後結小核如串諸書曰下唇有瘡蟲蝕其肛　以雄黃銅綠等分爲末撒之卽效

遺毒有稟受染受之分父母先患梅瘡後結胎元者百無一生如先結胎元父母後患梅毒傳於胎中兒生後頭上坑凹肌膚先出紅點次發斑爛甚者毒攻口角眼眶耳邊及前陰穀道破爛

初起卽用人中黃細末三五分土茯苓煎湯調稠日二三服如腫用紫金錠磨水塗之如破爛者用黃柏蜜炙爲末撒之乾用香油調搽投藥應效者後服二黃散十中可保三四若毒延及徧身日夜啼哭不喫乳食者終難救活二黃散卽胡連山慈菇各二錢生甘草一錢五分牛黃七分爲細末每服三分蜜湯調服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方　百合花曝乾研末油調搽之

一方 起於口內延及身膚　五棓子 濕紙包一個燒灰存性　雞子白調爲糊遍敷之立消

熱瘡　雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如雞子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即髮焦乃有液出旋取置碗中以液盡爲度取塗瘡上即以苦參末敷之

外科總治

癰疽瘡瘍 經云諸痛癢瘡瘍皆屬心火故知四者原因火毒以致榮衛不足氣血凝結經絡阻隔而生也瘡大一寸以上曰癰一寸以下曰瘡瘍癰發於肉脉屬陽疽發於筋骨屬陰瘍毒發於皮裏肉外瘡癤只發於皮膚之上實而痛者爲熱虛而痒者爲寒如癰疽陽盛者初起則焮腫赤痛易潰易斂順而易治如陰盛者初起色暗不紅塌陷不腫木硬不痛則難潰斂逆而難治如半陰半陽者慢腫不高微痛微焮色淡紅則屬險治之得宜尤可轉險爲順諸瘡瘍如見五善者爲順見七惡者爲逆諸癰疽見五善者亦順七惡者亦逆見三善者則必生見四惡者則必死若能審定形色脉症溫涼補汗下五法得宜庶有濟也是症不外外因六淫八風不正之氣內因六慾七情過傷或不

East Asian Library DO NOT COPY
Copyright © Trustees of Princeton University Library and the Gest Collection

內外因飲食不節起居不愼過飲醇酒茶水過食五辛傷飢失飽及晝日過勞負重挑輕跌撲擱墜損其身形或夜不靜息强力入房勞傷精氣而成也如　初起如粟麻癢焮痛身體或先熱而後惡寒或先癢而後疼如不疼最惡候也　卽屬毒甚纔覺時或七日以前形勢未成不論陰陽先當以艾壯於痛處灸之痛則灸至癢癢則灸至痛輕者使毒氣隨火而散重者拔引鬱毒通徹內外實良法也凡毒初起皆灸之如患在頭頂以上痛者小壯灸三五壯不痛者無妨大壯多灸　如失之於初瘡勢已成又當隨症審治得毒消膿潰方爲可治症灸法取紫色獨蒜切片貼腫心炷艾其上不痛者以灸至覺痛方止如痛者以灸至不痛爲度如蒜乾焦易新蒜再灸之

一方　初起癰疽用乾薑一兩泡炒紫色研末醋調敷四圍留頭甚妙

一方癰疽三日內或五日內宜服護心散眞菉豆粉一兩乳香五錢燈心灰同研勻以生甘草濃煎湯

East Asian Library Princeton University Gest Collection

調服一錢時時呷之若毒氣衝心漸生嘔吐或鼻生瘡菌大宜服此三日內卽無嘔吐等形亦須速進數服方免變症服至一兩則香徹瘡孔中眞聖藥也

一方灸法　癰疽發背對口惡瘡頑瘡一切無名腫毒及久近臁瘡先以濕麪隨腫處作圈高寸餘實貼皮上如井口形勿令滲漏圈外圍布數重防火氣烘膚圈內鋪蠟屑三四分厚次以銅漏杓盛桑木炭火懸蠟上烘之令蠟化至滾再添蠟屑隨添以井滿爲度皮不痛者毒淺灸至知痛爲度皮痛者毒深灸至不知痛爲度去火卽噴冷水少許於蠟上俟冷起蠟蠟底之色青黑此毒出之徵也如漫腫無頭者亦以濕紙試之於瘡之先乾處灸之初起者一二次卽消已成者二三次卽潰如瘡久潰不斂四圍頑硬者卽於瘡口上灸之蠟從孔入愈深愈妙其頑腐瘀膿盡化收斂而愈

Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

癰疽將成　急流水調牡蠣粉塗之乾再塗以拔其毒神效

一方赤腫　用米醋和蚌粉塗之乾即易塗甚良

一方及癤毒　黃犬頭骨灰芸薹子等分爲末水和敷之甚驗

一方及疔腫　白馬齒燒灰唾和塗之出根爲驗

一方癰腫　黃明膠一兩水半升化開入黃丹一兩煮勻以翎掃患口如未成者塗四圍即消

一方諸毒初起及經十日以上腫熟瘡痛　用雞子一枚新狗糞如蛋大攪勻微火熬令稀稠得宜捻作餅貼腫頭上以帛包抹時時看視覺餅熱即易勿令輕動及歇氣經一宿自定如日多者三日貼之一日一易至瘥乃已一切諸方皆不及也

一方瘡毒初起即令解散　蒲公英當歸身生黃芪甘草節各五錢水酒各半盞煎服發汗即愈

一方瘍腫初起紅腫無頭　肥皂去皮並子弦及筋　搗爛醋調敷立效

DO NOT COPY
Rust Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

或火煆存性粉調敷之

一方 癰疽及一切無名腫毒初起 赤小豆爲末入苧根末同研則不粘井水調敷毒氣立散或雞子清調塗亦佳

一方 癰疽初起 黃明膠四兩炖化川山甲四片燒存性入膠內酒冲或酒炖服之三五日用之則毒不內攻勝服蠟礬丸

一方 癰疽瘡瘍初起潰後皆可用之 薑製香附爲末每服二錢米飲下遂愈初作時以末煎湯代茶時時飲之

一方 一切癰疽無名腫毒 用清涼膏芙蓉花或葉或皮或棖生搗或乾研末敷於四圍中間留頭乾則頻換初起者卽覺清涼痛止腫消已成者卽膿出已潰者卽易斂又名清露飲鐵箍散或加赤小豆末或蒼耳燒存性爲末加入亦妙

癰腫惡毒 茴香苗葉搗汁一升服之日三四次仍以渣貼之冬月用根

一方 塗猪腦於紙上貼之乾則易貼多次卽消

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方 倘未成膿及發背疔瘡一切腫毒不問已成未成但見焮痛者 以烏牛耳垢封之

一方 槐花微炒胡桃仁各二兩無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服即效

一方 以三七用好醋磨塗即散已破者研末摻之

一方 用獨蒜搗爛麻油調塗四圍即愈

一方 野間殘糞下土篩細末敷之如水着背

一方 白芥子爲末醋調敷之或以蕪菁子搗爛敷之

一方 猪膽汁磨好墨塗之醋磨亦可

一方 伏龍肝末用醋調塗

一方 露蜂房炙乾研末醋調塗之如洗瘡煎湯用

一方 皂角樹上木耳磨醋塗之

癰疽不潰 好醋和雀屎如小豆大敷瘡頭即潰也

一方 冬葵子吞三五粒俟出頭作膿

一方 白芧針以酒煮服一針潰一孔二針潰二孔

NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一方不痛不腐及瘰癧流注頑臁惡瘡不愈者　桑木片紮成小把燃火吹熄灸患處內服補托之藥甚良

一方無頭不潰　蠶繭燒灰酒服一枚出一頭二枚出二頭奇妙

癰疽潰後不斂　老鼠一枚燒灰敷之或鼠皮燒灰封之俱效

一方因瘡口太深不能合者　絲瓜搗汁頻塗之

一方膿水不散　以黑驢懸蹄燒灰敷之立愈

一方癰久不斂　牛屎燒灰用雞子白和封之俟乾即易

一方或搭手發背破爛者　定疼散山藥白糖霜打爛塞入毒內即不臭使爛肉去新肉自生初時日換三次三日後一日換一次煎甘草湯或猪蹄湯洗用軟鵝毛數根紮洗洗去再敷待肉長滿方止

癰疽有蟲　鹿角燒灰爲末苦酒和鹽磨汁亦可

一切惡瘡　白鱔魚骨炙爲末入諸色膏藥中貼之外以紙護之甚良

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方 以母猪懸蹄同赤朮燒烟薰之卽愈

一方日久不愈 黃犬頭骨灰同黃丹末等分敷之

一方日久不愈 洗碗水煎沸以鹽投入洗之立效

一方其瘡似癩日久不愈 鯽魚燒灰研末和清醬敷之

一方及腫毒 內食馬檳榔一枚冷水下仍嚼塗之卽無所傷

一方及腫並小兒遊丹毒俱效 慈菇葉搗爛塗之

一方 用線香或棒香研細末和燒酒調敷卽愈

一方 陳米飯緊作團煆存性和麻油膩粉調敷

一方多年者 馬齒莧搗爛敷兩三遍卽瘥並治一切腫毒妊娠忌用

一方瘡癩遍身 紫背浮萍濃煮汁浴之甚妙浮萍一味蜜丸酒服能治三十六種風濕癱瘓

一方及沙蝨水弩惡疽 五月五日收蜣螂蒸過陰乾爲末油和敷之或杵汁塗之

一方多年者 冬瓜葉焙乾研末塗之

DO NOT COPY
Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　雄黃一錢五分杏仁去皮三十粒輕粉一錢爲末洗淨以猪胆汁調塗二三日卽愈百發百中

一切無名腫毒未破者　胆南星大黃等分爲細末燒酒調塗露頂卽消神效

一方未破者　尿缸底下垢研細濃塗四圍露頂乾再敷潤之卽消

一方未破者　蟹殼一個瓦上炙脆爲細末臨睡黃酒冲服卽消患小者一殼患大者二殼卽愈

一方未破者　生山藥鯽魚同搗爛敷之卽愈極效

一方未破者　用葱連鬚同白蜜搗爛敷之露頂如重換敷三二次卽消如已有膿將破不可用

一方未破者　芥菜子末同柏葉搗塗卽消神效或萊菔子爲末醋調敷

一方已潰將潰並治　用大栝蔞一個切去頂上一片將子挖盡裝入婦人油髮一大團再入明礬以滿爲度仍將切下一片蓋口週身用黃泥封裹以新瓦微

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University

火煆過去泥取蔞爲細末黃酒送下未潰者內消將潰者卽出膿收口重者不過三服全愈

一方未潰　全當歸一兩重者一叢金銀花二兩木通五錢甘草節二錢鹿膠一兩用無灰酒不拘多少煮服盡量飲之煖卧取汗其毒卽消而愈

一方初起者　金銀花五錢生黃芪五錢當歸八錢甘草一錢八分水煎服數服全愈如在上部加白芷中部加杜仲下部加牛膝各一錢八分

一方壯盛者用之　牛膝一兩山甲土炒研　何首烏各二兩水酒煎服神效

一方　熱飯敷之

一方　醋調大黃末塗之

一方　鯽魚燒灰醋和塗之以愈爲度

一方及諸瘡　鯽魚一觔重者去腸柏葉塡滿紙裹泥包煆存性入輕粉二錢爲末麻油調搽之

一方或已成或未成者　牛皮膠一片水漬軟當頭開孔貼

DO NOT COPY East Asian Library Princeton University The Gest Collection

之未有膿者自消已潰者令膿自出

一方　羚羊角磨汁塗之

一方癤毒腫痛　脆鹿角尖磨濃汁塗之

一方及諸瘡　大黃鼠即禮鼠一個清油一觔慢火煎焦水上試油不散濾去渣再煎傾入炒紫黃丹五兩柳枝不住手攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬焦乃成去火毒三日脩用臨症如常貼法貼之能去痛退熱

一方　赤龍散野葡萄根晒研末水調塗之即消

一方　生南星生貝母芙蓉葉狼毒各等分研細末春夏用蜂糖蛋清調敷秋冬用陳醋調敷之中留一孔甚效

一方或疔毒發背　糯米飯白糖銀硃獨頭蒜獨脚簷塵一線掛者方入藥非一線者反起泡各搗勻敷之乾再敷之神驗第一

一方及風氣　滕黃四兩白蠟半觔研極細篩過小磨

Best Asian Library Copy
Princeton University
Gest Collection

麻油十二兩先將油煎至滴水成珠入滕黃攪勻再入白蠟不住手攪之以磁瓶收好面上仍以麻油養之臨用攤貼極效

一切瘡疥　黃豆炙油塗之

諸瘡久潰　絲瓜兒根熬水掃之大涼即愈

一切漏瘡不斂　霜後苦壺蘆晒乾研末敷之

一方　以紙粘臘猪油納瘡中日五夜三自愈

一方　雞內金皮日日貼之

一方　鹿皮燒灰和猪脂塗之日五六易以愈爲度

三十六種風結瘡　馬齒莧葉水煮澄清入蠟三兩煎成膏塗之甚效亦治白禿赤癬敷杖瘡多年惡瘡及馬咬馬汗入瘡射工毒採覓葉時須揀葉小節間有水銀珠者方可用

身體卒腫不因熱即因毒也　醋和蚯蚓屎塗之

遊腫諸毒　白芥子爲末猪胆汁調如泥封之

一切風瘡　七星魚一尾去腸肚以蒼耳塡滿外以

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

蒼耳安鍋底置魚於上着水慢火煨熱去皮骨淡食忌鹽醬甚效

熱毒風及惡瘡 腹中一切蟲症並諸小熱瘡 多食野鴨即愈

久患一切風濕惡症 黃鱔魚作臛空服飽食煖卧取汗如膠從腰脚中止候汗乾以五枝湯煖浴之避風三五日一作甚妙

漏瘡惡穢 大腹皮煎湯洗之

身上浮風 白芋煮汁浴之忌風半日

風熱毒氣 用煎過水牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三次取效

消毒解熱 生犀角尖磨濃汁頻飲之

一切濕瘡 白扁螺螄燒灰塗之

灸瘡不瘥 烏賊骨白礬等分爲末日日塗之

小兒肌膚諸瘡 及停耳有蟲 鯉魚腸和鯉魚酢搗爛帛畏塗塞之以蟲盡爲度

小兒遍身諸瘡 或面生瘡爛成孔或患遺毒 用蒸糯米甑蓬四

Rust Asian Library Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

邊氣水以盤取掃瘡上不數日即愈神妙

一切腫毒　黑大豆搗爛塗之

諸般熱毒　蕪菁子根搗汁雞子清調塗立消

瘡中努肉　白梅搗餅貼之即收

寒濕蟲瘡　乾艾作湯入白礬三錢洗之然後敷藥

蓋人之血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺蟲也

天行時毒　苦參一兩或酒煎或醋煮取吐即瘥

一切漏瘡不拘蜂瘻鼠瘻　蜣螂燒爲末醋和敷之

灸瘡出血不止　死蜣螂燒同猪脂研塗即止

定痛生肌被傷出血不止者　紫金藤即好降眞香爲末敷之

一切風熱體如蟲行　鹽湯浴三四次即止即癢痛亦止

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

附奇症世家常宜知方

頭上生蝨　水銀和棗肉研爛塗氊帽上帶一夕其蝨盡死

蝨出怪病臨卧渾身蝨出血肉俱壞每夕漸多痛痒難言且舌尖出血身齒俱黑唇動鼻開用鹽醋爲湯飲至半月即安夏子益方

筋肉化蟲有蟲如蟹走於皮下作聲如兒啼急用雄黃雷丸各一兩爲末摻猪肉上炙熟喫盡自愈腹內應聲亦治

大腸蟲出行坐不能鶴蝨灰水調五錢服之自愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

脉溢毛竅出血或血不出皮脹如鼓須臾眼耳口鼻俱被氣脹合　以生薑汁合水各一盞飲之即安

截腸大腸頭出名曰截腸初截寸餘可治若腸盡則不治　芝麻油盛於器唇坐上飲天麻子汁數升即愈

女人病邪與邪交通獨言獨笑悲思恍惚者　雄黃一兩松脂一兩溶化以虎爪攪之丸如彈子大夜燒籠中令女坐上被蓋露頭在外不過三貼自斷仍以雄黃人參防風北味各等分爲末每旦井水服方寸匕即飯後方

妖魅貓鬼病人不肯自言　鹿角屑搗末水服方寸匕即飯後方

夜夢鬼物　鹿頭肉煎汁服之作膠彌善

一方　水獺肝末水服方寸匕日三服

夜夢魘寐　以赤氊一尺枕之即愈或以虎骨及豹骨枕之

夢與鬼交及狐狸精魅一切邪氣　以虎豹鼻水煮服之如狐精則以狐鼻水煎服之

中諸邪祟昏迷笑哭或作鬼語　急將兩手大指縛作一排用

艾圓嵌中間爪中盡頭連肉處灸七壯或十七壯邪卽出若仍昏沉卽用麻黃三兩杏仁七十粒甘草一兩水二碗煎半灌之愈後仍服參芪等補正之藥秘方集驗

熱死 用路上熱土和大蒜勻勻研爛水調去渣飲

鬼魘 竈心土碎死井水調服二錢更挑半指甲許吹鼻中如不醒用艾灸人中穴并兩足大指離用一韭葉各七壯卽甦五絕並可同法灸之

尸厥 由入廟弔喪問病而得者 用附子七錢重者炮熟去皮臍爲末 分二服每服酒三盞煎一盞如無附子以生薑汁半盞水一盞同煎百沸連灌二服卽醒

腹皮青色 不速治須臾死 胡粉乃錫粉非鉛粉 鹽熬色變摩腹上

腹內寢病 卽痞積之類 自死殭蠶白馬尿煎服卽愈

貪食非常諸物 男婦好吃生米或茶葉布頭泥炭瓦塊并酒積氣塊心痛腹痛或飽悶小兒疳疾一服除根 甘草 春夏四錢秋冬五錢 黑丑頭末 一兩二錢 槟榔 一兩二錢 雷丸 五錢 爲細末每服三錢五更用糖湯下天

久癇　猪心一個須不落水者去肉心血入射干三錢泥封固煨待紅取出存性研末每服三錢百試百驗

腹痛緊急不識何症男婦並治　川鹽微炒以布裹熨之其效如神

霍亂癍痧烏痧陰痧陽痧絞腸等痧　明礬二錢爲米大粗末用陰陽水送下再用針刺眉心頭頂十指尖出血立愈但不可食熱湯熱物

一方　急用滾水冷水各半盞和勻吞服鹽一錢或吞一錢即止或將鹽納臍中以艾葉灸之死亦可治

一方　用蘄艾一握水煎溫服奇效

一方　用大蒜搗爛塗兩足心立愈

一切痧脹中暑霍亂等症　食鹽一握在心口背心兩脇頻擦擦出許多紫點爲度即垂死者亦活第一良方

中惡卒死或往死喪墳廟來家卒死口鼻清血似乎尸厥但腹不鳴心下溫煖　急用犀角同麝香少許爲末服二錢即醒

Fast Asian Library Collection
Princeton University

一切卒死　紫金錠磨水服之立醒

蟻漏頂下忽腫一塊漸延至頸刺破即出水不止瘡久不合緣飯中有蟻誤食所致　用穿山甲燒存性爲末敷之立效

蛇串瘡因食烏蛇渾身變黑漸至遍生鱗甲　晚蠶沙五錢淘淨日服五錢服至一二斗久之自退或將沙於新瓦上炙爲末少加雄黃麻油調敷之

古井有毒及五月井中恐有毒以雞毛投入如有毒則毛迴旋不下無毒則毛直下也以熱醋數斗投入俟一二日方可汲飲恐中毒氣也

酒醋欲腐　以井華水投入即正

地多蟲蟻　稗子米煮汁沃之即能却去

壁蝨　蕎麥穰作薦即碎之或蟹殼燒烟薰之俱妙

除床席上諸蟲　三月三日日未出時採薺菜花放床席下甚效

燒烟薰蚊　乾鱦魚燒烟薰之或夜明沙鱉甲燒烟薰或以駱駝屎燒烟薰之

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University NOT COPY

斷蛀蟲薰氊及屋舍竹林蟲蟻　鰻鱺魚燒烟薰之

斷衣箱內蟲　以鰻鱺魚骨置箱內永可去之

井中生蟲　投烏賊魚骨即死

辟盜　正旦燒喜鵲巢撒門內賊難進

一法　用栗木爲門拴能辟難進

除水蠱蟲　取白馬頭骨浸於水之上流則除之

入山辟蛇　以麝香着足爪中則無蛇蟲當道因麝

噉蛇故以壓之

辟邪　伏內庚日采青蒿懸門庭能辟諸邪或冬至

元旦各服青蒿一錢亦妙

預識蠱毒　預知子綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲

而預知之

去脚臭氣　樟腦和烏頭爲末醋丸彈子大置足心

微火烘之汗出即效

腹中水鳴由抑鬱而致腹中有塊作痛行動則水聲漉漉甚至吐酸寒熱者　黃芪

五錢柴胡三錢白芍二錢甘草一錢陳皮貝母枳

East Asian Library Princeton University DO NOT COPY

實各五分薑三片水煎服三貼卽愈

身生碎蟲　大楓子二錢五分油核桃肉二錢五分水銀一錢信一分共六錢五分丸作六丸每日用一丸上身多於臍上揉之下身多於臍下揉之空臍處不揉連用五日用去五丸歇下一日再用第六丸收功

脾橫爪赤　煎青羊脂摩之

多眠不醒　白馬頭骨燒灰水服方寸匕日三夜一卽數分卽令人不睡作枕亦良

咽傷聲破　酒一合醋一匙乾薑末二匙和服日二次

穀不生蟲　冬至後第三戌日取雪貯之俟侵種時以是水浸則耐旱不生蟲

治水渾濁　以桃仁或杏仁擂末連汁投入攪勻片時卽清

治井無毒　以黑鉛爲井底最能清水散結飲之無

DO NOT COPY
East Asian Library and the Rest Collection
Princeton University Library

疾入丹砂鎮之令人長壽

鼠多　以蓮梗塞其穴則鼠自去

補腎方　黑豆入鹽煮時常食之最能補腎黑豆乃腎之穀鹽能通腎故也　馬華方

吞豆補臟到老不衰　每晨水吞黑豆二七枚謂之五臟穀　李守愚方

萱花代茶　鹿葱花名宜男草又名忘憂　萱花能安五臟利心志令人好樂忘憂輕身明目利心膈

服藥煩悶　飲東流水從西來者也　一二升即安地漿水亦可

一方　因過劑卒嘔不已　新汲水飲一升即安　即數分

一方　犀角燒末水服方寸匕

服藥過劑　白鴨屎爲末水服二錢甚妙

辟山中邪惡及虎狼　以青羖羊角燒之

宜蠶法　白馬頭骨埋於桑樹之午地則蠶盛其家食忌苦荼及苦荼如蠶見之則爛

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

令髮長黑　熊膽蔓荊子末等分和勻醋調塗之

令髮不落　榧子三枚胡桃二個側柏葉一兩擣浸雪水梳頭其髮永不脫落且潤也

髮毛黃色　以熊脂塗髮梳散入床底伏地一食頃即出便黑不過用脂一升即效

髮落不生　以酢泔洗淨布揩令熱以臘猪脂入生鐵煮三沸塗之遍生

沐髮光澤　以猪膽汁入湯沐之

髮長且黑　芸薹菜子取油敷之狐臭人忌之

髮常光潤　以芝麻葉一握同芝麻五升擣和浸三日去滓沐髮並去風除垢

兒髮欲黑而潤　取甑氣水常沐兒頭甚有驗

辟山嵐瘴氣　早行用生薑一片含之則不患嵐氣

惡夢　以絳囊貯丹砂戴髮根即安眠無惡夢

辟果樹上烏鴉　以生人頭髮掛樹上則不敢來

皂莢不結　將樹鑿一孔入鐵封之則結莢矣

辟衣箱蛀蟲　以樟腦薰衣箱裝衣永不生蟲

齒齵　人食烏梅齒齵者嚼胡桃即解

辟蚊　以紫背浮萍燒烟薰之

收梨不壞　收梨時與萊菔相間收藏則不爛或削梨蒂扞萊菔上亦妙

海水傷裂及風吹裂痛不可忍　以蜜半觔水酒三十觔防風當歸羌活荆芥各二兩爲末煎湯浴之一夕即愈

拔白轉黑　狗膽汁塗之或白犬青犬皆妙

髮髮早白　龜尿調水蛭極細末日日抹之自黑

少婦鬢髮黃白李仙妨方　黑豆一升青石榴一個搥碎入好醋三升同煮爛去豆不用再煎至一升收貯每早敷髮則黑而潤

擦牙烏髭　泥鰌槐蕊狼把草各一兩雄燕子一個酸石榴皮五錢搗成團入瓦罐內鹽泥固臍先文後武火燒炭十觔爲度取研日用之一月以來白者皆黑

烏鬚髮　取胡桃外面青皮壓油抹之自黑

浣油潤膚　以白果取漿抹面及手去油膩而澤肌膚甚妙

烏髭鬚　採鮮覆盆子榨汁日塗之則髭髮不白

去垢香澤　夏月取孩兒菊置髮中則髮不膩浸油塗髮去垢香澤

面黑令白　冬瓜一個竹刀去皮切片酒一升半水一升煮爛濾去渣熬成膏瓶收每夜塗之瓜仁亦可作面脂更佳又去皮風好顏

去黧黯　冬瓜藤燒灰搽之

面欲光潤　取啄木鳥血庚日向西熱飲之神妙

一方光華赤白　以麋角熬成漿磨塗面上極妙

一方能肥白美顏色　以麋骨煮汁釀酒飲之

牛犬羸瘦　鰌魚一二枚與食立肥

馬出黑汗　採乾酪以水化灌之即牛羊乳熬酥之渣也

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Digital Copy

喂馬誤食殭蠶烏梅　以桑葉喂之卽解或搗汁灌之甚妙

牛病瘟疫　狐腸燒灰和水灌之或狐頭並尾骨燒灰和水灌之或以水獺肉煮汁灌之

辟邪氣止馬驚　以狼毛繫馬胸前則夜行不驚

自刎食喉已斷氣喉未斷者可治　熊膽調水洗傷口滲去乾血塊用大鰱魚去鱗取魚皮貼傷處四圍搗三七末敷好以絹帕紮之一日一換如結實則不可換屢用屢效

自縊心下猶溫者　急刺丹雞冠血滴口中卽活男用雌女用雄

不藥良方續集終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

先大父桂舟公宦遊西蜀手輯是書凡二集十二
卷試之多驗鋟木以行嘉慶甲子重刻於京師嗣
以　先君出仕江浙轉而山左數十年內奔走弗
遑諸伯叔亦俱遊歷四方遂致此板散佚每撫手
澤能勿戚然今秋詳加校對再鐫於羊城以繼先
志以廣濟施篇次俱仍其舊惟增目錄於前所以
便於檢閱也於戲風塵歷碌幾從南北以奔馳編
簡幸存當與箕裘而並重雕刊既竟爰述始終俾

Last Aid Library Do Not COPY
Pamphlet Library and the Gest Collection
University Library

後世子孫無忘寶護焉

光緒七年歲次辛巳仲冬月孫貴奎成謹跋

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

惡肉瘡毒一女年十四歲腕軟處生物如豆半在肉中紅紫色痛極甚　用水銀四兩白紙二張揉蘸搽之三日自落李樓方

行步歪斜兩足不痠不痛每行動絕不聽用左右扭墜之玄而行一步不能正走乃筋軟不能束骨之故也宜用　人參黃芪白芍苡仁虎骨龜板杜仲鐵華粉各等分爲末煉蜜丸早晚服之自愈此方取其補肺金壯筋骨制肝木也孫文垣方

氣奔人忽滿身皮疵混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔　苦參細辛青鹽各一兩作一服水煎一大碗細飲盡即愈

麻骨有自項麻至心窩而死者或自足心麻至膝而死者　用人尿燒灰豆腐調飲即止

眉動時時動搖目不交睫喚之不應但能飲食有經日不止者　用蒜三兩取汁酒冲服即止

發斑眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅乃熱毒結於下焦所致　白礬滑石各一兩爲末作一服水三碗煎半不住服即愈

破腸腸破出肚門鼻穢難聞　急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自合矣吃羊腎粥十日即愈

惡肉瘡毒 一女年十四歲腕軟處生物如豆半在肉中紅紫色痛極甚 用水銀四兩白紙二張揉蘸搽之三日自落 李樓方

行步歪斜 兩足不痠不痛每行動絕不聽用左右扭墜之玄而行一步不能正走乃筋軟不能束骨之故也宜用 人參黃芪白芍苡仁虎骨龜板杜仲鐵華粉各等分為末煉蜜丸早晚服之自愈此方取其補肺金壯筋骨制肝木也 孫文垣方

氣奔 人忽滿身皮疵混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔 苦參細辛青鹽各一兩作一服水煎一大碗細飲盡即愈

麻骨 有自項麻至心窩而死者或自足心麻至膝而死者 用人屎燒灰豆腐調飲即止

眉動 時時動搖目不交睫喚之不應但能飲食有經日不止者 用蒜三兩取汁

樞々使君々為治百種蟲疾疳疾無價仙丹隨用一樣每服三五錢服止二三兩立見奇功百方千方不及此但病愈即止不可多服 雲谿經驗

參枸杞淋之皮自合矣吃羊腎粥十日即愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

明利下積物即愈名萬全不易妙靈丹

一方如茶葉壁泥桴炭石灰生米等類　芝麻一碟拌雄黃三分初服白湯下三日後只吃炒芝麻半月即愈

一方同前　生榧子一觔每日蘸沙糖吃數十粒以食完爲度或加史君子肉四五枚半生半熟更妙

一方　史君子肉二兩槟榔南星各一兩薑汁製如吃生米加穀芽炒一觔吃茶葉加茶葉炒一觔吃黃土加壁土火炒一觔吃黑炭加炭一觔爲末蜜丸梧子大每五十丸滿早沙糖水下

癲狂　鬱金七兩明礬二兩爲末糊丸梧子大每白湯下十丸即患數年者服之定覺胸中有物脫去神氣洒然再服全愈李時珍製

一方癲癇並治　猪心一個切入硃砂二兩燈心三兩在內麻紮石器煮一伏時取砂爲末同茯神末三兩酒打糊丸梧子大每服九丸漸增二十五丸麥冬湯下甚者乳香人參湯下

明利下積物即愈名萬全不易妙靈丹

一方如茶葉壁泥桴炭石灰生米等類　芝麻一碟拌雄黃三分初服白湯下三日後只吃炒芝麻半月即愈

一方同前　生榧子一觔每日蘸沙糖吃數十粒以食完爲度或加史君子肉四五枚半生半熟更妙

一方　史君子肉二兩檳榔南星各一兩薑汁製如吃生米加穀芽炒一觔吃茶葉加茶葉炒一觔吃黃土加壁土火炒一觔吃黑炭加炭一觔爲末蜜丸梧子大每五十丸清早沙糖水下

癲狂　鬱金七兩明礬三兩爲末糊丸梧子大每白湯下十丸即患數年者服之定覺胸中有物脫去

蛇串瘡及被蛇咬或腹中生蛇生蟲生龜用椒辣臭早烟油冲多服之均賽仙丹　雲韶註

酒打糊丸梧子大每服九丸漸增二十五丸麥冬湯下甚者乳香人參湯下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY