PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

**This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:**

**© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University**

**To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or**

**The East Asian Library and the Gest Collection**
**33 Frist Campus Center, Room 317**
**Princeton University**
**Princeton, NJ 08544**
**United States**

**A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).**

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/3817
v.2

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

噎膈門

治噎方　白馬尿一斤　地骨皮一斤　白蜜一斤　羊糞四十九粒

以上用水七升滚數滚濾去渣再熬至一碗為度每服一鍾忌馬齒莧蒸鍋水

治噎食開關方　白硼砂一錢五分　青黛一錢　好沉香二錢

三味研細末聽用　再用白馬尿一斤　白蘿蔔一斤取汁　生薑半斤取汁　共入銅鍋内熬成膏每服用膏三點加前藥末一分酒下一日三服可以開關如係番胃以黑驢尿一斤易馬尿

韭汁飲治血噎或因跌撲或因大怒血積胸膈所致　生韭汁一鍾　無灰酒一



NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
THE GEST ORIENTAL LIBRARY

鍾　共一處煑熟候温服之

三神膏 治一切痰膈食膈神效　用黑沙糖一斤　連皮生薑一斤

二味共搗如泥成膏入磁罐封固埋乾燥地下一七每

日調滚湯下

又治噎方　用猫胞衣以新瓦炭火焙焦為末每服二分

酒下五六次即愈服後睡時須口含竹筒恐傷齒

治噎食　用五穀虫以麻布包好水内洗淨炒黄色加木

香沉香共研為末燒酒調和服之

又方　生薑汁　韭菜汁　童便　各一鍾同放大碗内

入鍋中水煑數沸候冷取出露一宿重煎温服日日如

是以愈為止

治噎膈食不下痞塞不通　白蜜一兩　滚湯調服

治噎膈酒方　荸薺四兩搗末　厚朴一兩薑炒　陳皮一兩　白蔻仁一兩

炒白糖四兩　橘餅一兩　氷糖四兩　蜜二兩　用白酒漿

三斤燒酒三斤入罈泡藥十餘日早中晚飲

五噎膈氣　白鵝毛燒灰酒服

噎膈不通　野猫頭骨炒為末酒服

噎膈反胃　糯米和牛涎拌作小丸煑熟食之



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

卒噎　祀竈飯取一粒食之即下

治番胃　用白蘿蔔一個剜空入壯年人糞在内以竹簽簽住炭火煨至粉紅色研末不拘茶酒飯食拌入少許頻服

翻胃嘔吐　生薑三斤鉄絲穿串入糞缸内四十九日取起長流水擺淨晒乾為末陳米麪打糊丸如梧子大滚水每服二三丸

又治番胃方　以柿餅放乾飯上蒸食不用水亦勿以他物雜之十日即愈

翻胃嘔吐　白礬半生半熟不拘多少冷水調服

翻胃吐食　以柿餅每日同飯吃勿飲茶湯自愈奇妙方也

一方　抱出雞子殼為末酒服二錢即愈

一方　烏雄雞一隻治淨入胡荽子半觔於腹内烹食食二隻即愈

翻胃　牛乳韭汁薑汁和匀細細温服

一方　甘蔗汁薑汁和服梅師方嘔噦同方

一方　取驢尿服二合吐稍減再服二合自漸不吐緩緩



East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

以粥食之即漸愈

## 痰嗽門

咳嗽歌　咳嗽聲聲不斷頭此方原是老君留鶯粟半斤同醋炒杏仁四兩炒休休二兩五味微微炒一兩明礬不可丟每服一錢白湯下教君一夜更無憂

咳嗽吐血男女可用　三兩蘇油四兩蜜三兩生薑自然汁明礬柯子各五錢文武煎来黑如漆不論臨睡并起早遠年咳嗽無踪跡

久嗽氣急　知母一錢去皮毛切片隔紙炒　杏仁薑汁泡去皮尖焙五錢　水鍾半煎一鍾食遠服次以蘿蔔子杏仁等分為末米麪糊為

丸梧子大每服五十丸薑湯下絶病根

久嗽痰火　生薑一兩　雪梨四兩　共擣汁去渣加蜜四兩共煎一滚入磁瓶内封固不拘時服治肺痿聲啞氣急哮喘久嗽名曰薑汁雪梨百花膏無病可服能滋陰降火忌蘿蔔

痰迷心竅　貝母　沉香　甘草　辰砂　生地　枯礬　胆南星　半夏　木香　當歸　白术　大黄各七八九分　麝香少許水酒煎服先服五七劑後以本方為丸每服一二十丸白酒下

言語不出　真蘇子二兩　柯子三兩　山查三十個　百草霜三兩　共為末每服二錢熱酒調下

久咳言語不出　柯子一兩去核　杏仁一兩去皮尖　通草二錢　共剉每服四錢煨薑五片水煎食遠服

一切咳痰　蘿蔔切下一蓋挖空心用蜜灌滿自早晒至晚露一宿次早用原蓋蓋上飯上蒸熟滚水空心常服

老人久咳不能卧　猪板油　蜂蜜　米糖各四兩　熬成膏時時嚙化一匙妙

痰暈火動　生薑自然汁半小盃好糖二匙入塩少許滚



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do not copy

湯冲下

中痰　明礬末打陰陽水灌之再服再吐妙　或用明礬煎水入蜜少許服不吐飲熱湯催之能治頭疼痰癖

治久嗽聲啞奇方　青蒿不拘多少童便煮服最妙

太平丸　治勞症咳嗽喘急久成肺痿肺癰並皆嚼化

天冬　麥冬　知母　貝母　冬花　杏仁炒各二兩　當歸　生地　熟地　黄連炒　京墨　桔梗　薄荷各一兩　白蜜四兩　麝少許　以上共為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸末攪勻再上火入麝少許熬一二沸丸如彈子大每日服二丸嚼化

上焦痰熱　藕汁梨汁各半盞和服

風痰　萊服子生用以水研末服之取吐即愈

寒熱欬嗽初起者　燒生姜一塊含嚥之

冷氣欬嗽　乾生姜熱酒調服五分或飴糖冲服

欬嗽　鯽魚骨燒灰研末飲服

肺虛欬嗽　猪肺煮熟蘸苡仁末食之

肺燥欬嗽　松子仁一兩胡桃仁二兩研膏和熟蜜五錢收之每服二錢食後沸湯點服



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

久嗽不瘥　猪腎二枚入椒四七粒煮啖之

老人久嗽　夜卧後用連皮核桃仁三箇生姜三片細嚼嚥畢飲熱水一二口頃刻再如法嚼嚥飲水即愈

化痰止嗽　絲瓜燒存性為末枣肉和丸彈子大每服一丸温酒化下

欬逆上氣　杏仁連皮炒研蜜和為膏含嚥自愈

氣嗽痰喘欬吐膿血　萊菔子炒研末煎湯服之

積痰　頂大葱白頭二三十箇畧搗爛入鍋内炒熱俟微温塗於胸坎不久痰即盡出

痰核　鯽魚同著蕷塗之



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

治腹內蟲方　烏梅一個老姜三片榧子七個花椒十四粒
黑糖少許煎服蟲盡出矣

上氣喘嗽煩熱食即吐逆　白沙糖姜汁等分相和漫煎
二十沸每嚥半匙取效

食氷太過而患脾疾百藥不效　以氷煎大理中丸服
之即愈　此楊介治宋徽宗之方取治受病之源也

脾弱不食　大豆黃二升大麻子三升炒香為末每服一
合飯下日四五服孕婦忌之



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

久患吞酸諸藥不效　用魚膾鮮活魚薄切洗淨血味腥沃以蒜虀姜醋五味而食是也食之即愈勿夜食及飲冷水

食即汗出乃脾胃虛也　猪肝一具薄切瓦上焙乾為末煮白粥絹絞汁衆手為丸梧子大空心服下四五十丸日五次

中酒嘔吐煩亂　煮赤小豆汁徐徐飲之即愈

腹中緊脹　白糖以酒三升煮服之不過一服即愈

壯胃健脾　白羊肉三斤切碎粳米二升同煮下五味作粥食

健脾能食　猪舌和五味煮汁食之

血症門

治吐血不止　當歸一錢川芎一錢五分官桂三錢水煎服立效

又方　真三七一錢陳茶一錢同煎服

又方　生地　側栢葉　蘄艾葉　荷葉艾荷二葉以新者為佳各等分擣丸如雞子大每將一丸水三盞煎一盞去渣不拘時服

血止後　用韭菜連根擣汁一鍾童便一鍾煮滚數次露一宿次早温服十日可復元氣童便以食乳者佳



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

治暴吐血方　真廣皮五錢生粉草五錢　共為細末每用一錢五分燒酒調服立止

治損傷血流不止并吐血不止　旱三七三錢酒煎服以渣嚼爛敷傷處

吐血試驗良方　初起用茯苓補心湯　參蘇飲合四物湯去人參地黃服後胸次寬舒方服補劑

病在陽分　補中益氣　歸脾　二方酌用　病在陰分　六味湯五十外加附桂　大造丸

吐血不止　用薏苡仁一兩炒煮　柴胡五錢炒黑　水煎一服即止

治吐血　兎首一個整燒存性為末黃酒調服二錢孕婦忌

又治吐血不止方　鹿血一杯飲之不可坐定速速行走四五里即愈

治痰嗽帶血方　用大柿餅飯上蒸熟批開入真青黛一錢臨卧服一枚常服愈止

一切吐血　四聖飲生地熟地側栢葉藕節各四錢水煎服

一方　用側栢葉搗爛入童便二分酒一分溫服

一方　菉豆一升頭伏天將白布為袋以豆裝入縫口入



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

遠年糞窖內浸七日取去二伏天連袋繫於長流水中漂七日不可着地恐生豆芽三伏天將豆日晒夜露七日去袋入砂罐內煮爛每日早晚用白蜜一鍾豆半鍾和匀煮汁送下極妙

卒然吐血　海螵蛸末米飲下一錢神效

一方　先食蒸餅兩三個以榧子為末白湯服三錢日三服

一方　雙荷散藕節荷蒂各七個以蜜少許搗爛用水二鍾煎至八分去滓溫服或為末丸服之亦可

勞心吐血　蓮子心七個糯米二十粒為末酒服此臨安張上舍方也

吐下血不止　煮莞荽汁服下

吐血尿血　地骨皮新鮮者搗汁服之

吐血衄血　荷葉末熬香服崩淋損傷產瘀同方

又方　韭菜汁童便服並治損傷血瘀

治鼻血　用獨蒜切開貼手脚心即止右鼻貼左左鼻貼右

又治鼻血方　用頭髮燒灰研末吹入鼻內外用一錢清



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

水吞之

九竅出血不止　新汲水隨左右洗足即止

鼻衄　大蒜搗碎塗脚心止即拂去取以引熱下行之意也

鼻衄不止　白馬屎敷頭頂即止

一方　藕節搗汁飲之并塗鼻中

鼻衄垂危　以溺器中坼新瓦上烘乾研細五錢麝香少許用温水一碗調勻緩緩服之

咯血　用新棉燒灰五分好酒送下

肺癰咳唾膿血腥臭不問膿成未成　柘木耳即柘黄研末同百草霜二錢陳米餬丸梧子大米飲下三十丸其效甚捷

腸風下血　木耳　青菜　猪大臟共煮常食　或大腸一條入木耳在内煮食

下血不止　猪臟一條洗淨以槐花炒為末入腸内紮兩頭加醋入砂鍋煮爛為丸梧子大每服三十丸温酒送下

腸風下血糞前糞後　黄連　當歸各一錢　苦參　荆芥各二錢　水煎食遠服



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

下血　赤小豆當歸散　赤小豆五兩水浸令芽出晒乾　當歸一兩
右為細末漿水服
大便下血　羊血煮熟醋食最妙
又方　服回龍湯即愈
一方　萝蔔搗汁大半鍾好酒半鍾空心温服日三服
腸風下血　生炭三錢只殼燒存性研極細每服三錢米
飲下
又方　萝蔔紅棗各半煮熟連湯隨便飲之
一方　霜後乾絲瓜燒存性為末空心酒服二錢
一方　西瓜子殼煎水服之自愈
又方　蜜炙蘿蔔任意食之
一方　生柿子二個竹刀切去蒂核以棉花子塞入柿內
仍蓋好瓦上煆存性研細末米飲熱調服重者三服全
愈
又方　蕎麥麵三升炒熟用紅糖早辰調服
一方　烏梅七個熱猪血半觔全煮好食去梅不用盐重
者不過三服即愈
又方　粗草紙燒灰砂糖拌勻開水服



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

一方　鴨蛋一觔炒熟去殼常吃自愈

腸風下血因酒毒者　大田螺五個燒至殼白肉乾研末作一服熱酒下

一方　米麴一塊濕紙包煨為末空心米湯服二錢神效

一方　酒煮鯽魚常食最妙

下血不止其勢危篤　絲瓜燒存性槐花減半為末每空心米飲服二錢

腸紅方　用棉花核槐花米各炒黑等分再用烏梅水陳酒跌丸每日用烏梅水送下每服三錢即止

大腸下血屬熱風　柹乾燒灰以飲服二錢即愈

治男子血淋不止　浮小麥加童便炒為末砂糖煎水調服

治男女大小便不通危在頃刻　田螺十個葱白七根麝五分輕粉三分共搗成泥敷臍上以熨斗烙之交

治白濁　鴨蛋一個頂開一孔入生大黃末五分勻蒸熟空心服酒服

血淋沙淋　車前草搗汁一大碗空心頓服

白龍湯治男子失精女子白芍酒炒龍骨煆牡蠣煆桂花交盜汗等症



East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University and the Gest Collection

各三錢 炙甘草三分 棗三枚為引水煎服

夢遺食減 白色苦參四兩 白朮四兩 牡蠣粉四兩 共為末用牙猪肚一具洗淨砂鍋煮爛石臼搗和藥如乾則入前煮肚汁為丸小豆大每服四十丸日三服米湯下

又治男子血淋不止方 川牛膝一兩煎湯早晚服亦效

又方 用生大黃末三錢將鷄蛋穴一頭去黃白盡入大黃末填內封固用炭灰煨熟取出藥末研細溫水調下

血淋疾 鷄蛋一個頂開一孔以大黃末三錢入蛋內銀簪攪勻蒸熟黃酒下

淋疾 芝麻一把核桃一個石上馬齒莧共搗爛滚生酒冲服

夢遺 五味子不拘多少為末以陳米麪醋糊為丸梧子大每服三十丸空心淡鹽湯下或以雄黃一點塞馬口不遺

溺血 小麥麩炒香以肥猪肉蘸食之

一方 萵苣菜搗敷臍上即愈 小便不通同方敷之即通

血症門



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又方　治尿後有鮮血柿餅三枚燒灰陳米煎調服

小便過多　象牙燒灰飲之或象肉亦可

小兒遺尿　大甘草頭煎湯夜夜飲之自愈

小便不通　麥麪和作圈圈臍外鯽魚一尾連鱗腸搗爛

又麝香三分生蜜四兩和勻填滿臍上圈內以碗覆之

熟睡立通

又方　用松蘿茶簍內箬葉煎湯一大碗服下即通

一方　用獨頭大蒜一枚梔子七枚塩花少許搗爛塗紙

上貼臍良久即通未通塗陰囊上立效

小便不通腹脹欲死　蚯蚓五七條研爛投入涼水一碗攪勻

澄去泥滓飲下即通

男子下淋婦人赤白帶下　寒水石蕎麪各等分研細末

五月五日用水為丸彈子大陰乾臨服時用一丸燒灰

存性為末黃酒調服汗出即愈如得病重者先以熱塩

熨臍或以白雞血塗臍男用雌女用雄其效如神

大便虛秘大便先鞕後溏乃脾虛之故　松子仁栢子仁麻子仁俱去

油各等分研如泥鎔白蠟和丸梧子大每五十丸黃芪

湯下名三仁丸

血症門



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

大便虛秘或老人或久病諸虛或產後難行導藥者　蘇子胡麻各半合研極細用水再研取汁一碗煮粥食之先下結漸得通利此方最妙最穩效若影響

大腸火盛肛門腫痛難便或生痔並肛門邊生癤毒者，槐米不拘多少炒深黃色土地上去火毒為末空心黃酒調服三錢服三四次即愈若生痔或癤毒多服自消極驗

二便不通杵葱白填臍中艾火灸七壯立通集要方

一方　臘月取白兎屎一匙安臍中冷水滴之令透自通也

又方　食塩炒熱候冷填臍中灸七壯立通

尿管澁痛　牛膝用好酒濃煎服之

治脫肚奇方　用蟬退為木菜油調敷立收

治遺精白濁　用猪肚一個擦淨油氣將蓮子半觔去心留肉入猪肚內蒸爛或下酒或下飯服兩三個即愈

治小便不通血出痛甚方　甘草節食塩各三錢煎湯服



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蠱脹水腫門

治蠱脹方　五月五日取大蝦蟆一個入硃砂七錢于其腹內懸至次日以黃泥罨之火煅存性每早服五厘白水下

又方　用年久舊皷皮中間一塊燒存性好醋送下

治氣蠱　五谷蟲洗淨炒黃色為末用黃米飯為丸白滚水下立效

又治蠱脹方　苦丁香即甜瓜蒂乘未熟時以手摘之晒乾五錢為末白湯調下



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又仙方　將水蘿蔔一枚周圍鑽七孔入巴豆七粒入土種之待其結子取子又種待蘿蔔成仍鑽七孔入巴豆七粒再種如此三次至第四次將開花時連根拔起陰乾遇蠱脹者取一枚搥碎煎湯服之重者二枚立愈真仙方也

治蠱脹　草靈丹四五月黃牛糞陰乾微炒黃色為末每服一兩煎半時濾清服之三服全愈

治水蠱　冬瓜不限多少任意食之或取汁服亦可

治水腫方　腫在腹為水蠱腫在四肢頭面為水腫分別治之　用雄猪肚一個洗淨入蝦蟆一個胡椒一歲一粒加砂仁少許以酒煮熟去蝦蟆胡椒只將肚酒徐徐服盡其腫自消

治水蠱方　用烏魚一尾去臟入大蒜于內一歲一粒用濕紙封固再用黃泥封好火煨透紅為度取出食之屁下即愈

又治水腫方　用薏苡仁三錢炒黃研末鹽湯下

浮腫脹滿氣蠱也　猪肝一具洗切着葱豉薑椒炙食之或羅蔔羹食亦可

浮腫脹滿不食猪脊肉一觔煮熟切片以生蒜蘸拌食之

鼓脹水腫門



DO NOT COPY
Princeton University Library
East Asian Library and the Gest Collection

氣腫濕腫濕即水也　多煮野鴨食之即愈

水腫脹滿　青頭雄鴨煮汁飲之厚蓋取汗上腫者方宜汗或和米並五味熟煮作粥食亦良

一方　白鴨一隻洗淨以豉半升同椒薑入鴨腹中縫定蒸熟食之

一方　田螺一個車前草葉一片獨頭蒜一個合搗作餅貼臍上候一時其水隨二便出之則愈

一方　黃瓜一個破開連子以醋煮一半至爛空心全食之須臾下水也以上四方皆石水症藥

石水腫症少腹及腿足皆腫而脹　大鯉魚一尾醋三升煮乾食一日一作

一方　大鯉魚一尾赤小豆一升水二升煮食汁一頓服盡當見下利為愈　妊娠水腫同方

風水腫症身面皆腫　黃母雞雞子黃白相和塗腫處乾再上鮮毒同方

風石二水腫症　生猪肝一具細切醋洗入蒜醋食之勿用鹽

十種水氣垂死者　鱧魚一觔即七星魚俗云火柴頭魚是也洗淨煮汁和

鼓脹水腫門



Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

冬瓜葱白作羹食之

身腫攻心　生猪油以漿水洗壓乾切膾蒜虀喫一日二次

水腫危急屬熱　冬瓜不拘多少任意喫之神效無雙

水病足腫　葱子煮湯漬之日三五度即愈

治黃胆　用皂礬少許紅棗肉四兩同搗為丸菉豆大每日早晚服二丸舌底噙化

又方　用茵陳蒿作菜或蒸麥飯或作羹日日食之三五日愈

黃病神丹　皂礬八兩麪一斤和作餅入蒼术米泔浸厚朴去皮姜汁炒陳皮甘草以上四味各六兩川椒去閉口并椒目十兩共為末用好棗肉去皮核三斤煮熟核桃去皮核三斤同搗成膏丸桐子大每服八十丸酒下初服覺香病愈則聞臭矣

治黃胖腫方　砂仁一兩川椒去椒目閉口者一兩針砂三兩大麥不拘多少炒磨麪大黑棗一斤蒸熟去核皮搗爛共前藥末麪搗為丸如不成丸將前麪打糊為丸每服二錢好酒下早晚進一服

鼓脹水腫門



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

濕熱發黃或因大飢過食或因素有濕熱汗出浴身而成者　生姜時時周身擦之其黃自退或加茵陳蒿尤妙

一方　取蟹燒存性研末酒糊丸梧子大每服五十丸白湯下日二服

黃汗汗出黃色染衣面目微腫得寒有濕熱汗出浴身而致　蔓菁子為細末每服二錢日三服并華水調服小便白則愈

黃疸如金面身皆黃金色　薏苡仁根煎湯頻頻飲之

一方　陳糯米煎汁服之

一方更苦小便赤　萊菔子碾末白湯調服

黃疸無汗　芫荽搗汁一酒杯冲滾水服被蓋取汗即愈

一切黃疸病未甚者　小麥麪饅頭五個底下插一小孔每個填入廣木香末三分仍將原麪填好以文武火煅存性再用去過皮黑枣二十枚同煅過饅頭搗成泥作五丸每晨用茵陳三錢煎湯化服最妙

一方　水楊枝煎濃汁服之

一方　甜瓜蒂合赤小豆煎服或吹鼻中取出黃水奇妙

方

黃疸神方　用頭番荳菜未經割過者陰乾遇病用砂鍋煮湯鼓脹水腫門



Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

大碗不時服若遇無莧菜時即用莧菜種根子亦驗

痢瀉門

治痢瀉　細茶二錢　核桃仁五個　生薑三錢　紅糖三錢

水二碗煎八分服

駐車丸　治一切久痢紅白不止口乾發熱飲食無味

川連三兩酒炒　當歸三兩酒洗　烏梅肉一兩五錢　真阿膠一兩五錢蛤粉炒珠

炮薑一兩五錢　以神麯打糊為丸桐子大每服百丸空心

白湯下

治水瀉　如夏天瓜果食多以致泄瀉不休　漳州好橘

餅一個切片入茶鍾內潑服



East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

治痢仙方　荸薺十數斤浸火酒內晒過三伏天服數枚即愈

五更時溏瀉一二次經年不治名為腎瀉　五味子二兩　吳萸湯泡五錢　同炒為末每旦陳倉米湯服二錢神效

治老人脾虛五更泄瀉　老黃米炒三合　蓮肉二兩去心　澤瀉炒五錢　猪苓五錢　白术上炒二錢　木香一錢五分　白砂糖一兩　乾薑三錢　湿紙包煨熟　共為細末每服三錢空心白湯下其效如神

痢疾二妙丸并治生半夏一斤好燒酒一斤泡透陰乾為末老米飯濃汁為丸菉豆大硃砂為衣每服六十丸赤痢清茶下　白痢姜湯下　如瘧白湯下

痢後脫肛　五倍子末三錢　白礬一塊水煎洗

陰症　麝香二分納臍內以布蓋上將錫壺盛熱水熨之

陽脫　因吐瀉後四肢虛冷元氣不足不省人事或傷寒初痊誤行房事小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘身出冷汗連根葱七根切碎研爛以好酒三碗煎至一碗分作三服灌之

又方　用連鬚葱二三斤放白內搗爛作餅二枚烙熱放臍中冷易不時即愈



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do Not Copy

単治久痢　一切久痢諸藥不效服此立愈　黄丹一飛
枯礬二兩　以銅杓鎔黄蠟一兩入胆礬末乘熱為丸
如豆大每服二丸空心白湯下
又治痢仙方　用茜草一握煎水浸兩足底即愈
又方　用梧桐葉三四斤煎水洗足自愈
治禁口痢　石蓮子肉去青心一兩　木香三錢　同搗末每服
二錢米湯送下調服
脾瀉丸　治久瀉每早溏瀉一二次此係脾虚用此補脾
養胃而瀉即止　白术上炒一兩　白茯苓二兩　小茴香炒一兩
肉蔻一兩煨　故紙炒二兩　木香五錢　生姜煮紅棗肉搗藥為
丸桐子大空心服三錢白湯送下
白虎丹　治水瀉痢疾　五月五日午時以生白礬一兩
枯白礬一兩共為末用艾葉熬湯打糊二兩和丸雄
黄為衣如黑豆大大人五丸小兒三丸白滾湯下
痢疾便方　陳茶赤痢七錢白痢三錢　連皮生姜赤痢三錢白痢七錢　砂仁一錢
五分　核桃仁一錢五分　水碗半煎七分空心服如紅白痢茶姜各五錢
泄瀉脾弱　山藥切片炒研末粥内食之
又治痢後脫肛方　經霜浮萍草新瓦焙乾為末熱鞋底



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

上熨之

又方　五倍子炒黃為末放熱鞋底上熨之

水瀉不止　車前子炒為末每服六錢米湯調下

久患水瀉　米醋煮黃母雞雛子食之即止

一方　青羔羊角一枚白礬末填滿燒存性為末每新汲水服一錢神效

寒濕洞瀉　頭燒酒飲之

脾虛滑瀉　烏骨母雞一隻洗淨用肉豆蔻麪裹煨一兩草果仁麪裹煨二枚燒存性摻入雞腸內紮定煮熟空心食之

腎瀉日久不止　猪腎一個批開摻骨碎補去毛蜜炙末煨熟食之

滑瀉　新鮮核桃硬皮中黃肉不拘多少水煎湯服即止

老人泄瀉　乾糕一兩即糯米合粳米磨粉而成者　姜湯泡化代飯食之以愈為度

瀉痢至於脫肛　石榴皮陳壁土加明礬少許濃煎薰洗再用五倍子炒研細末敷托而上

四時暴患瀉痢四肢腫腹俱冷　煎百沸湯令患者坐深湯中浸



DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

至膝上為度生陽之藥無速於此

噤口痢　大田螺一枚搗爛入麝香三分作餅貼臍中半日時以涼水潤膚熱氣下行即思食矣甚效

一方　臘猪肉脯煨熟食之

一方　紅糖半觔烏梅一個水二碗煎一碗時時飲之自效

一方　砂糖白蜜蘿蔔汁各一盞飯上炖化灌下一二次立效

赤痢　馬齒莧搗汁一合入蜜二匙空心溫服大人小兒並方

一方　葵花葉炙過者食之

血痢不止　乾姜燒黑存性放冷水為末每服一錢米飲下

一方　牛乳餅一兩漿水一鍾煎服

血痢便血　木耳炒研五錢酒調服即止亦有用井花水服或以水煮鹽醋食之以汁送下

血痢作痛　槟榔一枚以麥冬煎湯細磨濃汁一盞空心服日二次



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

赤白痢　薺菜根燒灰蜜湯調服

一方　生姜切細和好茶一兩碗任意呷之便瘥熱痢雷姜皮冷痢去姜皮蓋姜能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽且解濕熱及酒食暑氣諸毒不問赤白通用

一方　以李根白皮煎汁飲之

一方　竹蓐即慈竹林內夏日逢雨滴汁着地而生似鹿角白色者和姜醬食之

一方　五日五時取完好葶薺洗淨拭乾勿令損破放瓶內入好燒酒浸之黃泥密封收貯遇有患者取二枚令細嚼之空心用原酒送下

一方　胡椒菉豆各一歲一粒為末糊丸梧子大紅用生姜白用米湯下

久痢不止食蟹所致者以此　新采藕節搗爛熱酒調下數服即愈藕能解蟹毒故也

積熱下痢　冬瓜葉嫩心拖麪煎餅食之亦治火瀉

一方　好茶一觔炙搗末濃煎一二盞服之久痢亦宜

一方　建茶合醋煎熱服即止

虛痢即虛滑痢也　黃母雞一隻炙以塩醋塗抹煮熟食之



DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

久痢噤口　金絲鯉魚一尾重者為佳如常治法用塩醬葱必入胡椒三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病即除根屢治有效

痢疾消磨積滯　沙糖調炒焦蕎麪二錢服之即愈　脾瀉同方

一切下痢　鯽魚頭燒灰研末酒服

赤白痢　葱白煮粥食之薤亦可並治吐血便血痢血

噤口痢　百一方山藥半生半炒米飲下

一方　新鮮萊菔生用搗汁飲之

熱痢　六一散加紅麴治赤痢加乾姜治白痢紅白並用

久患噤口粉米不進　常服牛乳久之自瘥

治水瀉不休　漳州好橘餅一個切薄片作二次沖滚水服



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do NOT COPY

瘧疾霍亂門

治瘧屢效方不拘老少一服即愈　苦參一味為末用好醋打麪糊丸桐子大臨發之日早晨用桃枝七寸柳枝七寸泡水一茶鍾送下

治久瘧方　用蕎麥細麪不拘多少取活鱉刺血丸之陰乾未發之先預服三錢白滚水下

又方　用大棗二個去皮核斑毛二個焙乾同研匀以熟猪油調揑成餅指頭大貼在印堂一宿即愈

治三日一次瘧疾方　生薑二兩　細茶二兩　山查二兩　柴



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

胡二兩　用酒河井水各一大碗煎一碗露一宿次早
温服立愈
治瘧初來　南蒼术米泔水泡去皮炒黄二兩　厚朴姜汁炒二兩　陳皮二兩
生甘草一兩　藿香一兩　製半夏一兩　葱姜自然汁糊丸
桐子大每服三錢
又治瘧仙方　用草從左手中指頂尖處量至中指根處
為止擘斷即用此草從根量至掌再從掌量至腕為度
用墨點記用核桃半個盛獨蒜研爛敷于墨點處以綿
紮上一個時辰即去之立愈

治小兒瘧瘧方　用雞肫黄皮煆灰存性乳和服之男雄女雌
又方　生鹿角煆灰存性先發之時服一錢
治久瘧腹中結塊名曰瘧母　鱉甲醋炙透一錢　白术土炒一錢　炙
甘草五分　黄蓍蜜炒一錢　白芍酒炒一錢　川芎一錢　水煎服
治瘧屢効方瘧者膈上停痰也外受風寒內停飲食所致　青皮醋炒　陳皮
姜皮　白术土炒　柴胡　桔梗　製半夏各錢　水二
碗煎六分　另用南山查二兩水二碗煎四分和在一
處露一宿次早温服
又方　臨來時用白糖四兩燒酒半斤盪最滚盡量飲之



Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

即愈

却瘧痢百病　立秋日五更取井華水長幼各飲一杯可免一切病症

寒熱瘧疾　秋後霜一錢熱酒服之即愈

一方　生姜四兩搗自然汁一杯露一宿於發日五更面北向飲即止未止再服

久瘧不愈　白术土炒為末每服二錢酒調服十劑除根

脾寒瘧方

瘧痢不止　龜殼燒存性研末酒服方寸匕

絶瘧神方　當歸一錢　茯苓一錢　廣皮一錢　甘草五分

右藥用好燒酒浸一宿臨發時去渣温服量大者前藥倍之三日瘧亦驗但必多服幾次

辟瘧法　五月五日午時取黑羊糞每粒分為二丸硃砂為衣用井華水朝東吞一丸

乾霍亂　腸痛出汗吐瀉不出危在旦夕　食鹽一兩　生姜五錢　切片同炒色變以水一碗煎服待涼服服後不宜吃飯食

又方　用艾綿鋪臍上外用棉花作圈將食鹽炒熱以布包放臍上用大碗盖定圈子令勿洩氣熱氣入肚即愈



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do NOT COPY

治乾霍亂腹痛　食鹽一兩牙皂一錢煎水服即吐而愈

治絞腸痧　明礬滚水調匀服一三錢即效

又方　以苧蘇繩蘸熱水先刮頭項次刮兩臂及手足曲灣處務刮起紅紫泡爲妙

又方　鹽一把置切菜刀上燒紅淬入水中乘熱飲水吐出而愈

一切痧脹　中暑霍亂等症

食鹽一握在心口背心兩脇頻擦擦出許多紫點爲度即垂死者亦活第一良方

霍亂吐瀉　飲新汲水一碗仍以水一盆浸兩足立止忌食熱物奇妙便方

一方　鹽醋同煎服甚良

一方　生藕搗汁服之

乾霍亂　食鹽一兩用熱水調灌入口鹽氣到痛即止如痛甚以手拍病人膝灣有紫黑點用針刺去黑血即愈

一方　飛鹽四五錢調童便三飲而三吐之即愈

一方　馬屎研汁飲之立愈

一方　蕎麪炒焦爲末温熱冲服



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方 煩脹欲死 好醋三升飲之

一方 乾嘔不止 薤子煎汁服之

霍亂轉筋中暑 白扁豆為末好米醋和服用豆葉亦可

一方 嚼大蒜令爛冷水送下

霍亂煩渴 藕汁一鍾姜汁半鍾和勻飲之

治轉筋霍亂 扶病人坐起將涼水淋兩腿筋即不轉或以水二桶將病人脚浸入水內過曲膝即愈

治乾霍亂 令病人面墻直立一人以手蘸温水在腿彎內反手拍打數十下有青紅脉突起即將針刺其上出黑血立止

霍亂痧痧

一方 用蘄艾一握水煎温服奇效

一方 用大蒜搗爛塗兩足心立愈

一方 急用滚水冷水各半盞和勻吞服塩一錢或吞一錢即止或將塩納臍中以艾葉灸之死亦可治



East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

治癱瘓中風　五靈脂四兩　草烏一兩火炮過去焦皮共為末核桃仁三兩去油合一處醋糊為丸如梧子大晚服白酒送下取微汗禁風初服一錢次服一錢五分又次服一錢五分又次服三錢止再服如前起

骨痛不拘何處並腰疼　五加皮三錢　胡椒七粒　鼠屎頭尖者三粒頭圓者四粒　薑三片用好燒酒一斤煮一炷香食飽畧後儘量飲取微汗輕者一次重者二三次以愈為度

中風中痰不省人事　香油一盃　生薑汁半盞　灌下痰



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

立愈

中風口禁遍身冷不知人事　獨活四兩好酒一斤煎至半斤灌服

肩背筋骨痛　槐花子　核桃仁　細茶葉　芝蔴　每樣或五錢或一兩共為一處用瓦礶盛藥入水六七碗熬折一半熱服神效

中風肢體難伸　羌活　獨活　升麻　柴胡　秦歸　防風　各等分為末每服五分酒調下

半身不遂仙方　牛膝三兩　藏鴨肚內重湯煑除牛膝食鴨每日常服

歷節風痛　獨活　羌活　松節　各等分將酒煑一炷香每日空心服一杯

風瘙癮疹心下迷悶並治疥瘡　巴豆五十粒去皮　水七鐘煮二鐘以帛染拭之隨手愈

徧正頭風　細辛　白芷各等分為末熱痛水調風痛酒漿調筆塗痛處立效

遠近徧正頭風　川芎　白芷各三錢　共為末用黃牛腦子一個切片同藥末入瓦器內加白酒頓熟乘熱和酒

風癱門



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

食之儘量一醉睡醒如失

中風身直不得屈伸反覆　槐皮（黄白者一兩切細）　酒二盞煎一盞稍稍服之

歷節諸風痛不止　沒藥一錢　虎脛骨二錢　為末酒調服立效

諸凡癱瘓　五月五日六月六日九月九日採蕷薟草去根入甑內層層用酒同蜜水洗之九蒸九晒研為末煉蜜為丸如皂角子大每服一二丸米湯送下

凡久癱瘓　槐枝　桃枝　柳枝　椿枝　楮枝（即垢樹）

茄枝　蘄艾合煎水三桶大盆浸洗如冷又添熱水以被蓋出汗避風未愈再洗幾次神效

瘋痴不知人事一發即治　桐油四兩煎豆腐八塊盡量與吃吃完吐痰盡即愈要餓一日夜餓極方與飲食吃為妙

中風不語　令人尿澆其面即醒

中風口噤　荊芥穗為末調好酒服二錢

中風痰厥　香麻油一盞灌入口中仍用鵞毛探吐痰涎立出



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

卒中不省薫鼻法　用巴豆油紙捻皂角末燒烟薫鼻自省

中風痰涎壅盛無汗表實者　用三聖散即防風藜蘆瓜蔕等分為末服之取吐　有汗裏實者　用瓜蔕散即瓜蔕熬黃赤小豆等分另為末每取錢大一匙以香豉一合熱湯七合煮作稀糜去渣取汁和散溫頓服之不吐者少少加服得快吐即止勿再過服致傷胃氣或加全蠍二方乃吐之輕劑也

宣吐風痰　連殼蝦米半觔入葱姜醬煮汁先喫蝦後喫汁驟束肚腹以雞翎探引取吐

卒中不省　生白礬三錢研細末生姜搗汁調灌即醒

口眼喎斜　巴豆去油一錢研末麝香二錢用棉花一塊放病人手掌上中留一孔入二藥末貯掌心以錫壺盛滚水放在面上熱即熨之喎左熨右喎右熨左壺冷即換正即去之

口喎　丹雞冠血塗頰正即洗去如前法塗之

驚怖卒死　温酒灌之即醒

卒中山嵐瘴氣頭身重痛或昏胃便泄浮腫　犀牛角磨水服之甚良



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

中惡卒死或吐利不止不知是何病症無論大人小兒　用馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁亦可此扁鵲法也赤白馬糞俱可用

小兒卒死而吐利不知何症　犬屎一丸絞汁灌之即愈無濕者水煮乾者取汁

口喎眼斜　將萆麻子研爛右歪塗左邊左歪塗右邊一經復正即速去之

又方　用皂角末塗法如前　以醋炒石灰為末仍以醋調塗法如前

疝氣門



丹溪疝氣神方　其病甚至氣上衝如有物塞心臟欲死手足冷者二三服除根

陳皮　荔枝核為末炒焦黃　硫黃火中溶化即投水中去毒研細各等分

右為末飯丸桐子大每服十四五丸酒下其疼立止若疼甚不能支持加五六丸再不可多也

去鈴丸　治疝消鈴　用大茴香一升以老生姜二斤取自然汁浸茴香一宿以姜汁滲盡為度入好青塩二兩同炒赤取去焙乾為末用無灰酒浸蒸餅為丸梧子大空心食前酒下二三十丸或米泔飲亦可　此方實脾



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

疎肝所以治疝多效非如常法之尅伐故為妙也

濕疝陰丸作痛　蘄艾　紫蘇葉烘乾　川椒炒熟各一兩

右三味拌勻乘熱用絹袋盛夾囊下勿令走氣冷即易之

荔核散　治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香炒　沉香　木香　青鹽　食鹽各一錢　川練肉

小茴香各二錢　荔枝核十四枚用新者燒焦烈衣

右為細末每三錢食前熱酒調服

經驗蒼朮散　治下元虛偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼朮六斤分制　一斤用老米泔水浸二日夜

一斤酒浸一日切片晒乾　一斤用斗子青鹽半斤同炒不用鹽　一斤小茴香四兩同炒黃色去茴香不用

一斤用大茴香四兩同炒如前　一斤桑椹二斤取汁拌製晒乾　右為細末每服三錢空心酒下

局方守效丸　治癩疝不痛者之要藥　蒼朮　南星　白芷　川芎　山查　半夏　枳實一云橘核　右等分為末姜汁糊丸桐子大每服七八十丸鹽湯下　有寒加吳茱萸　有熱加山梔子又或加青皮荔枝核

衝疝　遶臍衝心作痛　連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒



Fast Asian Library DO NOT COPY Princeton University Library and the Gest Collection

調下甚者二三服即消

衝疝厥疝臍悸奔豚疼痛上攻　吳茱萸塩水炒一味為末少入肉桂澤瀉茯苓水煎服

癩疝囊腫頑硬　荔枝核炒黑色大茴炒等分為末每服一錢温酒調下

一方　橄欖核荔枝核山查核等分燒存性研末每空心回香湯調送二錢

一方　樟木末盛炒鍋内夏布蓋好放炭火上燒烟起將患處燻之即愈

小腸氣痛或墜　大茴小茴各三錢炒乳香去油少許水服取汗

一方　大茴一兩花椒五錢炒研每酒服一錢

一方　每飧用鯽魚十個同茴香煮食自愈不發

一方　荔枝核一枚煨存性研末新酒調服

氣疝即偏墜也　絲瓜架上初結者留下待瓜結盡葉落取下燒存性為末蜜煉調成膏每晚好酒服一匙在左左睡在右右睡

一方　絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰二錢温酒調服



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方　雞頭根即芡實根切片煮熟塩醋食之

一方痛甚欲死者　雄黃五分飛淨為細末或姜湯或陳酒送下其效如神

癩疝重墜囊大如斗如盆　薏苡仁用東壁土炒水煮為膏數服即消此辛稼軒患是症一道人所傳之方也

一方　荔枝核青橘皮回香等分各炒研末酒服二錢日二服

狐疝陰丸左右偏大偏小時出時入少腹拘急而痛乃寒濕襲陰之故　蜘蛛散蜘蛛十四枚熬煎晒乾桂枝五錢為末取八分飲一匙和勻服之日二服或蜜丸亦可服後若下勿驚

膀胱氣　大茴杏仁各一兩葱白焙乾五錢為末每服二錢嚼胡桃送下

一方　梹榔十二枚一生一熟為末酒煎服之良

疝氣入腎　大茴炒作二包更換熨之良

腎陰卒痛　牛屎燒灰酒和敷之

寒疝　胡椒四十九粒荔枝核十枚為末好酒送下

疝症煨囊法　松樹柴細灰一大碗將陰囊埋於灰內一時灰濕再換埋三日即愈



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

卒急疝氣　乾姜研細末放在手心內用湼沫調勻將腎囊放手心有藥處再用右手蓋上候囊與手出汗腹內大熱方輕起右手不可冐風腹大熱痛即上

一切疝症灸法　急以艾葉灸大敦穴是穴肝經屬在足大指甲後有毛處灸之即安

冷氣入囊腫脹疼痛　生川椒擇淨帛裹着丸囊厚半寸須臾熱氣大通日再易以消為瘥　梅師方用桂末塗之亦良

治疝氣偏墜　猪毛燒灰每服二錢空心水送下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library