PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

C83/2796
v.1

辨證氷鑑

卷之一

上函

子部

傷寒

中寒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

辨證冰鑑

山陰陳士鐸遠公著

涇川潘駿德署

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
Property of the Gest Collection
University Library

辨證冰鑑 上卷 目次
中寒 午
暑 午

光緒二十二年冬月京都
擷華書局鐫

辨證冰鑑古今人有濟之以活人之術者必以救世而垂永久山陽程葭應先生抱道軱幽樂善

Digitized by Google
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不倦創設普濟堂規模宏遠綜理周密四方之病而無所歸者歲全活逾數千人嘗以良醫醫不可多得四民疾苦往往誤於庸劣之手思所以補救爰舉陳遠公先生辨證證冰鑑刊以行世遠公山陰之高士嘗于長安邂逅異人得授石室秘錄一書朝夕研究學益精

DO NOT COPY East Asian Library Gest Collection Princeton University Library

理益邃因註素問繼又著
為是書其自序云不知症
不可以用藥不辨症不可
以治人又云人病最多辨
症宜悉誠哉是言也但惜

向少刋本世鮮流傳則雖
有其書而遠公之志實未
能酬也今先生以此書付
剞劂流布海寓俾世之讀
是書者如軒鑑當前聽人

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

自照病者可不為似是而非之醫所誤醫者亦不致以似是而非之說誤人嘻先生之志可謂勤且遠矣余嘗閱歷代經籍藝文方技諸志有其書著而不傳與雖傳而不久非但作者之恨亦千萬世不及見者之恨故述者之功與作者並遠公書垂後世而先生

又得見是書為之纍噓太
息而不能已何先生好善
一至於此也用為之序題
其簡端以志余欣慕之意
云歸安沈樹德畏堂甫譔

為之噶矣先生活人之心
甯不與遠公活人之術並
傳不朽歟余早耳先生名
庚午春偶來淮上登普濟
堂覽温太史如玉所為志

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

序

辨澄冰鑑鈔本司李張君隅樵得之如獲拱璧者曩隅樵宰余結文字緣其兼通

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

醫學嗣選甘來直隸濮
甘同者一日出此書見眎
余公兄未遑辛讀適出
手麻證新瘳乃指中
諭手麻一条觀其審證

議方有竅獲我心之妙洎
檢閱各條皆稱是知作甘
於此道三折肱矣嘗怪世
之業醫者讀未畢一經
輒取坊刻之湯頭歌葉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

性賦稍事呼吸靈樞私為枕
中鴻寶證且不之辨以看
醫救人古今所深痛也夫
醫之為道有三要曰診脈
曰辨證曰定方而辨證尤
三要中之最要診脈為
呼窮不辨證則呼窮未
能求音宮之方必行軍不
辨證則行軍未能量敵

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
NOT COPY

昔長沙太守張仲景撰著傷寒一百一十三方先範之以三百九十七法又憲法傷寒雜病別著金匱二十五篇類列二百六十二才仲景為聖醫代聖醫舍證且不能定方況其下焉哉其二分作其有遠其辭文而索解人不得未依倚以爭趨便捷以

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

先正典型為高遠妥歸古
方不可治今病之澤說我
朝葉天士出於臨證指
南一切分門別類繁而有
要博而能精其議案如

洞達癥癖補瀉寒溫
之偏勝其議病如別出手
眼有表裏虛實之分途
復多醫書千金科玉律
如惜讀壯多病其駁雜又

有宜南不宜北主瘉生今
青囊秘笈及雖傳而不甚
傳吁可慨已余杜醫未嘗
習以善病及三今
浮屠書愛不思釋会者必
必有同好余者迺為序
民行此俾海內業醫之
士知方之視乎證狥射之
視乎的会證不可以射取
会證不可以博

觀傷寒金匱之金鍼
脈訣雜經之深窮究素
問靈樞之奧出陷危而躋
仁壽祖冰先生世為所深
遠去哉先生姓陳名士
鐸字遠公湖之山陰人
大概具舊序中茲不贅
時在
光緒二十年歲次甲午
秋九月涇川梅園潘駿

德序於清河通署

子部卷之一
傷寒門四十三則
中寒門七則
丑部卷之二
中風門二十五則
痺症門十一則
心痛門六則
頭痛門六則
脇痛門五則
腰痛門六則
腹痛門六則
寅部卷之三

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

大便閉結門九則
內傷門二十三則
陰痿門五則
卯部卷之四
五鬱門六則
喘門四則
驚悸門二則
不寐門五則
癲癎門六則
小便不通門六則
疝氣門附奔豚八則
痰症門二十則
欬嗽門八則
怔忡門三則
虛煩門三則
健忘門四則
狂病門六則
呆病門三則
辰部卷之五
呃逆門五則
關格門五則
翻胃門五則
厥症門七則
巳部卷之六
火熱症門十五則
燥症門十五則
消渴門五則
中滿門四則
臌脹門七則
春温門三十三則
傷暑門十一則
痿症門八則

DO NOT COPY
East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library

午部卷之七
痙痙門十一則
五癰門十則
痢疾門十二則
未部卷之八
瘧症門十則
癆瘵門十七則
陰陽脫門五則
申部卷之九
汗症門五則
大瀉門九則
癥瘕門八則
虛損門十三則
夢遺門七則
淋症門七則

咽喉門七則
鼻淵門三則
耳病門七則
血症門二十一則
酉部卷之十
鶴膝門二則
遺尿門三則
強陽不倒門二則
火丹門三則
牙齒門六則
目痛門十四則
口舌門二則
偏身骨痛門四則
癲風門二則
脫肛門二則
發斑門二則
離魂門三則

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痃夏門二則
中邪門六則
中毒門十二則
自笑門附自哭三則
喑啞門三則
種嗣門九則
帶門五則
血崩門七則
戊部卷之十一女科
血枯門二則
調經門十四則
腳氣門一則
中妖門六則
腸鳴門三則
惱怒門二則
瘟疫門一則
妊娠惡阻門二則
小產門五則
難產門六則
胞衣不下門二則
下乳門二則
受妊門十則
安胎門十則
鬼胎門一則
血暈門三則
產後諸症門十一則
亥部卷之十二外科小兒科
肺癰門四則
大腸癰門三則
無名腫毒門二則
背癰門七則
肝癰門三則
小腸癰門三則

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

對口癰門一則
囊癰門二則
乳癰門四則
多骨疽門一則
疔瘡門一則
腰疽門一則
腳疽門二則
唇疽門一則
痔漏門四則
腦疽門一則
臂癰門一則
肚癰門一則
惡疽門一則
楊梅瘡門五則
擎疽門一則
髮疽門一則
瘰癧門二則
頑瘡門二則

接骨門二則
物傷門三則
刑杖門一則
便蟲門二則
疹瘡門三則
胎毒門一則
金瘡門一則
癩門一則
驚猖吐瀉門七則
痘瘡門十五則
吃泥門一則

以上共計一百二十六門
七百六十九則

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

辨證氷鑑卷之一

山陰陳士鐸遠公著

陳遠公曰醫道之難也不知症不可以用藥不辨症不可以活人此症之必宜辨也余初得太倉公辨症奇函以為辨症盡於此矣後逢岐伯仲景張公兩夫子朝夕辨難始知人病最多辨症宜悉太倉公尚未十分之四也日記師言書之成帙共若千篇統各證而論之存於笥中以為時醫之氷鑑云

傷寒門　共四十三則

Not to be copied
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一冬月傷寒發熱頭疼汗出口渴人以爲太陽症也誰知太陽已趨于陽明乎若徒用乾葛湯以治陽明則頭痛之症不能除若徒用麻黃湯以治太陽則汗出不能止口渴不能解勢必變症多端而輕症變爲重症矣治法宜正治陽明而兼治少陽也何則蓋邪入陽明留于太陽者不過零星之餘邪也治太陽反傷太陽者故太陽不必治宜正治陽明爲多氣多血之府邪入其中正足大恣其凶橫如賊入通都大邑其搶掠之勢較窮鄉僻壤自是不同所得之物轉足以供其跳梁之暴故邪入太陽者挾六腑之氣血爲炎氣烈焰者往往然也然則治法豈可以輕少之劑遽望其解散之乎故必須用大劑涼藥始可祛除其橫暴也方用石羔一兩知母二錢麥冬二兩竹葉二百片茯苓三錢甘草一錢人參三錢柴胡一錢梔子一錢水煎服一劑頭痛除二劑身熱退汗止口亦不渴矣此白虎湯之變方用知石瀉陽明之火邪用柴梔斷少陽之路徑尤妙重用麥冬以清補肺金之氣使火邪不能上逼尤妙用茯苓引火下趨于膀胱從小便而出而太陽餘邪盡隨之外泄也至

于參甘竹葉不過取其調和臟腑所謂攻補兼施也或懼前方太重則淸肅湯亦可也載之以便選擇用

石羔五錢 知母二錢 麥冬一兩 人參柴胡梔子各一錢

獨活半夏各五分 水煎服

一冬月傷寒發熱口苦頭痛飢不欲飲食腹中時痛人以爲太陽症也誰知是少陽症乎夫傷寒未有不從太陽入者由太陽而入陽明由陽明而入少陽者傳經之次第也何以初入太陽而卽越陽明而入少陽也蓋少陽乃胆經也胆屬木最惡金肺屬金主皮毛風邪之來肺金先受肺欺胆水之虛卽移其邪于少陽故太陽症往往多兼少陽同病者此故耳然則此病乃二經同感而非傳經症也似宜二經同治矣而又不然單治少陽而太陽之病自愈柴胡二錢 甘草一錢 白茯苓三錢 白朮五錢 陳皮一錢 黃芩一錢 神曲一錢 白芍五錢 水煎服一劑熱止二劑頭腹不痛口亦不苦矣此逍遙散變方也何以用治傷寒有如此之神乎不知病在半表半裏之間此方解散寬奇表裏之邪旣解而太陽膀胱之邪又何能獨留況方中原有茯朮以利腰臍而通膀胱

之氣平。余所以止加神曲黃芩少解其胃中之火。以和脾氣而諸症所以盡除也。

用舒輕湯亦佳薄荷二錢 白朮二錢 白芍五錢 甘草八分 黃芩一錢 茯苓五錢 桂枝三錢 水煎服

一冬月傷寒。發熱口渴譫語。時而發厥。人以爲熱深而厥亦深也。疑是厥陰症。誰知是太陰症乎。夫太陰脾土也。與胃爲表裏。表熱而裏亦熱。此乃胃邪移入脾經也。此症最危最急。蓋人生以脾胃爲主。脾胃盡爲火邪所爍。而腎水有不立熬乾者乎。治宜急救脾胃矣。然救脾則胃火愈熾。救胃則脾土立崩。此中之消息最難。然則終何以救之乎。亦速救夫腎水之乾枯也。方用玄參三兩 甘菊花一兩 生地一兩 麥冬二兩 茯實五錢 水煎服。此名救枯丹。以玄參散脾胃浮游之火。甘菊消胃中之火。麥冬滋肺中之液。助生地生腎中之水。庶幾滂沱大雨自天而降。而大地焦枯立時漫渥。又何旱魃之作祟乎。又恐過於汪洋。加入茯實以健土氣。而又仍是腎經之藥。則脾胃相宜。俱得其灌溉之功。而絕無侵淩之患。此立方之所以神也。故一劑譫語定。二劑口渴除。三劑厥

止身亦涼也此症世人不知治法即仲景夫子亦未嘗談及天師因鐸之請特傳神奇治法爲傷寒門中之活命丹也

用清土散亦可石羔麥冬生地各一兩金銀花五錢白朮三錢甘草一錢水煎服

一冬月傷寒大汗而熱未解腹又痛不可按人以爲邪發于外未盡而內結于腹中乃陽症變陰之症也余以爲不然夫傷寒而至汗大出是邪隨汗而盡出直無邪之在中又何至有腹痛之疾此乃陽氣盡亡陰亦盡泄腹中無陰相養有似于邪之內結而作痛此陰陽兩亡之急症不可不治也夫痛之可按爲虛不可按爲實何以此症不可按而又以爲虛乎不知陰陽兩亡腹中正將絕之候不按亦可疼痛難忍之時況又按而傷其腸胃安得不重增其苦所以痛不可按也此症急不可緩用急救陰陽湯人參二兩黃芪二兩熟地二兩當歸一兩白朮二兩甘草三錢水煎服一劑腹痛頓止身熱亦解汗亦盡止矣此方用參芪補氣使陽回于陰之內歸熟補血使陰攝於陽之中甘朮和腸胃而通腰臍使陰陽

兩歸干氣海關元。則亡者不亡而絕者不絕也。倘認爲陽症變陰純用温熱之劑加入肉桂干姜附子之類。雖亦能回陽于頃刻。然內無陰氣。陽回而陰不能攝。亦旋得而旋失矣。

用救亡散。亦易奏功。人參當歸熟地各一兩　甘草一錢

附子一片　水煎服

一冬月傷寒。大汗熱解。腹微痛。腰不能俯仰。人以爲邪在腎經未出。用豨薟丸如防已治之。非也。此乃發汗亡陽。陽虛而陰不能濟之故也。夫陰陽兩相根也。陰根于陽。無陽則陰不能生。陽根于陰。無陰則陽不能化。此因汗泄過多。陽氣無幾。而陰又自顧不遑。不敢引陽入室。而陽無所歸之途。故行于腹。孤陽無主。而作痛矣。腎中之陰又因陽氣不歸。而孤陰無伴。不敢上行于河車之路。故腰不可以俯仰也。引陽湯治之。杜仲一錢　肉桂三分　山藥五錢　甘草一錢　茯苓二錢　茯實二錢　人參三錢　白朮五錢　水煎服。一劑腹痛止。二劑腰輕。三劑俯仰自如矣。此方妙在救陽氣之旺而不去助陰氣之微。蓋陰之所以杜陽者。欺陽之衰也。如夫婦好合。豈忍永絕良人。

East Asia Library Digital Collection
Do not post without permission
Princeton University Library

因其夫與外侮相爭。狼狽逃回。因羞變怒。欲杜絕而不許入房。倘其夫得朋資益。捆載而歸。嫉見金多有不開門笑迎者乎。所以助陽而不助陰者。實有鑒於此也。倘用豨薟防己以重損其陰。陽則夫貧而婦亦貧。彼此相仇。有終身反目不成爲廢人者幾希矣。

濟陽湯亦可。用杜仲二錢　山藥二兩　甘草一錢　人參五錢　白朮五錢　破故紙一錢　水煎服

一冬月傷寒。大汗氣喘不能息。面如硃紅。口不能言。呼水自救。人以爲熱極。欲用白虎湯以解其陽明之火也。而不知非治法也。此乃載陽之症。乃上發熱而下寒也。若用白虎湯。雖多加人參。下喉即亡矣。方用入味地黃湯半劑。大鍋煎湯。盛其湯飲。必熟睡半日。醒來語必正。氣不喘。面必白。口不渴矣。何故。蓋此症原不宜汗而汗之。必致大發其汗。汗既大出。而陽邪盡洩。陽氣盡散。而陰亦隨之上升。欲盡從咽喉而外越。汗出而陽氣奔騰。不得盡爲汗泄。故直趨咽喉大路。不可止抑矣。陰既上升。陽又外泄。不能引陰而回于氣源。陽亦隨陰而上。而陰氣遂逼之而不可下。故氣喘不能息也。且陽既在上。火

亦在上者勢也。況陽上升則腎宮寒極。下既無火而上火不得歸源。故泛炎于面而作硃紅之色也。上火不散。口自作渴。呼水自救者。救咽喉之熱而非欲救腸胃之熱也。夫實熱多成于胃火而胃熱之病。必多號跳狂呼之狀。今氣喘不能息。口不能言。非虛熱而何。此眞所謂上假熱而下眞寒也。八味地黃湯。妙在補水之中。仍是補火之藥。下喉之時。火得水而解。入胃之後。水得火而安。調和于上下之間。灌注于肺腎之際。實有妙用也。夫發汗亡陽。本傷氣也。何以治腎而能奏功。不知亡陽之病。內無津液。以致內火沸騰。今大補其眞陰。則胃得之而息焰。胃火一息。而腎之關閉矣。腎關閉而胃之土氣自生。胃土生而肺金之氣有不因之而得養者乎。肺氣一生。自然清肅令行。母呼子歸。同氣相招。勢必下引腎氣而自歸于子舍矣。腎氣既歸而腎宮之中。又有溫和春色以相薰。又得汪洋春水以相育。則火得水而生。水得火而悅。故奏功神速也。

近火湯亦神熟地三兩　山萸一兩　肉桂三錢　水煎服

一冬月傷寒發厥面青手冷。兩足又熱。人以爲直中陰寒

也。用理中湯治之。而不知非治也。此肝邪鬱而不散。風邪在半表半裏之間也。若用理中湯。必發狂死矣。夫直中陰寒之症。未有不從足而先冷者也。今兩足熱非直中肝經明矣。邪既不在肝經。似乎不必重治肝經矣。然而邪雖不在肝經之內。未嘗不在肝經之外也。邪在門外。與主人何豫。而現發厥面青手冷之症也。不知震鄰之恐猶然有警惕之心。豈賊在大門之外。而主人有不張惶色變者乎。是必登高號召。賊人知內有防護之人。恐外有救援之士。自易于解散逃遁。倘用理中湯。是用火攻以殺賊。賊未擒而房舍先焚。賊且乘火突入中庭。必至殺主人而出矣。治之法用小柴胡湯加減以散其半表半裏之邪。而肝氣自安。外邪化爲烏有矣。用柴胡二錢 白芍五錢 甘草一錢 當歸一錢半 黃芩一錢半 夏一錢 水煎服。一劑手温。再劑厥止。熱自盡除。而面青自白矣。

一 冬月傷寒。汗自出惡寒不惡熱。身熱人以爲陽明之症也。欲用石羔湯治之。而不知非陽明之症也。夫汗出似乎陽明。然陽明未有不惡熱而惡寒。此陽

氣甚虛邪欲出而不出內熱已解而內寒未散之症也必因悞汗之故所致用補中益氣湯人參三錢桂枝五分黃芪三錢白朮二錢當歸一錢甘草一錢水煎服一劑汗止身涼寒亦不惡矣夫補中益氣湯非治傷寒之方也李東垣用之以治內傷實有神功我何所取以治傷寒之病得毋見譏於長沙張使君乎不知傷寒之中亦有內傷之病正不可拘拘于傷寒而不思治變之方也況此症悞汗而成者汗已出矣邪之存于經絡者必淺卽有畏寒其寒邪亦必不重是外感而兼內傷也此方于補正之中仍有祛邪之味故兼用之而成功也況加桂枝散寒之咸宜乎倘認作陽明症而妄用白虎湯少投石羔鮮不變爲虛寒之症而死矣烏可不辨證哉

溫正湯亦可用人參五錢黃芪一錢當歸五錢柴胡一錢甘草五分神曲一錢桂枝三分水煎服

一冬月傷寒身熱五六日不解譫語低聲口渴小便自利欲卧人以爲陽明之餘熱未解也而予以爲不然夫譫語雖屬胃熱然胃熱譫語其聲必高拂其意必怒今但譫語

而低聲非胃熱也但既非胃熱何以口中作渴欲飲水以潤也然口渴飲水不能化痰上湧反直走膀胱而小便自利其非胃熱又明矣夫陽明火盛多致發狂今安然欲卧當非胃熱之病但既非胃熱何以譫語口渴不解至於五六日耶不知此症乃心虛之故也心虛則神不守舍而譫語心虛則火起心包而口渴夫心與小腸爲表裏水入心而心即移水入于小腸故小便自利也茯苓五錢　麥冬一兩　丹皮三錢　柴胡一錢　甘草五分水煎服一劑譫語止三劑口渴除身熱亦解也方名清熱散用麥冬補心茯苓分消火熱柴胡丹皮甘草和解邪氣心氣足而邪不能侵邪盡從少陽泄出而心中甯靜津液自生故渴除而腎氣上交于心而精自長亦不思卧矣若疑爲胃熱而用白虎青龍等湯鮮不敗衂矣

解涼湯亦可用茯神三錢　麥冬五錢　元參一兩　柴胡一錢　甘草三分　炒棗仁一錢　水煎服

一冬月傷寒至五六日往來寒熱胸脇苦滿或嘔或吐或渴或不渴或煩或不煩人以爲少陽症也用小柴胡湯和解之大小柴胡治少陽邪之聖方用之似乎合宜也

East Asian Library, Princeton University Library. Digitized by Google. Do not use without permission. Restricted to the Princeton Community.

以少陽居于表裏之間。邪入而併于陰則寒。邪出而併于陽則熱。故疾結于胸而若滿。欲吐不吐。欲渴不渴。而煩悶生矣。用柴胡湯以解之。自易奏功。然止可一用。而不可嘗用也。何故。蓋少陽膽木最喜者水耳。次則喜風。柴胡風藥得之則解温。然日投以風藥。雖枝葉條達。而終有乾燥之虞。一旦濟有大雨。則扶疎青翠。爲何如耶。故用柴胡湯之後。必須補水之劑以濟之。方用濟生湯。

熟地 五錢　元參 五錢　麥冬 三錢　山萸 一錢　白茯苓 二錢
山藥 三錢　白芍 三錢　柴胡 五分　神曲 三分　竹茹 一團　水

煎服。一劑煩滿除。二劑寒熱止。三劑全愈。此方多補腎水之味。直補其胆木之源。則胆汁不枯。足以禦邪而有餘。況加柴芍仍散其半表半裏之邪。安得不收功之速乎。若以傷寒之後。不宜純用補腎。恐胃氣有傷。難以消化。不知少陽之症。由太陽陽明二經傳來。火燥水涸。不但胆汁爲邪所迫。半至熬乾而臟腑盡多炎爍。是各經無不喜聆霖雨。非但胆水喜水也。然則補水正其所宜。何至有停膈之虞哉。

和膈散亦妙柴胡一錢　白芍一兩　生地 五錢　竹茹一團

元參三錢　麥冬二錢　茯苓三錢　水煎服

一冬月傷寒發熱至五六日晝則了了夜則譫語如見鬼狀按其腹則大痛欲死人以爲熱入血室也而不知非止熱入血室也雖亦因經水適來感寒而血結故成如瘧之狀然其未傷寒之前原有食未化血包其食而爲瘧母也論小柴胡湯爲正治然小柴胡止能解熱使熱散于血室之中不能化食使食消于血塊之內亦有一方最神治熱入血室亦正相宜可全治之也名兩消丹

柴胡二錢　丹皮五錢　鱉甲三錢　枳殼一錢　甘草一錢　查肉一錢　梔子二錢炒　白芍五錢　當歸三錢　桃仁十粒　水煎服一劑痛輕二劑塊去譫語止腹安無寒熱之苦矣

此方既和表裏而血室之熱自解妙在鱉甲攻于血塊之內以消其宿食所謂直搗中堅而瘧母何所存立以作祟乎

清白飲治之亦妙柴胡前胡青皮梔子各二錢　丹皮茯苓當歸各三錢　人參半夏甘草各一錢　白芍一兩　五味五錢　水煎服

一冬月傷寒項背強几几汗出惡風用葛根湯加桂枝而

不愈人以爲太陽陽明合病舍前方又將何藥以治之而不知不可執一也夫太陽之邪既入陽明自宜耑治陽明不宜又顧太陽也況于葛根湯中仍加桂枝以祛太陽之邪乎是太陽之邪輕而陽明之邪重矣用竹葉石羔湯瀉陽明之火前症自愈但不必重用石羔也用石羔三錢知母八分半夏一錢麥冬三錢竹葉五十片甘草一錢水煎服一劑汗止二劑項背强凡凡之毒盡去風亦不畏矣倘必拘仲景方法仍用葛根湯加桂枝雖病亦能愈而消灼津液矣予所以更示方法使治傷寒者宜思變計而不可死于古人之文內也

清胃湯亦佳元參生地各五錢知母二錢半夏一錢甘草五分水煎服

冬月傷寒頭痛几下利夫頭疼太陽症也几几陽明症也是二經合病無疑似乎兩解然而不可兩治之也正以其下利耳夫陽明胃土也今挾胃中之水穀下奔其勢欲驅邪盡入陰經若不耑治陽明急止其利則陽變爲陰熱變爲寒其害有不可言者矣用解合湯治之

葛根二錢茯苓五錢桂枝三分水煎服一劑利止二劑

頭疼几除盡何也蓋葛根乃太陽陽明同治之聖藥況加桂枝原足以散太陽之邪而茯苓不獨分消水勢得桂枝之氣且能直入膀胱膀胱正太陽之本宮也得茯苓澹泄而葛根亦隨之同行祛邪盡從小便而出小便利大便自止矣此不止利而正所以止利不瀉陽明而正所以瀉陽明兩解之巧孰能過於此者乎所以不必兩治只須一治之也

用葛根三錢　人參一錢　桂枝五分　煎服亦可

一冬月傷寒六七日後頭疼目痛寒熱不已此三陽合病也而不可合三陽經統治之夫邪之來者太陽也邪之去者少陽也欲去者而使之歸來者而使之去必須調和胃氣胃氣一生而陽明之邪自孤勢必太陽少陽之邪盡趨陽明以相援而我正可因其聚而急使之散也

用破合湯石羔三錢　葛根三錢　茯苓三錢　白芍藥三錢　柴胡一錢　陳皮一錢　甘草一錢　水煎服此方治陽明者十之七治太陽者十之一治少陽者十之二雖同治三經其實仍前治陽明也故一劑目痛愈矣再劑頭疼除矣三劑寒熱解矣此皆胃氣生之故而奏功所以甚速

也。倘不治陽明而治少陽。則損傷胃氣。而少陽之邪。日引二經之邪。盡遁入陰經。反成變症。不可收拾矣。

和陽湯亦妙。石羔五錢 葛根白芍各二錢 麻黃三分 柴胡甘草各一錢 天花粉五分 水煎服

一冬月傷寒五六日。吐瀉後。又加大汗。氣喘不得卧。發厥者。此悞汗之故。人以爲壞症不可治也。夫汗後。宜身熱盡解矣。今熱不退。而現此惡症。誠不可治也。吾欲于不可治之中而施可救之法。亦庶幾於不宜汗之中。而救其失汗乎。蓋傷寒至吐瀉之後。上下之邪必散。而熱未解者。此邪在中焦也。理宜和解。使當時用柴胡湯調治。自然熱退身涼。而無如其悞汗之也。今悞汗後。熱仍未退。身仍未涼。是邪仍在中焦也。此時用柴胡湯。則已虛而益虛。不死何待。必大補其中氣。使汗出亡陽仍歸于腠理之內。少加柴胡和解。則轉敗爲功。實有妙用也。救汗回生湯人參三兩 當歸二兩 白芍一兩 廣陳皮五分 柴胡一錢 甘草一錢 麥冬五錢 水煎服。一劑汗散。二劑喘定。三劑厥止。然後減去柴胡。將此方減去十分之六。漸漸調理。自無死法。此救壞症之一法也。人見人參之

多未有不駭用藥之太峻殊不知陽已盡亡非多用參何以回陽于無何有之鄉尙恐人參回陽而不能回陰故佐以當歸之多助參以奏功又恐參歸過于勇猛又多用麥冬白芍使調和于肺肝之中使二經不相戰剋而陽回于陰之中陰攝于陽之內聽柴胡之解紛實有水乳之合也又何以多用參歸爲慮哉

救敗湯亦效當歸人參麥冬各一兩白芍五錢神曲三分北五味十粒柴胡甘草各五分水煎服

一冬月傷寒汗吐後又加大下而猶身熱如火發厥氣息奄奄欲死人以爲壞症不治矣然亦有可救之法也正以其誤下耳夫誤下必損脾胃之氣救脾胃未必不增風寒生之道也惟是邪猶未解補脾胃之氣未必不增風寒之勢必須救脾胃而又不助邪之爲得耳用援下回生丹人參五錢白朮一錢柴胡五分赤石脂末一錢甘草一錢水煎服一劑瀉止厥定二劑身熱解口思飲食矣切戒不可遽與飲食只可少與米湯漸漸加入米粒調理若驟進飲食必變爲結胸之症斷難救死也夫同是壞症前條何以多用人參而此則少用人參也蓋大汗

亡陽。其勢甚急。大下亡陰。其勢少緩。亡陽者。陽易散也。亡陰者。陰難盡也。亡陽者。遍身之陽皆泄。非多用人參不能挽回于頃刻。亡陰者。脾胃之陰盡而後及于腎。故少用人參而即可救于須臾。此方之妙。在用參朮以固脾胃腎之氣。茯苓以分消水濕之邪。柴胡甘草以調和于邪正之內。加入赤石脂以收澁其散亡之陰。所以收功實神。此又救壞症之一法也。

用定亂湯亦神人參山藥各一兩 茯苓苡仁各五錢
甘草黃連各五分 陳皮神曲各三分 砂仁一粒 水煎服

一冬月傷寒。大汗後。又加大吐。氣逆嘔吐。飽悶胸中痞痛。時時發厥。昏暈欲死。譫語如見鬼神。旦知生人出入。此亦壞症之不可救也。然因悞吐之故。不宜吐而吐。以成此至危之症也。欲求悞吐之逆而深思安吐之方。舍轉氣之法。又將何求乎。用轉氣救吐湯治之。人參一兩 茯神五錢 旋覆花一錢 赭石末一錢 水煎服。一劑氣逆轉矣。另用招魂湯。人參三錢 茯苓三錢 山藥三錢 芡實三錢 神曲三分 陳皮三分 麥冬三錢 白芍五錢 柴胡二錢 水煎服。一劑身涼。神魂安貼。前症盡愈。夫汗下之後。身熱

未解者此邪在半表半裏也理宜和解乃不用和解而妄用吐藥邪隨氣涌氣升不降者因汗下之後元氣大虛又加大吐則五臟反覆自然氣逆而不能順矣氣既逆矣嘔吐何能遽止胸中無物而作虛滿虛痞之苦以致神不守舍隨吐而越出于軀殼之外故陰陽人鬼盡能見之也似宜先追魂奪魄之爲急而必先轉氣者何也蓋氣不轉則神欲回而不能回魄欲返而不能返也所以先轉其氣氣順而神自歸也況轉氣之中仍佐以一定神之品安得不奏功哉至轉氣之後反用招魂湯者豈魂魄尚未返而用此以招之乎非也蓋氣虛之極用轉氣之湯以順之苟不用和平之劑調之則氣轉者未必不重變爲逆也招魂湯一派健脾理胃土氣既生安魂定魄而神自長處于心宮不再越矣然則招魂湯即養神湯也此又救壞症之一法

救逆散亦能成功人參二兩 茯苓白朮各一兩 附子一錢 麥冬五錢 牛膝二錢 破故紙一錢 水煎服

一冬月傷寒身重目不見人自利不止此亦壞症不可救也然乃悞汗悞下之故耳一悞再悞較前三條爲更重

耳本不可治而內有生機者以胃未經悞吐則胃氣未傷也扶胃氣以回陽助胃氣以生陰未必又非可救之一法也用漸生湯人參三錢白朮五錢茯苓一兩山藥一兩茯實一兩黃芪五錢白芍五錢甘草一錢砂仁三粒水煎服一劑目能見人二劑利止三劑身涼體輕矣此方妙在緩調脾氣脾氣生而臟腑俱有生氣自然陽衰者而生其陽陰衰者而生其陰矣夫陰陽之衰與陰陽之絕原有不同壞症乃陰陽之絕而非陰陽之衰也陰陽之衰易于相生陰陽之絕難于相救不知陰陽之道有一線未絕皆可再延此症雖壞而猶有生氣是陰陽在欲絕未絕之候故用參苓芪朮之品得以回春也倘陰陽已絕又安能續之乎此又救壞症之一法也

一冬月傷寒悞吐悞汗悞下身熱未退死症俱現人以為必死矣即法亦在不治吾不忍其無罪而死也再傳一起死回生之法以備醫者于無可如何之地而為追魂奪魄之方方名追魂丹人參一兩茯苓五錢山藥一兩甘草一錢附子一分生棗仁一兩水煎服一劑而使大便止者便有生機或汗止或吐止三者得一亦有生意

矣蓋陰陽未絕得一相接則陰陽自能相生如星星之火引之可以燎原悞吐汗下之症其陰陽原未嘗自絕也因悞吐汗下而亡其陰陽耳其根實在故一相引而生意勃發如火之燃服之而大便止是腎陰未絕也上吐止是胃陽未絕也身汗止是五臟六腑之陰與陽未絕也又何不可生之有倘三者無一應是陰陽已絕亦無第二方可救也或問追魂丹中純回陰回陽之藥絕無去邪之品豈無邪可散乎若身內無邪宜身熱盡退矣何又熱如故也嗟乎經吐汗下之後又有何邪身熱未退者因陰陽之虛而爲虛熱耳使早用補則何至變症之生也故只大補陰陽陰陽回已無餘事矣不必又去顧邪若顧邪而用鮮紛之味又安能回陰陽哉

一冬月傷寒八九日腹痛下利便膿血喉中作痛心內時煩人以爲少陽症也誰知是少陰之症舍治少陰必生他變將何方以治之乎使治膿血而用桃花湯也則心煩者不宜使治喉疼而用桔梗湯也則腹痛者不宜而予以爲二方不可全用而未嘗不可選用也合酌一方名草花湯甘草二錢赤石脂二錢糯米一撮水煎服一

劑腹痛除二劑喉痺止三劑利愈煩安何也蓋少陰之症乃脾胃之拂亂也故走下而便膿血奔上而傷咽喉今用甘草以和緩則少陽之火不上矣後以石脂固其滑脫又有糯米之甘以益中氣之虛則中氣不墜而滑脫無源而自止又何必用寒涼以瀉火而化膿血哉膿血既消于烏有而中焦又有何邪之作祟使心中悶煩乎故一用各症痊耳誰謂桃花甘草之湯不可選用哉

一冬月傷寒二日即自汗出咽痛吐利亥作入以爲太陰症也而不知不然此乃少陰腎寒之症也蓋傷寒初起宜無汗而反汗出者無陽以固其外故邪不出而汗先出耳其症實似太陰太陰亦有汗自除之條但太陰出汗因無陽而自泄少陰之出汗因陽虛而自越也夫少陰之邪既不出于腎經不能從皮毛分散勢必隨任督而上奔于咽喉咽喉之竅甚小少陰邪火直如奔馬因竅小不能盡泄于是又下行于大腸而下焦虛寒復不能傳送以達于肛門又逆而上冲于胃脘而作吐矣

方用溫腎湯人參三錢熟地一兩白朮一兩肉桂二錢水煎服一劑汗止吐瀉亦愈咽痛亦除矣此症乃下部

虛寒温其經可也。以參朮回陽肉桂是助命門之火。則虛火歸經。安于腎臟。又何必用熟地以補水耶。不知肉桂過于辛熱。未免有助雷火之虐。得以相制。則水火有既濟之功也。

一冬月傷寒。五六日腹痛。利不止。厥逆無脉。乾嘔而煩。人以爲直中陰寒。而不知非也。夫直中之病。乃冬月一時得之。身不熱而腹痛嘔吐發厥者爲眞。今身熱至五六日之後。而見前症。乃傳經少陰之症。非直中少陰也。雖傳經陰症可通治。直中之病。而辨症不可不清也。此傳經症。自宜用白通湯。加猪胆汁治之。夫本是陰寒之症。何以加入人尿胆汁之多事。不知白通湯乃純是大熱之味。投其所宜。反致相格而不得入者。宜藉人尿胆汁爲疏導之物乎。正因其陰盛格陽。用之以從治之爲得也。蓋違其性則相背。順其性則相安。然此等症往往脉伏而不見。服白通湯而脉暴出者。反非佳兆。必緩緩出者。轉有生機。以病乃眞熱也。藥乃假寒。亦取其相畏而相制。原有調劑之宜。不取其相爭而相逐。竟致敗亡之失也。

一冬月傷寒。四五日後。腹痛。小便利。手足沈重而疼。或欬。或嘔。人以為少陽症也。宜眞武湯救之。是矣。然用眞武湯之故。世人尚未知也。試言之。夫四五日腹中作痛。此陰寒入腹犯腎也。此時小便自利。則膀胱尚有腎氣之相通。可以消寒邪而從小便中出。倘小便不利。則膀胱內寒。無腎火之象矣。火微又何能運動于四肢乎。此手足所以沈重作痛也。火既不能下通于膀胱。引寒邪之下去。勢必上逆而為欬為嘔矣。眞武湯補土藥也。土健而水不能泛濫作祟。仲景製此方于火中補土。土熱而水亦温。消陰攝陽。其功有不可思議者矣

一冬月傷寒。四五日後。手足逆冷。惡寒身蹉。脈又不至。復加躁擾不安。人以為少陽陽絶也。而不知陰亦將絶矣。蓋惡寒身蹉。脈不至。陽已去矣。陽去而不躁擾。則陰猶未絶。尚可回陽以攝之也。今躁擾不安。是基址已壞。又何以回陽乎。然亦未可竟棄之也。人有一息尚存。當圖救之之術。以人之陰陽未易遽絶也。有一線之陽氣未泯。則陽有救。有一線之陰氣未泯。則陰可綴也。陰陽有根。原非後天有形之物。實先天無形之氣也。補先天之

氣而後天之氣不明續而自續矣用參附湯人參一兩附子二錢水煎服往往有得生者此方雖不能盡人而救之然既有此症寧用此方而無濟于生不可置此方而聽其死也況人參能回陽于無何有之鄉附子能奪神于將離未離之際使魂魄重歸陰陽再長原有奇功烏可先存必死之心哉願留意是方焉

一冬月傷寒六七日傳少陽而息高人以為太陽症未除而作喘非也夫太陽之作喘與少陰之息高似同而實殊太陽之喘氣息粗乃邪感也少陰之息高氣息緩而細乃眞氣虛不足以息息似高而非高也故太陽之喘宜散邪而少陰之息高宜補正何也因少陰腎宮火虛腎氣不能藏于氣海之中乃上奔而欲散至危症也用朝宗湯人參三錢麥冬三兩熟地三兩山萸一兩胡桃一枚破故紙一錢水煎服一劑息平二劑息定此方純用補氣填精不去治息而氣自歸源者氣得補有所歸也或曰下寒則火必上越此等息高獨非腎氣虛寒乎何以不用肉桂引火歸源也嗟乎腎氣奔騰實因腎火上沖所致然不用桂附者腎火必得腎水以相養不先

補腎水而濾助腎火則火無水濟而龍雷之火反上升。益不能收息矣所以先補水而不急補火也況故紙亦補火之味更能引火入于氣海又何用桂附之跳梁哉。

一冬月傷寒頭疼偏身痛宜麻黃發汗矣倘元氣素薄尺脈遲緩雖是太陽正治而不可輕用麻黃以汗之也人以為宜用建中湯以城郭不完兵甲不堅米粟不多宜守不宜戰耳然建中湯只能自守而不能戰而賊圍城城中又有奸細安能盡祛出之不知症是太陽傷營之病舍麻黃湯終非治法用麻黃湯加人參一兩治之則麻黃足以散邪而人參足以助正攻補兼施正既不傷而邪又盡出也或謂既是麻黃之症不得已而加參不識可少減參之分兩乎不知元氣大虛非多參則不勝任故必須一兩而後元氣無太弱之虞且能生陽于無何有之鄉可以禦敵排難逐北而無恐矣或曰既元氣大虛用參可矣何以又用麻黃麻黃似不可少得毋以之為君耶嗟乎以麻黃為君人參為佐必致僨事今用參一兩麻黃只用一錢是以參為君麻黃為佐正正奇奇並而用之此兵道通醫道也

一冬月傷寒吐下汗後虛煩脈微八九日心下痞硬脇痛氣上沖咽喉眩冒經脈動惕者必成痙症人以為太陽壞症也然而不止太陽之壞也傷寒經汗吐下之後症現虛煩者虛之至也脈又現微非虛而何宜有各症之見矣夫痙症責在陽明豈未成痙之前反置陽明于不治乎治陽明之火宜用人參石羔湯矣然既經汗下之後石羔峻利恐胃土難受火未退而土先受傷非治之得也用青蒿防痙湯人參一兩青蒿五錢半夏一錢陳皮五分乾葛一錢連服二劑胃氣無傷而胃火自敗諸症漸愈而痙症亦可免也蓋此症不獨胃火沸騰而腎肝之火亦翕然共起青蒿去胃火而散肝腎之火一用而三得之然非多參則青蒿力微不能分治于臟腑尤妙佐以陳皮半夏否則痰未全消而氣不能遽下痞硬脇痛何能盡除哉然青蒿瀉胃火恐勢單力薄復佐以乾葛共瀉陽明之火則青蒿尤能奏功況乾葛散邪而不十分散氣得參以輔青蒿尤有同心之慶也

一冬月傷寒譫語發潮熱以承氣湯下之不應脈反微澁是裏虛也仲景公謂難治不可更與承氣湯豈承氣湯

之固不可用平夫既以承氣下之矣乃不大便是邪盛而燥乾津液故脈澁而弱也非裏虛表邪盛之明驗乎倘攻邪邪未必去而正益虛故難治耳予有一法可以相救但可望回生而不能信其必生也用人參大黃湯救之人參一兩大黃一錢水煎服一劑得出大便而氣不脫即生否則死矣若大便而氣不脫再用人參三錢陳皮三分甘草三錢白芍一錢煎服二劑可慶生全也

一冬月傷寒發熱而厥厥後復熱厥少熱多病當愈既厥之後熱不除者必便膿血厥多熱少寒多熱少病皆未盡也夫厥少熱多邪漸輕而熱漸退也寒傷厥深而熱亦深何以厥少而熱反深乎此蓋邪不能與正氣爭正氣凌邪而作祟也如賊入人家賊不能敵主將欲逃遁主人欺賊之懦更加精神僕從奮力吆喝壯威正氣既旺邪氣既衰故病當愈也至既厥之後熱仍不除者如賊首既得餘黨尚未擒拿必欲搜尋盡殺賊無去路安肯自死必帶傷而戰賊雖傷而主亦不無焦頭爛額之損矣故熱勢雖消反不能盡散更堅其無生之氣雖不敢突入經絡必至走竄于腸門因成便膿血之症矣治

法。不必用大寒之藥以助祛除。只用和解之劑。賊自化爲良民。又何餘邪之作祟乎。方用散羣湯。甘草二錢　黃芩三錢　當歸五錢　白芍一兩　枳殼一錢　水煎服。一劑無便血者。斷無此災。已便血者必然自止。妙在用歸芍活血。加芩甘凉血而和血也。所以邪熱盡除。非單藉枳殼之攻散耳。至于熱少厥多。熱少寒多。無非正氣之虛。正虛則邪盛。邪盛則易凌正。正不敵邪。安得不病進乎。宜大補正氣。少加祛邪之味。自然熱變多而寒變少也。用祛邪湯。人參五錢　白朮一兩　甘草一錢　當歸五錢　柴胡一錢　附子一錢　水煎服。一劑而轉熱矣。二劑厥定。寒除矣。夫厥深而熱亦深。似消其熱即消其厥也。何以反助熱乎。不知此二症非熱盛而厥。乃熱衰而厥也。熱衰者正氣之衰。非邪氣之衰也。吾用人參歸朮以助正氣。非助邪熱也。正旺則敢與邪戰而作熱。一戰而勝。故寒與厥盡除也。加附子者。尤有妙義。參朮之內。未免慈仁倘不用附子將軍之藥。則仁而不勇。難成迅掃之功。且助柴胡之力。則無經不達。寒邪盡散。此以大勇而濟其至仁也

一冬月傷寒四五日後下痢手足逆冷無脈者人以爲厥陰寒症也灸之不温脈亦不還反作微喘人以爲死症不必治也而吾以爲可治者正因其無脈耳夫人死而後無脈人未斷氣其脈猶存今未死而無脈乃伏于中而不現非眞無脈也無脈固不可救脈伏而似于無脈安在不可救乎用灸以出脈今灸而不還宜氣絕矣乃氣不遽絕反現微喘此正生生之機也蓋脈既絕又何能因灸而喘喘者正其中有脈欲應其灸無如內寒之極只藉星星之艾火何能驟達是微喘也非脈欲出不能遽出之驗乎急用參附湯以助陽氣則脈自出矣但宜多用也人參二兩附子三錢水煎服一劑手足温二劑脈漸出三劑痢自止而愈矣夫附子有斬關奪門之勇人參有回陽續陰之功然非多用則寒邪勢盛不能陷陣突圍何能生之于無何有之鄉起之于幾微欲絕之際哉必須信之深見之到用之勇任之大始克有濟若徒用灸不施湯劑或少用參附皆無識而害之也夜臺號冤可不慎乎

一冬月傷寒身熱一日即發譫語人以爲邪傳陽明也誰

知其人素有陽明胃火風入太陽而胃火即沸然不靜乎若兼治陽明以瀉胃火治亦無差然太陽之邪正熾之火未必不引邪而入陽明反助其騰燒之禍也不若單治太陽使太陽之邪不能深入而陽明之火不治而自散耳用爭先湯桂枝三分麻黃一錢甘草一錢青蒿三錢天花粉一錢水煎服一劑身熱退譫語止矣此方少用桂枝多用麻黃者以寒輕熱重也以青蒿爲君者以其退熱又能散邪且又入膀胱而走胃既解膀胱之邪又解胃中之火不但不引邪以入陽明而且散邪以出陽明也加花粉者以譫語必帶痰氣花粉善消帶中之痰而無增熱之慮入于青蒿桂枝麻黃之內通上達下消痰而即消邪也痰邪兩消又何譫語之生乎所以一劑奏功也

一冬月傷寒身熱二日即有如瘧之狀人以爲傳少陽也誰知其人少陽之間原有寒邪一遇傷寒因隨之並見乎世見此症投以小柴胡亦能奏功然終非治也當重治陽明兼治少陽爲是蓋陽明火邪未散雖見少陽症

其邪仍留陽明也。邪留陽明身發寒熱而譫語發狂之病未必不因之而起。惟重治陽明。則胃中之火自解。使邪不走少陽。少陽原存之寒邪。孤立無黨。何能復煽陽明之焰。自然陽明火息。而少陽邪亦解也。方用破邪湯。

石羔三錢　柴胡一錢　半夏一錢　甘草一錢　麥冬一兩　元參二錢　茯苓二錢　陳皮一錢　水煎服。一劑身熱解。如瘧亦痊。此方妙在用石羔元參治陽明之火。尤妙以麥冬滋肺中之燥。蓋肺燥。即不能制肝胆之過旺也。且肺燥必取給于胃。胃土益枯。其火益熾矣。多用麥冬。使肺金得潤。不必藉于胃土。則肺金得養。自能治肝胆之木。而少陽之邪。何敢附和胃火以作祟乎。況柴胡原足以抒少陽之氣。而茯苓甘草半夏陳皮更能調和于陽明少陽之間。邪無黨援。安得而不破哉。

一冬月傷寒。身熱三日。腹滿自痢。人以爲陽傳于陰矣。而熟知不然也。夫陰症腹滿自痢。而陽症未嘗無之也。不辨其陰陽。而概用治太陰之法。鮮有不危者也。而陰陽終何以辨之。夫太陰自痢。乃寒極而痛也。少陽自痢。乃熱極而痛也。痛同而症異。必手按之而益痛。非若太陰

之痛手按之竟不痛也治法仍須和解少陽之邪不可悞治太陰也用加減柴胡湯柴胡一錢白芍五錢茯神二錢甘草一錢梔子二錢陳皮一錢當歸三錢枳殼五分大黃五錢水煎服一劑腹滿除二劑痢自止矣此方和解之中仍寓微攻之意分消之內仍兼輕補之思所以火邪易散正氣又不傷也若以大承氣下之未免過于推蕩若以大柴胡下之未免過于分消所以定此方以治少陽之腹滿自痢耳

一冬月傷寒身熱四日畏寒不已人以為太陰轉少陰矣誰知仍是太陰也夫太陰脾土也少陰腎水也似不相同然脾土乃濕土也土中帶濕則土中原有水象故脾寒卽土寒土寒卽水寒也所以不必邪傳于腎早有畏寒之症矣不必治腎只治脾而寒症自消也理中湯加減治之白朮一兩人參三錢茯苓三錢肉桂一錢附子一錢水煎服一劑惡寒自解身熱亦解矣夫用桂附似乎仍治少陰然以參朮為君則仍治脾而非治腎也雖然脾腎原可同治參朮雖治脾而亦能入腎況得附桂則無經不達矣然則治脾又仍治腎此方所以神耳

一冬月傷寒身熱五日即發厥人以爲寒邪已入厥陰也誰知乃腎水乾燥不能潤肝之故乎夫發厥本厥陰症邪未入厥陰何以先發厥蓋肝血極必取給于腎水而腎水乾枯因顧子而腎受風邪子見母之仇自然有不共戴天之恨故不必邪入厥陰而先爲發厥母病而子亦病也治法不必治肝胆只治腎而厥自定母安而子亦安也子母兩快湯熟地五錢麥冬五錢當歸二錢山萸三錢茯苓二錢茯實二錢山藥二錢元參五錢水煎服一劑厥定二劑身熱亦愈也此方純補腎惟當歸滋肝血也治腎而治肝在其中何必又用白芍以平肝氣耶但此不用白芍者以白芍雖平肝氣可以定熱厥于須臾然未免過于酸收與補水之品同用于無邪之日易于生精與補水之品同用于有邪之頃亦易于遏火不若單用補腎之味脾水足以制火又無火留之害爲更勝也故此方不用白芍而用當歸者以當歸性動不比白芍之酸收耳且又喜助奠熟以生水生水以滋肝即補腎以制肝也

一冬月傷寒身熱六日而汗不解仍有太陽之症人以爲

邪返于太陽也。誰知是邪欲返于太陽而不能乎。夫邪既不能返。似宜無太陽之症矣。宜不必治太陽也。然不治太陽則邪反有變遷之禍。蓋邪既不能復返于太陽。窺太陽之門而欲入者。亦勢所必至也。用太陽之藥。引邪歸于太陽。而太陽曾已傳過。邪走原路。邪反易散矣。方用桂枝湯以散之。一劑而邪盡化也。倘若多用桂枝湯。焦頭爛額不勝其祛除矣。此用藥之機權。不可不知也。

一冬月傷寒。至七日熱猶未解。譫語不休。人以為復傳陽明也。誰知是邪欲走陽明。陽明不受乎。夫陽明前已經見邪。見邪則拒。似邪之難入矣。而切膚之痛。已經備嘗。故邪再入太陽。惟恐邪之重入陽明也。所以震鄰之恐。先即號呼。而有譫語之生。非從前邪實而作譫語者之可比。治法不必前治陽明。以截陽明之路。只散太陽之邪。邪既散。斷不復入陽明也。用桂枝湯一劑而譫語自止。何必用石羔湯以重傷胃氣哉。

一冬月傷寒。至八日而潮熱未已。人以為邪再傳少陽矣。誰知是邪在陽明。欲出而未出乎。夫陽明多氣多血之

府也。氣血既多而藏邪亦不少。痰在胸鬲原能自發潮熱。不必假少陽經也。況邪又將出竅。伺少陽少陽前受陽明之貽害。堅辟以拒。未免寒心。故現潮熱之症。其實尚未入少陽也。治法不必治少陽之邪。而單解陽明之熱。熱解而少陽之邪自散矣。用解胃湯。青蒿五錢。茯苓二錢。甘草五分。麥冬三錢。元參五錢。竹葉五十片。水煎服。一劑胃熱解。二劑潮熱退。不必三劑也。此方息陽明之焰。又解少陽之氛。一方而兩治。若獨解少陽則陽明愈熾矣。倘獨息陽明而少陽又燥矣。兩陽有偏勝之處。則二腑必有獨乾之嘆。自然輕變爲重。而傳邪正無已時矣。今一方兩治。雖單治陽明。而少陽已在其中。所以收全功也。

一冬月傷寒至九日瀉痢不已。人以爲邪入太陰陽又變陰之症。誰知乃陽欲辭陰之病乎。何以辨之。夫變陰者陽傳入于陰也。辭陰者陽傳出于陰也。入陰則自痢。豈出陰反自痢乎。不知陰陽不相接。多爲瀉痢不已。但入陰自痢腹必痛。出陰自痢腹必不痛也。九日而瀉痢不已。腹不痛者。正離陰自痢也。切戒不可用太陰止痢之

藥若悞用之而輕邪入陰必成危症宜仍治少陽而解其表裏之邪則痢自止寒熱之邪亦散也小柴胡湯加減治之柴胡一錢茯苓三錢甘草一錢陳皮五分水煎服一劑即止寒熱頓除矣此方耑解半表半裏之邪又能分消水濕之氣既不入陰復善治陽故效捷耳

一冬月傷寒至十日惡寒嘔吐人以爲邪再傳少陰矣誰知是邪不欲入少陰何以惡寒嘔吐不知傷寒傳經而再入于太陰其中州之氣前經刻削則脾氣已虛脾既虛則脾必耗腎中之火氣而腎又當經邪犯在腎亦自顧不遑母貪而子不思盜母之財故邪入于脾甘自受先行惡寒嘔吐不待傳入少陰而始見此候也治法單治脾土而嘔吐可止然治脾而不治腎則腎火不生而惡寒終不能愈寒既不除則嘔吐暫止不能久也用脾腎兩温湯人參三錢白朮五錢肉桂一錢丁香三錢肉豆寇一枚茯實三錢山藥三錢巴戟三錢水煎服一劑惡寒止二劑嘔吐除也此方以參朮健脾巴戟山藥補腎丁桂闢除寒氣旺腎火以生脾土土氣自温母旺而子不貪亦母温而子不寒也

一冬月傷寒身熱十一日熱更盛發厥不寧一月而三四見人以爲邪再傳厥陰也誰知乃邪不能傳肝乎夫少陰寒水也邪在少陰未入厥陰何以發厥而見熱症然而此厥似熱而非熱也內寒之至逼陽外見而發厥故不待傳入厥陰之經而先發厥耳本是死症而用藥得宜未必至死仲景未嘗立方非無方也以神奇矣法示人以艾火灸少陰者正以不必治厥陰也然灸少陰者固易回春而方藥又安在不可起死哉用回生至神湯

人參 三兩 肉桂 二錢 白朮 二兩 生姜汁 一合 葱十條 搗汁同水煎服一劑厥止二劑身熱解矣此方之妙在用參朮之多若不佐以姜葱則不能宣發于外而邪伏腎中不得出也惟得姜葱之助導之出外不必走肝厥自安矣此治之巧者

一冬月傷寒身熱十二日熱仍不退不發厥人以爲傷寒至厥陰不發厥而熱自退矣誰知傷寒虛極欲厥而不可得乎夫熱深者厥亦深不厥似乎熱之不深矣然熱深發厥者元氣足以鼓之也熱深不厥者元氣不足以充之也傳經至十二日病已入肝而厥不應者非熱之

不深乃元氣之困也烏可因不厥而卽疑因之不熱乎宜補其肝氣輔以解熱之品則厥陰不燥而木氣邪不能留非但熱解而見厥抑亦邪散而消厥也用消厥散

白芍五錢人參一錢當歸五錢丹皮三錢炒梔子一錢生地二錢炒黑荊芥三錢天花粉二錢甘草一錢水煎服一劑厥發二劑厥定矣此方補肝涼血以治傳經傷寒世無其胆然肝燥而內熱因虛而厥伏者非滋肝中之血則熱深矣厥何能見外乎故必補虛而發厥隨乘之而散熱也人聞吾言可放胆治之矣

一冬月傷寒至十二日後忽厥去如死人一般但心中火熱四肢如氷有延至三四日身不腐者人以為尸厥也誰知是邪火犯包絡堅閉其氣以守護其心乎夫傷寒傳徧六經未有傳心者也一至傳心無不死者然邪得以傳心者亦因包絡之虛力不能障心使邪竟入也若包絡無虧邪雖直搗心宮而膻中膜帛足以相拒然三陰三陽俱為邪之所傳各各損傷包絡相臣出死力以禦賊號召勤王絕無一應惟有堅閉宮門甘與君王同殉至于各臟腑見君相號令不能宣揚于外自然解體

有國亡無主之象所以手足支體先冷也此時有斬關奪門之將掃除羣妖救君相于危亡之候自然外藩捍應不必聽旨宣召無不歸誠恐後矣治法助包絡之氣加以祛邪之味可返死爲生也用救心神丹人參一兩黃連三錢菖蒲二錢茯苓五錢白芍一兩附子一分半夏三錢水煎一碗以筆管通病人口中含藥送下無不受者一劑氣甦二劑心中火熱自解四體盡温矣夫厥症多熱四肢冷者正心中之熱如火也熱極反爲寒顫顫極而人死其實心未死也此方以人參固其生氣黃連清心中包絡之火邪妙在加附子一分爲先鋒菖蒲爲向導引參連突圍入于心中又得苓芍半夏平肝而不助火利濕消痰則聲援勢盛攻邪尤易也或疑用黃連清熱是矣何必助以人參而且如此之多不知六經遍傳以攻心則臟腑自虛多用黃連而不助之以參則有勇無謀必至斬殺過盛反傷元氣又有主弱臣强之患矣雖救君于頃刻不能衛君于崇朝不亦虛用奇兵哉

中寒門 共七則

人遇嚴寒之時忽感陰冷直入于腑手足身皆冷自色青

口嘔清水腹中雷鳴胸脇逆滿體寒發戰腹中覺有涼氣一衝直冲而上猝不知人事此寒直冲七腑也夫中寒與傷寒大相懸絶蓋傷寒之寒由表而入于裏中寒之寒由腑而入于臟雖入腑入臟同是直中之症而治法終不同也蓋入腑之寒輕于入臟而治腑之寒烏可重于治臟哉惟是腑有七而中腑之藥似宜分別然陰寒中人必乘三焦之寒而入温二焦之寒而七腑之寒可盡散也然三焦之所以寒者又由胃氣之虛也使温三焦而不補胃則氣虛不能接續烏能回陽于頃刻哉用救腑回陽湯人參五錢附子一錢肉桂二錢巴戟一兩水煎服此方以人參扶胃氣附桂回陽不必更藉已戟為君矣不知巴戟補心腎之火心腎火旺而三焦之火更旺矣且生胃氣而回陽故用之為君統人參附桂同心之將掃蕩祛除寓剿於撫之中也所以一劑奏功回陽而陰寒立散矣

人有嚴冬之時忽感陰寒唇青身冷手足筋脈攣急上吐下瀉必腹痛囊縮指甲青腰不能俯仰此陰寒中臟之病也夫中腑寒氣入于五臟似宜分臟而治

補也。蕩陰救命湯。人參一兩　白朮三兩　熟地三錢　肉桂一錢　附子三錢　山萸二錢　茯神三錢　水煎服一劑　陽回二劑全愈。何神速乃爾。蓋寒入五臟。由命門之陽外出。一回其陽則寒氣無留于臟矣。方中以參朮爲君。似乎只救心脾二經。雖附桂與熟同用。腎亦在所救之中。而肝肺竟付之度外。何以能斬關直入。回陽于頃刻也。不知五臟爲寒邪所犯。大約犯腎之後。即便犯脾。而後犯心也。犯肝肺者無多也。故前顧心腎脾而肺肝已在其內。況參附並用。無經不達。又安有不入肺肝者乎。且補肺

然亦不必分也。但温命門之火。則諸臟之寒可盡散。蓋命門爲十二經之主。主不亡。則肝木必不爲遊魂之變。主不亡。則肺金必不爲魄散之升。主不亡。則心君必不爲下殿之走。主不亡。則脾土必不爲崩解之阨。惟命門既寒。而陽氣爲陰邪所逼。越出于腎外。則五臟之神不能獨安。各隨陽俱遁矣。然則五臟爲寒邪所犯。不必治五臟也。獨温其命門。而五臟之寒可解。蓋命門爲五臟之主。而五臟氣虛。大兵到處掃蕩羣妖。苟無粮草。何以供命。以回陽哉。此命門之宜温。而五臟之氣亦不可不

肝無非收斂之劑欲祛邪而使之入乎倘用收斂之味以補肝肺反掣參附之手不能逞于蕩除矣此用藥不雜實有秘義也或曰收斂之味既不可以補肝肺豈莫熟又可補腎陰乎嗟乎又未可以並論也腎中水火原不相離用桂附大熱之味以回陽未免腎中乾燥與其回陽之後大補腎水以濟陽何如于用火之時先爲防微之爲得吾所以少用莫熟于桂附之中以制火之橫且火得水而歸源水招火而入宅故能奏既濟之功而無亢炎之失也

一冬月直中陰寒吐瀉交作身發熱者人以爲傷寒傳經症也雖是傷寒實有分別此乃直中少陰之邪而非傳經少陰之邪也夫直中少陰經原無身熱之症此何以身熱耶乃陽與陰戰邪旺而正不肯安于弱以致爭鬨而成熱也若傳經少陰之症必數日後始行吐瀉未有初感第一日即身熱而吐瀉者故此是直中而非傳經也直中邪即入裏傳經邪在表而入裏本自殊別不可不知也用人參附子茯苓湯人參一兩附子一錢茯苓五錢水煎服一劑吐瀉止身熱亦退何效之速乎不知此症

原因陽氣之弱不勝陰氣之盛故爾發熱吾助其陽陽旺而陰自衰又佐以附子則陽氣更盛自轉敗爲功矣且益以茯苓淡泄分消水氣則胃土得安上下無非陽氣之升降而陰邪又安能冲決哉

人有直中陰寒腎經獨受身顫手戰考人以爲寒入于骨中也誰知乃命門火冷不能外拒陰寒乎蓋命門爲十二宮之主宰人有此火則生無此火則死火旺則運用于一身而手足自温火衰則力不能通達上下而一身皆冷又何能温熱手足耶故命門火旺外來之寒邪可以相拒而不敢相犯惟火衰之極而陰寒內逼直入腎宮命門之火畏寒太甚有不敢同居之勢身顫者難以自主也手戰者難以自衛也治法即補命門使命門之火足以勝外來之寒則命門之火不弱而後陽氣健旺能通達上下陰消陽散不致侵犯心宮也用直中陰臟第一方治之附子一錢　肉桂二錢　丁香一錢　白术二錢　水煎服一劑而寒祛身手皆定矣此方盡是陽藥以補陽之品而治陰症自是相宜然至急症何以少用分兩而成功至神者因火欲外發一助火而火即回宮火因

弱而逃自必見强而返火既歸矣又有餘火以相助則命門火旺毋論足以祛寒寒邪以亦望火而遁也

人有少陰腎經感中邪氣小腹作痛兩足厥逆人以為寒邪直犯腎也誰知入腎而兼入于小腸之腑乎夫邪入腎是入臟也臟重于腑又何必辨其入小腸乎然辨症不清則用藥必至少效雖腎開竅于二陰又曰腎主大小便腎寒則小腸亦寒治腎則小腸亦愈而終不知腎與小腸同感寒邪也蓋寒客于小腸則腹痛而脈不通脈既不通安得兩足不厥逆乎不可認作寒入于腎而不入於小腸也温腎即所以温小腸矣用正逆湯附子一錢白朮三錢車前子三分吳萸三分水煎服一付痛除厥止矣此以附子祛寒吳萸通氣加白朮車前利腰臍而消濕雖治小腸實温腎也腎宮之命門熱而小腸氣化自行又烏有不通之病乎故不必治痛而痛除不必轉逆而逆定耳

人有猝中陰寒身不能動人以為寒中于脾也誰知仍中于腎乎夫中寒而致手足之不能動已是危症況一身乎蓋手足冷而不能動猶是四圍之病身僵而不動乃

中州之患也。危乎脾主手足而身則不獨屬之脾也。人非火不生。而火非心火。乃腎火也。腎火旺而脾土自運用於無窮。腎火衰而脾土難轉輪于不息。故腎寒而脾亦寒。身亦不能運動耳。所以治法不可獨治脾。必須治腎。尤不可統治腎而必須温腎中之火也。用直中陰臟第二方。附子一錢。肉桂一錢。熟地二錢。干姜一錢。水煎服一付。身動寒消矣。此用以桂附干姜直搗中堅。迅掃寒邪。則腎中命門之火勃然猝發而寒邪不知何以去也。然過用純陽。未免太燥。佐以熟地。陽得陰而生水。庶不致陽缺陰而耗水也。豈特相濟有成。僅免偏勝之虞哉。

人有猝犯陰寒之氣。兩脇痛極。至不可受。如欲破裂者。人以爲寒犯肝也。誰知仍犯腎乎。夫脇乃肝位。犯腎宜病在腎。不宜病在肝也。因腎寒而又畏外寒之侵。而腎之血乃逃避于肝子之家。受創身重。不敢復出也。在肝木因腎水遁入。忍見父母受傷而無復仇之念乎。自奮不顧身。怒極欲戰也。兩脇欲破。正木鬱難宣之象。治法以火慰其外。寒者少濟一時之急也。宜用寬肝湯以救之。

人參一兩熟地二兩附子一錢柴胡五分甘草三分肉桂三錢水煎服。一劑痛定矣。人見用參附回陽未必相疑。用熟地滋陰。不能無疑也。嗟乎。腎氣逼入肝宮而寒邪必乘勢以逼肝矣。肝氣一祛。非上走心。必下走腎矣。走心則引邪而上犯于心君。必有下堂之禍。走腎則引邪下侵于相位。必有同殉之虞。故用參以補心。使心不畏邪之犯。用熟地補腎。使腎不畏邪之侵。而肝氣瞻顧子母之間。兩無足慮。自併力以禦寒矣。況有助火舒水之品。而肝之鬱火解。故一戰奏捷也。倘用此全無一效。是心腎兩絕。肝氣獨存。又何能生哉。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library