PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑 卷之二

上函

丑部

中風　痺症

心痛　脇痛

頭痛　腹痛

腰痛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

C83/2796
V.2

山陰陳士鐸遠公著

中風門

人有入室向火一邊熱而一邊寒遂至左頰出汗偶而出戶遂爲賊風所攻覺右頰拘急口喎于右人以爲中風也而余以爲非中風實無風只和其氣血佐以解火之邊耳若作風治而中寒矣用和血息火湯升麻一錢當歸味則火平而喎自正矣

五錢 黃芪三錢 秦艽一錢 天花粉三錢 白芷

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

五分　桂枝三分　甘草一錢　麥冬三錢　元參五錢　水煎服。

一劑輕二劑喎正矣。此以補氣血爲先而輔佐多用陽明之味者何居。蓋陽明之脉起于鼻交于額中循鼻外入上齒中是兩頰與齒正陽明部位也升麻白芷乃陽明經藥也故用以引入齒頰而秦艽能開口噤也防風能散風邪也桂枝實表而固榮衛與歸芪元參麥冬同用自善通經絡而活腠腑矣使眞有風邪亦于何處存活況原無大風之犯不過些小之風自應效如桴鼓也。人有久利之後一旦昏仆手撒目瞪小便自遺汗大出不止喉作拽鋸聲人以爲中風也。余獨以爲不然此乃下多亡陰陰虛而陽暴絕也。本不可救然急灸其氣海之穴而陽氣得續亦有生者雖然陽氣回而不用補氣之藥陽氣隨回而隨絕也用獨參湯人參三兩　附子三分　煎湯灌之即不死矣夫氣海穴前與丹田相通乃生氣之源也故灸之而陽回非助之以人參則氣回于無何有之鄉而不能生生于無已徒爲接續又何益乎此參人有兩手麻木面亦麻者人以爲中風將現之症也誰知

乃氣虛不能運化夫血乎。夫頭乃六陽之經而面尤陽之外見也。氣旺則陽旺。氣衰則陽衰。陽旺則氣行夫血而面乃和。陽衰則氣滯于血而面乃木。面既木矣。陽衰可知。又何能運于十指間乎。無怪其十指盡麻也。治法補氣之虛。通陽之閉。麻木盡解也。用助陽通氣湯。人參三錢　白芷五錢　黃芪五錢　防風五分　廣木香二錢　蔻仁五錢　附子一分　烏藥二錢　茯苓二錢　天花粉二錢　水煎連服二劑。手木解矣。又二劑面木解矣。再二劑永不復發。此方大補氣。氣旺血行。何木之有。

人有身忽猝倒。兩目緊閉。昏暈不識人。人以中風之危症也。誰知絕非中風。乃心氣之絕乎。夫人身中未有不痰盛者也。痰盛則直走心經。而心氣之絕。則痰涎壅於膻中。不能開矣。膻中雖爲心君之相。痰之侵心。膻中先受。所以障心而使痰之不能入也。然則膻中本衛心以障痰。何反壅痰以害心乎。不知心氣既虛。而膻中亦虛矣。膻中既虛。只可障痰以衛心。力難祛痰以益心也。況痰氣盛。犯心甚急。膻中緊閉。膜膈使痰之不入。而心氣因之不通。不能上通于大。皆故目閉不識人也。宜急補其

君相之火。佐以祛痰之味。心氣一通。不必開目自開。人自識也。四君子湯加減以治之。人參一兩　白朮二兩　茯苓三錢　附子一錢　竹瀝一合　薑汁一合　菖蒲三分　水煎服一劑目開。二劑識人矣。此方以參朮救心氣之絕。然非假附子之力。亦不能破圍直入也。即用附子而不用竹瀝薑汁。則痰涎間阻。恐附子孤軍亦難於斬殺耳。佐以菖蒲者。借以向導。引附子達於心君易施祛之力也。

人有素性好飲。兩臂作痛。服祛風治痰藥更加麻木。痰涎益盛。體軟筋弛。腿膝拘痛。口噤語澁。頭目暈重。口角流涎。身似虫行。搔起白屑。人以為中風已成也。誰知乃脾氣不足乎。凡人後天之補益全借於飲食。飲食過多。反傷脾氣。脾氣一傷。又何能受益乎。況酒能散人真氣。小飲脾益。多飲則損。日日貪杯。則臟腑無非糟粕之氣。欲真氣之不傷得乎。故體軟筋弛。脾虛不能運也。痰涎益盛。脾虛不能化也。腿膝拘痛。脾虛不能行也。口噤語澁。脾虛氣難接也。頭目暈重。脾虛氣難升也。至於流涎起屑。一則脾虛不能攝。一則脾虛不能運也。以上諸症。皆

脾虛之故。不補脾氣。又烏能愈哉。加味六君子湯以治之。人參五錢　白朮一兩　甘草一錢半　夏一錢　陳皮五錢　附子三分　茯苓三錢　連服十劑而愈。六君子常治脾氣。又善治痰。然無附子。則不能走經絡。而通血脉。或疑白朮太多。不知白朮健脾。又善去濕。多用始利腰臍而升陽氣。陽氣不下陷。而脾得健。其運化之功也。

人有怒後吐痰。腸腹作痛。服四物二陳加芩連只売之類。杳無一應。更加祛風之味。反致半身不遂。筋漸攣縮。四肢痿軟。日晡益盛。內熱口乾。形體倦怠。人以爲中風於腑也。誰知乃鬱怒未解。肝氣未舒。所致。本無風症。治風反爲風藥所損。損氣傷血。以成似中風之病也。治法必尋其源。仍解其鬱怒。佐以補氣血之味。益陰益精之品。庶可救耳。舒怒益陰湯熟地一兩　當歸五錢　茯苓二錢　甘草五錢　白芍一兩　陳皮五分　麥冬二錢　柴胡一錢　丹皮三錢　白朮二錢　人參一錢　水煎服。十劑筋不攣矣。又十劑四肢不痿軟矣。後用六味湯大劑煎服。一月而半身皆遂矣。此逍遙散加味者也。用參熟麥丹於逍遙散中。實有妙義。蓋逍遙散爲解鬱聖方。鬱散而得補。補始

East Asian Library Princeton University Do NOT Copy Digital Collection

有功方中全在用白芍一兩以平肝氣肝平則木不剋土而土有生氣況又有健脾開胃之品以輔佐而相成所以反敗爲功也

人有懷抱鬱結筋攣骨痛喉間似有一核結住不下服烏藥順氣散等藥反口眼歪斜兩臂不能伸舉痰涎愈甚內熱脯熱人以爲偏枯之漸也誰知乃肝木之不舒乎夫木最忌無水木鬱則耗水矣水耗木更難舒木既不舒而木中之火又安得舒乎自然木來剋土而脾胃兩傷脾熱胃燥內自生風自現風象正不必外來之風入始現歪斜之症也治法自必補脾胃之土矣然徒補脾胃而木來剋土脾胃仍不舒也必須攄肝以扶脾胃之爲得耳用舒木生土湯白芍五錢茯苓三錢山藥一錢生棗仁二錢遠志一錢甘草五分白朮三錢熟地五錢麥門金一錢人參一錢麥冬二錢當歸二錢元參三錢水煎服此方心脾胃肺肝腎全治何以名之舒木生土不知方中雖兼治之品而實崇治肝木也治心者不耗肝也治腎者所以生肝也治肺者使不剋肝也治脾胃者使不伐肝也羣藥無非滋肝以舒木舒木矣而脾胃有不

得其天者乎。此舒木生土之名實、有微意耳。

人有一時猝倒。口吐痰涎。發狂號叫。自坐自起。立行自便。目不識人。身中發斑數日後便成瘡癰者。此謂眞中風也。蓋其人元氣未虛。一時爲風邪所中。正氣既盛。而邪氣又不弱。於是邪正相戰而不肯負於是而痰涎生。於是而狂叫起。心中如焚。坐立不安。目不識人矣。內熱既盛。必由內發外。故紅斑燦爛於皮膚。火毒難消於肌肉。因變爲瘡癰矣。治法不必助正。惟事祛邪。掃蕩賊風。正氣自安矣。方用掃風湯。荊芥五錢　防風三錢　半夏三錢

陳皮一錢　天花粉一錢五分　茯苓三錢　黃芩二錢　蘇葉一錢

水煎服。一劑狂定。二劑痰消。三劑斑化。瘡癰亦尋愈矣。

此症萬人中生一者也。人亦不知是眞中風症。吾特表出之。使人知眞中風之如此而類中風可照症治之也。

人素有內熱。一旦顛仆。目不識人。左手不仁。人以爲中風也。誰知非眞中風乎。此腎水不足以養肝。肝木太燥。木自生風而仆也。若作風治。鮮不立亡。卽作氣虛治。則陽旺而陰益消。亦非恰中病情。必須仍補腎水以生肝木。木得其養而左手不仁可愈矣。六味地黃湯加味以治

之熟地一兩山萸五錢山藥四錢茯苓三錢丹皮三錢澤瀉三錢白芍一兩白芥子三錢當歸五錢柴胡一錢水煎服一劑目識人矣四劑手知痛癢十劑全愈矣此非治中風之方今奏效者以其似中風耳六味滋其腎水歸芍平其肝木柴芥疎通肝氣消其兩脇之痰水足而木自達痰去而氣自通內熱頓除外體自適亦何左手之不仁哉

人有身忽自倒不能言語口角流涎右手不仁肌膚不知痛癢人以爲中風氣虛也夫氣虛則有之而中風則未也此乃心氣既虛不能行氣於胃胃氣又虛胃自生熱蒸其津液結爲痰涎塞隧道不能行氣於心即堵截神氣出入之竅故神明昏亂神明無生則舌縱難言廉泉穴開口角故流涎也一身能運者全藉氣以行之也今氣既大虛不能行於四肢則手自不仁右手尤氣之所屬也氣不行於肌膚則不知痛癢矣若作風治未有不死者即於補氣之中加入祛邪之味設或苟延性命亦必成半肢之風故半肢風皆候治中風而成之也宜用六君子湯加入附子治之人參一兩白朮二兩黃芪

二兩 半夏三錢 茯苓五錢 甘草一錢 陳皮一錢 附子一錢
水煎服一劑出聲二劑涎收連十劑全愈參苓芪朮乃
補氣聖藥加附子則遍達諸經之內豈但心胃相通使
痰涎之不壅塞乎所以奏功如神也
人有無故身仆肉跳心驚口不能言手不能動足不能行
痰聲如酣惟雙目能動者人以爲因痰中風嗟乎此痰
病而非中風也天下怪症多生於痰痰病多成於濕痰
濕結而不散往往有見鬼神而猝倒者此症無故猝仆
亦其一也人不知爲痰濕之氣一見身仆即呼爲中風
也悞矣然治此症不治痰而治風適足以招風而生變
即不治風而惟治痰痰亦不能消必大補氣血氣旺而
痰自化血盛而痰自去也用十全大補湯以治之人參
五錢 黃芪一兩 當歸五錢 白朮三錢 白茯苓
五錢 熟地一兩 川芎二錢 肉桂二錢 甘草一錢 水煎服
一劑口能言二劑心驚肉跳止三劑痰聲息十劑手能
動足能行又二十劑氣血重旺如無病之人矣此症世
人皆以風治多至敗事苟不治風惟補氣血斷不致變
生不測者也補虛則風自出十全大補湯愈中風者此

之謂也誰爲類中風症絕無風也如挾虛者必補虛而風始出也

人有一時猝倒痰涎壅塞汗如雨出手足懈弛不收口不能言囊縮小便自遺人以爲中風惡症誰知是陰陽兩脫乎此至急之症刻不可緩生死在反手之間也若作風治下口立亡用三生飲救之人參二兩 生附子二枚 生南星五錢 生半夏三錢 水煎服一劑囊縮伸小便止二劑口能言矣始可用別方也人疑此方過於猛烈不知病來甚暴非此斬關之藥何能直入臟腑而追其散失之元陽故必投於參中始可奪命於須臾也否則斬關奪門而不得入矣惟是關門既啟前方不可再用另用人參一兩 白朮二兩 茯苓五錢 當歸一兩 熟地一兩 山茱萸五錢 麥冬一兩 半夏三錢 水煎服方名濟急丹連服二劑元氣日旺虛汗不流手足可以運動無癱瘓之憂也如破城而守內無糧草則士有飢色今關門大開搬輸輓運皆糧草也兵馬有飽騰之氣賊自外遁矣倘仍用星附之屬未免過於酷烈民已歸城又用虎賁之士沿城搜索其損傷元氣不亦多乎故用歸熟萸麥資

陰之品。從前奪門之時。不無誅殺太甚。臟腑必有焦枯之苦。一旦得資財之濟。其樂爲何如乎。自然踊躍奮興。有手舞足蹈者矣。

人有口目喎斜。身欲顛仆。腹中鳴如囊裹漿之聲。人以爲中風之症。內有水濕之氣也。余以爲不然。夫水濕之氣。由脾氣之虛也。脾氣不能運化於水。水乃停積不化。不能下行。必涌而上行矣。於是涌於頭而作暈。涌於口目而爲喎斜。水氣既在上。則頭重足輕。故欲顛仆。似中風而實非也。用分水止鳴湯。

人參五錢　白朮一兩　車前子二錢　茯苓一兩　半夏二錢　水煎服。四劑腹鳴止。口目亦平復矣。此症原無風可祛。故不必祛風。只健脾土。土自能治水。又恐徒消膀胱之水。水冷不化。又補命門之火。以生土。土有先天之氣。益足以分後天之瀾。大地陽回。則膀胱不寒。雪消冰解。而無阻隔之嘆也。下流疎通。上游何患壅塞而成泛溢之害哉。或曰口目喎斜。實係風症。安在水氣能使之然也。不知水寒則凍。口目處於頭面之間。一經寒風。而成喎斜。似乎中風。然而風在外。而不在內也。風既在外。不入於腠理之中。又何

必加祛風之劑哉

人有猝倒後致半身不遂人以爲中風症萬人中間生一二者因治中風而成偏枯乎夫中風而治風乎原無風邪也豈可因一時猝倒卽認作中風因氣虛而猝倒此時用大補氣之藥少佐消痰之味焉有成偏枯之症惟過於祛風以耗其氣必致右身不遂或過於祛風以耗其血必致左身不遂矣夫猝倒之時本正氣不能主宰也乃不補氣而反虛其氣欲氣之周於身也何可得乎天下至悞者謂中風有中經中絡中臟中腑之分也自此言出人遂信風初中絡不可引之入經既中經不可引之入腑既中腑不可引之入臟於是諸般風藥雜然亂投而民生不可救藥矣臟腑經絡未嘗有風必頭强用風藥成偏枯之症猶爲幸也蓋臟腑既無風症卽是元氣未虛之人尙不禁風藥之侵耗況係羸弱之子搖搖靡定之身乎今不死亡而只成偏枯者亦因其於補正之中而用祛風之劑故猶存殘喘耳然則已成偏枯之症其可再用風藥乎方用全身湯

人參 二兩 白朮 二兩 茯苓 一兩 半夏 三錢 附子 三分 神

曲一錢 水煎連服四劑手足能舉矣再四劑步履如故身臂皆輕矣或疑偏枯非急症可比不必大用參朮不知猝仆之後非重用參朮則元氣不能驟復與其日後多用補劑零星期效何若乘其將危未絕之先多用而救之也

人有猝仆後遍身不遂手足不收者人以爲中風而成癱瘓也誰知乃血虛而氣不順也乎夫手得血而能握足得血而能步今不能握步正主於血虛耳然而氣血未嘗不相兼而行者使血虛而氣順則氣能生血血倘足以供手足之用今氣既不順是氣與血有反背之失欲血之蔭手足也得乎故不但手足不收且一身盡不遂也夫手足不收猶四隅之疾一身不遂實心腹之患也此所謂風痺症也名曰風痺實無風也四物湯加味治之熟地一兩 當歸一兩 白芍五錢 川芎二錢 人參二錢 半夏二錢 黃芪三錢 水煎服二劑知痛癢矣十劑能步履矣又十劑全愈若作中風治之則風藥必耗爍其血血乾氣益不順血益加虛必變爲棄人矣

人有猝仆于地不知人事人以爲中風重症也然非風也

乃氣虛不能接續耳既無口眼之喎斜又無手足之麻木全無風象若作風治必引風入室矣世人謂中風症必須塡塞空竅使風不能入矣今用風藥治無風之症安得不開其腠理哉腠理既開玄府大泄欲風之不入也得乎夫氣虛不能接續以致猝仆不知人事本是風懿之症未嘗內有風也必以中風治之愈矣二陳湯加參治之足矣人參五錢　甘草一錢　茯苓三錢　半夏三錢　陳皮一錢　水煎服一劑能知人二劑全可蓋不治風而反奏功也

人有一時猝仆狀似中風自汗不止懶言語人亦以為中風也誰知亦是氣虛乎夫猝倒有似中風更加自汗此虛症之極乃亡陽而非中於風也亡陽症必用參附以回陽始有生機倘用風藥治之有立亡而已矣參芪歸附湯救之人參一兩　黃芪二兩　附子三錢　當歸一兩　水煎服一劑自汗止二劑言語出四劑神氣復矣或曰猝倒後既無五絕之虛不過自汗之多與語言之懶耳似可緩治何藥品之多如此毋乃太急乎不知此症似輕而實重似緩而實急天下初病易於圖功久病難於着力

East Asian Library, Columbia University
Digitized by Google
COPY
the Gest Collection

況亡陽症元氣初脫有根易於重培無根難於再續必乘此將亡未亡之時大補其氣血實省日後無數之挽回也若畏藥品之多因循退縮坐失機宜及至後日百劑不效謂之何哉

人有身未猝倒而右手不仁言語蹇澁口中流沫人以為半肢風也然而非外來有風乃本氣自病所謂中氣之病也夫氣何以曰中其似中風而又非中風故別其名曰中氣其實乃因氣虛而非中風因氣虛故不中於左而中於右人身左屬血右屬氣也惟女子則右為血而左為氣今所言乃男子耳非氣虛而何可不急補氣乎

用至仁丹人參一兩白朮一兩黃芪一兩茯苓三錢半夏三錢肉桂二錢甘草一錢水煎服一劑語言清二劑涎沫止十劑不仁者愈矣此補氣之妙也或疑氣虛補氣可矣何又加消痰之味豈氣旺不能攝水氣盛不能化水耶至加肉桂助火不更多事乎不知氣虛者未有不脾胃寒也脾胃既難以變化水穀不變精而變痰矣故氣虛者痰盛痰即欺氣虛而作祟上迷心而旁及於手足故身欲仆手不仁口欲言而蹇澁流涎

East Asian Medical Library Digital Collection Do not copy

沫耳乃用參芪補氣蒼朮健土治濕則痰無可藏之經加半夏苡仁逐其已成之痰則未成之痰安能再成哉猶恐脾火久寒一時難以建功加入肉桂補命門之火則火自生土旺氣自醫蒸氣有根蒂臟腑無非生氣而經絡皮膚何至有不通之患哉

人有身未顫仆左手半邊不仁言澁口流涎人以為半肢風也然非風也乃血虛不能養筋脉有似乎中風耳夫中風病速易於奏功中血病緩難於取效耳蓋中風陽病中血陰症陽速而陰遲耳然得法亦不難也用生血

起廢湯葳蕤二兩熟地一兩山藥四錢當歸一兩茯苓五錢白芥子五錢水煎服一劑語言清十劑涎沫止三十劑不仁者愈矣愈後方中加入人參三錢黃芪五錢減當歸五錢又服二十劑如無病之人矣或疑葳蕤過於中和不若四物之流動雖白芥子能消膜膈之痰然用五錢未免太多起初口角流涎自宜多用後來似可少減何以始終多用耶不知血病多痰痰消始能補血況中血之病血虛之至膜膈之間無非痰也非多芥子斷不能消痰而不耗氣且助補血之味以

生血故始終必需但力少薄不比半夏貝母之功厚故不可用人也四物雖補血聖方而白芍非中血之宜川芎亦過於動故用歲並以其生血又能起廢同歸熟用之尤善建功實勝四物湯耳且歲難暫用難於取勝久用易於建功以治緩病寔有相宜今用二兩其力更厚用之爲君又相佐得宜故始終任之而收功也

人有頭面腫痛口渴心煩一旦猝中手足抽搐言語不清口目喎斜人以爲中風也誰知是中火乎夫火生於木之中火藉木風之力似乎中風而中火也不解其風火從何息嗟乎中火而祛風非所以治火也火所惡者水也祛風以息火火之熠少戢而根未除滋水以救火則火光自消火性盡滅是祛風治火不若滋水以治火也況中火症內寔無風用祛風之劑則毛孔盡開反足以通火之門路火之路開則風反得入之矣火得風威風特火勢本非中風欲不變爲風症不可得矣治法貴乎補水不必用祛風也方用滅火湯元參三兩沙參二兩白芥子三錢茯苓一兩熟地一兩山黃五錢麥冬五錢北五味一錢水煎服一劑心煩定二劑口渴除三劑語

言清四劑喎斜正十劑手足不搐矣蓋元參息浮遊之火益以熟地沙參山萸麥冬五味純是補水添精之味自然水足火衰何必用風藥以搜風哉儻於補水之中少加風藥則拘牽其手足水不去滅火而反去助風轉增火勢之燎原矣或曰不用風藥是矣獨不可用涼藥以解氛乎不知此火乃虛火而非實火也寔火可用寒涼而虛火斷不可用寒涼以增其怒也況元參微寒未嘗不於補中以瀉火又何必更用寒涼哉

人有一時猝仆手足牽搐口目喎斜然神思清語言如故人以為陽虛中風也而誰知不然夫陽虛猝仆未有不神昏者也今心中明了狀似陽虛而非陽虛此乃陰虛之中耳夫陰虛非血虛之謂蓋真陰虛腎水乾枯不能上滋於心故痰來侵心一時迷亂而猝中及痰氣既散而心清如故作中風治非治也即作中氣治亦非治法惟有直補腎中之陰則精足而腎自交於心心之液自流行於各臟腑而諸症自痊也方用填陰湯熟地四兩山萸二兩北五味三錢麥冬一兩山藥一兩牛膝三錢白芥子五錢破故紙一錢附子一分水煎服一劑搐除

二劑口目正連十劑平復如常矣夫黃熟山藥塡精妙藥麥冬五味益肺仙丹蓋單補水恐水難速生故又補肺使肺金以生腎水子母相資更易滋潤也又恐陰不下降用故紙牛膝下行以安於腎官則獨陰不致上干而眞陰自既濟矣加附子者以陰藥太多未免壅滯少加附子以行眞陰之氣非假之以助火也水得火之氣則水猶易生毋怪其奏功之奇矣

人有平居無恙覺手足麻木無口目喎斜等症人以爲風中於內三年後必有暈仆之症預服搜風順氣等藥以防猝中其論則是方則非也手足麻木乃氣虛非氣不順也卽氣不順亦非風作祟也人若中風其來甚暴何待三年後而發哉然氣虛何故能使手足之麻哉不知氣一虛卽不能化痰矣痰聚胸中而氣卽不能通于手足也治法於補氣之中佐以消痰之味則得之矣用釋麻湯人參一錢當歸三錢黃芪三錢白芥子一錢半夏一錢陳皮一錢白朮三錢甘草五分柴胡八分附子一分水煎服四劑手足不麻木矣儻仍麻木將方加倍再服四劑未有不愈矣蓋手足麻木四隅輕症原不必重治

之也。今人因不知症所以取效之緩。遂疑爲重症亂投風劑反致變動矣苟知是虛非風一治虛而風象滅矣。

又何難治之有

人有遍身麻木身又不仆狀似中風。然而風則有之而非中也。不可不治風而又不可直治風也。不治風則風不能出於軀殼之外。直治風則損傷氣血。風欵氣血之虛。反客爲主而不肯去。必於補氣血之中佐以祛風祛痰之品。則氣血不傷。風又易散也。方用解縛湯黃芪一兩　當歸五錢　人參五錢　附子一錢　白芍五錢　天花粉三錢　葳蕤一兩　白朮五錢　秦艽三錢　羌活一錢　水煎一連四劑。身知痛癢矣。十劑全可。同一麻木之症。何以上條用藥之少。而此條用藥之多。且重耶。蓋上條麻木只在手足。尚無風之入體也。此條麻木在遍身。是風乘虛入腑矣。不可同日語也。故上條可輕治而此條非重治。斷難奏效耳。

人有天稟甚厚。素好飲酒。一時怒氣相激。致成口目喎斜。有似中風。而未嘗身仆。且善飲食。脉洪大有力。此非風中乃火盛而肝傷也。此症西北人多。南人寔少。然治法

又不可徒泄火。而不養肝血也。方用解焚湯酒蒸大黃二錢　柴胡一錢　當歸一兩　白芍一錢　栀子二錢炒　水煎服此以大黃瀉火酒之毒。栀子泄肝木之火未免迅利。又用歸芍大補肝氣。蓋血足火自息也。尤妙加柴胡白芥子舒肝葉之氣。消膜鬲之痰。痰消而肝氣益舒。肝舒則風象自去。儻悞以爲中風妄加麻黃羌活等味。愈祛風而益動其火矣。或不去滋肝、反去補胃。則陽旺而氣盛。反來助火。肝中血燥。益足以增怒氣勢必火亢自焚而成猝斃矣。

人有猝中後手足流注疼痛久則麻痺不仁。難以伸屈。人以爲中風傷濕。以致風濕相搏。關節不通也。而不知不然。此症因先有水濕不知治元氣之衰。反去祛風利濕。以成似中風之症也。既因虛而成濕。又因濕而致中。不知治元氣之虛。尙可治風濕之旺乎。然風濕既已搏擊。乎一時但去補氣。而不祛風利濕。亦非救悞之道也。用兩利湯白朮五錢　茯苓五錢　薏仁一兩　人參一錢　甘草五分　白芍一兩　當歸一錢　肉桂三分　防風五分　半夏一錢　水煎連服四劑疼止矣。又十劑麻痺愈矣。再十劑屈伸

利矣方中補多於攻以防風散風而不用猪苓澤瀉以利水蓋因虛以成風濕既祛風何可復瀉其水況方中白朮苡仁未嘗非利水之品於補氣之中以行利水之法則水易流而無阻滯之虞水濕既去風獨難留故少用防風以表邪而孤立之風無水難於作浪不必多用風藥而風自除也

痺症門

人有兩足牽連作痛腹又微溏又不能屈足縮而不伸伸則愈痛人以為寒濕成痺也誰知乃風寒痰濕同結於大腸乎夫風入大腸日月大便邪似乎易下即有濕氣亦可同散何以固結於中而痛形於兩足乎不知寒邪入腹而留於大腸又得風濕相搏每不肯遽散因成痺耳必去風寒濕三氣之邪使不留於大腸而痺病可愈然徒治大腸之邪而風寒濕轉難去也又宜益大腸之氣令氣旺於腸中而轉輸倍速則風寒濕亦易祛矣方用逐痺丹

人參一錢　茯苓五錢　肉桂三分　升麻五分　甘草一錢　苡仁一兩　白朮五錢　神曲五分　水煎服一劑去濕二劑風寒散也此方治濕為多而治風寒反輕者蓋

水濕最難去也治其難而易者更易況治濕之中不傷元氣則大腸自有傳化之妙能使風寒隨濕同解也

人有嘔吐不安胸膈絕悶吞酸作痛因而兩足亦痛者人以為胃口寒也誰知乃風寒濕結於胃而成痺乎夫胃喜熱惡寒胃口一寒邪氣因之相犯矣風入於胃而不散濕停於胃而不行三者合而痺症乃成治法祛三者之邪而調胃氣胃氣健而三邪不攻自解也六君子湯加減以治之

人參二錢　白朮五錢　陳皮五分　甘草五分
肉桂五分　制半夏三錢　茯苓三錢　生姜五片　水煎服一劑輕二劑又輕三劑更輕連十劑飽悶酸痛盡除也此方開胃又善分消加之生姜荊芥又善祛散風寒以散其黨與故奏功特神也

人有心下畏寒作痛惕惕善驚懶於飲食手按之如有水聲嘔噦人以為水停心下也誰知乃風寒濕結於心包絡乎夫水邪犯心則痛風邪乘心則痛寒邪入心則痛是邪毋論風寒濕均能成病重則未有不死者今止畏寒則痛不致死亡正心包以障之也然心包既障心捍衛之勞心包獨當其鋒則心包安得不痛乎治法自宜

急祛三邪使無犯心包而心君相安何致心下之痛哉
然徒治三邪而不補心包之氣則心包太弱而外援之
師亦多相欺未必不附强敵反成覆亡之禍故必補心
包氣而治三邪也方用散痺湯巴戟五錢炒棗仁三錢
白朮五錢遠志八分山藥五錢蓮子五錢菟絲子三錢
茯苓三錢甘草三分柴胡一錢半夏一錢水煎服一劑
驚止二劑胃氣開三劑水聲息十劑心下之痛安然矣
此方似乎單治心也然心包爲心之相臣治心正所以
治心包耳如主君清明而相臣供職惟謹安反側於頃

刻也。
人有小便艱澁道濇如淋而下身生疼時而升上有如痂
氣人以爲疝或以爲淋而不知非也蓋風寒濕入於小
腸之間而成痺耳夫小腸主泄水也水出小腸何邪不
去而乃縮住不流蓋風與寒作祟也必須散小腸之風
寒而濕氣不難去也然治小腸必宜治膀胱之爲得膀
胱利而小腸無不利也雖膀胱亦有痺症與小腸之痺
正無差別故治小腸之痺必當以治膀胱者治之耳用
玫痺散白茯苓三錢苡仁一兩肉桂五分王不留行一錢

車前子三錢　白朮五錢　木通二錢　水煎服。數劑似淋不淋似痛不痛矣又數劑痛如失也此方利濕而不耗氣祛寒而風自散所以爲宜又何用逐風之品損臟腑也

人有一身上下盡行作痛有時而止痰氣不清欲嗽不能咽喉氣悶胸膈飽脹二便艱難人以爲肺氣不行也誰知風寒濕犯於三焦主氣而流通於上中下之間者氣也風寒濕感一而氣即不能宣矣況三邪搏結又安能自舒乎無怪二道閉塞而作痛也治法不祛三邪則三焦何以流通哉然治三焦必宜治腎腎氣旺而下焦之氣始通又宜治肺肺氣肅而上焦之氣始降尤宜治脾胃脾胃健而中焦之氣始化理肺腎脾胃之氣而益以散邪之味則三焦得令三邪不難去也方用理本湯人參一錢　白朮五錢　麥冬三錢　山藥五錢　肉桂一錢　巴戟天三錢　桔梗五分　貝母五分　防己三分　茯苓三錢　稀薟草一錢　芡實五錢　白芥子二錢　水煎服四劑上中下之氣乃通一身之病盡解又四劑諸症全愈此方扶肺腎脾胃之氣而輕於祛三邪者正所以理其本也理本而攻標在內矣況未嘗無蕩邪之藥故建功寔

神耳

人有胸背手足腰脊牽連疼痛不定或來或去頭重不可舉痰吐稠粘口角流涎臥則痰中有聲人以爲痺症也宜控涎丹治之而不知非也夫痺雖合風寒濕之邪以成之然人氣血不虛則三邪何由而入三邪之入亦乘氣血之虛而侵之也既因氣血之虛而入三邪烏可徒治其邪而不補正哉控涎丹用甘遂大戟以祛邪而無補氣血之藥用以治痺不能收功反致敗事者坐此弊也法宜補正助以祛邪則百戰百勝也方名補正逐邪湯白朮五錢　茯仁五錢　人參一錢　桂枝三分　茯苓一兩　白芥子二錢　水煎服一劑輕十劑全愈朮參苓皆健脾補氣之味又利水去濕之劑也雖曰三邪合而成痺其最多者濕也濕在經絡腸胃之間最難分化逐其濕而風寒不治自散所以佐桂枝三分而已足也惟是既用朮苓參朮以健土利濕倘痰哉然三邪每藉痰爲奧援故治痺必治痰今用白芥子膜間之痰盡消其各處之痰有不消者乎痰消而三邪無可藏之藪況正氣日旺哉或曰痺成於氣血之虛自宜氣血雙補矣何

以方中盡用氣分之藥。以益氣。絕不用血分之藥。以益血也。不知氣旺自能生血。血乃有形之物。難於速生。因循等待。有碍生氣之速。不若帶補氣而去三邪更捷也。人有飢肉熱極。身上如鼠走。口唇反裂。久則縮入。一身皮毛盡發紅黑。人以爲熱瘅也。夫風寒濕合而成瘅。未聞有熱瘅之謂。此乃熱極生風。似瘅而寔非也。解陽明之熱。少散其風。則得矣。不必更治濕也。至於寒邪尤不必顧。蓋寒則不熱。熱則不寒耳。用化炎湯元參一兩 麥冬五錢 甘菊花五錢 升麻三錢 生地五錢 羚羊角鎊五分 荆芥三錢炒 水煎服。連二劑熱少解。又四劑盡愈矣。此以玄菊地麥解陽明之火。更退肺金之炎者。以肺主皮毛也。然只治胃與肺。止散其在內之熱。不能散其外熱也。故以荆芥升麻導之出外。而不使其內留。以乱心君之神明。外既清涼。而內有不快然者乎。至羚角雖取其散火之毒。亦藉其上引入於唇口之間。使縮者不縮。裂者不裂也。或謂既是陽明火毒。何不用石羔知母。涼藥以瀉之。不知火熱外見於皮毛唇口肌肉之處。一用大寒大涼則直攻。其火必從下泄。不能隨升荆而外泄矣。

East Asian Library Princeton University DO NOT COPY Digitized by the Gest Collection

故不用知羔。而用玄菊。平補中表火之爲得也。

人有足膝疼痛行步艱難。自按其皮肉直涼至骨。人以爲冷痺也。夫痺而曰冷。正合風寒濕三者之旨也。此症雖三邪相合。而寒爲甚。蓋挾北方寒水之勢。侵入骨髓。乃至陰之寒。非至陽之熱。不能勝之也。然至陽之熱。又恐過於暴虐。恐至寒之邪未及祛。而至陰之水先已熬乾。眞水涸。邪水必然汎溢。邪水盛而寒風助之。又何以愈痺哉。用眞火湯。白朮 五錢 巴戟天 一兩 附子 一錢 防風 一錢 牛膝 三錢 茯苓 三錢 萆薢 二錢 水煎連服四劑。皮肉温矣。又四劑。骨髓熱矣。再四劑。膝脚痛去。又四劑。步履無難矣。妙在以巴戟爲君。補火仍是補水之味。而輔佐相宜。不用肉桂當歸之品。温其血分。寔有意義。蓋補氣則生精。最速。生精既速。則温髓亦速矣。若入血分之品。則沾濡遲滯。欲速不達矣。萆薢原忌防風。使相畏而相用。更復相宜。所以同羣共濟也。

人有肝氣常逆。胸肩引痛。睡卧多驚。飲食不思。吞酸作嘔。筋脉攣急。人以爲肝痺也。夫肝痺是矣。而所以成痺者。人知之乎。雖亦三邪成之。然亦氣血不足以成之也。肝

血不足而濕邪乘之肝氣不足而風邪乘之肝之氣血不足而寒邪乘之三邪直入於肝而後肝血益虧肝氣益耗於是肝之魂不能藏於肝之中乃越出而作驚也肝木既病何能生心心無血養又安能生胃氣胃氣不生自難消化飲食飲食不消而強飲食焉必致吞酸作嘔矣夫飲食所以養臟腑者也飲食既不消不能變精以分布於筋脉筋脉無養安得不拘攣哉然則治法可徒治三邪而不顧肝之氣血也用肝痺散人參三錢當歸一兩代赭石末二錢川芎五錢酸棗仁一錢羌活五分肉桂一錢茯苓五錢丹砂末五分水煎調二末仝服一劑驚止二劑胸高不痛肝氣不逆矣又四劑吞酸作嘔痙筋脉不攣急矣方中用歸芎生血妙矣尤妙在加人參益氣以開血引赭石去通肝氣以佐芎歸之不逮氣血開通而後邪可引而出又加肉桂辟寒茯苓濟濕羌活除風則邪自難留魂自不亂矣又益以棗仁丹砂收驚特速也

人有下元虛寒復感寒濕腰重痛兩足無力人以為腎痺也而腎痺之成非盡由於風寒濕也夫腎雖寒藏而其

中原日有火。有火則水不寒。而三邪無由而入。無奈人過於作強。將先天之水日日奔泄。水去而火亦隨流而去。使生氣之原。竟成爲藏氷之堀。火不能散寒而寒邪侵之矣。寒既直入於腎。以邪招邪。而風濕又相因而至。則痺症生矣。治法不必去邪。惟在補正。惟是補正者。補腎中之火也。然火非水不長。補火必補水。但補水恐增其濕。濕旺而風寒有党。未能遽去爲憂。而誰知不必憂也。夫腎水者。火中之水也。乃眞水而非邪水也。眞水衰。邪水始盛。眞水盛。邪水自衰。故補眞水而已足治邪水也。況水中有火。又何濕不去乎。夫難治者水邪也。水邪既去。而風寒不治自散矣。方用腎痺湯。白朮一兩 山萸五錢 茯苓五錢 苡仁五錢 杜仲三錢 肉桂一錢 地骨皮五錢 附子五分 防己五分 石斛二錢 水煎服。二劑腰輕。四劑疼止。十劑兩足有力。又十劑全愈。方中妙在補水之味少。去濕之味多。於水中補火。則火無大炎之患。於水中祛濕。則濕無大利之憂。寒濕既去。而風又安能獨留哉。又有防己之祛邪。故三邪所以盡去也。

人有欬嗽不安。心高窒塞。吐痰不已。上氣脹滿不能下通。

East Asian Library Digitization Project
DO NOT COPY
Property of the Gest Collection
Princeton University Library

人以爲肺痺也。然亦知肺痺之成於氣虛乎。夫肺爲相傳之官。治節出焉。統一身之氣。無經不達。無臟不傳。是氣乃肺之充。而肺乃氣之主也。肺病則氣病。氣病則肺亦病。肺痺則氣痺也。然則治肺痺者。烏可舍氣而不治乎。但肺雖主氣。而補氣之味。不能直入於肺也。必須補脾胃之氣。以生肺氣。然而生肺。只有脾胃之土。而剋肺者有心焉。仇肺者有肝焉。耗肺者有腎焉。一臟之生。不敵衆臟之剋。此氣所以易衰。而邪所以易入也。且脾胃之土。又能暗傷肺金。蓋飲食入胃。必由脾胃之氣。以轉入於肺。今脾胃既受三邪。邪亦隨脾胃之氣。輸之於肺。而肺乃傷矣。況多怒而肝氣逆於肺。多慾腎氣逆於肺。肺氣受傷。而三邪遂填塞肺竅。而成痺矣。方用肺痺湯。

人參 三錢　白茯苓 三錢　白朮 五錢　白芍 五錢　蘇葉 二錢
半夏 一錢　陳皮 一錢　枳殼 三分　黃連 二分　肉桂 三分　神曲 五分　水煎連服二劑而嗽安。又二劑而窒塞開矣。用十劑諸症盡痊。或謂人參助氣。是矣。但多用恐助邪氣。何以用之咸宜乎。不知肺氣之虛。以成痺。非肺氣之實。以成痺也。人參畏實不畏虛。況有蘇葉治風。半夏消濕。

肉桂祛寒邪又何能作祟哉而且苓朮健脾開胃白芍平肝連桂交心腎則肺氣自安自然下降正不必陳皮之助矣

心痛門

人有久患心疼時重時輕大約飢則痛重飽則痛輕人以為寒氣冲心也誰知乃虫傷胃脘乎蓋心為寧靜之宮客熱客寒之氣皆不能到儻寒氣犯心人立死矣安能久痛乎凡痛久不愈者皆邪犯心包與胃口耳但邪犯心包與胃口暫痛而不常也斷無飢重飽輕之理若虫飢則虫上行而無食充飢則虫身上攛口齧胃脘之皮若心痛而實非也不殺虫而止痛何能止乎化虫定痛湯生地二兩 水煎汁二碗入白薇二錢 煎汁一碗淘飯食之非吐物如蝦蟆即瀉虫如守宮也大凡胃中濕人多生虫飲食倍常者亦有虫此方殺之皆效不但治心痛之虫也蓋生地殺虫於有形白薇殺虫於無形合用之殺虫最神虫死心痛自除非生地白薇之能定痛也

人有一時心痛倏又不痛已而又痛一日十數次飲食無

碍日夜不安。人以爲虫也。而不知不然。夫虫痛必非一日而成者也。豈有無端一時心痛者乎。或曰。此火也。夫火則終日痛。必不時痛時不痛也。然則何痛乎非火。非虫乃氣虛而微感寒濕之邪。冲心包而作痛。邪不冲心包卽不痛也。夫心痛也。而此卽古人所云。去來痛也。痛無補法。而獨去來痛必須用補。不補虛而痛不能止。然徒補而不加祛寒祛痰之味。亦不能定痛也。去來湯人參三錢　茯苓三錢　蒼朮三錢　白朮五錢　甘草二錢　川烏二錢　半夏一錢　水煎服。一劑痛止。二劑不再發。此以二朮爲君。最有深意。蓋痛雖由於氣虛。畢竟濕氣之侵心包也。二朮去濕。又健脾胃之氣。故用以佐人參茯苓補氣。以利濕。濕去而氣更旺也。氣既旺矣。而川烏得直入心包。以逐其寒邪。半夏得行於中脘。消其敗濁之痰。甘草和緩調停於邪正之間。所以奏功敢捷也。人有心痛之極。若不欲生。日夜號呼。涕泗滂沱。人以爲火邪作祟也。然致火邪犯心者何故。蓋因肝氣之鬱而不舒。木遂生火以犯心矣。我今闡其秘奧以傳世。夫心屬火。而火不可極。火極反致焚心。往往自焚而死者。故

心火之旺。正爲心之所惡。又得肝木之助。則心不能受。必呼救於四鄰而不可得。有無可如何之勢。自然涕泗交垂不能止矣。肝木又係鬱火正火盛而鬱火逆尤非心之所喜。故入心而心不受。心雖不受而火勢太旺。又不能遏抑。欲直入心宮。雖心宮謹閉。似難直入。而心包又重重掩護。宜未易焚也。然肝之鬱火。乃龍雷之火也。每從下而上沖。霹靂之威振開天門。火光所至。焚林燒木。天地爲之動蕩。又何能止遏哉。此肝木之沖心。所以直愛其害也。必須瀉肝木之火。又必須解木氣之鬱。少佐以安心之劑。心痛自止也。用救痛安心湯。白芍一錢炒梔子三錢甘草一錢柴胡二錢貫仲二錢乳香一錢沒藥一錢蒼朮三錢水煎服。一劑痛定。二劑全可矣。亦何神乎。不知柴芍最解肝鬱。梔貫最瀉肝火之暴。乳沒最止臟腑之痛。甘蒼和中消濕。輔佐得宜。故二劑而奏功也。

人有眞心痛。法在不救。然用藥得宜。亦未嘗不可生也。其痛不在胃脘。亦不在兩脅。恰在心窩之中。如虫咬蛇鑽。不特不飯。飲水亦不可入。手足氷冷。面目青紅者是也。

眞心痛原有二症。一寒邪犯心。一火邪犯心也。寒犯心者乃直中陰經之症。猝不及防。立刻身死。死後手足盡紫黑者甚則一身俱青。非藥所能救。亦至急而不暇救也。若有人參一二兩。附子三錢。急煎救之。可以望生。否則必死。若火犯心者其勢雖急而猶緩。可以覓藥。故不可不傳方以救人也。余所言正火邪犯心也。何以辨其寒熱。蓋寒邪舌必滑。熱邪舌必燥。耳儻知爲火熱心痛。卽以救眞湯救之。炒梔子 三錢 炙甘草 一錢 白芍 一兩 廣木香末二錢 石菖蒲 一錢 水煎服。一劑痛止。不用二劑也。但痛止後必忍飢一日。永不再發。或謂眞心痛宜以黃連直治心火矣。何以不治心而仍治肝也。不知肝爲心之母。瀉肝木之氣。則肝不助火。而心氣自平。瀉肝木正善於瀉心火也。儻直瀉心心必受傷。雖暫效於一時。而脾胃不能仰給於心火。則生氣遏抑。必至中脘虛寒。變成他症矣。此黃連所以不用。反用梔子也。

人有患心疼。百藥治之不效。得寒而痛。得熱而痛。人以爲熱而非止熱。以爲寒而非止寒。蓋非心痛。乃胃痛也。既曰胃痛。何以偏在心而不止也。不知寒熱俱能作痛。不

可執諸痛皆火之言。疑心痛盡是火而非寒也。夫熱能作痛而寒何以作痛耶因寒熱相擊而痛生矣。夫寒熱不並立寒熱同乘於心胃之間。寒欲凌熱。熱不肯相讓。熱欲欺寒寒不肯相安兩相攻戰勢均力敵。治心則胃氣受傷治胃則心氣受損投以治寒治熱而兩無一效。也宜兩治以解紛而心痛自愈。方用雙治湯附子一錢黃連一錢白芍五錢甘草一錢水煎服。一劑全愈。用黃連以清心火附子以祛胃寒。妙在以白芍甘草爲君。使兩家有和解之好。蓋白芍甘草最能入肝平木。肝木既平。自不去剋胃。又去生心。調和心胃之間。實有至理存焉。豈漫然用之者哉。

人有心痛不能忍氣息奄奄。服姜湯少安。手按之能忍。日輕夜重。痛時幾不欲生。人以爲寒痛也。用熱藥可止片時而仍痛。何故。蓋寒有不同也。凡人心君安靜。由於腎氣之通心也。腎氣不交於心而寒邪中之。心遂不安。儻徒去其寒。不補其腎。則腎虛而火不能下。熱於腎中。卽腎虛而水不能上交於心內矣。此治心必須治腎。而補腎中之火以救心。尤必須補腎中之水以救腎也。用補

水救火湯。熟地一兩 山藥三錢 白朮五錢 肉桂一錢 水煎服一劑痛止二劑全愈。十劑永不再發。此方絶非治心痛之方而用以治心腎不交之心痛實有奇功。蓋腎中水火不交而邪直犯心矣。吾補腎中之水火水得眞火以相生。火得眞水以相養。腎中之陰陽既濟。則心腎之陰陽又安得有氷炭之乖乎。故不必引其上下之相交而腎氣自通於心。心氣自降於腎。如夫婦之好合矣。邪亦烏能間之。況原無寒邪哉。奏功實奇。

脇痛門

人有兩脇痛。經年月不愈。或時少止。或又作痛。痛時身發寒熱。不思飲食。人以爲肝經病也。然肝經既以成病。尙未知其故。大約得之氣惱者爲多。因一時拂鬱。欲怒不敢。忍耐吞聲。一種不平之氣。未泄。肝氣鬱而胆氣亦鬱。胆鬱則不能取決於心中。心中作熱。外反變寒。寒熱交蒸。肝血遂淤塞不通。停於兩脇作痛矣。儻境遇順適。則肝氣少舒。其痛猶可忍也。若聽不入耳之言。觸動其怒氣。前之怒氣則前病頓興。病且更重矣。治法必解其怒氣。

要在平肝。平肝實有法也。用遺怒丹。白芍二兩 柴胡一錢 甘草一錢 乳香末一錢 廣木香末一錢 桃仁十粒 生地三錢 白芥子二錢 枳殼三分 水煎服。一劑痛輕。四劑痛止。十劑痛除矣。夫平肝之味。舍白芍無第二味可代也。人不知其功效。不敢多用。故不能取勝。用至二兩。則力大倍於尋常。自然舒其肝氣。況助以柴胡之疎泄。甘草之調劑。桃仁白芥以攻其敗瘀。乳香廣木以正其疼痛。安得不直搗中堅。散其敵壘哉。

人有橫逆驟加。一時大怒。叫號罵詈。以致大痛於兩脇而聲啞者。人以為怒氣傷肝矣。然其人必夙有火性也。此人肝脉必洪大而無倫次。目珠必紅。口必大渴。呼水舌必乾燥開裂。急用平肝瀉火之藥。方舒其暴怒之氣。儻藥稍遲。觸其怒氣。有吐血傾盆之患矣。用平怒湯。白芍三兩 丹皮一兩 當歸一兩 炒梔子五錢 炒黑荊芥五錢 花粉三錢 甘草一錢 香附三錢 水煎服。一劑氣少舒。二劑氣大平。三劑痛如失。不必四劑也。蓋肝性最急。怒則其氣不平。白芍以平其氣。甘草緩其急。肝氣既平而且緩。而後可散其氣。而瀉其火矣。當歸次以散之也。荊芥

引而散之也。梔子丹皮涼以瀉之也。然徒散其火而火為痰氣頭緒則散火而未能遽散。故加香附以通其氣。花粉以消其痰。君臣佐使無非解紛怒氣雖盛有不自知其解而解者矣。或疑藥劑太重涼藥過多。誰知其人素係有火又加大怒則五臟無非熱氣苟不用大劑涼藥。又何以平其怒而解其火哉。

人有跌撲之後兩脇脹痛手不可按入以為瘀血作祟也。用小柴胡湯加龍胆草青皮等味而愈。次年而佐脇脹痛仍以前方治之不效。蓋瘀存於中積久而不散。久而成痛也。夫小柴胡乃半表半裡之藥。豈能入肝以舒木而脇乃肝之部位。宜於取效。而不效者。以小柴胡止能消有形之活血。不能散有形之死血也。血活易於流動行氣而瘀滯可通。血死難於推移。行氣而沉積難化。必用敗血之味以下死血。而痛可除也。用抵當丸以水蛭蝱虫有形之毒物。庶易下有形之死血耳。服一劑。必便黑血而愈。愈後用四物湯加減調理之。熟地一兩　白芍一兩　丹皮三錢　川芎一錢　當歸五錢　三七根末三錢　水煎服。四物湯補血之味也。既下死血。何以又補血乎。不

知死血既久在肝肝經已無生氣不補血則肝舍空虛未必不因虛而成痛惟補血則死血方去而血則生肝氣快樂何有再痛之患乎然則補血可也又加三七根以止血者何居恐水蛭虻蟲重過於下血萬一死血行而活血隨之而下不徒補於無益乎所以於補中止之得補之益而無下之失始成萬全之功也

人有右脇大痛腫起如覆杯手不可按按之益痛人以為肝火也誰知是脾火內伏瘀血存注不散乎夫血瘀肝位而肝必剋脾脾受肝剋則脾亦隨肝而作痛然無形之痛治肝而痛可止有形之痛治脾而痛始消今作痛腫正有形之痛也此瘀血積脾中礙而不舒乘肝部之隙因外腫於右脇耳治法必通脾中伏熱下其瘀血痛可立除也用敗瘀止痛湯大黃三錢桃仁十四粒當歸三錢白芍一兩柴胡一錢黃連一錢厚朴二錢甘草一錢水煎服一劑瘀血下二劑腫痛盡除矣此方妙在大黃柴胡黃連全用能掃瘀血開欝逐水迅速而無多瀦之苦然非多用白芍則肝氣難平而脾中之熱受制於肝正不易散是病在脾而治仍在肝也

人有貪色過於泄精又兼惱怒因而風腑脹悶兩脇作痛人以爲色慾損腎怒氣傷肝理宜兼治而不知兼治之中尤當治腎也蓋肝爲腎之子腎足肝氣易平腎虧肝血多燥肝惡急補血以治其急不若補水以安其急也況肝血易生而腎水難生所以肝血不足輕補肝而木得其養腎水不足非大補腎則水不能長然則房勞之後脇痛虧於精者更多烏可重治肝而輕治腎哉用填精益血湯熟地一兩山藥五錢地骨皮三錢白芍五錢當歸三錢柴胡一錢丹皮二錢沙參三錢白茯苓一錢白芍三錢水煎服一劑肝氣平二劑脇痛止連十劑全愈此方重補腎以填精輕舒肝以益血妙在治肝腎之中復去通腰膂之氣氣利而兩脇有不同利者乎故精血生而痛止耳

頭痛門

人有頭痛連腦雙目紅赤如破如裂者所謂眞頭痛也一時暴發法在不救蓋邪入腦不得出也然邪在腦不比邪犯心與犯五臟也治之得法亦有生者蓋眞頭痛雖必死之症非卽死之症也予傳一奇方以救世世可無

頭痛之患豈特救一人而已哉方用救腦湯辛夷三錢
川芎一兩細辛一錢當歸一兩蔓荊子二錢水煎服一
劑即止、細辛蔓荊治頭痛之味也然不能直入於腦內
得辛夷則引入之矣但三味皆耗氣同川芎用之雖亦
得愈然過於辛散邪氣散而眞氣亦散矣故加入當歸
之補氣血則氣血周通於一身邪自不能强留於頭上
矣邪既不留而痛有不愈者乎予所以合用之也
人有頭痛如破走來走去無一定之位者此酒後當風而
卧風邪乘酒氣出入而由中之也酒氣既散而風邪不隨

酒俱散遂留於太陽經而太陽本上於頭頭爲諸陽之
首陽邪與陽氣戰故往來於經絡之間作痛也病既得
之於酒似宜兼治酒矣不知用解酒之味必轉耗眞氣
而痛益不效也不若直散風邪反能奏功之速用救破
湯川芎一兩細辛一錢白芷一錢水煎服一劑即止不
二劑也川芎最止頭痛非細辛不能直上於巔頂非白
芷不能盡解其邪氣而徧達經絡也然他藥未嘗不可
止痛而大傷元氣不及川芎散中有補之妙也
人有頭痛不十分重遇勞遇寒遇熱皆發儻加色慾則頭

岑岑欲卧此少年不慎酒色又加風入腦而得之者也
人以頭疼藥治之而不效者何也蓋此症得之腎勞無
腎水以潤肝則肝木之氣燥木中龍雷之火時時沖擊
上升巔頂故頭痛且暈也治法宜大補腎中之水也少
益補火之品使水足以制火而火有歸源自然下引入
於腎宮火有水養則龍雷之火安居於腎自不再升於
上而爲頭痛也用加減八味地黃湯熟地一兩山茱萸
五錢山藥五錢茯苓三錢丹皮三錢澤瀉三錢肉桂一錢
川芎一兩水煎服二劑痛輕十劑全愈然後去川芎而
加歸芍各五錢又服二十劑不再發矣蓋六味湯補精
之聖藥肉桂引火之神品川芎治頭痛之靈丹全用之
所以奏功惟是頭痛在上焦補腎中之水乃下焦也
何以治下而愈上且如川芎陽藥也何以入至陰之中
偏能取效不知腦髓與腎水原自相通補腎而腎之氣
由河車直入於腦未嘗相格也川芎雖陽藥然能補腎
而入於巔頂既可入於巔頂獨不可入於腦內乎況加
肉桂以助命門之火火亦陽也同氣相合故能同羣共
濟入於腦中又能出於腦外使宿邪老疾盡行祛散而

腎中之水火又復既濟火永藏肝下焦何至有上沖之患使頭痛而暈乎十劑後去川芎者以頭痛既痊何必用之以耗眞氣所以改用歸芍腎肝同治使木氣無乾燥之憂龍雷永藏於腎宅尤善後之妙法儻人倦服藥改湯爲丸可也

人有患半邊頭痛或左或右大約痛左者爲多百計治之罔效人不知其故此病得之鬱氣不宣又加風邪襲之於少陽之經遂至半邊痛也痛有輕重者大約遇順境則痛輕遇逆境則痛重更加以風寒則大痛矣痛之既久則眼必縮小十年之後必至壞目而不可救矣治法急解其肝胆之氣雖風入少陽似乎解宜在胆耳然胆肝而爲表裡治胆者必須治肝況鬱氣先傷肝而後胆肝舒胆亦舒也用散偏湯白芍五錢川芎一兩柴胡一錢郁李仁一錢香附二錢甘草一錢白芷五分白芥子三錢水煎服一劑卽止不必多服夫川芎止頭痛者也同白芍尤能平肝之氣以生肝血肝血生而胆之汁亦上矣胆汁生則胆無乾燥之苦而郁李仁白芷自能上助川芎以散頭風矣又益以柴附開鬱白芥消痰甘草

調和滯氣則肝胆盡舒風於何藏故痛除也惟是一劑後不可多用者頭疼既久不獨肝胆血虛而各臟腑之陰陽盡虛也若單治肝胆之舒暢未免消除眞陰風雖出於骨髓之外未必不因勞因感而風又入於骨髓之中矣故奏功之後必改用補劑如八珍湯者治之爲善後之計也

人有遇春而頭痛者日夜不得休息昏悶之極惡氣惡風寒不喜飲食人以爲中風寒之故者而不知非也內經云春氣者病在頭氣弱之人陽氣內虛不能隨春氣上升於頭上故頭痛而昏悶也凡有邪在頭者發汗以散表邪則頭痛可愈今因氣微不能上升是無表邪也無邪發汗則虛其虛矣而青陽之氣益難上升氣既不升則陽虛而勢難外衛故惡風寒氣弱而力難中消故憎飲食耳治法補其陽氣則清氣上升濁氣下降內無所祛外亦自固也用升清固外湯黃芪三錢人參二錢白朮三錢炙甘草五分陳皮三分當歸二錢白芍五錢柴胡一錢蔓荊子一錢川芎一錢花粉一錢水煎服一劑痛減二劑病愈此補中益氣之變方去升麻用柴胡俾入

調和滯氣則肝胆盡舒風於何藏故痛除也惟是一劑後不可多用者頭疼既久不獨肝胆血虛而各臟腑之陰陽盡虛也若單治肝胆之舒暫未免消除眞陰風雖出於骨髓之外未必不因勞因感而風又入於骨髓之中矣故奏功之後必改用補劑如八珍湯者治之爲善後之計也

人有遇春而頭痛者日夜不得休息昏悶之極惡氣惡風寒不喜飲食人以爲中風寒之故者而不知非也內經云春氣者病在頭氣弱之人陽氣內虛不能隨春氣上升於頭上故頭痛而昏悶也凡有邪在頭者發汗以散表邪則頭痛可愈今因氣微不能上升是無表邪也無邪發汗則虛其虛矣而青陽之氣益難上升氣既不升則陽虛而勢難外衛故惡風寒氣弱而力難中消故憎飲食耳治法補其陽氣則清氣上升濁氣下降內無所祛外亦自固也用升清固外湯黃芪三錢人參二錢白朮三錢炙甘草五分陳皮三分當歸二錢白芍五錢柴胡一錢蔓荊子一錢川芎一錢花粉一錢水煎服一劑痛減二劑病愈此補中益氣之變方去升麻用柴胡俾入

肝提其木氣也木主春升木以應春氣則木不陷於肝中自然清氣上升於頭況參芪歸芍無非補肝之味氣旺而上榮亦氣旺而外固又何頭痛之不愈哉

人患頭痛雖盛暑大熱之時必以帕蒙首而頭疼少止苟去帕少受風寒痛即發而不可忍人以為風寒入腦也誰知氣血兩虛不能上榮於頭乎夫腦受風寒藥餌上治甚難用祛風散寒之味益傷氣血而病不愈也古人用生萊菔汁灌鼻者以鼻竅通腦中萊菔開竅而分清濁故用之可愈頭風也然單用以取勝不若佐以生姜汁之更勝也蓋萊菔祛腦中之風是其所長祛腦中之寒是其所短二物同用則姜得萊菔而併可祛風萊菔得生姜兼可治寒也其法用萊菔汁十分之七生姜汁十分之三和勻令病人口含涼水仰卧以二汁灌鼻中至不能忍而止必眼淚口涎齊出痛立止也後用四物加羌活藁本甘草服數劑調理斷不再發此治法之巧者

腹痛門

人有腹痛欲死手按之更甚乃火痛也但火痛不同有胃

火脾火大小腸火膀胱火腎火不可不辨也胃火者必多汗而渴口臭脾火則不然必走來走去無一定之處大腸火者大便必閉結肛門必乾燥後重小腸火者小便必閉澁而若急腎火者則强陽不倒口不渴而面赤水竅澁痛是也既知火症之分明然則因症分治自然不差然各火各方未免紛紜我有一方治火痛無不可共治也方名導火湯元參一兩 生地五錢 車前三錢 甘草一錢 澤瀉二錢 水煎連服二劑諸痛盡愈也夫火之有餘者水之不足也玄參生地滋陰妙品滋陰則陽火自除況又益以車前澤瀉之滑利甘草之調和尤能導火解氣化有事爲無事儻知爲胃火而加石羔知爲脾火而加知母知爲大腸火而加地榆知爲小腸火而加黃連知爲膀胱火而加滑石知爲腎火而加黃柏尤效之極也

人有終日腹痛手按之而寬快飲冷則痛劇此乃寒痛也寒痛不必分別臟腑蓋命門火衰而寒邪留之也夫命門爲一身之主命門寒而五臟七腑皆寒矣故治寒痛者只消温其命門之火然命門之火不可獨補必須兼

治脾胃脾得命門之火以相生胃得命門之火以相長況火土相合變化生焉然又不可止治土也蓋土之仇者肝木也命門助土而肝木乘之則脾胃之氣仍爲肝制不能發生必須治肝使木不剋土而後以火生之則脾胃之寒邪既去而陽氣升騰濁陰銷亡於烏有土木無戰剋之憂而腸腹享安靜之樂矣方用治肝益火湯。

白芍三錢　白朮五錢　茯苓三錢　甘草一錢　肉豆蔻一枚　肉桂一錢半　夏一錢　人參三錢　水煎服。一劑痛減半二劑痛盡除矣方中乃六君子加減皆助脾胃之陽氣加入白芍則能平肝木又加肉桂温命門之火則火自生土而肉蔻復自煖其脾胃則寒邪不戰自走也。

入有腹痛得食而減遇飢則甚面黃體瘦日加困頓此腹內生虫也夫虫之生也必有故或因飢食難化生物而不消渴飲寒冷之湯而不化以至久變爲虫有之然虫生腸胃之內亦因其可生而生之者可變而變之也儻陰陽氣旺虫即驟生亦即隨滅安能久據其腹而成巢長蝕人血而作疼哉惟陰陽氣衰不能運化於一身而虫乃生之矣其初食物後將飲血而不可止及至飲血

East Asian Library Digitization Project
Gest Collection
Princeton University Library

而腹痛之病作然則烏可單殺虫而不培陰陽之氣血乎用衛生湯人參三錢　白朮五錢　白薇一錢　甘草一錢　檳子十個切片　梹榔一錢　史君子十個　干葛二錢　水煎服一劑腹反痛二劑痛除矣服藥後尤痛者拂虫之意也切戒勿飲茶水犯之只可殺虫一半不能盡殺之也若禁茶水半日則虫盡爲水從大小便趁出方中妙在用參朮爲君以升陽氣陽升而虫不能自安必頭向上覓食所佐者盡殺虫之藥虫何能久與藥戰而不受及者哉若飲茶水則虫得水翻波躍浪變化躑躅以遂其

跳梁反得於死中求活矣虫根未除雖暫時寧貼久則痛如故也

人有腹痛至急兩脇亦覺脹滿口苦作嘔吞酸欲瀉而又不可得此氣痛也用寒熱補三方治之皆不效蓋肝木氣鬱下剋脾土土畏木剋而陽氣不敢升騰因之下行無可舒泄復轉行上而作嘔彼此牽掣而痛已多時也治法必須疎肝氣之鬱而加之升脾胃之陽氣則土不畏木之侵凌痛自止也逍遙散加減以治之柴胡一錢　白芍五錢　白朮一錢　甘草一錢　白茯苓三錢　陳皮一錢

當歸二錢　神曲一錢　水煎服二劑痛止矣此方解鬱而
此痛又須緩圖不必用重劑而施霸道再服四劑可收
全功予所以不另立方也

人有多食生冷燔炙之物或難化之品存於腹內作痛者
手按之必痛甚不許人手按往往痛欲死此食積於腸
閉結而不得出有燥屎之故也法亦逐積化滯非下之
不可然下多亡陰又不可不防也夫人能食者陽旺也
能食不能化者陰衰也使陰旺之人何物不能消化焉
有停住大腸之理必陰血不能潤於大腸陽火禁爍而
作祟遂致大腸熬乾留食結爲燥屎而不下也燥屎不
下則陰陽不通變成腹痛宜於滋陰之中佐以祛逐之
味則陰不傷而食又下也用逐穢湯當歸尾五錢　大黃
三錢　甘草一錢　枳實一錢　丹皮三錢　水煎服一劑燥屎
下腹痛除不二劑也此用大黃枳實逐穢加入當歸丹
皮補血生陰得下之之功而無下之之損攻補兼施復
何患亡陰哉

人有腹痛從右手指冷起漸上至頭如水凌由上而不腹
乃大痛已而遍身大熱熱退則痛止或食或下食者或

過於食而皆痛初則一年一發久則一月一發發久則旬日一發也用四物加解酲之味不應用四君子加消積之品又不應用二陳加消痰破氣和中之藥亦不應人以爲瘀血也誰知乃陽氣太虛乎夫四肢爲諸陽之末而頭諸陽之首也陽虛則惡寒陰虛則惡熱陽虛而陰來乘之則發寒陰虛而陽往乘之則發熱蓋寒熱分於陰陽之勝負耳今指冷而上至於頭陽不敵陰以失其健運痛乃大作也痛作而熱者寒極而變熱也及其寒熱兩停陰陽俱衰兩不相鬬故熱止痛亦止也治法

單補其陽陽旺而陰自衰況陽旺則氣自旺氣旺則血自生氣血兩旺而陰陽又何致爭戰作痛哉方用獨參湯八參一兩陳皮八分甘草一錢水煎服數劑痛輕十劑痛除矣夫獨參湯補氣之藥也張夫子曰血虛氣弱以參補之故用而止痛也或曰四君子亦補氣何以用之不效蓋四君有茯苓白朮以分人參之功不若獨參之功出而力大況前又佐以消積之味無積而用消積人參只可救失耳何能成功哉

腰痛門

人有兩腰重墜如帶三千文不能俯仰人以爲腰痛夫腰痛不同此病乃因房勞行役又感風濕而成之者也既是房勞行役以傷腎必須補腎宜矣然愈補腎而腰愈疼者何故蓋腰膂之氣未通風濕入腎而不得出故也法宜先利腰膂之氣以祛風利濕而後大補腎中之水火則腰輕可俯仰矣用輕腰湯白朮一兩　茨仁一兩　白茯苓五錢　防己五錢　水煎連服二劑腰輕矣此方全利濕不去治腰又妙在利腰膂之氣一方而兩治也然此方不可多服者以腎可補而不可瀉防己多用必過泄腎邪腎有邪可用泄藥至邪已去而仍用之必至無邪可祛反損正氣矣必須另用補腎之味而前方不可再用也三聖湯杜仲一兩　白朮五錢　山萸肉五錢　水煎服此方較前不同補腎中水火之路則俯仰之間無非至適也

人有動則腰痛自覺其中空虛無着者乃腎虛腰痛也夫腎中有水火之不同未可以腎虛一言了之也經謂諸痛皆屬於火獨腎虛腰痛非火也腎中有火則腰不痛惟無火所以痛耳然則治腎虛腰痛宜補腎中之火耳

然火非水不生徒補火而不補水則火無水制火難驟生而痛不可遽止必須於水中補火而水火既濟腎氣足痛自除也方用熟地一兩杜仲五錢破故紙一錢白朮五錢水煎連服四劑自愈熟地補腎水也得白朮利腰膂之氣而熟地不至呆補杜仲故紙補火以止腰痛者也得熟地則潤澤不至乾燥有太剛之慮調劑相宜故取效最捷耳

人有腰痛日重夜輕小水艱澁飲食如故者人以為腎虛也誰知乃膀胱水閉乎膀胱為腎之腑膀胱火盛則水不能化而水反轉入於腎中膀胱太陽之經也水火雖犯於腎經而病終在陽不在陰也故不治膀胱而治腎用補精以填水或用添薪以益火適足以增腎氣之旺然陰旺而陽亦旺腎熱而膀胱亦熱膀胱之水不流而膀胱之火益熾必更犯腎而腰痛何能痊乎方用寬腰湯車前子三錢苡仁五錢白朮五錢茯苓五錢肉桂一分水煎服一劑膀胱之水火泄二劑腰痛頓寬也夫車前茯苓以利膀胱之水苡仁白朮以利腰膂之氣兩相合而兩相利則膀胱與腎氣內外相通加肉桂一分得肉

Digitized by the Harvard-Yenching Institute
East Asian Library
Do Not Copy
Please contact us for permissions

桂之氣。尤易引腎氣而外歸於膀胱。以直達小腸。從陰器而盡泄也。水既外泄。反不入於腎。則腰痛猶有不愈之理乎。

人有大病後。腰疼如折。久而成爲傴僂者。此濕氣入腎。悞服補腎之味。而成之也。夫腰痛明是腎虛。補腎正其所宜。何以用塡精補腎。不受其益。反受其損乎。不知病有不同。藥亦有各異。大病後腰痛如折者。乃脾濕非腎虛也。脾濕當去濕而乃用熟地山藥一派滋潤。雖非刻削之味。而濕以加濕。正其所惡。故不但無益。而反害之也。

世人不悟。以爲補腎之劑。尙少用之也。蓋加其分兩則濕以助濕。腰骨河車之路。竟爲汎濫之鄉矣。欲不成傴僂也得乎。用起傴湯。茯苓三兩　白朮二兩　黃芪一兩　防風三分　附子一分　水煎服。日一劑。服一月。腰輕二月。腰可伸矣。服三月。全愈。此方利濕。又不耗氣。氣旺則水濕自消。加入防風附子於芪朮之中。有鬼神不測之機。相畏而相使。建功實奇。萬不可疑藥劑之大而少減其品味。使不得爲全人也。

人有跌打閃挫。以至腰折。不能起床。狀似傴僂者。人以爲

腰痛也而不可作腰痛治然腰已折矣其痛自甚又何可不作腰痛治哉或謂腰折而使之接續其中必有瘀血在內宜乎於補腎補血之中少加逐瘀活血之味爲當似未可只補腎也而不知不然夫腎有補而無瀉加逐瘀之味必反傷腎臟矣折腰之痛內傷腎臟而非外傷陰血也活血之藥不能入於腎中皆不可用而必須獨補腎也惟是補腎之劑少用不能成功方用續腰湯熟地一斤白朮半斤水數大碗煎遠服數劑腰如舊矣夫熟地原能接骨不止補腎之功也白朮善通兩臍之氣氣通則接續更易但必須多用爲神矣使加入大黃白芍桃仁紅花之味則反敗事若恐腰痛而加杜仲破故紙胡桃等品反不能收功矣

人有露宿於星月之下感犯寒濕之氣腰痛不能反側人以爲血凝少陽胆經也誰知是邪入骨髓之內乎夫腰乃腎堂至陰之宮也霜露寒濕之氣乃至陰之邪也以至陰之邪入於至陰之絡故搐極而作痛惟是至陰之邪易入而難散蓋腎宜補而不宜瀉散至陰之邪必瀉至陰之眞矣然得法亦正無難也用轉腰湯白芍一兩

Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

杜仲五錢　防已五分　肉桂一錢　蒼朮三錢
羌活五分　桃仁五粒　水煎服。一劑痛輕。二劑痛止。此方以白朮爲君者。利濕而又通腰膀之氣。得杜仲相佐。則攻中有補。而腎氣無虧。且益以巴戟肉桂。以祛其寒。蒼朮防已以消其水。更得羌活桃仁逐其瘀血。行其滯。雖瀉腎實補腎也。至陰邪既去。而至陰之眞無傷。故止痛如神耳。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library