PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑 卷十一 下函

戊部

帶門　血枯　血崩
調經　受妊　妊孕惡阻
安胎　小産　鬼胎
難産　血暈　産後諸證
下乳

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2796
v.11

辨證氷鑑卷之十一

山陰陳士鐸遠公著

帶門

女人有經年月下流白物。如涕而垂。不能禁止。自然而下。甚則臭穢。所謂白帶也。夫帶俱是濕氣。以帶名者。因女人有帶脉不能約束。故以帶名。帶脉通於任督之脉。任督病而帶脉亦病。帶脉止女人有之。乃束胞胎之系也。女人無帶脉。則胞胎不堅。難以繫胎。故帶脉弱而胎易墜。帶脉損而胎必不牢。然帶脉損傷。非但跌閃挫氣已

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

也。行房過于縱送。飲酒過于顛狂。雖無痛苦。而其中暗耗。則白物自下。故帶病。尼師。寡婦。出嫁之女多。在閤未破瓜之女少也。加之脾虛肝鬱。濕氣之侵。火氣之逼。安得不成帶下哉。白帶者。濕盛火衰。肝鬱氣虛。則脾土受傷。濕土之氣下陷。是以脾精不守。不能化爲榮血。而變白滑之物。由陰戶直下。欲禁止不可得也。治宜大補脾胃之氣。少佐以舒鬱之味。使風木不閉塞於地中。則地氣自升於天上。脾健而濕氣自消也。用完帶湯。白朮一兩　蒼朮三錢　甘草一錢　山藥一兩　車前子三錢　陳皮五分　人參二錢　白芍五錢　柴胡六分　荊芥五分　半夏一錢

水煎服。六劑全愈。此脾胃肝同治之方。寓補於升之中。寄消於散之內。開提肝木之氣。則肝血不燥。何至下尅脾土。補脾土之元。則土不濕。何難分消水氣。至兼補胃者。脾與胃爲表裏。脾非胃强。則脾弱不能旺。然則補胃正所以補脾也。

有帶而色紅者。似血非血。所謂赤帶也。亦是濕病。濕宜見黃白之色。而見赤者。火熱之故也。火色赤。故帶下亦見赤色耳。惟帶脉系於腰臍間。近至陰之地。不宜有火。豈

East Asian Library and the Gest Collection
PROTOCOPY
Princeton University Library

其路通命門而腎中火出而燒之耶不知帶脉不通腎而通肝女人憂思傷脾又加鬱怒傷肝于是肝火內熾下尅脾土脾土不能運化濕熱之氣蘊結帶脉之間而肝火焚燒肝血不藏亦滲于帶脉之內帶脉又因脾氣之傷約束無力而濕熱之氣隨氣下陷同血俱下似血非血其寔血與濕不能兩分之也世人以赤帶屬之心火者悞也治法清肝中之火扶其脾氣庶可愈乎清肝止淋湯白芍一兩　當歸一兩　阿膠三錢　生地五錢　丹皮三錢　黃柏一錢　牛膝二錢　黑豆一兩　香附一錢　紅棗十

個水煎服四劑全止十劑永不再發此方但補肝血全不利脾之濕者以赤帶火重濕輕也夫火之所以旺者由于血衰補血足以制火矣且水與血合而成赤帶不能辨其似濕非濕則濕竟化爲血矣所以治血可也何必利濕哉此方妙在純治血而少加清火故奏功獨奇倘一利濕反引火下行更難遽效耳或問前云助其脾土今但補肝木絕不補脾何也不知以白芍平肝則肝氣得舒自不下尅脾土是補肝正所以扶脾又何必加參朮之多事哉

有帶下色黑者甚則如墨汁其氣最腥人以爲下寒極也誰知火熱之極乎夫火色宜紅何以成黑不知火極似水乃假象也其症必腰疼小便時必如刀觸陰戶之口必發腫面色必紅久則黃瘦飲食必兼人口必大渴飲涼水少快此命門火與膀胱三焦火合胃火又旺四火同煎安得不熬乾而成炭色也不致發狂者以腎水與肺金之氣涓涓不絕足以潤心濟胃耳所以飲水下胃但成帶症火結于下而不上炎也治惟瀉火爲主火退而濕熱自舒也利火湯大黃三錢白朮五錢茯苓三錢車前子三錢劉寄奴三錢炒梔子三錢王不留行三錢黃連三錢石羔三錢知母二錢水煎一服小便通二服黑變爲白矣又六劑全愈此方未免過于迅利不知火盛之時用不得依違之法少爲迂緩則火勢延燒不盡不止矣今以連梔知羔一派寒涼瀉火入于大黃之中則迅速掃除又得王不留行寄奴利濕甚急無停住之機佐以苓朮車前速成既濟之功也

有帶下色黃者如黃茶濃汁其氣帶腥人以爲脾經濕熱也誰知任脉濕熱乎夫任脉本不能容水如何濕氣入

Post Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

于中而化黃帶乎不知帶脉橫生通于任脉任脉直上走于唇齒唇齒之間原有不斷之泉下貫任脉使任脉無熱則口中津液盡化爲精以入腎中矣惟有熱存下焦則津不化精而化濕夫水色白而火色紅今濕與熱合欲變紅而不能返白而不傳煎熬成汁因變爲黃色矣黃乃土之色眞水眞火合而成丹邪水邪火合而成帶也世以黃帶爲脾之濕熱單去治脾所以難痊也用退黃湯山藥一兩　芡寔一兩　黃柏二錢　車前一錢　白果十枚　水煎服四劑全愈此方兼治白帶而治黃帶尤奇

蓋山藥芡寔補任脉之虛又能利水加白果引入任脉更爲便捷奏功甚速也黃柏清腎中之火腎與任脉相通同心共濟解腎中火即解任脉之熱矣

有帶下而青色者甚則如菉豆汁稠粘不斷其氣亦腥人以爲小腸濕熱也誰知肝經濕熱乎夫肝屬木木色青帶下如菉豆汁明是肝木之病但肝喜濕水亦濕也似非肝之所惡何以成青帶之症不知水雖爲肝之所喜而熱寔爲肝所惡以所惡者合之所喜必有違其性者矣肝性既違肝氣必逆氣欲上升濕欲下降兩相牽掣

Bristol Library Project on Univ. Gest. Collection

以停住中焦之間。於是走于帶脉。從陰門而出。色青綠者。正以其乘肝木之氣也。逆輕者。熱必輕而色青。逆重者。熱必重而色綠。似乎治青易。而治綠難。然而無難也。解肝中之火。利膀胱之水。帶自愈矣。逍遙散加減治之。茯苓五錢　甘草五分　陳皮一錢　白朮五錢　炒梔子三錢　柴胡一錢　白芍五錢　茵陳三錢　水煎服。二劑色淡。四劑盡愈。不多劑也。逍遙散解鬱之方也。何以治帶如是之神乎。蓋肝經濕熱留之者。肝氣逆也。今解肝之逆氣。逆氣平。則濕熱難留。況加茵陳利濕梔子清熱。肝氣清涼而青綠帶何自來乎。倘只治青帶。惟以利濕清熱爲事。置肝氣于不問。安有止帶之日哉。

血枯門

女人有年未七七。而經水先斷者。人以爲血枯經閉也。誰知是心肝脾氣鬱乎。凡人血枯。安能久延人世。醫見月水不行。謂爲血枯耳。寔非血枯。乃血閉也。且經水非血也。乃天一之水。出之腎經之中。至陰之精。而有至陽之氣。故色紅赤似血。而非血也。世人以經水爲血。此千古之悞。倘果是血。何不名之曰血水。而古昔至聖。創呼經

DO NOT COPY
Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

水者。以水出于腎經。故以經名之。無如世人沿襲。不思其故。而皆視之爲血也。然則經水早斷。似乎腎水衰涸。而吾以爲心肝脾氣鬱者。何故。蓋腎水之生。不由於三經。而腎水之化。寔關於三經也。腎非肝氣之通。則腎氣不能開。腎非心氣之交。則腎氣不能上。腎非脾氣之養。則腎氣不能成。倘三經有一經之鬱。則氣不入于腎中。而腎氣即閉塞不宣。況三經同鬱。而腎水眞足。尙有格格難出之狀。今腎氣又虛。何以搆精盈滿。化月水而外泄耶。此經所以閉。有似乎血枯耳。治法。必散三經之鬱。大補其腎。仍補三經之氣。則精溢而經自通也。益經湯。

熟地一兩　白朮一兩　山葯五錢　白芍三錢　生棗仁三錢　當歸五錢　丹皮二錢　沙參三錢　柴胡一錢　杜仲一錢　人參二錢

水煎服。八劑經通矣。服一月。人健。經不再閉。而易受孕。此心肝脾腎同治之方。妙在補以通之。散以開之也。倘徒補。則鬱不開而生火。倘徒散。則氣益衰而耗精。若用攻堅之味。辛熱之品。不但無益。反害之也。

有室女月水不來。腹大如孕。面色乍紅乍白。脉乍大乍小。人以爲血枯經閉。誰知災鬼憑身乎。凡人心正則邪不

Digitized by Google
Original from Harvard University, Ohio Center for Research Libraries

能侵心邪則邪自來犯或精神恍惚而夢裏求親或眼目昏花而日中相狎或假托親屬而暗處貪歡或明言仙人而靜地取樂其先未嘗不詫爲奇遇不肯告人後則羞爲淫褻不敢告人矣久之人身精血僅足以供腹中之邪邪日旺而正日衰必至經閉血枯而後已欲導其經則邪據其腹而難通欲生其血則邪飲其精而血難長似胎非胎似瘕非瘕往往有因循等待成爲勞症至死不悟者治法似宜補正以祛邪然邪不去補亦無益也必先去其邪而補正爲得耳蕩邪湯桃仁三十粒雷丸三錢大黃三錢當歸五錢丹皮五錢生甘草二錢水煎一服必下穢物半桶再用補正湯止之白术五錢蒼术五錢茯苓三錢陳皮一錢苡仁五錢甘草一錢貝母一錢水煎服四劑脾胃氣轉經血漸行矣前方去邪後方補正有次第也或疑身懷鬼胎必傷其血所以血枯經閉今既墮其胎乃不補血反補胃氣者何故若鬼氣中人正氣之虛可知且血不能驟生補氣自易生血二术善補陽氣陽氣旺則陰氣難犯尤善後妙法也倘服補血之味則陰以招陰恐鬼胎雖下而鬼氣未必不

再種矣故不若補其陽氣使鬼祟之難侵而生血愈速也

血崩門

女人一時血崩雙目黑暗昏暈於地者人以爲火盛動血也然此非是火也乃虛火耳世人一見血崩往往用止澁之劑雖能取效一時而虛火未補易於冲激隨止隨發經年月不愈者是止崩之藥斷不可用必於補中行其止法也固本止崩湯熟地一兩白术一兩黃芪三錢人參三錢當歸五錢炒黑干姜三錢水煎一服止矣十劑永不再發倘減分兩則力薄不能止矣妙在全不去止血惟去補血而且補氣不但補氣而且補火何也夫血崩至于黑暗昏暈則血已盡去只存一綫之氣若不急補氣而先補血則有形之血不能速生而無形之氣必且盡散此所以先補氣然補氣而不補血血又不易生補血而不補火則血凝滯不能隨氣速生也況干姜引血歸經補中有收斂之妙所以同補氣血之藥而並用耳

有老婦血崩者症與前同人以爲虛也誰知乃不愼房幃

之故乎女人五十之外天癸匱乏宜閉關不戰苟或適興草草了事尚不至腎火大動倘浪戰如少年時鮮不血室大開崩決而下矣加味當歸補血湯黃芪一兩當歸一兩三七根末三錢桑葉十四片水煎二服血止四劑不再發必須斷慾也若再犯之未有不重病者也此方氣血雙補神劑三七根止血聖葯加桑葉者滋腎中之陰又有收斂之妙但老婦陰精既乏以此方止暫時之漏寔有奇功不可責以永遠之功者以補精味尚少也四劑之後加入白朮五錢熟地一兩北五味一錢山葯四錢麥冬三錢服三月可以盡除矣

有少婦甫受妊三月即便血崩胎亦隨墮人以為挫閃受傷血崩也誰知行房不慎哉少婦行房亦常事耳何至血崩亦因氣之衰也女人氣衰者不耐久戰久戰必泄精精泄太多則氣亦不能收攝血矣況久戰則虛火內動精門不關血室不能閉於是胎不能固內外齊動血又何能固哉治法自以補氣為主少佐以止血之味則得之矣用固氣湯人參五錢白朮五錢當歸三錢熟地五錢茯苓二錢甘草一錢五味子十粒杜仲三錢山萸

二錢　遠志一錢　水煎一服血止十劑全愈此方固氣補血已去之血可以速生將脫之血可以盡攝凡因虛血崩此方通治非只治小產血崩也此方妙在不去止血而止血已全於中所以可通治耳

女人有一交合則血流不止者雖無血崩之甚然終年不愈未免氣血兩傷久則有血枯經閉之患矣此症成於月事來時交合精冲血管也夫精冲血管不過一時之傷精出宜愈何以久而流血也不知血管不可以精傷也女人受孕則血管已淨若經初來其血正旺彼欲出而精射之則所泄之血盡退縮入既不能受孕成胎勢必集精而化血交合時淫氣觸動舊日之精兩氣相感精欲出而血即隨之出矣治法通胞胎之氣引精外出益以補精補氣之葯則血管之傷可以再補矣引精止血湯人參五錢　白朮一兩　茯神三錢　黃柏五分　熟地一兩　車前子三錢　山萸五錢　荊芥三錢炒黑　乾姜一錢炒黑　水煎四服即愈十劑不再發此以參朮補氣萸熟補精精氣既旺血管自然流動加入車茯以利尿竅尿竅利血竅亦利矣又加黃柏直入血管以引夙精出于血管

之口。荊芥引敗血出于血管之外。黑姜止其血管之口。有調停曲折之妙。然服此方。必愼色三月。則破者不至重傷。補者不至再損。否則只可取目前之效耳。愼之。

女人有懷抱甚鬱。口乾作渴。嘔吐吞酸。血下崩者。人以火治之時。效時不效何哉。蓋肝氣結也。夫肝藏血。氣結宜血結矣。何以反至崩傷。不知肝性甚急。氣結性更結矣。急則血不能藏矣。治宜開鬱。然開鬱而不平肝。則肝氣大開。肝火更熾。何能血止渴除也。用平肝止血湯。白芍二兩　白朮一兩　當歸一兩　柴胡一錢　三七根末三錢　甘草二錢　丹皮三錢　荊芥二錢　生地三錢　水煎一服吐止。二劑渴除。四劑血止。此以白芍平肝。得柴胡而鬱氣盡解。白朮利腰臍。則血無積住之患。荊芥通經絡。則血有歸遠之葯。丹皮凉骨髓之熱。生地清臟腑之炎。三七當歸補血之中。行止血之法。自然鬱散血止也。

女人有井高墜下。或閃跌受傷。以至惡血下冲。如血崩者若作血崩治。用止澁之劑。所以害之也。其症必手按之而痛。久則面目痿黃。形容枯槁。治法須行血以去瘀。活血以止疼。則血自止。苟不解瘀痛。即用補澁。則瘀內攻。

疼不能止反至新血不生舊血作祟也用逐瘀止崩湯大黃三錢生地一兩歸尾五錢白芍三錢敗龜板三錢丹皮一錢只殼五分桃仁十粒水煎一服輕二劑疼止三劑血止不四劑也此于活血之中佐以下滯之味故逐瘀如掃止血如神也或疑跌閃升墜雖由外而傷內不比內傷之重然已血崩則內傷必不輕何以但治瘀而不顧氣也不知跌閃升墜非由內傷而致外傷者可比此本寔未撥去標可耳何必顧本而補內哉

人有交合經水即來一如血崩人以為胞胎有傷觸之以動其血也誰知子宮血滯因熱不固之故乎夫子宮在胞胎之下而血海又在胞胎之上也血海者衝脉也衝脉寒而血虧衝脉熱而血沸血崩之症乃衝脉之熱也然衝脉既熱血宜日崩也何以交合而血始來耶蓋脾與肝無恙也脾健則能攝血肝平則能就血人未交合則君相二火寂然不動雖衝脉獨熱血不外泄及至交合子宮大開而君相二火齊動以鼓其精房血海泛溢有不可遏之勢肝欲就血而不能脾欲攝血而不得故月水隨交而至若有聲應之捷焉治法必絕慾三月然

後用滋陰降火之劑。以涼血海。則終身之病。半載可愈也。用清海丸。熟地一觔　桑葉一觔　白朮一觔　元參一觔　山萸八兩　麥冬十兩　沙參十兩　丹皮十兩　北五味三兩　白芍一觔　山藥十兩　石斛八兩　龍骨二兩　酒淬　爲末蜜丸。每早晚滾水送下五錢。服半年全愈。此方補陰無浮動之虞。縮血無寒涼之害。日計不足。月計有餘。潛移默奪。子宮清涼。血海自固也。倘不治本源。而止以髮灰白凡黃連五倍子外治。幽陰之處。吾恐愈塞愈流也。

調經門

女人有先期經至。月水甚多。人以爲血熱之極也。又誰知腎中水旺乎。夫火旺則血熱。水旺則血多。此有餘之病。非不足之症也。似可無葯。然過有餘。則子宮大熱。亦難受孕。恐爍乾男精。太過者損之。亦既濟之道也。然火不可任其有餘。而水斷不可使之不足。治法。少清其火。不必泄水也。清經散。丹皮三錢　地骨皮五錢　白芍三錢　青蒿二錢　黃柏五分　熟地三錢　茯苓二錢　水煎二服。自平也。此雖清火之味。仍是滋陰之品。火瀉而水不瀉。則兩不損。而兩有益也。

Digitized by Harvard University, Harvard-Yenching Library
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

有先期經至止有一二點人以爲血熱之極誰知腎火旺而陰水虛乎同是先期經至何以分爲虛寔蓋女人經事最難調不分別細微用葯何能奏效先期者火氣之冲多少者水氣之驗故先期而至多火熱而水有餘後期而至少火熱而水不足若一見先期俱以爲有餘之熱但瀉火而不補水或水火雙瀉如何不增病哉治法不必瀉火耑補其水水足火自消也兩地湯元參一兩生地一兩白芍五錢麥冬五錢地骨皮三錢阿膠三錢水煎服四劑經調矣方名兩地乃生地地骨同用耳二地凉骨中之熱骨中熱由腎中熱也凉骨隨則腎氣自寒又不損胃氣此治之巧者況餘品又純補水水旺而火安得不平乎此與上條並參必無悞治矣

有經水後期來甚多者人以爲血虛也誰知非也夫後期之多少不同不可執一而論後期來少血寒而不足後期來多血寒而有餘夫經水雖本於腎而其流則各臟腑之血皆歸之故經一至而諸血盡來附益以經開而門啟不遑迅閤諸血乘隙皆出也夫血既出矣則成不足之症治法宜補中溫之非日後期者俱不足也溫經

攝血湯白芍一兩川芎五錢肉桂五分熟地一兩白朮五錢續斷一个五味子三分柴胡五分水煎服三劑經正矣此方大補肝腎脾之精血加肉桂祛寒柴胡舒鬱是補中有散散非耗氣補中有瀉瀉非損陰所以受補之益收溫之功也此方凡經來後期者俱可用誠調經妙劑攝血仙丹倘人乏元氣加參一二錢未爲不可

有經來斷續或前或後無定期者人以爲氣血虛也誰知肝氣鬱結乎夫經水出腎經而肝爲腎子肝鬱則腎亦鬱矣腎鬱而氣自不宣或前或後斷續正腎氣之或通或閉耳然肝氣鬱而腎氣不虛未必至此但子母關切子病而母必有顧復之情肝瀉而腎自多繾綣之誼肝氣之或藏或閉即腎氣之或去或留有相因而至者又何疑乎治法舒肝之鬱即所以開腎鬱也開腎肝之鬱即所以定經水之流也用定經湯白芍一兩當歸一兩熟地五錢山葯五錢兎絲子一兩柴胡五分茯苓三錢荊芥一錢炒黑水煎二服經水淨四劑經期定矣此方舒腎肝之氣非通經之劑也補肝腎之津非利水之品也肝腎氣舒而經通肝腎津旺而水利不治之治正妙

於治也

有數月一行經者。每以爲常。亦無先後之異。多少之殊。人以爲異。不知非異也。乃無病之人。氣血兩不虧耳。夫氣血不虧。何數月一行經也。女人有天生仙骨者。經必四季一行。蓋以季爲數。不以月爲盈虛也。女人經水不泄。則黃河便可逆流。眞氣內藏。則坎中之陽不損。加以鍊形之法。一年便可飛昇。無如世人不知。見經不至。悞認作病。妄用葯餌。往往無病成病。余聞異人之教。時爲闡揚。使人見此在不必治之例。勿疑氣血不足。轉施醫治也。然天生仙骨之女。世正不少。而嗜慾深者。天分損也。又可不立方療之。助仙丹。白朮三錢　茯苓五錢　兎絲子二錢　甘草一錢　山葯三錢　白芍三錢　杜仲一錢　陳皮五分　水煎服。四劑仍如舊矣。不可再服。此方平補中。有健脾益腎。解鬱消痰。不損天然之氣血。便是調經之大益。何必用重劑以助火。用熱葯以通經哉。

有五十外。或六七十歲。忽然行經。或紫血塊。或紅血淋。人以爲還少之期。誰知血崩之漸乎。女人至七七之外。天癸已窮。又不服補陰濟陽之葯。精如何滿。而如少婦耶。

今行經者乃肝不就血脾不統血也非泄精而動命門之火必氣鬱而發龍雷之炎二火齊動血乃奔突有似乎行經而寔非也此症非大補肝脾則血不能驟止然補肝脾者不可全補血以止血尤當補氣以止血也用接老丹人參一兩黃芪一兩熟地一兩山萸五錢當歸五錢阿膠一錢木耳灰一錢香附五分荊芥一錢甘草一錢白朮五錢水煎二服大減四服全止十劑全愈此方補肝脾之氣氣足自然生血而能攝血也尤妙大補腎水腎水足肝氣益舒肝舒而脾氣得養肝藏血而脾統血又安有漏泄哉血無漏泄又何患于血崩乎

有月水忽來忽斷時痛時止往來寒熱人以爲血結而不知非也乃肝氣不舒耳夫肝木所惡者寒風也經行則腠理大開適逢風吹則肝氣閉塞而經水之門亦閉於是腠理經絡皆不宣而作寒熱氣行于陽而熱生氣行於陰而寒生也然此猶感寒之輕者倘外寒更甚則內熱益深往往有熱入血室而變似狂之症如遇鬼狀今但往來寒熱是寒未甚熱未深耳治法補肝中之血通鬱散風則隨手而效也用加味四物湯熟地一兩川芎

三錢白朮五錢當歸五錢白芍五錢甘草一錢玄胡索一錢丹皮三錢柴胡一錢水煎服此以四物滋脾腎以柴丹宣揚風鬱以甘朮元胡利腰臍和腹痛也入於表裏之間通於經絡之內自然奏功也

有經前疼痛數日再行經者多紫血之塊人以爲熱極而然也誰知鬱極而火不能化乎夫肝有火鬱則不揚經欲行而肝氣不應則拂抑其氣而痛生然經滿則不能內藏而肝中火氣焚燒內逼經出而火亦隨之而泄色紫黑者水火兩戰之象也成塊者火熱煎成形也經失其經正鬱火內奪其權耳治法似宜大瀉肝火矣然不解肝鬱則熱之標去而熱之本未除也用宣鬱調經湯白芍五錢當歸五錢柴胡一錢香附一錢白芥子二錢鬱金一錢丹皮五錢甘草一錢黃芩一錢炒梔子三錢水煎服四劑下月斷不先腹痛而後行經也此方補肝血解肝鬱利肝氣又退肝火所以奏功耳

有行經後小腹作痛人以爲氣血虛也誰知腎氣涸乎夫經水天一之水也滿則益空則虛亦其常也何以虛能作痛哉蓋腎水虛則水不能生肝而肝必尅脾土土木

相爭而氣逞故爾作痛治法亦須舒肝氣爲主而益以補腎則水足而肝氣益安矣用後補湯阿膠三錢荊芥三錢巴戟天一錢山葯五錢白芍三錢當歸三錢山萸三錢水煎服此方平調肝腎既能轉逆氣于須臾尤善止鬱痛於頃刻經後以此方調理最佳不獨治經後腹痛也

有經行前一二日忽然腹痛而吐血人以爲血盛之極也誰知乃肝氣之逆下不順行而上吐乎夫肝氣急宜順不宜逆也順則氣安逆則氣動血則隨氣俱行氣安則血安氣動則血動毋怪其然若經逆則腎病而不在肝何以隨血妄行竟從口出耶不知少陰火急如奔馬得肝中龍雷之氣直冲而上反經爲血又至便也不必肝不藏血始成吐血之症但此吐血不同各經之吐血也各經吐血乃內傷成之也逆經吐血乃內溢激之出者也其症絕異而氣逆則一也治法似宜治逆以平肝不必益精以補腎然逆經吐血雖不損血而反覆顛倒未免傷腎之氣血又泄多則腎水亦虧矣必于補腎之中行順氣之法也順經湯當歸五錢白芍二錢熟地五錢

Copyright © 2010 Chinese Medical Collection
Hong Kong University Library

茯苓三錢　丹皮五錢　沙參三錢　荊芥三錢炒黑　水煎服。一劑吐血止。二劑經順。十劑不再逆也。此於補腎調經之中用引血歸經之葯。肝氣不逆。腎氣自順也。腎氣順而經何逆哉。

有經水將來。三五日前。臍下痛如刀刺。寒熱交作。下如黑豆汁。既而經來。因之無孕。人以爲血熱也。誰知乃下焦寒濕相爭之故乎。夫寒濕之氣。乃邪氣也。女人有任衝之脉。居下焦。衝脉爲血海。任脉主胞胎。爲血室。皆喜正氣相親。惡邪氣相犯。經水由二經外出。而寒熱之氣。瀰滿二經之外。必相爭而作痛矣。邪旺正衰。寒氣生濁。下如黑豆汁者。現北方寒水之象也。治法利濕溫寒。衝任無邪。何至轉結作痛哉。用溫臍化濕湯。白朮一兩　茯苓三錢　山葯五錢　扁豆三錢　白果十個　蓮子三十粒連心用　巴戟五錢　水煎服。必經未來前十日服。四劑邪去經調。可種子也。此以白朮利腰臍。巴戟白果通任脉。扁豆山葯蓮子衛衝脉。故寒濕盡去。經自調矣。倘疑腹痛爲熱邪作祟。妄用寒凉。則衝任虛冷。血海變爲冰海。血室成爲冰室。無論艱於生育。又何止痛之日哉。

有經水過多。行後又行面色痿黃。人倦無力。人以爲血熱也。誰知血虛不歸經乎。夫血旺則經多。血少則經縮。何以血虛反經多耶。不知血歸於經。雖血旺經亦不多。血不歸經。雖血衰經亦不少。世人謂經水過多。是血旺也。此悞耳。倘經多果是血旺。一行經卽止矣。何以行後再行耶。惟經多是虛。故再行。而不勝其困乏。血損精散。骨中髓空。不能色華於面也。治法。大補血之不足。行其歸經。又何有再行之病哉。加味四物湯以治之。熟地一兩　川芎二錢　白芍三錢　當歸五錢　山茱萸三錢　荊芥三錢　白朮五錢　續斷一錢　甘草一錢　水煎四服。血歸經矣。十劑後加人參三錢。又十劑。下月經來不再行也。四物乃補血神方。加白朮荊芥行中有利。加萸斷止中有補。加甘草調和。所以血足而歸經。經歸而淨也。

有經行前先瀉三日。而後行經。人以爲血旺也。誰知脾氣虛乎。夫脾統血。脾虛則氣不能攝血矣。脾屬濕土。脾虛則土不寔。而濕更甚焉。經水將動。脾氣先不能固脾。血欲流注於血海。而濕氣先乘之矣。所以先瀉水。而後行經也。治法。不在先止水。當先止血。亦不在先止血。在先

補氣。氣旺自能固血。亦氣旺而濕自能瀉也。用健固湯。人參五錢　茯苓三錢　白朮一兩　苡仁三錢　巴戟天五錢　水煎服。十劑經行不瀉矣。此方補脾氣。以固脾血。則血攝于氣之中。脾血日旺。自能運化其濕。濕既化矣。何能作瀉哉。

有行經前大便一日出血者。人以爲血崩也。誰知經入大腸乎。夫大腸與行經之絡各別。何以入其中乎。不知胞胎之系。上通心。下通腎。心腎不交。則胞胎之血。兩無所歸。而心腎二經之氣。不來照攝。聽其自便。血乃不走小便。而走大便矣。治法單止大便之血。則愈止愈多。反動三焦之氣。拂亂而不可止。蓋經妄行。由心腎不交。今不使心腎之既濟。而徒出其胞胎。則胞胎之氣無所歸。血又何能歸經哉。必大補心腎。心腎氣接。而胞胎之氣不散。則大腸之血。自不妄行也。用歸經兩安湯。人參三錢　當歸五錢　白芍五錢　熟地五錢　山萸二錢　巴戟天一錢　白朮五錢　麥冬五錢　升麻四錢　荊芥二錢炒黑　水煎一服血止。二劑經從陰出矣。三劑經止。兼可受孕。此方大補心肝腎。全不去顧胞胎。而胞胎有所歸者。以心腎氣合

也心腎虛而氣分心腎足而氣合心腎不離而胞胎之氣聽令二經之靜攝又安有亂動之形哉然則補心腎可也何又補肝木耶不知肝乃腎子心之母也補肝血則肝氣往來心腎間自然上引心而入腎下引腎而入心不啻如介紹之歡也

受妊門

女人有瘦怯身軀久不孕育一交合卧病終朝人以爲氣虛也誰知血虛之故乎夫血就於肝中精涵於腎內交合則泄腎中之精與血虛何與不知肝氣不開則精不能泄及精既泄肝氣益虛以腎爲肝母母而泄精不能分潤以養肝之子肝燥無水則火暗動以爍精腎愈虛矣況瘦人多火又加泄精則水益少而火益熾水難制火而腰腎空虛所以倦怠而卧也此等女人火偏易動然此火出於肝乃虛火也不合則已交又偏易走泄陰虛火旺不能受胎即偶成胎迫乾男精亦隨受隨消者矣必大補腎水而平肝木水旺血亦旺血旺火亦滅矣養陰種玉湯熟地五錢白芍五錢當歸五錢茯苓二錢甘菊花一錢山萸五錢丹皮二錢山藥三錢杜仲二錢

牛膝一錢　水煎服三月身健必受孕也此方補血純於塡精精滿則子宮易於攝精血足則子宮易於容物皆有子之道也惟人貪色者多節慾者少服此方保守三月必坐孕矣否則只可自健勿咎方之不靈也

有少思飲食胸鬲飽悶終日倦怠惟思卧一交合呻吟不已人以爲脾胃氣虛也誰知腎氣不足乎夫氣宜升不宜降升騰於上焦則脾胃易於分消降陷於下焦則脾胃難於運化人無水穀之養則精神自然倦怠脾胃之氣豈可降而不升乎惟是脾胃之氣雖充於脾胃之中而寔生於兩腎之內無腎中之水氣則胃氣不能升也無腎中之火氣則脾氣不能化也有腎中水火之二氣而脾胃之氣始能升而不能降也然則補脾胃之氣可不急補腎中水火之氣乎治法必以補腎爲主但補腎不補脾胃則腎中水火二氣不能提至陽之上也兼提湯人參五錢　白朮一兩　熟地一兩　山萸三錢　黃芪五錢　枸杞二錢　柴胡五分　巴戟一兩　水煎服三月腎氣大旺又一月未有不受妊者此方補氣多於補精似宜補脾胃爲主不知脾胃健自易生精是補脾胃正所以補腎

Restricted Copyright © 2010 Copyright Princeton University Library

也。脾胃旺又加補精則陰氣既足陽氣易升不必提升而氣自升越於上焦況原有升提之味乎陽不下降無非大地之陽春隨處皆是生機安得不孕哉

有下身冰冷非火不煖交合時陰中全無溫熱之氣人以爲天分薄也誰知胞胎之寒乎夫寒水之地不生草木重陰之淵不長魚龍胞胎寒冷又何能受孕哉雖男精至熱射入子宮而陰寒之氣相逼亦暫茹之而即吐也但何以寒冷至此豈皆天分薄乎不知胞胎居心腎間上繫心而下繫腎胞胎寒冷乃心火之微腎火之衰也故仍補心腎二火溫胎散人參一兩 白朮一兩 巴戟天一兩 杜仲三錢 兎絲三錢 茯實三錢 山藥三錢 破故紙二錢 肉桂二錢 附子三分 水煎服一月胞胎熱矣此方補心而即補腎溫腎而即溫心心腎氣旺則心腎之火自生胞胎之寒自散因胞胎之寒以至茹而即吐今胞胎既熱尚有施而不受者乎若改爲丸日夕服之尤能攝精種子也

有素性恬淡飲食少多則難受作嘔瀉脘飽悶脹人以爲天分薄也誰知脾胃虛寒乎夫脾胃虛寒亦心腎之虛

寒也胃土非心火不生脾土非腎火不化心腎火衰則脾胃失生化之權不能傳化水穀之精以化精液矣脾胃既不化精液無以灌注胞胎何有溫煖之氣以養胎氣也縱然受孕而任脉必無力亦必墮落此脾胃虛寒所以無子治法可不補脾胃乎然脾母在於腎之命門胃母在於心之包絡溫補脾胃必須溫補二經之火蓋母旺子自不弱母熱子自不寒也溫土毓麟湯覆盆子一兩　巴戟天一兩　白朮五錢　人參三錢　神曲一錢　山葯五錢　水煎服一月可受胎矣此脾胃同補即脾胃同溫也所用之葯既溫命門之火又溫心包之火也葯味不多而四經並治命門心包火旺則脾胃無寒冷之虞自然食多而善化氣血日旺帶脉有力可以勝任安有不育子者哉

有小腹間覺有迫急之狀急而不舒斷難生子人所不識以爲邪氣在腹也誰知帶脉之急乎夫帶脉繫腰臍間宜弛不宜急帶脉急者由腰臍不利也腰臍不利又由脾胃之不足脾胃虛而腰臍氣閉腰臍氣閉而帶脉拘急胞胎牽動精即直射胞胎胞胎雖茹納力難載負必

有小產之虞。且人不能節慾。安保不墮乎。此帶脉急。所以不生育也。治宜寬帶脉之急。而帶脉不能遽寬也。必須利腰臍之氣。而腰臍又不能遽利也。又必須大補脾胃。帶脉可寬也。寬帶湯。白朮一兩　補骨脂一錢　肉蓯蓉三錢　巴戟五錢　人參三錢　五味子三分　麥冬三錢　杜仲三錢　蓮子二十粒不去心　熟地五錢　當歸二錢　白芍三錢　水煎服。四劑無急狀矣。服一月。無不受孕者。此方脾胃雙補。無非利腰臍之氣。自然帶脉寬舒。可以勝任也。或疑五味白芍酸以收之。不增帶脉之急乎。不知帶脉之急。由於氣血之虛。血虛則縮而不升。氣虛則攣而不達。白芍酸收平肝。則肝不剋脾。五味酸以生腎。則腎能益帶。似相礙而實相成也。

有懷抱素惡。不能生子。人以為天數窮也。誰知肝氣鬱乎。夫女人有孕。心脉必流利而滑。肝脉必舒徐而和。腎脉必旺大而鼓指。始為喜脉。未有三部脉鬱而能生子也。蓋三部脉鬱。肝脉未有不鬱結者。肝鬱而心腎脉亦鬱。肝結而心腎脉亦結也。即心腎不鬱不結。而肝獨鬱結。即非喜脉矣。蓋鬱則不喜。喜則不鬱也。不成胎者。以肝

氣不舒必尅脾土脾土氣塞而腰臍之氣不利又何能通任脉而達帶脉乎帶脉氣閉而胞胎之口不開精至門而不受矣治必開胞胎之口然開胞胎之口舍開鬱無第二法也開鬱種子湯香附三錢白芍一兩當歸五錢丹皮三錢陳皮五錢白朮五錢茯苓三錢天花粉一錢水煎服一月鬱結開盡無非喜氣滿腹結胎于頃刻矣此方解肝氣之鬱宣脾氣之困腰臍氣利不通任脉而自通不達帶脉而自達不啟胞胎而自啟也

有身體肥胖痰涎甚多不能受孕人以爲氣虛誰知濕盛之故乎夫濕從下受乃外邪之濕也而肥婦之濕非外邪乃脾土內病也然脾土既病不能分化水穀以養四肢宜身瘦弱矣何以肥乎不知肥婦氣衰肉勝肉勝則肥氣衰則胖外似健而內寔虛也內虛則氣衰氣衰則不能行水而濕停腸胃不化精而化涎矣夫脾乃濕土又因痰多愈加其濕脾不能受自浸潤於胞胎而年久日積胞胎變爲汪洋水窟矣且肥婦內肉必滿遮隔子宮難以受精必然之勢也又況多水濕卽男子健鬬深入精射子宮而水勢滔滔亦隨入隨流矣何能受孕乎

治必以瀉水化痰爲主然徒瀉水化痰不補脾土則陽氣不旺濕痰未必去而人先病矣烏能茹精不吐乎加味補中益氣湯人參三錢當歸三錢黃芪三錢陳皮五分白朮一兩甘草一錢柴胡一錢升麻四分半夏三錢茯苓五錢水煎服八劑痰氣盡消又十劑水濕亦利子宮易於受精此方提脾氣而升于上則水濕反利於往下助胃氣而消于下則痰涎轉易于上化不必用消尅以損肌不必用濬決以開竅陽氣旺自足攝精邪濕散自可受孕也

人有口乾舌燥骨蒸夜熱徧體火焦咳嗽吐沫斷難生子人以爲陰虛火動也誰知骨髓內熱乎夫寒陰之地固不生物而火燥乾旱之田又何能禾黍油油乎然骨髓與胞胎有何關切而能使人無子此前人未言也余今言之不驚世駭俗乎然有至理也胞胎爲五臟外之一臟因其不陰不陽所以不列於五臟之中不陰不陽者以其上繫心包下繫命門繫心胞者通於心繫命門者通于腎也陰中有陽陽中有陰善於變化男女俱由此出然必陰陽兩平不偏不枯始能變化生人否則不能

生人也胞胎既通腎骨髓者腎所化也骨髓熱而腎熱腎熱而胞胎亦熱也況胞胎無骨髓之養則兒何以生骨髓熱而骨中空虛惟有火氣又何以生胎而作骨哉治法必須清骨中之熱然骨熱由于水虛補腎中之陰而骨熱自除無胞胎乾燥之患有珠露滴濡之喜矣清骨腈湯丹皮五錢麥冬五錢元參五錢沙參五錢白朮三錢地骨皮一兩金釵石斛二錢北五味五分水煎服一月骨熱解矣二月受孕此方補腎之精凉骨之髓不清胞胎自無大熱之患矣陰虛內熱之人原易受胎

今因骨髓太熱所以受精而變燥以致難育非胞胎之不能受精也所以少補腎以殺火之有餘又益水之不足更易種子耳

有腰痠背楚胸腹脹悶日日思卧不能得子人以爲腰腎虛也誰知任督之困乎夫任脉行于前督脉行于後然皆從帶脉上下而行也故任脉困而帶脉墜于前督脉虛而帶脉墜于後雖受男精必多小產況任督間有疝瘕之症則外多障碍而胞胎縮入瘕疝之內往往精不能施雖懷玉燕亦何益乎治必去疝瘕之病補任督之

脉則提挈有力足以勝任外無所障內有所容安得不孕乎升帶湯白朮一兩人參三錢沙參五錢肉桂一錢荸薺粉三錢神曲二錢茯苓三錢半夏一錢鱉甲三錢炒水煎服一月任督氣旺又一月疝瘕盡消此方利腰臍之氣正升補任督之氣任督氣升疝瘕難存矣又方中肉桂散寒荸薺祛積鱉甲攻堅茯苓利濕有形化爲無形無非升騰之氣何至受精再墮乎必無之事也

有小水艱澁腹中作脹兩腿虛浮不能生育人以爲小腸熱也誰知膀胱之氣不化乎夫膀胱與胞胎相近膀胱病胞胎亦病也水濕之氣必走膀胱然膀胱不能自分消必得腎氣相通而膀胱始能化水水從陰器泄也倘膀胱無腎氣之通則氣化不行水濕之氣必滲入膀胱汪洋之田何能生物哉治法必分消胞胎之濕然腎氣不旺胞胎之水氣何從而化必治腎中之火使火氣達於膀胱也化水種玉丹人參三錢白朮一兩肉桂一錢兎絲子五錢茯苓五錢巴戟一兩車前二錢芡寔五錢水煎服二劑膀胱氣化矣四劑艱澁症去又十劑虛脹盡消服二月腎氣大旺易於受胎此方利腰臍之水在

補腎中之氣然補腎多濡潤之味不益助濕乎妙在補腎火而不益腎火尤妙補火無燥烈之虞利水無蕩滌之甚所以膀胱氣化胞胎不至于過濕安有佈種而難于發育者乎

妊孕惡阻門

女人懷妊之後惡心嘔吐思酸解渴見食則憎困倦欲卧人以爲妊娠之惡也誰知肝血之燥乎夫女人受孕本腎氣旺也腎旺足以攝精然腎一受精則腎水生胎不能化潤他臟而肝爲腎子日食腎氣一旦無津液之養肝氣迫索而腎水不應則肝氣益急火動而氣乃逆於是惡心嘔吐症生矣雖嘔吐不至甚而傷氣則一也氣傷則肝血愈燥耗世人以四物治產前諸症正以其能生肝血也然補肝以生血未爲不佳但恐生血不能生氣則脾胃衰微不勝頻嘔吾恐氣虛則血不易生也必于平肝補血之中用健脾開胃之葯以生陽氣則氣能生血尤益胎氣耳然氣逆而補氣氣旺而更助逆乎不知懷妊惡阻其逆不甚其逆亦因虛而逆非因邪而逆也因邪而逆者補氣而更逆今補氣于補血之中則陰

足以制陽又何患逆乎用順肝益氣湯白芍三錢當歸一錢白朮三錢人參一錢茯苓二錢熟地五錢蘇子一錢麥冬三錢砂仁一粒神曲一錢陳皮三分水煎服一劑惡阻輕三劑全愈此肝腎脾胃肺同治之法而意耑主肝腎肝平則氣不逆腎旺則血易生凡胎不動少帶惡阻者俱投此方無不安靜如故有益孕婦勝於四物湯蓋四物耑治肝此方不止治肝所以尤妙也

孕妊每至五月肢体倦怠飲食無味兩足先腫漸至徧身後及頭面俱腫人以爲濕也誰知脾肺氣虛乎夫妊孕雖有按月養胎之分其寔不可拘于數月總以健脾補肺爲主蓋脾統血肺統氣也胎非血不蔭兒非氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣旺而生子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣于皮膚矣脾虛則血少血少則不能運氣于肢体矣氣血兩衰脾肺失令飲食難消精微不化勢必氣血下陷不能升舉而濕邪乘其虛處聚而爲腫矣治宜補脾肺之虛不必以去濕爲事補中益氣湯加減人參五錢白朮五錢當歸三錢黃芪三錢陳皮三分甘草一錢柴胡一錢升麻三分茯苓一兩水煎服二劑

即寬四劑愈十劑不再犯矣補中益氣乃升提脾肺之方似乎益氣而不益血不知血非氣不生升氣即升血也況濕氣相犯未便補血今補氣而助以利濕則氣升而水易散耳然則少用利水可也何以重用茯苓至一兩之多不幾以利水爲君乎嗟乎濕症不以利水爲君則將何葯爲君也多用茯苓於補氣之中雖利水而仍是健脾清肺凡利水之味多耗氣血而茯苓白朮補多於利所以多用以分濕邪即所以補氣血耳

安胎門

女人小腹痛胎動不安如下墜狀人以爲帶脉無力也誰知脾氣兩虛乎夫胞胎繫於帶脉而帶脉寔関於脾腎二經虧損則帶脉力微胞胎何能勝任乎然脾腎之虧者非于飲食過多即本色慾太甚不補脾胃而帶脉迫急胞胎所以下墜也雖然胞胎亦何関於帶脉哉胞胎之繫通於心腎不通脾也補腎可也何必補脾然脾胃爲後天脾非先天之氣不化腎非後天之氣不生補腎不補脾則腎精不遽生補後天之脾正所以補先天之腎補先後天之脾腎正所以固胞胎之氣胞胎原借先

後天之氣安可不兼補先後天脾腎哉用奠安二天湯人參一兩熟地一兩白朮一兩山葯五錢炙甘草一錢山萸五錢杜仲三錢枸杞二錢扁豆二錢水煎服一劑痛止二劑胎安不三劑也夫胎動乃脾胃兩虧必大用參朮熟地補其陰陽始可挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用之所以少效此方之妙妙在多用也

人有孕三四月覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以至胎動不安甚則流血如經水人以爲火動也誰知水虛之故乎夫胎非男精不結亦非女精不成古人每分逐月養胎其寔不離腎水也故腎水足而胎安腎水缺而胎動然腎水亦何能動胎必腎火動而胎始不安耳然火之有餘仍是水之不足火旺動胎補水足以安之矣但腎水不能速生必補肺金金能生水水有化源則源泉有本無根之火又何難制乎方中少用清熱之品則胎氣易安也潤燥安胎湯熟地一兩山萸五錢益母草二錢黃芩一錢麥冬一錢生地三錢阿膠二錢五味子二錢水煎服二劑燥減又二劑胎安又十劑胎不再動也此耑添腎之精兼於治肺故腎不燥而火不爍安胎得不

寧靜乎。

女人上吐下瀉。胎動下墜。疼痛難忍。急不可緩。人以爲脾胃寒極也。誰知脾胃虛極乎。夫脾胃氣虛。則胞胎無力。有下墜之患。又加吐瀉。則脾胃更虛。欲胎之無恙得乎。然胞胎雖痛。猶不下者何故。蓋脾胃雖損。腎氣尚固也。胞胎繫於腎。而連于心。腎未損。則腎氣交於心。心氣通於胞胎。所以欲墜未墜也。且腎氣固。則來生脾。心氣通必來援胃。脾雖虛而未絕。則胎動而未落耳。治法可不急救脾胃乎。然脾胃將絕。止救脾胃。而土氣難生。必補助心腎之火。則火能生土。尤易接續也。用接土固胎湯。

人參一兩　白朮二兩　肉桂二錢　山葯一兩　炙甘草一錢　附子五錢　杜仲三錢　續斷三錢　山萸一兩　枸杞子三錢　縮砂仁三粒　兎絲子三錢　水煎服。一劑瀉止。二劑吐止。而痛除也。此方救脾胃土十之八。救心腎火十之二也。救火輕于救土者。豈土欲絕。火未絕乎。不知土崩非大劑不能援。火息雖小劑而可助。熱味多用。必有太燥之虞。不比溫補之品。可以多用。況胎動原係土衰。非係火衰也。何用大熱之劑。過于助土。以傷胎氣哉。

有懷抱抑鬱胎動不安兩脇悶痛如子上懸人以爲子懸也誰知肝氣不通乎夫養胎半係腎水然非肝血相助腎水亦獨力難支故肝血最不可缺也使肝經不鬱則肝氣不閉而肝血自灌注胞胎以助腎之不足今肝既鬱則閉塞不通子無血廕安得不上升覓食乎此子懸之必至乃氣使之升也治法不必治子懸只開肝之鬱結補肝血之乾燥子懸自定也解懸湯白芍一兩　當歸一兩　炒梔子三錢　枳殼五錢　砂仁三枚　白朮五錢　人參一錢　茯苓三錢　薄荷二錢　水煎一服悶痛除二劑子懸定三劑全愈減去梔子多服數劑尤妙此平肝解鬱聖方鬱開則肝不尅土肝平則木不去生火又有健脾生胃之葯自然水穀生精四佈各臟而肝腎有潤澤之機胞胎自無乾澁之患何至上懸哉

有跌閃失足傷損胎元疼痛人以爲外傷誰知仍是內傷之故乎凡人胎氣甚固雖跌撲閃挫仍然無恙惟氣血素虧故少有舉動即便動胎若作外治未能奏功且有因治而墜者必大補氣血少加行動之味則瘀血自散胎又得安但補氣血之中又宜分別補血宜多補氣宜

少也。救損湯。當歸五錢　白朮五錢　白芍三錢　人參一錢
生地一兩　沒葯末一錢　甘草一錢　蘇木三錢　乳香一錢
研末　水煎一服疼止。二劑胎安。此方去瘀。又不瀉胎。補
血氣而無停滯之憂。又少通滑之害。治無胎跌損。亦有
建功。治有孕跌閃。尤多殊效。有益無損。此方之謂歟。

有胎不動腹不痛。然時有血流出。人以為血虛胎漏也。誰
知是氣虛。不能攝血乎。夫血能廕胎。胎中之血。必得氣
以包之。氣虛下陷。而血乃隨氣亦陷矣。然氣虛下陷。血
未嘗虛。宜不與氣同陷。不知氣虛則血必旺。血旺則血
必熱也。血寒則靜。血熱則動。動則有欲出之兆。又加氣
虛。安得不漏泄乎。幸氣之虛也。倘氣旺血熱。血必大崩
矣。治法。補氣之不足。瀉火之有餘。血不止自止矣。助氣
補漏湯。人參一兩　甘草一錢　白芍五錢　黃芩三錢　生地
三錢　益母草二錢　續斷二錢　水煎一服血止。二服全愈。此以
人參補陽氣。黃芩瀉陰火。火瀉則血不熱。無欲出之機。
補氣則能包血。無可瀉之竅。自然氣攝血以歸經。安有
漏泄之患哉。

有孕至七八月。忽腹中兒啼。腰隱隱痛。人以為胎熱也。誰

知氣虛之故乎夫兒在胎中母呼亦呼母吸亦吸無一刻間斷也孕至七八月母氣必虛子不能隨母氣呼吸則必有不及隨母之勢子母原相依者子失母氣則拂子之意而作啼矣似乎可異而寔不必異也大補其氣使母之氣亦如子之氣子之氣安子啼亦息矣止啼湯

黃芪一兩　人參一兩　當歸五錢　麥冬一兩　天花粉一錢　橘紅五分　甘草一錢　水煎二服啼不再也此以參芪歸冬補肺氣以肺主氣氣旺而胞胎之氣又安弱哉胞氣旺而子尚不能隨母之氣吾不信也所以二劑奏功耳

有口渴出汗大飲涼水煩燥發狂腰腹痛胎動欲墜人以爲火盛極也亦知何火乎乃胃火熾炎熬乾胞胎之水故不安耳夫胃爲水穀之海多氣多血以養各臟腑者也萬物皆生于土土氣厚而物生土氣薄而物死土厚者土中有火也然胃能化水穀者非胃中有火乎火在胃中宜乎生土何以火盛反太乾害土乎不知無火難以生土而火多又爍水也土中有火則土不死土中有水則土不燥使胃火過旺必先爍腎水腎水乾而土中無水又何以潤胞胎哉土燥之極而火勢炎蒸犯心神

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

越胞胎逼迫安得不下墜乎必急瀉其火而瀉火必以水濟之水旺而火自衰火衰胎自定也用止焚定胎飲元參二兩甘菊花三錢青蒿五錢茯苓三錢生地一兩知母二錢天花粉二錢白朮五錢人參三錢水煎二服狂定三劑火解胎安不四劑也此方葯料頗多恐有不勝之患第孕妊火盛若此若非大劑而火不息狂不止胎不安也然葯雖多多是補水之味有益無損何必顧忌哉

有妊娠在身痰多吐涎偶遇鬼神忽然腹痛胎向上頂人以爲子懸也誰知中惡而胎不安乎凡不正之氣最能傷胎故孕妊不宜入廟與遊陰寒之地古洞幽岩不可登眺盖邪祟多潛于此觸之最易相犯不可不戒也況妊婦又素多痰涎眼目易眩怪症多起於痰所以招邪亦有可招而招之也似宜治痰爲主然治痰必耗氣氣虛而痰難消化胎必動搖必補氣以生血補血以活痰少加消痰之味則氣血不虧痰又易化也消惡安胎湯白朮五錢甘草一錢白芍一兩陳皮五分沉香末一錢蘇葉一錢花粉三錢當歸一兩人參三錢乳香末一錢

Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

茯苓五錢　水煎調服。一劑腹痛止。鬼神亦去矣。此方大補氣血。惟圖顧本。而邪自消。痰消。而胎自安也。

有懷孕後。或成形。未成形。其胎必墜。性又甚急。時多怒氣。人以爲氣血衰。不能固胎也。誰知肝火之盛。常動而不靜乎。夫肝本藏血。肝氣不藏。血自難固。盖肝屬木。木中有相火。相火宜靜。而不宜動。靜則安。動則熾也。然木中之火。又易動難靜。人生日用無非動靜之時。卽無日非動火之候。況加大怒。則火更動矣。而火勢飛揚難遏。不能生氣化胎。反食氣傷精矣。精傷而胎又何養乎。自然易墜也。必須平肝之火。大利腰臍之氣。使氣生血。血清其火也。用利氣瀉火湯。白朮一兩　當歸三錢　甘草一錢　黃芩二錢　人參三錢　白芍五錢　熟地五錢　芡寔三錢　水煎服。三月胎不墜矣。方名利氣。寔補氣也。補氣而不瀉火。則氣旺而火不能平。反害氣矣。加黃芩於補氣之中。益以歸芍熟地滋肝。則血不燥。而氣益和。氣和而血和。氣血和不必利氣。氣自利矣。況白朮最利腰臍者哉。

小產門

女人因行房顛狂。以至小產血崩不止。人以爲火動極也。

PO-HOT COPY Fashion Library and the Gest Collection Princeton University Library

誰知氣脫之故乎。凡孕婦腎水廕胎。水原不足。而火邪沸騰。加之久戰。火必大動。又至顛狂。精必大泄。泄則腎水更乾。腎火益熾。水火兩病。胎何能固。胎墜而火猶未息。故血隨火崩。有難止之勢。治當以止血爲主。然火動由於水虧。血崩本於氣脫。不急固氣。則氣散不能速回。血將安生耶。不大補精。則精固不能遽長。火且益熾矣。固氣塡精湯。人參一兩　白朮五錢　熟地一兩　當歸五錢　黃芪一兩　荊芥二錢炒黑　三七根末三錢　水煎一服。血止。二劑身安。四劑全愈。此方全不清火。惟補氣補精救其匱乏。奏功神者。以諸葯甘溫。能除大熱也。蓋此乃虛熱。非實熱也。實熱可寒折。而虛熱必溫補。故補氣自能攝血。補精自能止血也。

有跌撲閃損。以至小產。血流紫塊。昏暈欲絕。人以爲瘀血作祟也。誰知血室損傷乎。夫血室與胞胎相連。胞胎損而血室亦損。所謂唇齒相依也。然傷胞胎血流者。其傷淺。傷血室流血者。其傷深。傷淺者痛在腹。傷深者暈在心。同一跌閃之傷。與未小產。已小產。治各不同。未小產胎不安者。宜顧胎。不可輕去其血。已小產血大崩者。宜

DO NOT COPY Gest Collection
Fast Asian Library Y and the Gest Collection
Princeton University Library

散血。不可重傷其氣。盖胎已墜矣。血既盡脫。則血室空虛。惟氣存耳。倘又傷氣。保無氣脫之憂乎。故必補氣以生血。新血生。瘀血可止也。理氣止瘀湯。人參一兩　黃芪一兩　當歸五錢　紅花一錢　丹皮三錢　炒黑干姜五錢　茯苓三錢　水煎一服瘀血止。二劑暈除。三劑全安。此方以參芪補氣。氣旺血可攝也。以歸丹補血。血生瘀難留也。以紅花黑姜活血。血活暈可除也。以茯苓利水。水利血易歸經也。

孕妊口渴煩躁。舌上生瘡唇裂。大便結數日不通。以至腹疼小產。人以爲大腸火也。誰知血熱爍胎乎。夫血所以養胎。然血溫則胎受其利。血熱則胎受其損。兒在胎中如探湯之苦。如何存活。自外越下奔。以避炎氣之逼。欲不墜也得乎。但妊婦血蔭于胎。則血虛耗。血虛宜生寒。何反變熱。不知血即陰水。所以血日蔭胎。則取給甚急。陰水不能速生以變血。則陰虛火動。陰中無非火氣。則血中亦無非火氣矣。二火合逼兒胎。胎所以欲墜也。治法清胎中之火。補腎中之精則得矣。或疑兒已下墜。何故再顧其胎。血不廕胎。何必大補。夫水不知火動之極。

Pasta Asian Library Princeton University Library

以至墜胎則胎純是火氣乃虛火非寔火也虛火宜于補中清之則火易散眞水可生倘用寒凉以降火不顧胎之虛寔必寒氣逼人胃中生氣蕭索又何以化精微生陰水乎不變爲瘵者幾希矣加減四物湯熟地五錢白芍三錢川芎一錢當歸一兩山萸二錢梔子一錢山葯三錢丹皮二錢水煎服四劑全愈矣

有畏寒腹痛落胎者人以爲下部太寒也誰知氣虛又加寒犯不能攝胎而下墜乎夫人生於火亦養於火然火非氣不充氣旺而後火旺氣衰則火不旺矣人之坐胎者受父母先天之火也先天火即先天之氣成之故胎成于氣亦攝于氣氣旺則胎固氣衰則胎弱胎日加大氣日加衰安得不墜哉又遇寒氣外侵內之火氣更微所以腹痛胎落也當腹痛時即用人參乾姜之葯則痛止而胎安無如人不敢用也以至墜胎僅存微氣不急救氣則以何法救之乎黃芪補血湯黃芪二兩肉桂五分當歸一兩水煎服一劑血止二劑氣旺三劑氣旺不至垂絕之憂也倘認是寒大用辛熱全不補氣血則過於燥烈必至亡陽爲可危耳

Eastasian Library and the Oestrich Collection University Library

有大怒後忽然腹疼墜胎後仍腹痛人以爲肝之餘火未退也誰知血不歸經而痛乎夫肝藏血怒則血不藏宜失血而不宜墜胎何爲失血胎亦墜乎不知肝性急血門不閉其血直擣胞胎胞胎原通于心腎肝血來冲必斷絕心腎之路胎因心腎路斷而胎氣一時遂絕所以墜也而疼如故者因心腎來援欲續無計彼此痛傷而肝氣欲歸于心而心不受欲歸於腎而腎不受血猶未淨除而痛未已也治法引肝血仍入肝中而腹疼自止然引肝血而不平肝木則氣逆不易轉血逆不易歸也用引氣歸血湯白芍五錢當歸五錢荊芥三錢炒黑白朮三錢丹皮三錢乾姜五分炒黑鬱金一錢香附五分麥冬三錢甘草一錢水煎服方名引氣寔仍引血也引血即是引氣氣歸肝中即血歸肝內矣氣血兩歸而腹猶作痛者吾不信也

鬼胎門

女人懷孕終年不產面色黃瘦腹大如斗肌膚消削有二三年不生者此鬼胎也必與鬼交或入神廟而興雲雨之思或遊山林而起交合之意皆能召祟成胎幸其人

不敢淫蕩見祟驚惶遇合而愧鬼祟不能久戀一合而去然淫氣妖氣已結于腹遂成鬼胎初則未覺久則漸大盖人身氣血不行內外相包如懷胎之兆似血臟之形寔非胎也治必逐穢爲主然懷孕數年即非鬼胎其氣血必衰況非眞孕則邪氣甚旺而正不敵邪其邪弱之狀可掬烏可以迅利之味祛蕩之乎必由補中逐之爲得蕩鬼湯雷丸三錢大黃一兩紅花三錢枳殼一錢厚朴一錢桃仁三十粒當歸一兩人參一兩牛膝三錢丹皮三錢水煎服一劑腹必大鳴瀉惡物半桶又一劑瀉盡惡物而愈此方以雷丸祛穢大黃掃除以紅花厚朴皆善行善攻之品邪亦何能留於腹中自然盡情逐下妙在以參歸補氣血則邪去而正不傷若單用雷丸大黃以迅下之必有氣脫血崩之害矣倘或自知鬼胎如室女寡婦一旦成形雖邪氣甚而眞氣未漓可用岐天師新傳紅黃霹靂散紅花牛觔大黃五錢雷丸三錢水煎服亦能下胎但恐過傷氣血不若前方有益無損爲佳也在人善用之耳

難產門

Eastasian Library and Archive Collection
Copyright © 2012 Chinese University Library

有腹疼數日不能生產人以爲氣虛力弱不能送子出產戶也誰知血虛膠滯胎中無血兒難轉身乎夫胎之成由於腎之精而胎之養半資于臟腑之血故血旺者子易生血衰者子難產所以臨產之前必須補血然血難驟生補氣正所以生血也然補氣而不兼補血則陽過旺而陰不足偏勝之害恐有升而不降之患故宜氣血兼補氣旺則能推送而出而血又足以濟之又何有膠滯之憂哉送子丹黃芪一兩　當歸一兩　川芎三錢　熟地五錢　麥冬一兩　水煎服一劑生下矣且無橫生倒養之病此氣血兼補之方也然補血重于補氣無論氣血兩平陰陽交泰易於生產而血旺於氣則胞胎之內無非血也如舟行遇淺雖用盡力氣終難移動得春水之汎濫則舟自行又遇順風有不揚帆迅走者乎血猶水也氣猶風也無水而風雖順亦何益哉故補氣必補血耳

有兒已到門不能生下此危急存亡之時也人以爲胞胎先破水不能送之故誰知交骨不開乎盖產門之上有骨二塊兩相鬬閤未產之先其骨自合將產之際其骨自開產門之肉原自斜生皮亦橫長可寬可緊可大可

小苟非交骨聯絡則產門大開可用手入之以探之胞胎也故交骨爲鬼門之關亦爲女人鎖鑰之鍵此骨不閉腸且直下然交骨之能開合者氣血主之也無血而兒門閉無氣而兒門不開欲兒門之開闔必須交骨順滑而後可非大補氣血交骨何能開乎然閉之甚易開之甚難生產而交骨不開者因產前貪色也過於泄精則氣血大虧無氣血以行于兒門則交骨粘滯而不易開故開交骨必於補氣血之中而用開骨之葯而產門自開子自下矣降子散當歸一兩人參五錢川芎五錢

紅花一錢柞木枝一兩牛膝三錢水煎服一劑兒門一聲响亮骨如解散兒自下矣此方以人參補氣歸芎補血紅花活血牛膝下降柞木開關同心協力所以取效妙在用開于補之內也雖單服柞木亦能開骨但無補氣血之味則開不易合兒門不閉不無風入之憂也但子未至門切不可先用柞木以開產門然用降子散亦正無碍以其補氣血耳若單用柞木必俟兒到產門而用之也

有生子而足先下或手先出人以爲橫生倒產至危之症

誰知氣血甚衰乎。凡兒在胎中。兒身正坐。男向內。女向外也。及至生時頭必旋轉而後生。此天地造化之奇。非人力所能勉。然先天與後天。未嘗不並行。而不悖天機之動。必得人力濟之。人力者。非產母用力之謂也。乃產母之氣血耳。氣血足。而胎必順。氣血虧。而胎多逆。夫氣血既乏。則母身多弱。子在胎中又何能強。雖欲轉頭。往往無力。故破胎而出。此手足所以先見也。以針刺兒手足。兒即驚縮而入。急用轉天湯以救之。人參一兩　當歸二兩　川芎一兩　牛膝三錢　升麻四分　附子一分　水煎一服。子轉身矣。急用二劑。自生下矣。此方以人參歸芎補氣血。人盡知其義。乃用升麻牛膝附子。恐未知其妙。蓋兒身已斜。非用提挈。則頭不易轉。頭已轉矣。非用下行。則身不速降。二者並用。非附子不能無經不達。使氣血迅達。而推生也。

有生產三四日。子已至門。交骨不開。子死母未亡者。服開交骨之葯。不效。必有死亡之厄。今不死者。正因子已死。胞胎已墜。子母離開。子死而母氣已收。未同子氣俱絕也。治法。但救其母。不必顧其子矣。然子在產門。塞住其

口亦有死之道仍宜用推送之法補氣以生血血氣兩旺死子可出也倘用祛除降墜之劑則死兒未必下母先脫矣非救援之善也救母丹當歸二兩人參一兩川芎一兩荊芥三錢益母草一兩赤石脂末一錢水煎一服子下矣此方以歸芎補血人參補氣氣血旺則上能升下能降氣能推血能送矣安有阻滯之憂乎益母草善下死胎赤石脂易化瘀血自一湧而出耳

有生產六七日胞水已破子不見下人以爲難產也誰知子已死腹中乎夫子死兒門易於辨生死兒死腹中難於辨生死兒在門邊未死者頭必能伸縮已死者必不動也若係未死少拔其髮兒必退入矣故易辨也若死於腹中何由知之凡子死腹中者產母之面必無黑色難產之時產母面有黑氣子母兩亡面無黑氣是母無死氣也非子死而何以此辨之斷斷不爽既知子死腹中不用葯以降之亦危道也豈以覇道瀉之乎生產六七日氣血困乏烏勝覇道哉況覇道必逐其子也子下而母且立亡必仍補其母而子自出矣用瘵兒散人參一兩當歸二兩川芎一兩牛膝五錢乳香末二錢鬼舊

三錢水煎服。一劑子下矣。凡兒頭之難轉。原氣血之衰也。世人往往用催生之葯。以耗兒氣血則兒氣不能通達。反閉悶而死。寔醫殺之也。所以難產不可催之。惟補氣血。救兒無窮也。此方救死兒之母。仍大補氣血。所以救本也。誰知救本。正所以催生哉。

有產數日而胎不下。服催生方不效。人以爲交骨難開也。誰知氣結不行乎。夫交骨不開。固爲難產。然兒頭至門。不能下者。乃交骨不開也。宜用開骨之劑。若子未到門。而不產者。非交骨不開也。若開交骨。則兒門大開。兒頭未轉。必變出非常也。大約生產之時。初忌坐盆太早。兒頭未轉。原難驟生。乃早坐盆。見兒不下。未免心懷恐懼。則神怯。而氣下不升。上焦閉塞。而氣乃逆矣。氣逆而上焦脹滿。氣益難行。氣阻上下之間。不利氣而催生。則氣逆而胎更閉矣。治法。但利氣不必催生。胎自下矣。舒氣飲。人參一兩　紫蘇三錢　川芎五錢　當歸一兩　陳皮一錢　白芍五錢　牛膝三錢　柴胡八分　葱白七寸　水煎一服。氣轉子下矣。此方利氣。而寔補氣。氣逆由於氣虛。氣虛易於恐懼。補氣而恐懼自定也。況蘇柴牛芍。無非平肝疏

CC-0. NOT COPYRIGHT. Gest Collection
Hist Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

肺之品佐以人參歸芍寔有補利之益也何必開交骨之多事哉

血暈門

有生子後忽眼目昏花惡心欲吐或神魂外越恍如天上雲行人以爲惡血冲心也誰知氣虛欲脫而血暈乎夫新產後血必盡傾血舍空虛止存微氣倘陽氣表虛則不能生血心中之血前已廕胎胎破而心血隨胎而墜則心無血養望血以固之也今氣又虛脫而心君無護所剩殘血欲奔回救主而血非正血不可歸經變亂內庭反成血暈矣治必大補氣血勿單治血暈也或疑心爲血暈今更補血不更補暈乎不知新血不生則舊血不散補血以生新血正活血以逐舊血也但有形之血難以速生無形之氣易於迅長補氣以生血不又易於補血以生血乎解暈湯荊芥三錢人參一兩當歸一兩炮姜一錢黃芪一兩水煎一服暈止二服心定三服血旺四服血生再不暈也此解血暈聖方凡產後能服此方必無死亡之症或疑參多不能用減去大半或少一二錢多服數劑自無不奏功也

有子方下地即昏暈不語此血氣雙脫也本在不救然救得法亦有生者余隱受天師授傳忍不告以救萬世乎此時急以衣針刺眉心之穴血出即能語矣後以獨參湯人參一兩煎灌之無不生者倘無力買參則用當歸補血湯黃芪二兩當歸一兩煎服亦可切不可於二方之中輕加附子盖附子無經不達反引氣血之葯走而不守不能耑注於胞胎不若人參歸芪直救氣血之絕聚而不散也夫產婦昏暈全是血舍空虛無血養心以至血暈舌乃心之苗心既無主舌又安能出聲耶眉心

上通于腦下通于舌而繫則連于心刺眉心則腦與舌皆通而心中清氣上通瘀血自降然後以參芪當歸補之則氣血接續又何死亡乎雖單用參芪當歸閒亦能生者然終是刺眉心則萬無一失瘀血冲心所以昏暈不語解其瘀血之冲所謂扼要爭奇也世人但知灸眉心之法不知刺勝于灸盖灸緩而刺急急則易於回生緩則難以救絕也

有產後三日發熱惡露不行心爲敗血所攻狂言呼叫甚欲奔走拏捉不定人以爲邪熱在胃也誰知血虛心無

所養乎產後之血盡隨胞胎外越則血室空虛五臟皆無血養此時只心中之血尚存些微以護心也而各臟腑皆欲取給于心心包爲心君之相攔截各臟腑之氣不許入心故心安神定是護心者全藉心包也然心包亦虛尚不能障心而各臟腑之氣遂直入心中以分取心之血而心包情極既不能顧君又不能禦中于是大聲疾呼欲號召勤王迹反過于狂悖故病似熱寔非熱也治法大補心中之血使各臟腑分取之以自養不必再求于心君則心安而心包亦安矣安心湯生地五錢乾荷葉一片丹皮五錢當歸二兩川芎一兩生蒲黃二錢一劑即定惡露亦下矣此方以芎歸補血何又丹皮生地涼血似非產後所宜不知惡血奔心未免因虛熱而相犯吾于補中涼之則涼不爲害況加乾荷葉則七竅相通引邪外出於心而不內害於心又佐蒲黃以分解惡露也此方只可暫用一劑以定狂不可多用以取勝也

有子已下地胞衣留腹三日不下心煩意躁時欲暈去人以爲胞胎之蒂未斷誰知乃血少乾枯粘連於腹乎人

East Asian Library Project on the Gest Collection
PO NOTCOPY Princeton University Library

見胞衣不下心中疑懼恐上冲心有死亡之兆然胞衣何能冲心也然胞衣未下而血難行有血暈之虞耳治宜大補氣血使生血以送胞胎胞衣自然潤滑生氣以生血血生尤速更易催墜也用送胞湯當歸二兩川芎五錢乳香末一錢沒藥末一錢益母草一兩麝香半分研荆芥三錢水煎調服立下此方以芎歸補氣血荆芥引氣血歸經益母乳香等味逐瘀下胎新血既生舊血雖存氣旺上升瘀濁自降也胞衣是物也非依于子即依於母不隨子而下以子之不可依也故留於腹有顧母之心而母胎雖已生子蒂間之氣原未絕也所以流連未脫也往往有在腹六七日不下竟不腐爛正以其有生氣也可見胞衣在腹不能殺人補之自降也或謂胞衣既有生氣補氣血則胎衣宜益堅固何以補之而反降不知子未下補則益于子子已下補則益于母益子而胞衣之氣連益母而胞衣之氣脫寔有不同又是何故氣連者胞胎之氣閉氣脫者胞胎之氣開通則兩合閉則兩開矣所以補氣血胞衣反降也

有兒下地五六日胞留腹中不下絕無煩躁昏暈之狀人

以爲瘀血粘連也。誰知氣虛不能推送乎。夫瘀血在腹。斷無不作祟之理也。有則必然發暈。今則安然無恙。是血已盡矣。血盡宜清氣升。而濁氣降。今胞胎不下。是清氣下陷。而難升。遂至濁氣上浮。而難降。然濁氣上升。又必有煩躁之病。今亦安然者。是清濁之氣不升也。然則補氣。不無濁氣上升乎。不知清升濁降者。自然之理。未有清升而濁亦升者也。能于補氣之中。分其清濁之氣。則升清正所以降濁也。用補中益氣湯。人參三錢　黃芪一兩　當歸五錢　升麻三分　柴胡三分　陳皮二分　白朮五錢　甘草一錢　卜子五分　水煎服一劑。胞自下矣。此方補氣。即提氣之葯也。並非推送之劑。何以下胞衣。如此之速也。不知濁氣不陷。由于清氣不升也。提氣則清升。而濁氣自降。而腹中所存之物。無不盡降。不必又推送之也。又有卜子。能理清濁。不致扞格。所以奏功耳。

產後諸症門

產後小腹痛甚。則結成一塊。手按之更痛。此名兒枕痛也。兒枕者。前人謂兒枕頭之物也。兒枕不痛。豈兒生不枕反痛乎。是非兒枕可知。但何以作痛。乃瘀血成團未散

也。此痛多是健旺女人。血之有餘。非血之不足。似可用破血之葯。然血活。則瘀血自除。血滯則瘀血作祟。不補血而破血。雖瘀血可消。畢竟耗損氣血。不若於補血中。以行逐穢之法。則瘀血既去。氣血又復不傷也。散結安枕湯。當歸一兩　川芎五錢　山查十粒　丹皮二錢　益母草三錢　荊芥二錢　桃仁七个　乳香一錢　水煎服。一劑而止。此方逐瘀於補血之中。消塊於生血之內。妙在不耑攻痛。而疼自止。世人一見兒枕痛。動以延胡蘇木蒲黃五靈脂等。以化塊。又何足論哉。

產後小腹痛。按之即止。亦以為兒枕痛也。誰知是血虛之故乎。產後亡血過多。則血舍空虛。原能腹痛。但疼有不同。如燥糠觸骭光景。此乃虛痛。非寔痛也。凡虛痛宜補。而產後虛痛。尤宜補也。惟血虛之病。必用補血之劑。而補血之味。潤滑居多。恐與大腸有碍。然產後則乾燥。滑潤正相宜也。故補血。不但腸中甚安。亦甚便也。腸寧湯。當歸一兩　續斷二錢　阿膠三錢　人參三錢　炙草一錢　麥冬三錢　山葯三錢　熟地一兩　肉桂二分　水煎服。二劑疼止。多服尤佳。此補氣血之方。然補氣。無太盛之憂。補血。

亦無太盛之患。氣血既生而痛止矣。

產後氣喘。最是危症。苟不急治立死。人以爲氣血兩虛也。誰知氣血相脫乎。夫氣血既脫。人將立死。何能作喘。此乃血脫。氣未脫也。血脫欲留而氣又不能留血之脫。故氣上喘。如人與賊鬬。力不能勝。乃號呼求救鄰人之助。故聲呼喘作。其症雖危。而可救處。正在作喘。肺主氣也。喘則肺氣若盛。而不知是肺氣之衰。此時血難驟生。只存些微之氣。望肺相救。甚急而肺因血失無力。難以提挈。則氣安保不遽脫乎。是救氣必須提氣。而提氣必須補氣也。用救脫活母丹。人參三兩 肉桂一錢 當歸一兩 麥冬一兩 山萸五錢 枸杞子五錢 熟地一兩 阿膠三錢 荆芥三錢炒黑 水煎二服。喘輕。三服喘平。四服全愈。此以人參救續元陽。然補氣而不補血。則血燥陽旺。雖回陽于一時。不能治陽于永久。亦旋得旋失也。即補血矣。而不補腎肝。則本不固。陽何由續乎。所以用萸熟枸杞。補肝腎之精。而後益肺氣。肺氣健旺。升提有力也。又恐新產後。以補陰之藥。膩滯不行。加入肉桂。補命門之火。不但火氣有根。助參以生氣。且運化地黃之類。以化精

微然過于助陽萬一血隨陽動瘀血上行亦非善計又荆芥引血歸經則肺氣更安喘尤易定也

產後惡寒惡心身顫發熱作渴人以爲產後傷寒也誰知氣血兩虛正不敵邪之故乎凡人正氣不虛則邪難入產後失血既多則氣大虛虛則皮毛無養邪原易入不必戶外之風襲骭即一舉動風即乘虛而入矣然產婦風入易而風出亦易凡有外邪不必祛風況產婦惡寒者寒由內生非外入也發熱者因內虛非外寔也治其內寒而外寒自散治其內熱而外熱自解矣十全大補湯人參三錢黃芪一兩白朮五錢茯苓三錢甘草一錢熟地五錢白芍二錢川芎一錢當歸三錢肉桂一錢水煎二服寒熱解身亦涼矣此方補氣血之虛不去散風邪之寔以正氣足邪自除矣況無邪氣乎所以奏功也

產後惡心欲嘔時吐人以爲胃寒也誰知腎氣冷乎夫胃爲腎關胃寒則不能行于腎之中而腎寒則亦不能行於胃之內是胃腎不可分爲兩治也惟產後失血血虧必至腎水之涸腎涸宜腎火炎上矣不宜胃有寒冷之虞也何故腎寒胃亦寒乎蓋新產之餘水乃遽然涸去

Digitized by Google
Original from Harvard University Library

其虛火尚不能生。火既不生。而寒象自見。治當補腎中之火矣。然無水相濟。則火過熱。恐成火動陰虛之症。必於水中補火。腎火溫胃。而後腎無太熱之虞。胃有既濟之歡也。溫胃止嘔湯。人參三錢 橘紅五分 白豆蔻一粒 巴戟天一兩 白朮一兩 茯苓二錢 炮姜一錢 熟地五錢 山萸五錢 水煎二服吐止。四服全愈。此方治胃多於治腎。所以胃氣升騰。寒氣盡散。不必以太熱之味。溫胃祛寒。

產後腸下。亦危症也。人以爲兒門不閉。誰知氣虛下陷。而不收乎。夫氣虛下陷。似宜升提以提氣矣。然新產。恐有瘀血在腹。一旦提氣。恐瘀血亦上升。則冲心之患。變出非常。是氣不可提也。氣不可提。腸又下陷。將何治之乎。止用萆麻以吸之歟。設萆麻一時不可猝得。將奈之何。不知氣之下陷。因氣虛也。補其氣。氣旺。則腸自升。不必用升提之味也。但必多用補氣之葯。少則力薄。難以上升。多則陽旺力大。何至終陷也。升腸飲。人參一兩 黃芪一兩 白朮五錢 當歸五錢 升麻一分 川芎三錢 水煎一服。腸升矣。此方純補氣。絕不升腸。即加升麻一分。引氣而不引血。蓋升麻少用。則氣升。多則血升也。

Eastasian Library Collection
Copyright © 2010 Gest Collection
Hong Kong University Library

產後半月。血崩昏暈。目見鬼神。人以爲惡血冲心。誰知乃不愼房幃乎。夫產後半月。雖不比初產一二日。然氣血新生。未能全復。卽血路已淨而胞胎損傷如故。必不可交合。以重傷門戶。今血崩而至昏暈。目見鬼神。是心腎兩傷。不止胞胎門戶已也。明犯色戒。又皆酣戰。大泄其精。精泄。神亦脫矣。此症多不可救。然思一救之之法。舍補氣無二方也。救敗求生湯。人參二兩 熟地一兩 當歸二兩 川芎五錢 白朮二兩 山萸五錢 山葯五錢 附子一錢 棗仁五錢 水煎一服。神定。二服暈止。血亦止矣。否則不救。此方補氣。以回元陽。於無何有之鄉。陽回則氣回矣。氣回可以攝血。歸神可以生精。續命。不治他症。他症自除也。

有臨產因收生婆。手入產門。損傷尿胞。因而淋瀝不止。少忍須臾而不可得。人以爲不能補也。誰知不然。夫破在皮膚。尚可完補。豈破在腹。獨不可療之乎。或以破外者。可用葯以生皮膚。今破在內。卽有外膏。無可補救。不思瘡瘍之毒。大有缺陷。尚可服葯以長肉。況收生小有損傷。又無惡毒。何難補耶。用完胞飲。人參一兩 白朮一兩

當歸一兩川芎五錢桃仁十粒益母草三錢黃芪五錢茯苓三錢紅花一錢白芨末一錢以猪羊胞煎湯再熬藥飢服十日全愈夫胞損宜補胞之藥何反用補氣血耶蓋生產而至收生婆手探其難產必矣難產者氣血虛也產後大傷氣血是虛其虛矣因虛而損又因損而虛不補氣血胞胎何以重完乎今補氣血則精神驟生氣血再造小損何難完補旬日便成功耳

產後四肢浮腫寒熱往來氣喘咳嗽胸鬲不利口吐酸水脇痛人以爲敗血流入經絡四肢以致氣逆也誰知腎肝兩虛陰不能入陽乎夫產後氣血大虧自然腎水不足而腎火沸騰水不足則不能養肝肝木大燥水中無津火發于木而腎火有党子母兩焚將火焰直冲而上金受火刑力難制肝而咳嗽喘滿之症生肝火既旺必尅脾土土衰不能制水而浮腫之症生然肝火之旺乃假旺非眞旺也假旺則氣若盛而寔衰故時熱時寒往來無定隨氣之盛衰而爲寒熱熱非眞熱寒非眞寒氣逆胸鬲而不舒而脇肝位也酸乃木之味吐酸脇疼皆肝虛而腎不能容也治法補血以養肝尤補精以生血

精血足而氣順矣轉氣湯人參三錢熟地一兩山萸三錢白芍五錢破故紙一錢當歸五錢茯苓三錢芡寔三錢山葯五錢柴胡五分白朮三錢水煎服此方多補精血何以名之轉氣也不知氣逆由於氣虛氣虛者腎肝之氣虛也今補腎肝之精血所以補腎肝之氣也氣虛則逆氣旺有不順者乎是補氣即轉氣也氣轉而各症盡愈陰入于陽陽無扞格之虞矣

產後水道中出肉線一條長三四尺動之則疼欲絕人以爲胞胎下墜也誰知帶脉虛脫乎夫帶脉束于任督之脉任前督後兩脉有力則帶脉堅牢無力則帶脉崩墜產後亡血太多無血以養任督帶脉崩墜力難升舉故隨溺下帶脉下垂每作痛于腰臍況墜出產門失關鍵更甚安得不痛絕乎治法大補任督之氣則帶自升矣兩收丹白朮二兩人參一兩川芎三錢山葯一兩芡寔一兩巴戟天三錢白果十個扁豆五錢杜仲五錢熟地二兩山萸四錢水煎服二服全收矣此方補任督仍補腰臍者何故蓋任督脉連腰臍補任督不補腰臍則任督無力帶脉何以升舉惟並補之而任督得腰臍之助

兩脉氣旺帶何收乎所以二劑奏功也

產後戶內一物垂下其形如帕或有角或二岐人以爲產頹也誰知乃肝痿乎夫產後何以成肝痿乎盖因產前勞役過傷又觸惱怒產後肝不藏血血亡過多故肝之脂膜隨血崩墜寔非子宮也若子宮下墜狀如茄子只到產門而不越出產門之外惟肝之脂膜往往出產門者長六七寸且有粘席乾落者一片如掌大使子宮墜落人且死矣安得生乎治法大補氣血少用升提之味則肝氣旺易生肝血血旺易養脂膜不收自收矣收脂湯黃芪一兩人參五錢白朮五錢升麻一錢當歸三錢白芍五錢水煎一服即收或疑產婦禁用白芍何以用之奏功也嗟乎白芍原不可頻用也然病在肝者不可不用況用于大補氣血之中在白芍亦忘其酸收矣何能作祟乎且脂膜下墜正借酸收之味助升麻以提血所以無過而收功耳

下乳門

有產後數日絕無點滴之乳人以爲乳管閉也誰知氣血之涸乎夫無血不能生乳無氣亦不能生乳乳者血所

East Asian Library of Cornell University Library
Copyright © 2010 Cornell University Library

化也。然二者之中。血之化乳。不若氣化乳之爲速。產後血已大虧。生血之不遑。何能生乳。全借氣以行血。成乳也。今數日而乳不下。誠血少氣微。氣旺乳旺。氣衰乳衰。氣絕乳絕。必然之勢也。世人不知補氣之妙。一味通乳。無氣則血從何來。無血則乳從何化。治法。補氣以生血。不可利竅而通乳也。通乳丹。人參一兩　當歸二兩　桔梗三分　麥冬五錢　黃芪一兩　木通三分　猪蹄二個　水煎二服。乳如泉矣。此方補氣血以生乳。正以乳生于氣血也。產後氣血衰。而無乳。非乳房之閉者可比。然則不必通乳也。今方名通乳者。因無乳而名之。不通乳而乳生。即名生乳丹。未爲不可也。

有壯婦產後數日。或丈夫之嫌。或公姑之誶。以至兩乳脹滿作痛。乳汁不通。人以爲陽明火也。誰知肝經鬱結乎。夫陽明多氣血之腑。乳汁之化。原屬陽明經也。然陽明屬土。必得肝木之氣相通。則稼穡作甘。始成乳汁。未可全責之陽明也。壯婦產後。雖多亡血。而氣未衰。乳汁之化。在氣而不盡在血。宜乎有乳。今數日而乳脹滿作痛。是欲化乳而不得。非無血不能化乳也。此乃因羞成鬱。

肝氣不提。而陽明土氣。因而同鬱。木土相合相鬱。安能化乳哉。治法。大舒肝木之氣。則陽明氣血自通。乳亦自流也。通肝生乳湯。白芍五錢　當歸五錢　麥冬五錢　通草一錢　柴胡一錢　白朮五錢　熟地一兩　遠志一錢　甘草三分　水煎一服即通。此方葯料太重。似于產婦不宜。不知健婦抱鬱。不妨權宜用之。若非少壯之婦。雖因鬱少乳。不可全用。減半治之。亦不至全失。臨時斟酌之可也。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library