PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑 卷十二 下函

玄部

背癰　肺癰　肝癰　大腸癰　小腸癰
無名腫毒　對口癰　腦疽　囊癰　臀癰
乳癰　肚癰　多骨疽　惡疽　疔瘡
楊梅瘡　腰疽　鶴疽　脚疽　髮疽
唇疽　瘰癧　痔漏　頑瘡　接骨
金瘡　物傷　癩門　刑杖　驚癇吐瀉
便毒　痘瘡　喫泥　胎毒　疹瘡

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library Do Not Copy

C83/2796
v.12

辨證氷鑑卷之十二

山陰陳士鐸遠公著

背癰門

有背心間先發紅瘰。後漸紅腫。此發背之兆也。最爲可畏。古人云。外大如豆。內大如拳。外大如拳。內大如盤。言其外小而內寔大也。然癰疽等毒。必辨其陰陽。有先陰變陽者。有先陽變陰者。有前後俱陽者。有前後俱陰者。陽症雖重而寔輕。陰症雖輕而寔重。先陰變陽者生。先陽變陰者死。何以知之。陽症形高大而腫起。陰症形低平

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
and the Gest Collection
University Library

而陷下。陽症色紅。陰症色帶黑。陽症初起必痛。陰症初起必癢。陽症潰爛多血。陽症收口身必輕爽。陰症收口身必沉重。至于變陰變陽以此消息。必不差也。見紅腫高突。乃陽症也。乘其肉腫初發。肉猶未化。急以散毒之藥治之。可隨手愈也。發背至橫決者。皆因循失治。以至破敗而不可救。陽變陰者多矣。救癰如救火。宜速撲滅。否則延燒屋廬。不盡不止。切勿見爲陽症輕緩治之也。急消湯忍冬藤二兩　茜草三錢　貝母二錢　紫花地丁一兩　甘菊花三錢　桔梗三錢　黃柏一錢　花粉三錢　生甘草三錢　水煎服。三劑全消。不四劑也。此方消陽毒。初起極神。既無迅烈之患。大有和解之妙。人不知治法。謂陽毒易于祛除。浪用虎狼之味。毒雖消散。而眞氣耗損。往往變成他症。乃醫者成之也。何若王霸並施。有益無損。爲妙哉。

有背心發癤癰甚。已而背如山重。隱隱發紅暈。如盤大。此陰癰初起之形。最爲可畏。非前症可比。乃一生罪孽鬼祟憑身。必胡言讕語。將平日欺心之事。盡情宣布。此症本不救。然人心善惡。成于一念。苟肯悔艾而刀圭無術。

Copyright East Asian Library Princeton University

亦見吾道之無奇矣。夫陽症有可救之條。陰症豈無可生之理。在治之得法耳。大約陰症雖成于鬼祟之纏。亦必正氣大虛。邪得入之也。故治法必用補氣血之藥。佐以散鬱散毒之品。則正旺邪自散矣。變陽湯。人參二兩　黃芪二兩　金銀花半斤　勿附子一錢　柴胡二錢　白芍一兩　花粉五錢　生甘草五錢　荊芥三錢炒黑　用水十餘碗煎汁二碗。先服一半。後又服一碗。陰必變陽而作痛。又一劑痛消。再一劑全愈。世人不見此方。用此方以治發背無論病人不肯服。卽醫士亦不肯用。往往決裂潰爛瘡口如碗大而不可收。始悔參芪之遲用矣。所以論症而多戒辭。勸人早服此方。以免喪命。蓋陽毒可用攻毒而陰毒必須補正。以參芪補氣氣旺則幽陰之毒不敢入心肺之間。金銀花性補善解陰毒得參芪而功益大。然非附子不能直入陰毒之中而叉出于陰毒之外。毒深者害深。又加生甘草以解餘毒。然毒結于背。氣血之壅也。壅壅者。鬱之極也。故加柴荊白芍花粉。消痰通滯。開鬱引經。自然氣宣血活。痰消毒自消也。

有背癰潰爛。洞見肺腑。瘡口黑陷。身不能卧。口渴思飲。人以爲陽症敗壞也。誰知陰虛不能變陽乎。夫背癰雖有陰陽之分。及至潰膿之後。宜補內而不宜消。則陰陽之症一也。潰爛而見肺腑。此足見失補之故。使毒過于延燒。將好肉化爲瘀肉。耳肉瘀。必腐腐則洞見底裡。此症九死一生之兆。倘胃氣健能食者。猶可治。若見食則惡者。必無生理。然能用參芪歸熟。亦有生者。轉敗湯。人參二兩 生黃芪一兩 熟地二兩 肉桂二錢 白朮四兩 當歸一兩 金銀花四兩 麥冬二兩 山萸一兩 遠志三錢 柴苓三錢 北五味一錢 水煎一服。胃氣大開者。即可轉敗爲功。倘服後少能健飯。亦在可救。若杳無應驗者。乃胃氣將絕矣。不必治之也。或服之而飽悶。少頃而少安者。亦有生機。此方補氣血更補肺腎之陰。蓋陰生則陽長。陰陽生長則有根。易于接續。後以銀花解餘毒。則毒散而血生。血生而肉長。肉長而皮合也。倘以解毒爲事。不補氣血之陰陽。則陰毒不能變陽。有死而已矣。不亦悲哉。

有背癰將愈。瘡口不收。治無一效。人以爲餘毒未盡也。誰知陰虛不能濟陽乎。夫癰疽初起。則毒盛。變膿則毒衰。

膿盡則毒化矣瘡口不收乃陰之虛非毒之旺人不知治法以敗毒攻之是已虛益虛也欲肌肉之長也得乎世亦有補而不效者但用陽分之品以補陽不用陰分之味以補陰也蓋獨陰不長獨陽不生今膿血盡矣陰必大虛只補陽則陽旺陰虛陰不能交于陽矣雖陽有濟陰之心而陰無濟陽之力所以補陽而陰愈虛瘡口愈難合也治必大補其陰使陰精盛滿自能灌注瘡口不必用生肌外敷瘡口之肉內生矣生膏散麥冬一兩熟地二兩山萸一兩人參五錢肉桂一錢忍冬藤一兩當歸一兩白朮五錢水煎二服肉自內長又二服外口自平又二服全愈此方補陰多于補陽使陰勝于陽也然補陽之葯仍是補陰之助以其能入陰中交于陽內也忍冬非特以解餘毒取其能領各味至瘡口之間也

有背瘡長肉瘡口已平忽開裂流紅人以爲瘡口肉未堅也誰知色慾惱怒不謹乎凡癰症最忌色慾次忌惱怒犯惱怒新肉有開裂之虞犯色慾新肉有流水之害然此猶些小瘡癰也其在背癰犯惱怒者不過疾病犯色慾者多致死亡瘡口開裂之處必色變紫黑流血之處

East Asian Library Princeton University Digital Collection

肉必變敗壞矣此時必急補氣血切不可仍治其毒蓋前毒未盡必難收口復至敗壞寔新肉不堅而自決裂也況發背新愈其精神氣血空虛交合泄精遂變出非常舍補氣血又安求活乎然補氣血必用大劑方能收危亂之功也定變回生湯人參四兩黃芪三兩北五味二錢當歸二兩麥冬二兩肉桂三錢白朮二兩忍冬藤二兩山萸五錢茯苓一兩水煎二服肉自生矣三劑皮仍合矣四劑平復如故切戒再犯再犯無不死者此方亦不能救矣此方救瘡瘍壞症仙丹不止治發背愈後犯色敗腐也人疑泄精以至決裂宜熟地大補之何故不用以熟地補陰最緩而症犯甚急所以不用熟地多用氣血之葯救其垂危非熟地不可用輕棄之也此方數劑後正宜減半而多加熟地以為善後計耳

有夏月生背癰瘡口不起脈大無力發熱作渴自汗盜汗用參芪補劑益加手足逆冷大便不寔喘促嘔吐人以為火毒太盛也誰知元氣大虛補不足以濟之乎夫癰分陰陽瘡口不起乃陰症也脈大似乎陽症大而無力非陰而何發熱作渴此水不足以濟火故作渴作汗也

既陰症似陽用參芪助陽、足以祛陰而返陽矣、何以愈補反作逆冷嘔吐、此陰寒之氣甚而微陽之品力不能勝耳、非加桂附子之辛熱、何能斬関以祛蕩陰邪哉、助陽消毒湯、人參八兩 黃芪一觔 當歸四兩 白朮四兩 陳皮一兩 附子五錢 水煎膏、二次服、諸症退、服數劑瘡起、乃減半、又服數劑而愈、此非治癰之法也、然以治癰之法、而輕治此等之症、鮮不立亡、可見治癰不可熱也、大約陽癰可用消毒化痰而陰癰切不可用消毒化痰之葯、今舍癰從症、乃治癰變法、醫者不可不知也、

有背生癰疽潰膿之後、或發熱或惡寒或作痛、或膿多、或流清水、自汗盜汗、膿成不潰、口爛不收、人以為毒氣未盡也、誰知五臟虧損、血氣大虛之故乎、凡人氣血壯盛、陰陽和平、何能生毒、惟脏腑內損、而毒氣得以內藏、久之外泄、及至癰疽發出、其毒自不留內、然脏腑原虛、又加流膿血、則已虛益虛、觀其外而瘡口未斂、似乎有餘、審其內而氣血未生、寔是為不足、法當全補、不必偏補一脏、致有偏勝之虞也、用十全大補湯為妙、以其全補氣血耳、然有不效者、非方之不佳、乃用之不得法也、夫背

癰何等之症豈細小之劑所能補哉必大劑始克有濟
予酌一方以清正人參一兩黃芪二兩白芍五錢肉桂
二錢川芎三錢生甘草三錢熟地二兩當歸一兩白朮
五錢茯苓五錢水煎服一劑有一劑之效也人以此方
絕不散毒如何毒化肉生不知癰疽未潰以化毒為先
癰疽已潰以補正為急縱有餘毒未盡不必敗毒也敗
毒之味非寒涼即消耗消耗即損人眞氣寒涼則傷人
胃氣胃氣傷則穀氣全無眞氣損則邪氣反盛何能生
肌肉哉惟此方專助眞氣以益胃氣故能收全效但此
方不但治背癰已潰凡瘡瘍已潰者皆宜用之惜世人
未知也

肺癰門

人有胸膈間作痛咳嗽時更加痛手按之更增氣急人以
為肺癰也誰知肺熱生癰乎夫肺為嬌臟藥食所不到
者也故治之甚難治法似宜瀉火以救肺藥既不入肺
而肺為脾子脾經未嘗不受藥也補脾土則土能生金
也平肝木則金不尅木也清心火則火不刑金也三經
有益于肺無損于金則肺氣得養後以消毒之品解肺

之邪。何癰不散乎。全肺湯。元參三兩。生甘草五錢。花粉三錢。茯苓三錢。金銀花五兩。白芍三錢。麥冬二兩。水煎服。二劑痛減。內消矣。凡癰疽症。必須內消。不可令其出毒內消之法。總不外心肝脾三經。而別無消癰之道也。或曰。肺之子腎也。獨不可治腎以消乎。然肺癰雖成於火燥肺金之液。寔因肺氣之自虛也。補腎雖或能使肺不來生腎。但肺腎相通。補腎之水。恐肺氣下降。而火毒反不肯遽散。不若止治三經。使肺氣得養。自化其毒。不遺于腎。爲妙也。

人有胸膈作痛。咳嗽不止。吐痰便覺甚疼。按之痛不可忍。喉間聞腥臭之氣。隨吐膿血。此肺癰不但已成而且已破矣。未破者易消。已破者難治。以膿血未能遽淨耳。然得法亦無難也。夫肺之生癰者。因肺火不散也。然肺火之來。因肺氣之虛也。肺虛而後火留于肺。火盛而結爲癰。不補虛以散火。而未成形者何以消。已成形者何以散。既潰爛者。又何以愈哉。是虛宜補矣。然補何脏乎。若補肺虛而肺不能直補。只補胃氣。則肺氣自旺矣。今癰已破。多吐膿血。則肺氣尤虛。雖毒氣尚存。不可純瀉其

毒于補氣之中而行攻散之法則毒易化而正氣無傷也完肺飲人參一兩元參二兩蒲公英五錢花粉三錢金銀花二兩生甘草三錢桔梗三錢黃芪二錢水煎一服膿必多二劑漸少又三劑痊止膿血亦止六劑全愈也此方補胃氣卽瀉胃中之火旺胃氣而肺氣自不能衰瀉胃火而肺火自不能旺所以敗毒生肉也雖諸葯亦能入肺不單入胃然入胃者十之八入肺者十之二仍是治胃益肺之葯也或問肺癰已破病已入裏似不宜升提肺氣南昌喻嘉言謂宜引之入腸而先生仍用桔梗開提肺氣恐不可爲訓嗟乎余所用葯無非治胃之葯入于胃有不下引入腸者乎然肺氣困頓清肅之令不行用桔梗以清肺上氣通而下行更速然則上之開提正下行之速逐也

人有久咳後肺受損傷皮膚黃瘦咽喉惟啞自汗盜汗不得卧吐稠痰腥臭毛悴色焦嗽時必忍氣須臾輕輕吐痰始覺膈上不痛否則大痛氣息奄奄人以爲肺癰也誰知乃是肺痿生瘡乎本不可救然治之得法亦有生者夫肺癰與肺痿不同肺癰生于火毒治之宜速肺痿

East Asian Library Princeton University

成於勞傷治之宜緩火毒宜補中帶瀉勞傷宜補中帶清清與瀉不同而補則同也瀉中用補可用大劑清中用補可用小劑勿忘勿助若有若無始奏功也養肺去痿湯用金銀花三錢生地三錢麥冬三錢紫苑五分百部五分生甘草五錢百合二錢款冬二分天冬一錢貝母三分白微三分水煎服十劑膈痰少減便有生機矣又十劑更輕又十劑漸愈共六十劑始全愈也此方不寒不熱養肺氣于將危保肺葉于將痿寔有奇功若圖效捷于一旦必至輕喪于須臾寧忍耐以全生勿欲速而送死也

有膏粱子弟多食熇熬厚味美醞香醪以致舌乾喉燥吐痰吐血喘急膈疼不得安臥人以爲肺經火熾誰知肺癰已成乎夫肺爲五臟之蓋喜清氣熏蒸惡燥氣炎逼今所食飲無非辛熱則五臟之中一團火氣火性炎上而肺獨受其害不能下生腎水腎水無源則益加燥勢必取資于肺肺金又病不亦虛其虛而燥其燥乎況各經紛紛來逼火烈金刑肺間生癰必至之勢也恰法化毒之中益以養肺降火之內濟之補腎庶已成者可痊

未成者可散也扶桑清肺丹桑葉五錢柴苑二錢貝母三錢犀角屑五分生甘草三錢款冬花一錢百合三錢杏仁七粒阿膠三錢金銀花一兩熟地一兩人參三錢水煎調犀末服數劑可收功也此方肺腎同治全不降火蓋五脏之火因飲食而旺乃虛火也故補水而金氣堅虛火息況補中帶散則非呆補火毒又易解也

肝癰門

有素多惱怒容易動氣一旦兩脇脹滿發寒發熱已而脇疼之至按之疼不可忍人以為肝火盛也誰知肝葉瘡乎人但知肺生癰不知肝亦能生癰也且靈素諸書亦未言及得毋創論以驚俗乎余聞異人云脇疼手不可按者肝葉生癰也靈素不談者以肝癰世不常有所以略之也凡古今之氣運不同癰毒之生長不一肝能生癰烏可缺而不論也況肝之癰未嘗無理也肝一惱怒則葉開張肝氣即逆大怒之後肝葉空脹未易平復使時加惱怒是肝葉竟不得安且惱後必然動火怒蓋多而火益盛盛必燥乾肝血血乾則肝氣大燥無血養肝更易發怒欲不癖結成癰烏可得乎然癰生于內何從

而見然外可辨也肝癰生在左而不在右左脇之皮必見紅紫之色也此而辨之斷斷無差治必以平肝爲主佐以瀉火去毒萬不可因循令其潰爛而不可救也化肝消毒湯白芍三兩炒枝子五錢當歸三錢生甘草三錢金銀花五兩水煎三服疼止又減半服數服全愈此方以歸芍入肝以滋肝血則肝血驟生易解肝血之燥又得甘草緩急枝子清火銀花解毒安得不效哉惟是火毒大盛肝血大虧不如此大劑亦自徒然倘執以肝火之旺非肝癰之症只用歸芍治脇痛必

不效也

有左脇大痛按之尤甚此肝癰耳非脇痛也肝癰多得之惱怒前條已論之矣然而憂鬱亦能生癰也惟惱怒得者其痛驟憂鬱得者其痛緩初痛之時逍遙散大劑煎飲痛立止矣何至成癰也因失于速治而肝中鬱氣苦不能宣而血因之結矣血結不通遂化膿而成癰其勢似緩然肝性最急癰成而毒發甚驟也有脇疼數日而死者正因生癰毒敗而死非脇痛能死也可不急爲治之乎宣鬱化毒湯柴胡二錢白芍一兩香附二錢薄荷

三錢 當歸一兩 生甘草三錢 陳皮一錢 只殼一錢 花粉三錢 金銀花一兩 水煎服。四劑全愈。重則六劑。後用四物湯大劑調治。不再發也。此症世不常有。前論已悉。然肝癰少見。而脇痛世所常有。余特發明憂鬱之能成癰又如此。人知急治何至成癰哉。

大腸癰門

有腹中疼甚。手不可按。右足屈而不伸。人以爲腹中火盛而存食也。誰知大腸生癰乎。凡腹痛足不能伸者。俱腸癰也。而大腸癰。足尤不能伸也。但大腸生癰。無不成于火。火盛不散。則鬱結成癰矣。然火之有餘。本于水之不足。水衰則火旺。火無水制。乃養成其毒耳。治法不必治其火。壯水以制火。毒氣自消矣。清腸飲。金銀花三兩 當歸二兩 地榆一兩 麥冬一兩 元參一兩 生甘草三錢 苡仁五錢 黃芩二錢 水煎服。一服痛少止。二服足可伸。又二服毒盡悄矣。此方活血解毒。雖瀉火而寔滋陰也。相濟相成。取效故神耳。倘不益陰以潤腸。惟攻毒以降火。則大腸先損。何能勝火毒凌爍哉。無怪治之不效也。大腸生癰。右足不能伸。腹疼甚。便出膿血。肛門如刀割。此

已潰爛也。能食者生。不能食者死。然不能食之中。亦有非因火毒之熾而然者。又不可因其不能食而棄之也。凡生癰瘡。俱以有胃氣爲佳。無胃氣無論陰毒陽毒多不可救。故陰疽症必以扶胃氣爲第一。少加敗膿祛毒則正氣無傷。火毒又散。令大腸癰破而不思飲食。胃氣盡絕。大危症也。不急補胃而惟治癰。必死之道也。開胃救亡湯。人參一兩 金銀花二兩 山藥一兩 生甘草三錢 芍仁一兩 元參一兩 白朮一兩 山羊血一錢研 用水煎調服一劑胃開。二劑膿少。三劑痊。止四劑全愈。此救胃而敗膿祛毒已在其中。妙在銀花治毒。仍是滋陰之品。爲瘡家奪命之將軍。乃至仁至勇之帥。又得參朮輔助其力。則敗毒尤神。山羊血止血消瘀。且善通氣。引各藥直入癰中。以解散之。合而治之。調合有人。撫綏有人。攻勦有人。安得不效乎。自然胃氣開。化精微而轉輸于大腸也。倘胃氣未傷。服之尤效。切勿疑而不用。以枉人性命也。

有大腸生癰。小腹痛甚。淋瀝不已。精神衰少。飲食無味。面瘦黃。四肢無力。自汗盜汗。夜不能卧。人以爲火盛生癰

也。誰知水衰不能潤腸乎。夫大腸不能傳導者。全賴腎水灌注。今因醉飽房勞過傷精力。大泄其精。以至火動水涸。又加生冷並進。以至氣血乖違。濕動生痰。腸胃痞塞。運化不通。氣血凝滯而成癰也。然則生癰之先。本腎水之不足。滋癰潰之後。又復流其水。是虛其虛矣。若作火毒治。鮮不變爲死症。必須大補腎水。并補脾胃之氣。則脾胃化精。生水更易。枯涸之腸。一旦得滂沱之潤。自然淹足重蘇。不治癰而癰已化。氣血足而肌肉生也。加味六味地黃湯。以治之。熟地黃二兩　山藥八錢　澤瀉一錢　白茯苓三錢　人參一兩　黃芪五錢　麥冬一兩　水煎服。數劑痊止。神健而愈。六味補腎水。加參芪麥冬補脾胃之土。土旺而肺自旺。肺與大腸爲表裏。又爲腎之母。母子相需。表裏相顧。故奏功如神也。

小腸癰門

有腹痙口渴。左足不伸。手按之尤不可忍。人以爲腸中生癰也。然腸癰有大小腸之分。屈右足者。大腸生癰也。屈左足者。小腸生癰也。今屈左足。是小腸生癰矣。但大腸癰易治。小腸癰難醫。以大腸可瀉。小腸難瀉

也然得法又何不可瀉哉蓋大腸瀉火從糟粕而出小腸瀉火從溲溺而泄也瀉毒至神湯金銀花三兩茯苓一兩車前子三錢劉寄奴三錢澤瀉三錢肉桂一分水煎服一劑水如注二劑疼大減三劑全愈此方俱利水之味只金銀花消毒荷神奇至此蓋小腸之毒必須內消內消之藥舍金銀花無他味可以代他味消毒皆損正氣而小腸斷不可傷故以金銀花爲君也但此物不能入小腸今同苓苡車瀉之類引入小腸又少加肉桂引入膀胱從溲溺而化又恐火毒太旺各藥不能迅逐加大寄奴之速祛甘草之緩調既無留滯之患又無峻烈之害火毒自從膀胱小腸出也

有腹痛呼號卻在左腹按之疼不可忍人以爲食積在大腸也誰知小腸生癰乎凡腸癰必屈足而伸小腸癰然腸癰生腸內者必屈其足在大腸者屈右足而不伸在小腸者屈左足而不伸也若癰生腸外皆不屈足疼在左則小腸生癰疼在右則大腸生癰也至食積燥屎之痛時疼時否也生癰之痛有定而不移痛而不止也故疼在左乃小腸之外生癰也癰生二腸之內尙

可破潰生于腸外不可使之潰者以腸外無可出之路。皆死症也而小腸尤甚必早治之內化丹金銀花四兩當歸二兩車前五錢茯苓一兩苡仁一兩生甘草三錢水煎服三劑痊止四劑全愈此即前方之變也前方利水之中行其敗毒之法此方利水之中補血敗毒之法也蓋癰破利水則毒隨水出易于祛除癰未破不補血以利水則水泄而血虛難于消化同中之異不可不知。總宜早治否則癰難愈而瘀血于腸外必有終身腹痛之病也

有腹疼驟甚小便流血右足不能伸人以為小腸生癰也誰知小腸火太盛乎夫小腸生癰必屈左足今足不伸明是生癰而曰火盛者何故不知生癰必有其徵未有一旦驟生而即流血者也癰日久而生膿膿欲盡而血出豈有不潰而先流血者然左足不伸何也蓋小腸與大腸不同小腸細而大腸寬寬者可以容邪細者難以容邪必然之理者也小腸受火煎熬腸中逼迫腸不能舒而左足暫屈不若生癰者長屈而不伸也勿以足不伸即信是癰妄行解毒然何以辨之初病之時辨其小

便中有血無血耳。初痛而足屈。小便無血。乃是生癰。初痛而足屈小便有血。乃是火痛。不可差也。治法瀉其火邪。不必化毒而痛止足伸矣。小柴胡湯加味以治之。柴胡一錢　黃芩三錢　甘草一錢　茯苓五錢　人參二錢　半夏一錢　水煎服一劑足伸。二劑血痛俱止。小柴胡非治小腸之方也。何以應效如此之捷。夫小腸火盛者。起于肝胆之鬱也。木鬱則火生。不敢犯心而犯小腸耳。夫火性炎上。今反下熾。拂火之性矣。所以小腸受之而作痛也。小便流血者。乃小腸之血。爲火所逼。血恐爲火爍乾。越出小腸之外。直走膀胱。反使水道不行。而流血也。小柴胡舒肝胆之氣。則火氣上炎。其性既順。又得茯苓清消水氣。水流而血自歸經。此方之所以奇耳。

無名腫毒門

有頭面無端忽生小瘡。癢甚。第二日頭重如山。第三日面目俱青紫。此至危之症。苟不速救。數日內一身發青黑而死。若青不至心胸者。尚可救。因此人素服熱葯。熱極而便爲毒也。人入房久戰。雖氣主之。而寔火主之也。氣旺而非火濟之。則不足鼓其興趣。博久戰之歡。補氣之

葯斷不能舍參芪而求異味。世人貪歡者多而咎惜者不少。用熱葯助火。非多加參不足以駕馭其猛烈之威。無如人參力難多餙。方士不得已遷就世人之心。乃少減參。則功力薄。多加熱葯以壯火。于是金石火燬之葯。紛然雜投。謂不如此不足以助命門之火也。夫命門之火。賢火也。非眞陰之水不養。不同于脾胃之火。可以外水解之也。且賢火既旺。則外勢剛強。多御女戕。亦復何傷。無奈淫心無盡。火熾則水乾。火拂則水涸。水不足以制火。熱毒結于腸胃。況戰久必大泄精。精泄過多。火且更旺。未免再戰。或歸咎前葯太少。更多服以助其勢。不知葯益多而火益烈。戰益頻而水益燥乎。久之水涸火炎。陽易舉而不能久戰。即有忍精勉強而鬬。精不化而變爲毒。結于陰之部位而成癰。結于陽之部位而成毒。頭上陽部位也。較陰部尤爲可畏。非多用化毒之葯。安能起死回生哉。回生至聖丹。生甘草五錢。川芎一兩。元參三兩。金銀花八兩。蒲公英三兩。天花粉三錢。水煎服。一劑頭輕。青紫色淡。又一劑全愈。此方化毒而不耗氣。敗毒而不損精。所以奇也。此毒原係水虧之極。而瀉毒

之味。皆損于陰陽。惟銀花攻補兼妙。故以之爲君。必多用而力始大。加元參去火甘草瀉毒。蒲公英清熱花粉消痰。川芎散結。自然相助成功也。

有無名腫毒。生于思慮不到之處。其勢凶惡。有生死之關。皆以無名腫毒名之。不必分上中下也。前條只言頭上。而身之左右前後四肢。尙未言也。治之得法。可以通治之也。大凡上中下之生腫毒者多起于淫慾無度。加之氣惱憂鬱。火乘其隙。處蘊藏結毒故一發而不可救。所以此症盡屬陰症而無陽症也。治法。似用解陰毒之葯矣。然解陰毒之葯。大半消爍眞陰。本陰虛而結毒復解毒而虧陰。安有濟乎。余得異傳。于補陰之中。以行散鬱之法。佐以解毒之品。少助行經之味。是以多收其功。不敢秘傳。書之于冊。以救萬世之人也。元參一兩　柴胡三錢　生甘草一兩　煎湯十碗。生頭面者。加川芎二錢　附子二錢

再煎汁取三碗。分二日服完。未破者即消。已破者生肌自愈。不二劑也。生身左右前後。加當歸二兩　附子三分　甘菊花一兩　如前服。生手足四肢。加白朮二兩　附子五分　茯苓一兩　亦如前服。無不收功。方名黑虎湯。元參退浮

遊之火得甘草之助解其迅速之威得柴胡之佐能舒抑鬱之氣又有引經之味引至毒處大爲祛除用至一劑力量更大又是補中去散則解陰毒不傷陰氣所以建功人勿見藥之重不敢輕試負余慇懃救世之心也若些小之症與非陰症不必用此重劑不可不知也

對口癰門

有對口後生小瘡先癢後疼隨至潰爛人以爲至凶之癰也不知生對口者反輕而生于偏傍者尤重蓋頸項之上乃腎督之部位也其地屬陰所生多是陰疽非陽癰也陽症必高突色紅腫必發光疼痛呼號若陰疽則不然色必黑黯疼亦不甚身困欲卧沉重呻吟無力瘡口不突或見無數小瘡口世人不知何處覓頭然陰陽二症皆可內消何可令其皮破腫消而後治之乎惟內消之法不必分辨陰陽但既破潰膿陰陽不審漫投葯餌則禍生頃刻也內消用三星湯金銀花二兩蒲公英一兩生甘草三錢水煎二服全消陽症已破者以此方治之三服必膿盡肉生若陰症大潰者改用七聖湯生黃芪一兩人參一兩當歸一兩金銀花二兩白朮一兩水煎

一服血止。二服肉生。三服口小。四服皮合。又二服全愈也。此方治各處癰毒。凡低陷不收口者。神效。不止治對口陰毒而已也。總以陽症可以涼瀉。陰症必須溫補故耳。

腦疽門

有生疽於頭頂者。始名腦疽。若對口偏口。俱非眞腦疽也。此疽九死一生。大約生此疽者。皆腎火沸騰也。腦爲髓海。原通于腎。腎無火則髓不能化精。腎多火。髓亦不能化精。不但不化精而髓火升降。且化爲毒。以生癰疽矣。蓋腎之化精。必得腦中之氣以相化。若腦中無非腎火。勢必氣化爲火。火性炎上。不及不降。卽于腦中髓海自發其毒。較之腦氣不流而爲毒者更甚。故往往有更變形容。改換声音。瘡形紫黑。燥煩口乾。甚至腦骨俱腐。片片脫下。狼狽之狀不可以言語形容者。又何以救之耶。此症須問飲食若何。倘飲食知味。卽可用藥。名曰五聖湯。金銀花八兩。元參三兩。黃芪四兩。麥冬三兩。人參二兩。水煎服四服。漸愈。改用十全大補湯。重四兩。服四劑。又改八味地黃湯。恣其酣飲。可全愈矣。此亦九死一生之

法。然舍此寔無第二法也。此疽得于房術者居多。與陽澁精俱是丹石燥烈之品。霸阻精道。日積月累。真陰枯爍。腦竭火發。遂至潰頂而不可救。人何苦博女人之歡。喪千金之命也。

囊癰門

有陰囊左右生癰者。名曰便毒。生於囊之下。糞門之前。名曰囊癰。三處相交。便毒易治。囊癰最難治。以囊之下爲懸癰。其皮肉與他處不同。他處皮肉或橫生。直生俱易合口。而囊下橫中有橫。不易收功。此皆少年負于酒色。忍精而戰。耐肌而交。或苟合有毒之婦。或鬬精有瘡之妓。所謂欲洩不洩。化爲膿血是也。治必大補其虛。佐以化毒之味。以毒因虛而成。不治虛得乎。逐邪至神丹。金銀花四兩 蒲公英二兩 人參一兩 當歸二兩 生甘草一兩 大黃五錢 天花粉二錢 水煎二服全愈。潰者三劑收功。此方用金銀花四兩 蒲公英二兩 佐以參茂大黃之大料。未免覇氣。然大虛之症。又用大黃祛逐。似乎不宜。誰知毒盛乘初起之時。正氣未甚衰。大補瀉火之爲得乎。倘因循不敢治。及至流膿出血。正氣蕭索。

始用參芪補氣。往往用至數觔。尚未能復元。何若早用于化毒之中。正又無傷。毒又易散。此因勢利導之法。不可不知也。

有飲火酒入房。精不得泄。至半夜寒熱煩渴。小便淋赤。痰涎湧盛。次日囊腫煽痛。又次日囊處盡腐。五莖下貼囊者亦腐。人以爲酒毒也。誰知肝火得酒毒濕而肆虐乎。夫酒何至作腐。蓋火酒大熱之物也。人過飲火酒多致醉死。死後身骸腐爛。以火酒乃氣酒。遇熱自焚。人身五臟六腑。原自有火。以火引火。安得不炎燒耶。飲火酒入房。鼓動精房之慾。火是命門之火。非肝火也。然木能生火。肝木生相火。理之常也。入房借火酒之力。火勢必猛。火動無根。何能久乎。必精泄而可解也。無奈精欲泄而阻抑之。火無泄路。又無可依。火酒又無可解。于是火入于肝。將依母自歸也。惟是相火。內火也。可附肝以爲家。而酒火。外火也。反得木而焚体。囊與玉莖。乃筋之火也。筋屬肝。因入房而火聚陰氣之際。故火發而囊腫。囊腫極而莖亦腐矣。治法。解酒之毒。益以補氣血之品。則濕熱解。而腐肉長矣。用救腐湯。人參一兩。當歸二兩。黃芪二兩

白朮一兩　茯苓五錢　黃柏三錢　炒梔子三錢　苡仁五錢
澤瀉三錢　白芍一兩　葛根三錢　水煎服。四劑腐肉去而
新肉生。又四劑囊蓋悉平復矣。酒毒成于拂抑。平肝瀉
火。利濕解毒宜也。何以用參歸芪朮大補氣血耶。大凡
氣血盛者。力能勝酒。縱酣飲無碍。服火酒而腐必成于
火酒之毒。亦其氣血之衰。力難勝酒所以兩火相合。遂
至焚身外腐。苟不急補氣血。則酒毒難消。腐肉又何以
速長哉。

臂癱門

有臂上忽然生瘡。變成癱瘓者。亦陰癱也。雖比頭面對口
肩背稍輕。然治不得法。亦能殺人。故須辨陰陽治之。大
約痛者陽症。痒者陰症。如陽症用三星湯一二劑便可
立消。若陰症此方又不可用。必大補氣血。佐以消痰化
毒。始可奏功。勿以手足非心腹之疾。不須補虛也。夫陰
主靜而手則至動者也。至動生陰癱。則動變靜矣。反常
之道也。可不畏乎。況動變靜。又走陰之道也。陽走于陰。
非生近于死者乎。欲陽返陰易。欲陰返陽難。誰謂手癱
而小視之哉。消癱還陽丹。

人參三錢　白朮一兩　花粉三錢

生甘草三錢　肉桂一錢　生芪一兩　銀花二兩　當歸五錢
乳香末一錢　水煎服。一劑痒變疼矣。二劑疼止。三劑全
消。此方與七聖湯相同。而意氣各異。七聖治已潰者也。
此方治未潰者以先肉爲先。未潰者以護肌
爲主。所以七聖湯無乳香花粉。以二味攻中有擁衛之
功耳。

乳癰門

有乳上生癰。先疼後腫。尋常發熱。變成瘍癰。此症男婦皆
有之。而女人居多。蓋女人乳兒之時。偶爾貪睡。兒以口
氣吹之。使乳內之氣閉塞不通。以至作痛。卽以解散葯
治之。隨手而愈。若因循失治。而乳癰成矣。惟男子則不
然。乃胃火熾盛。不上升于口舌。而中擁于乳房。乃生此
症。故乳癰乃陽症也。不比他癰有陰有陽。治法不必分
陰陽。但分先後。爲虛實耳。蓋乳癰初起。爲實邪。久經潰
爛。爲正虛。然邪之有餘仍是正之不足。於補中散邪。乃
萬全之道。不必先攻而後補也。和乳湯貝母三錢　當歸
一兩　花粉三錢　蒲公英一兩　生甘草二錢　川山甲一片
土炒爲末　水煎服一劑乳房通腫消。不二劑也。此方以

貝母花粉消胃中壅痰痰壅而乳房不通令化其痰則胃火失勢後以公英山甲解其熱毒利其閉竅不攻自散矣恐葯過于迅逐加入當歸甘草補正和解正既無傷邪又退舍何至火毒不行變爲乳岩也哉

有生乳癌已經收口因不愼色以至復爛變成乳岩現出無數小瘡口如管如漏如蜂窩狀肉向外生經年月不愈服敗毒之劑身益狼狽瘡口更窩爛人以爲毒深結于乳房也誰知氣血大虛乎凡人乳房內肉外長而筋束于乳頭故傷乳卽傷筋也此處生癌原宜急散遲恐有筋弛難長之患況又泄精損傷元氣安得不變出非常乎當先精後卽大用補精塡腦之葯尙不至如此之橫今旣陰虛而成岩又因岩而敗毒不亦虛其虛乎治法必大補氣血以生其精不必泄毒以其無毒可泄耳化岩湯人參一兩白朮二兩黃芪一兩忍冬藤一兩當歸一兩茜根二錢茯苓三錢白芥子二錢水煎服二劑生肉又二劑膿疼止又二劑漏管重長又二劑全愈再二劑不再發也此方全補氣血不去敗毒雖忍冬乃消毒之味其性亦補況入于補葯亦純于補矣惟是失精

以續婺岩似宜補精令止補氣血何也蓋精不可速生而功又緩不若大補氣血反易生精且乳房屬陽明既生乳岩而陽明必無多氣多血矣今補氣血則陽明經旺自生精液以灌乳房又何必生精以牽掣參芪之功乎所以不用塡精之味也

有左乳內忽大如桃又不疼色亦不赤身發熱体漸瘦損人以爲痰氣鬱結也誰知肝氣不舒平夫乳屬陽明乳腫宜責陽明矣而余獨謂之肝不起世人之疑乎夫陽明胃土最畏肝木肝氣不舒胃氣亦不舒矣蓋胃見木之鬱惟恐來剋畏首畏尾伏而不揚乳又近兩脇兩脇肝之位也與肝相違尙退縮不敢舒今與肝爲隣亦何敢吐氣哉氣不舒而腫滿之形成氣不敢舒而畏懼之色現不疼不赤正見其畏懼也治法不必治胃但治肝而腫自消矣用加味逍遙散柴胡二錢白芍五錢當歸三錢陳皮五分甘草一錢白朮三錢人參一錢茯苓三錢川芎一錢瓜蔞三錢水煎服十劑內消矣

去瓜蔞又十劑不再發矣此方解肝之滯肝解而胃氣不解而自舒蓋以瓜蔞半夏崙治胸中積痰痰去腫尤

易消也

有產後忽兩乳細小下垂過小腹疼甚人以爲乳癌誰知乃胃血燥平夫胃爲水穀之海多氣血之腑產後亡血過多則胃中宜虛飲食又不能遽進卽進飲食而各臟腑取給于胃甚急則胃氣困困則胃血益燥燥則無以解各臟腑之紛爭而兒又索乳內外取資胃無以應乳房者胃之外郭也乳頭者胃之門戶胃苦內之紛爭欲避于外而不可得而又不免于兒之吮咂細小下垂以至于腹有入地無門之狀此切膚之病至危之症也治法急救其胃氣益以補血之味則胃氣生而胃不燥內足以分給臟腑何至外痛而倒懸哉解懸湯人參二兩當歸四兩川芎二兩荊芥三錢益母草三錢麥冬一兩炮姜一錢水煎服四劑乳收又四劑全愈此方以人參生胃氣于無何有之鄉以歸芎補血于至危之地以荊益分解各臟腑以歸經絡用麥冬炮姜者因陽明之燥恐火動炎燒產後忌用寒涼故用麥冬微寒之品少解火勢之烈也

肚癰門

有生癌小腹間者必無陽症以地屬陰部位也陰生陰毒似乎至重然純陰無陽一用陽葯立可成功無奈世人一見肚腹生癌多用陰葯消毒反成不救爲可憫也然余所謂陽葯者非散火祛風之葯乃補氣溫火之味耳蓋陰部成陰毒乃寒虛之故寒因虛而不行毒因寒而結用熱葯以去寒自能解寒散毒也辟寒救腹丹用白朮三兩茯苓三錢肉桂三錢金銀花三兩附子一錢當歸二兩蛇床子五錢水煎一服內消矣已潰者三劑膿盡肉生四劑全愈此以白朮爲君者以其能利腰膀之氣也腰膀利則下部盡利矣後以蛇床銀花祛毒毒氣亦易消又恐寒極不能直入故加附桂輭閑而入惟是一派乾燥之味邪雖祛除未免耗血故用當歸陽中之陰少制其橫則陰寒漸散又無陽旺之患所以奏功也

多骨癰門

有大腿邊旁長強穴間忽疼痛高腫變成癌疽久則肉中生骨以鉄拑取出已而又生人以爲多骨癌也誰知是濕熱毒所化乎夫多骨癌之生因人多食瓜果濕熱所成者也早治服二劑便可解散無如因循失治以至

濕壅添熱熱盛而化骨日久遷延卧床不能起也說者謂初起時未嘗有骨有骨可以內散既生骨後必須爛骨外取未可全恃解散誰知不然蓋多骨症無形所化非肉中眞生骨也似骨而非骨耳眞骨難化似骨又何難化之有治法利濕清熱而去之補氣血之藥骨自消矣五神湯茯苓一兩　金銀花三兩　牛膝五錢　紫花地丁一兩　車前子一兩　水煎服二劑輕三劑骨消四劑瘡口平五劑全愈此以車前茯苓利水地丁清熱牛膝銀花補中散毒安得不奏功哉

惡疽門

有四肢間或頭面上忽然生疽頭黑皮紫疼痛異常此陽症之毒也亦能殺人此症其勢甚驟不急散毒則養成大橫世人每以生疽甚小不似生瘡之大往往不以爲意誰知變成大毒乎疽與瘡宜有不同瘡潰于內而疽腫于外也潰內者難外治腫外者易內消雖瘡疽之毒盡由內而外發宜皆治內而外愈而疽病尤宜內治也

消疽散　生地三錢　連翹三錢　夏枯草一兩　忍冬藤一兩　天花粉三錢　白芷二錢　地榆三錢　當歸一兩　生甘草二錢

水煎服末潰者二劑即消已潰者四劑全愈此方通治惡瘡無不神效蓋補血以散毒則血活而毒難留涼血以清火則血寒而火易散瘡多陽症所以治無不宜也

疔瘡門

有生疔瘡者疼痛非常亦陽毒也初生之時人最難辨人以生黃豆令嚼之不知腥者便是其瘡頭必發黃泡中現紫黑之色也細看泡中必有紅白一線通出泡外凡疔生足上紅線由足入臍疔生手上紅線由手走心疔生唇面紅線由唇面至喉如見此紅線于是盡處以針刺出毒血則免毒攻心若現白線不必刺也捻以消毒瀉火為主世人戒用官料之藥此不知醫之語毒非藥安除哉拔疔散治之紫花地丁一兩甘菊花一兩水煎一服紅線除二劑疔散三劑全愈不必外治挑疔之多事也若已潰爛加當歸二兩治之不必四劑毒盡肉生也

楊梅瘡門

有嫖妓戀炊酣戰覺馬口間如針刺痛此毒氣已過也未幾生魚口矣生瘡矣徧身生瘡矣黃膿汎濫臭腐不堪入以為毒盛多用敗毒之味不知日敗毒而毒益盛

瘡盜多有窩爛而死者夫楊梅之毒中于泄精之時必元氣虧損故毒乘虛而入若元氣大旺毒難深入即有傳染不過輕微之毒可一瀉而痊今遍身毒瘡乃大虛而毒深中也不補虛而瀉毒何能奏功乎若止服敗毒無異下石矣二生湯生黃芪三兩生甘草三錢土茯苓三兩水煎服四劑瘡漸紅又四劑乾燥又四劑全愈此方不去解毒只以黃芪補氣氣旺邪自難留得甘草之化毒茯苓之引毒去而正又無虛氣生而血又能養此治之巧無如人不知也可勝嘆息云

有竄頭生疳瘡服敗毒藥毒盡從二便而出倘大腸燥結則敗毒藥不能走大腸勢必走小便而出小便口細毒難盡泄于是毒不留于腸中而單結于外勢毒盛必發安得不腐爛哉往往連龜身爛盡人多以藥外敷雖外藥亦不可少然不先消火毒遽用外遏不啻如石之壓草也故必先內治之散毒神丹黃柏三錢生甘草三錢茯苓一兩炒梔子三錢肉桂一錢水煎服四劑火毒盡從小便而出疼亦止後用生勢丹敷之炒黃柏三兩孩兒茶一兩氷片三分生甘草一兩大黃三錢滴乳香一錢

沒葯一錢 射香三分 丹砂一錢勿見火 爲末糝之疼卽止數日膿血乾筋肉再長一月全愈但不能長龜頭也

愈後服十全大補湯一二月則外勢仍能伸縮尙可種子若多服敗毒泄火之劑無論命門寒冷而外勢亦且冰冷安得陽和之驟復哉此治法之次序也

有疳瘡初發魚口將生苟不急治必一身生瘡遷延月日腐爛身骸多至不救然早治之法世人多以五虎散敗毒雖毒亦能不泄然損元氣亦不少也設敗毒葯少減又恐有留毒之患夫毒氣之入因元氣虛也因虛而毒入又敗毒而重虛勿論已犯虛虛之戒況單敗毒毒又何能散乎宜于補中攻泄則毒盡出正又無妨也早奪湯入參一兩茯苓一兩當歸一兩遠志三錢生芪一兩生甘草三錢大黃一兩石羔一兩柴胡二錢白朮一兩金銀花一兩花粉三錢水煎一服大瀉惡物臭穢不堪掘土埋之又二劑惡物盡出矣後減去大黃加土茯苓二兩同煎服四劑一身上下頭面之間必隱隱有瘡影現于皮膚之間又二劑瘡影亦漸消又二劑永不再發此方以大黃泄毒石羔清毒甘草銀花化毒柴胡花粉

散毒非多助以補氣血之味未免將軍過勇斬殺無遺則四野蕭條元氣難復妙在用參芪歸朮以至仁佐至勇則攻撫兼施自得全勝少少祛除化賊爲良民矣此一方有益于風流子弟不淺余寔親驗者也倘病人陰虛陽燥可加熟地數兩或加元參餘品不可乱加也

徧身生楊梅瘡惧服輕粉一時收斂以圖目前遮飾誰知毒藏于內必至外潰未幾毒發于鼻覺一股臭氣冲鼻而出次日鼻色變黑不聞香臭矣此症宜急治否則鼻柱自傾一至腐爛便不可救然卽急治矣而又豈小之劑亦正無益蓋毒甚盛非杯水可濟也況此毒不結他處而結鼻中其毒更勝以毒不在他脏而在肺結也肺主氣主清氣也毒氣非清氣可比毒氣在肺則清氣盡爲毒氣矣肺氣出于鼻而藏于腎腎感毒氣移之于肺以散于皮膚則毒氣可以外出今用輕粉收斂則毒發皮膚者盡還肺中肺又歸還于腎腎又不受乃上冲鼻矣鼻孔細小安得遽泄平自然毒氣盡結于鼻鼻乃獨受其禍矣治法必須多藥以解毒以肺經不能直治必隔一隔二以治之也護鼻散元參 三兩 生甘草

麥冬二兩　桔梗五錢　花粉三錢　生丹砂末三錢　金銀花三兩　水煎調丹砂末服一劑鼻知香臭矣又四劑鼻黑色去不臭爛矣更用全鼻散元參一兩　生甘草三錢　金銀花一兩　當歸一兩　麥冬五錢　生丹砂末一錢　入參三錢　水煎一服身毒盡出矣前方過于勇猛所以救其急後方少于和平所以補其虛前後俱用丹砂者以輕粉毒非丹砂不能去輕粉乃水銀所燒而丹砂乃水銀之母子見母自不肯相違丹砂出而輕粉亦出此人所未知也倘鼻柱已傾肉腐不堪將前護鼻散救之雖鼻不重長而性命可拔亦不至死亡也

有生楊梅瘡一身皆爛瘡痛非常人以爲毒在皮膚也誰知乃血虛而毒結皮膚乎夫楊梅瘡發于骨髓之中惟毒在骨難于醫治今毒在皮膚似易施治也然毒未出于皮膚其毒蘊藏瀉骨中之毒可從下而外泄毒已出于皮膚其毒開張斂肌中之毒不可由表而入攻得其法則易泄散未得法則益橫矣法宜補血而瀉毒引之從小便而出耳二苓化毒湯白茯苓一兩　土茯苓二兩　金銀花二兩　當歸一兩　紫草三錢　生甘草二錢　水酒各

半煎服十劑全愈無留毒也此方平淡無奇寔有異功者補以瀉之也此瘡生于腎虛腎虛則血虛也不補虛以治瘡反瀉毒以耗血此世人治此症所以不效耳

腰疽門

有腰眼間忽生疽毒疼痛呼叫似乎陽症然腰腎乃至陰之地未可作陽症治之也此症雖本于忍精欲泄不泄以成此毒似乎純是陰分之過但腰雖不遠于內腎火發而毒成則陽中有陽未可純以陰症治之也必陰陽并治以化毒則毒去如掃倘不補陰竟治其毒則腎益傷而毒難速化即補陰而不補陽則陰無陽不生毒且深藏腎宮不得外泄矣兩治散白朮一兩金銀花三兩杜仲一兩當歸一兩防已一錢稀簽草三錢水煎一服痛輕二劑疼止三劑全愈此以杜仲白朮利其腰膂氣通毒自難結又得銀花當歸補中有散而防已稀簽直入腎宮去濕熱之毒陰陽無偏勝之虞邪正有解紛之妙自然一二劑成功也

擎疽門

有手心中忽紅腫高突變成一疽疼痛非常日夜無間世

所謂擎疽也此症多是冤家相尋內外治療往往不能收功有流血致死者似乎不必治也然有症無方安見吾道之大乎苟能懺悔怨艾安在不可救此疽雖是冤孽亦因病人有火熱之毒乘機窃發也消火熱之毒何不可奏功耶但火熱非起于一旦而解毒難憑于小劑蓋毒成于熱熱起于火火之有餘終是水之不足不大料以滋水惟小劑以滅火安得取勝乎必大用補水之劑少佐解毒之味則自愈耳釋擎湯元參一兩金銀花一兩生地一兩當歸一兩紫花地丁五錢貝母二錢水煎二劑疼止已潰者又服四劑未潰者又服一劑無不全愈愈後仍須懺悔則無後患否則恐變生他症非方之過也此方滋水以治火補正以解毒自居于無過之地又何擬議哉

腳疽門

有足指頭忽先發癢已而作痛指甲黑色第二日足指俱黑三日足面俱黑至脛骨即死此無名腫毒得之多服春藥乃火熱之毒非足疽可比若足疽止黑左足指也然足疽最凶雖不如無名腫毒之橫而速殺人則一

也蓋足爲四餘之末宜毒所不到何以凶惡至此正以毒所不至之處而毒聚不散反出于指甲間則毒盛非常而治之轉不可輕視然則以泄毒之藥治之可乎而誰知不然人身之氣盛則周流于上下毒斷不聚于一處惟氣血大虧不能徧行經絡而火毒惡邪乃固結于骨節之際足疽之生乃氣血之虧不能周到之故然則烏可單泄毒以重傷氣血乎必大補氣血加泄毒之味則全勝之道也顧步湯牛膝一兩金釵石斛一兩人參三錢黃芪一兩當歸一兩金銀花三兩水煎服一劑黑色解二劑疼止三劑全愈若已潰爛多服數劑無不愈也此方以金銀花解毒非牛膝石斛不能直達足指非人參歸芪不能氣血周流使氣血通活以散毒也即無名腫毒此方治之亦效不但治足疽也世醫有以刀切去足指亦是治法然不若此方補中散毒起死回生既無痛有腿上忽腫一塊其色如常不疼人以爲癰疽也誰知氣虛之故乎夫癰成于腫未有腫而不變爲癰者予謂氣虛非癰人誰信之嗟乎氣所以行血者也氣行則血行、

縱有邪氣斷難成腫彼邪氣之盛每成于氣血之衰其腫爲瘡每每作痛色必變紅赤也今既不疼其色又不變是有腫毒之名無腫毒之實全是氣虛血無以養非邪盛而氣不能鼓也治法補氣以扶正不必化毒去邪須用補中益氣湯人參五錢白朮一兩生黃芪一兩當歸五錢柴胡一錢升麻五分陳皮一錢生甘草二錢半夏二錢茯苓三錢水煎服十劑腫消此方補氣聖藥非消毒之劑何以用之消腫耶蓋眞氣奪則虛邪氣盛則實眞氣既虛邪氣益盛不用補氣氣何以行腫何以化耶此方補氣即所以消腫也況益以化痰去濕之品故更易收功耳

髮疽門

有髮中忽生疽紅腫高突頭面目鼻俱浮狀異平常此陽毒也蓋兩髮近太陽乃陽位也陰氣不能至故作陽症治之然往往有變爲陰症者所以陽藥中加入陰分之味以防其變若已潰爛尤須陰藥多于陽藥今立一方名理髮湯治潰爛未潰爛無不收功川芎一兩當歸一兩金銀花三兩白芷二錢夏枯草三錢水煎服二劑即消

已潰者四劑全愈此方以銀花枯草解火毒以川芎白芷引入兩鬢太陽之間則銀花枯草更得施其祛逐之功又妙在當歸補氣血陰陽雙益正足邪自難變安得不愈哉

唇疔門

有唇上生疔者或口角旁或上下唇不論大小大約皆脾胃火毒也宜早散之否則毒氣熾炎必且艱于飲食往往有腐爛死者疔毒以愈小而愈橫也治法急泄其火毒不可損傷脾胃之氣毒易散矣救唇湯金銀花一兩　紫花地丁一兩　白果二十個　桔梗三錢　生甘草三錢　知母一錢　水煎服一劑疼止二劑疔消三劑全愈已爛者又二劑此方治頭面疔瘡亦效此以白果桔梗引銀花地丁至生疔之處而盡去其毒也

瘰癧門

有生痰塊于項堅硬如石久則變成瘰癧流膿流血一塊尚未消一塊復長未幾又潰或耳下或缺盆或肩上脇下有串走之狀故名鼠瘡又名串瘡言如鼠之穿也人謂食鼠窃餘以成此症而不盡然也蓋此症多起于瘰

East Asian Library Princeton University

痰塊之生多起于鬱未有不鬱而生痰無痰而成瘕瘕者故治法必須開鬱爲主然鬱久氣血必耗況流膿血則氣血更虧消痰而不解鬱鬱解鬱而不化痰皆虛其虛也消串湯白芍一兩白术一兩柴胡二錢蒲公英三錢茯苓五錢陳皮一錢附子一片甘草一錢天花粉三錢柴貝天葵五錢水煎服八劑痰塊漸消又十劑盡化又二月全愈愈後服六君子湯爲善後計不再發也此方妙在蒲公英天葵爲消串神品然非佐以柴芍則肝木不平非助以芩朮則脾胃主不健又何能攻痰破塊哉惟有攻有補又得附子之力引各味直搗中堅所以能除夙疾于旦夕耳

有久生瘰癧頸間盡爛且及于胸肩無非痰塊以至身体發熱發寒肌肉消瘦不思飲食自汗盜汗驚悸恍惚此症原難醫治然治得法亦在可救也夫此症初起宜解鬱爲先佐之補虛以消其毒倘執尋常治法以祛痰敗毒爲事鮮不速之亡矣用轉敗丹人參二兩柴胡二錢白芍三錢金銀花三兩當歸二兩半夏五錢白术一兩生甘草三錢水煎服四劑痰塊在胸者盡消又四劑頸上潰

East Asian Library, Princeton University
Digitized by Google
Not to be copied or distributed

爛亦愈將方減半再服十劑瘡口盡平不再發也此方補多于消而開鬱寓于中化痰存于內人從未有知此治法但一味攻毒所以愈壞也殺運無窮神方難信人見此方無不訕笑者誰知乃祛病之仙丹奪命之异葯哉余不勝掩嘆息也

痔漏門

有肛門內外四旁忽生紅瘰先癢後疼後成爲痔日久不愈此症皆濕熱所成也而得之縱飲者爲多江南人常生此症正因地之濕熱加之酒熱之毒所以結于肛門不能遽化也夫肛門通于大腸凡有濕熱亦隨大便同出何以積而成痔以濕在大腸不能久留必盡走肛門而肛門爲大腸鎖鑰有防範之意不容濕熱出于門外于是蓄積既久而濕熱之毒肛門獨受之矣有毒必然外形不生肛門之外必生肛門之內雖內外少殊而作芒則一也治法烏可舍濕熱而他求乎但肛門去脾胃甚遠化濕熱之毒必假道於脾胃肛門未必受益而脾胃先損所以無功耳故用葯必須無損于脾胃有利于肛門者始可奏功益後湯治之茯苓一兩　川山甲一片　土炒

East Asian Library Princeton University

白芍一兩　地榆三錢　山藥一兩　苡仁一兩　水煎服四劑內外痔消再以此方加十倍修合丸散蜜丸每日滾水下五錢服完一料不再發也此方利水去濕既無損于脾胃又有益于肛門兩得之也

有肛門邊先生小癤因不戒酒色以至腐爛變成痔漏不能收口長生肉管每年生一管流膿流血甚以為苦世人治法多用刀針挂線徒受苦楚而內毒未除外口難長經年月日難以奏功豈漏癆終不可治乎抑犯酒色之戒乎治之不得法也夫肛門之肉不比他處肛門之皮亦不比他處皮肉非橫生即直生也惟肛門皮肉有縱有橫最難生合況大便不時出入加以刀針挂線是以傷又傷也安能遽長皮肉乎故刀針挂線切戒輕用惟消濕熱之毒內治為佳然漏症既久毋論漏不可止而氣血反傷終難奏效也方于補中用消則何漏之不痊哉

青龜丸　烏龜一個　茯苓五兩　薏苡仁六錢　羊蹄後爪四付　土炒　川山甲五錢　土炒　人參二兩　黃芪八兩　乾青苔一兩　當歸三兩　瓦松二條　陰二不可見火　白芷一兩　槐米一兩　為末　將龜石臼內擣死　以藥末拌之　飯

鍋內蒸熟將龜肉與甲火焙干爲末同前藥蜜丸每日服三錢一月漏痔乾三月漏痔滿服完全愈不復發矣

但服丸時必戒酒色三月倘犯之不能奏功此方治漏神效非俗方可比有不可思議之妙去濕而不散氣敗毒又不損血補破于無形塡隙于有孔願人敬信此方堅三月之戒以去宿疾也

有大便時先射血幾許始下糞者人以爲便血症誰知肛門暗生血痔乎夫痔久必變漏宜流膿血矣不知受病不同見症亦異此多得之飲火酒太多熱走直腸而不

得遽泄乃結成小痔久則皮破血流此血乃外出直腸之外非出直腸之中乃膀胱之血也夫膀胱化氣而不化血酒毒滲入膀胱膀胱將酒氣化水出于陰器而酒毒燥血不能從陰器而出不得不走大腸肛門而出矣無奈門徑各別戶口牢閉無可出路而酒毒結直腸之外毒向內攻也而直腸之痔生矣痔生必破有隙可乘而膀胱之血注之久且以血引血不但膀胱之血盡歸之也乘其大便之開關血先奪門而出耳治法似宜急塡其隙使血出而無路然私竇既開漏卮湯洩不急清上游

之源而但截下流之隙非計之善也清源散黃連三錢茯苓五錢白芍五錢葛根二錢白芷三分川山甲土炒一錢爲末槐花三錢地榆三錢人參三錢車前子二錢三七根末三錢白术五錢水煎調末服三劑血較前更多減去黃連又三劑血止痔愈矣必須戒酒終身勿服也若女色只忌三月永不再發倘不能禁不必爲之治以瀆吾方也此方妙在多用黃連以解酒熱之毒所謂清源也上游無病下流自安各葯又分派得宜無非去湿化熱堵截有方故慶平成何患泄流冲決哉

有胸間生瘡因不慎酒色致成漏竅生數頭流血久則神形困憊腰痛難伸行同傴僂人以爲心漏也誰知腎虛成漏乎夫心腎本相通也心氣必得腎氣以相生腎氣必得心氣以相閉心漏之成成于腎氣之泄也安可不急治腎氣之衰乎然治腎而心氣不閉則補腎無益有出氣而無止氣耳或云漏瘡多成于湿熱今補腎而不閉心竅則漏不愈閉心竅而不去湿熱只治心腎漏亦不能愈也然漏亦不同漏在他處者可泄其湿熱在胸間者不可泄湿熱也蓋漏既成于腎虛腎虛則寒而

非熱也腎虛者腎水虛而非邪水盛也補眞陰而邪水自消溫腎寒而濕熱自退耳用溫腎丹鹿茸二個附子二個青塩二兩人參二兩瓦松二枝紅棗四兩爲末棗煮熟搗丸每空心酒下三十丸服半月腰疼少減服月餘而漏愈矣此方妙在鹿茸既能益腎中之水火更能補心中之缺陷加以附子之辛熱則無經不達引鹿茸直入心腎以塡其空竅青塩者鹹以軟堅也漏多孔竅流血必多血得塩必止也瓦松者消濕熱于無形心漏雖非濕熱然既少有留存則孔竅難塞故兼用之以防其變又恐氣虛不能運化加參以生氣于心腎之間助附茸之力通達上下尤易成功。

頑瘡門

有久生惡瘡或手足或頭面或背胸經年月不愈臭腐不堪百葯罔效人所謂頑瘡言其冥頑醫工無所施力也然亦治之不得法耳人身氣血和必不生瘡即間生瘡旬卽速愈是生瘡者乃氣血不和也其不和者或因濕侵或因熱盛或濕熱寒邪交至以致氣結不宣血滯不散結于皮而皮生瘡結于肉而肉生瘡久則膿血不淨

因而生虫人又用殺虫之葯又傷其皮肉則氣血更虛力難兼到。乘皮肉于膜外而不顧則成此瘡矣故治瘡必以行氣和血爲主而虫不可盡氣補而氣自行一身血亦不易治也非補氣血不能救頑湯當歸二兩黃芪一兩白朮一兩生甘草三錢熟地一兩山萸五錢麥冬二兩柴胡一錢茯苓五錢防風一錢半夏二錢連翹一錢附子一片水煎服二劑瘡口必腫此乃葯助氣血與瘡戰也乃速愈之兆也又二劑不疼而癢矣又二劑癢止肉生矣又二劑結靨而愈又二劑不再發此方單去行氣活血得補之力也氣行血活虫將安寄故不必殺虫頑瘡盡愈也有內股生瘡斂如豆許翻出肉一塊宛如菌狀人以爲虫蝕外翻也誰知肝經風熱血燥之故乎夫肝熱則生風乃內風而非外風也外風清涼內風蘊熱故外風宜散內風宜清然清其風而不補血則熱不可解風不可解也必于養血之中益以清熱之味則燥者不燥熱退而風自靜矣清風湯白芍一兩人參五錢當歸五錢白朮三錢炒枝子三錢甘草一錢川芎二錢丹皮三錢炒參

三錢　天花粉三錢　柴胡一錢　連翹一錢　水煎服數劑。瘡口自斂。此方滋血以養肝。非消肉以化毒。何以瘡斂而愈也。蓋瘡成于肝木之旺。平肝而血無過燥之虞。自然風散而熱無炎燒之患。苟不平肝而內用降火之品。外用追虫之法。則蝕而又翻。翻而又蝕。其肉益大而氣益虛。變出非常。正難援耳。

接骨門

有跌傷骨折。必用杉木或杉板。將折骨湊合端正。以繩縛定。勿偏邪曲。又以布扎。切不可因疼痛心軟。少致輕鬆。反爲害事。後用內服之藥。或皮破血出。尤須用外治之藥。但骨折而外邊之皮不傷。正不必用外治之藥。然內外夾攻。未嘗不更佳耳。內治法。必以活血去瘀爲先。血不活則瘀不去。瘀不去則骨不能接也。續骨神丹當歸二兩　大黃五錢　生地一兩　敗龜板一兩　爲末　丹皮三錢　續斷二錢　牛膝二錢　桃仁三十个　羊躑躅一錢　乳香末二錢　紅花二錢　白芍一兩　水煎服二劑瘀沒藥末二錢　去新生骨即合矣。又二劑去大黃。再服四劑。全愈。外治法用膏藥而加末藥。糝傷處爲妙。全體神膏當歸二兩

生地二兩續斷一兩牛膝一兩甘草五錢刘寄奴一兩
地榆一兩茜草一兩木瓜一兩桑木枝四兩
杏仁三錢人參一兩皂角二兩川芎一兩紅花二兩柴
胡三錢白朮一兩黃芪一兩荆芥三錢麻油三斤熬數
沸。以麻布濾去渣再煎滴水成珠加入黃丹末水漂過
一觔四兩收為膏勿太老再用乳香三錢沒藥二錢花
蕊石三錢白蠟一兩麝麟蜈蚣五錢海螵蛸三錢自然銅
三錢醋浸燒七次為末乘膏未冷投于膏中以桑木棍
攪勻取起以瓦器盛之臨時以火煨攤膏大約每張重
一兩。既攤膏藥再入細藥。名曰勝金丹。射香三錢血竭
三兩乳香一兩古石灰二兩海螵蛸一兩自然銅一錢
如前製花蕊石三錢沒藥一兩冰片一錢樟腦一兩土
狗十個紫英石二兩乾地龍一錢乾土黃一錢人參一
兩木耳灰一兩象皮三錢琥珀一錢兒茶一兩三七根
末一兩生甘草五錢和勻礶盛之每膏一張用勝金丹末
三錢糝膏上貼之凡接骨不須二個也重則二個此皆絕
奇絕異之方也倘骨未斷損只須膏一張即全未必勝
金丹也三方內外治法有不可形容之妙內外同治旦

夕即奏功。得此三方。無折骨之不可救也。
有從高墜下。昏死不醒。人以為惡血奔心也。誰知乃氣為
血壅乎。夫跌仆之傷多是瘀血攻心。然跌仆出其不意。
未必心之動也。惟從高墜下。失足時。心必驚悸。自知必
死。是先挾一必死之心。不比一蹶而傷者。心不及動也。
故氣血錯亂。每每昏絕不救。治法逐其瘀血。佐以醒氣
之品。則血易散。而氣易開。倘徒攻瘀血。則氣閉不宣。究
何益乎。用甦氣湯。乳香末一錢。沒藥末一錢。蘇葉三錢。荊
芥三錢。當歸五錢。羊蹄五錢。丹皮三錢。大黃一錢。桃
仁十四粒。山羊血末五分。白芍五錢。水煎調服一劑。氣
甦二劑。血活三劑。全愈。此方醒氣活血兼吊之。故奏功
神速。妙在用羊蹄與蘇葉荊芥。因其氣亂而亂之。則
血易活。氣易甦也。

金瘡門

有殺傷氣未絕者。或皮破而血大流。或肉綻而腸出。或筋
頭入膚。刀斷背指。死生頃刻。可不急救乎。大約金刃之
傷。必多流血。血盡則渴。飲水則立死。故刀傷作渴。必不
可飲水。世有飲水不死者。乃其人素有熱病。得水則熱

可解不可熱治也但既不可飲水將以解渴惟補血以救之也然既補血以止渴而刀刃之口大傷所補之血仍然外泄血流無止期亦速死之道也故補血之中仍用止血之藥止血之內更用生肉之品則惡血不至攻心內火不至焚胃庶死者可生破者可完斷者可續也

完膚續命湯　生地二兩　當歸三兩　麥冬三兩　元參三兩　人參二兩　生甘草三錢　續斷五錢　地榆一兩　白朮五錢　乳香末三錢　刘寄奴三錢　三七根末五錢　沒葯末三錢　花蕊石二錢　水煎服一劑渴止二劑傷口閉三劑斷縫生四劑全愈眞神方也此方補血加以止澁之味以便血之不流內之易長是矣何又用補氣之味蓋血傷不易速生補氣則易生血且生血以接肉又不如氣旺以接肉之更易所以于補血之中兼以補氣然不用參朮未嘗不可建功然終不能成功之速凡有刀傷皆可治之但視傷之輕重以分別葯料多寡耳

物傷門

有爲虎所傷流血必多大凡虎傷多在頸項必有深孔兩個或四個其孔一時即變黑色急以生猪油塞之無則

以生猪肉填之。隨填隨化。庶不再窩所傷之肉。然後急買地榆半觔爲末。敷所傷處。血卽頓止。隨用湯藥以解渴。蓋虎傷流血必多。而虎又有熱毒直來犯心。故口渴甚萬不得已可與小便飲之。急用治虎湯三七根末一兩。當歸三兩。地榆一兩。黃芪三兩。生地三兩。麥冬三兩。水十碗。煎盡其飲。完必安然而卧。明日傷處大癢。又一服。又卧如是五日。傷口生合而愈。此方大補氣血。以生肌。以地榆化虎毒。以三七根止血斂口。藥料無奇。收功實神也。

有爲蛇傷。不拘何處。或足或頭面或身腹。足腫如斗。面腫如盤。腹腫如箕。三日不救。毒氣攻心。人卽死矣。蛇乃陰物。藏于土中。初出洞時。其口尚未飲水。毒猶未解。傷人最毒。治以解毒爲主。惟是蛇毒乃陰毒也。若以陽毒解之。則毒愈熾。必用陰分解毒之品。順其性而解之也。

祛毒散　白芷一兩　紫花地丁一兩　生甘草五錢　蒲功英一兩　夏枯草二兩　白凡三錢　水煎服一劑。腫漸消。二劑毒從大小便而出。三劑全愈。此方白芷雖陽分之藥。得夏枯草則陽變爲陰。地丁公英甘草白凡。盡消毒之味

也又且屬陰陰藥以化陰毒自易奏功助白芷直攻蛇毒無有存留之害也或問解蛇毒既不可用陽分之藥何必又用白芷不知蛇毒非白芷不除世人不善用之所以有不效者今用于陰分之中自無不效矣何可舍白芷反致無功乎或問雄黃亦制蛇毒何不用之不知白芷陽中有陰不比雄黃純陽也雄黃外用可建奇功內用每至僨事不若白芷用陰分之中可收全功耳

有爲癲狗傷者人必發癲有如狂症世人以生小狗于腹中此候傳也因其發狂有如狗狀見人則咬逢女則嫋

非狗生腹中不宜有此景象況人爲癲狗傷二便必閉不能遽出二便用力虛努似生產艱難且外勢急痛腰腹作脹而死人以爲腹中有狗不能產而死腰痛者乃小狗內咬也豈不可笑此狗候食毒物而發癲人爲所傷則毒氣傳染於人狗愈人死矣可畏之病也然得法以解毒去病如掃矣夫狗性最熱狗食物發癲乃食熱物之故或食自死之肉或食熱病之屍多成癲病然則狗之發癲乃熱上加熱也解其熱毒何不愈之有但人不知其解法所以不救耳予逢异傳名活命仙丹木鱉

子三個切片斑毛七個陳土炒去頭足米一撮炒刘寄奴五錢大黃五錢茯苓五錢射香一分各研細末黃酒調服三錢毒氣全解神方也不必二服七日者奏功七日外者多服數次忌色慾二月并忌發物餘無所忌是方用木鱉斑毛者以狗最畏二物也木鱉大涼又能瀉熱毒得大黃迅掃之則熱毒難留寄奴善逐血尤走水竅茯苓利水引毒從小便而出射香亦走竅然用之不過制斑毛木鱉之毒又何畏癩狗之傷哉

癩門

有一身發癩皮厚主瘡血出如疥或痤或癢或乾或濕似虫非虫人以為濕熱留皮膚也誰知乃氣血不能周到滋潤乎世多以苦參煎湯或稀簽白芷外治不能成功正坐於氣血虛也夫氣血足則經絡無閉塞之虞氣血旺則毛竅無乾枯之患且氣足血旺則熱散濕消何至凝滯不通結于皮膚之外哉治法以補氣血為主佐以消濕散熱雖十年沉痾可奏效也剋目前近癩乎用掃癩丹黃芪三兩當歸二兩防風二錢茯苓一兩白术一兩生甘草三錢麥冬一兩白芍一兩川芎五錢熟地一兩

金銀花二兩 山萸五錢 元參一兩 荆芥三錢 花粉三錢
水煎一服 皮色潤 二劑乾燥解 十劑全愈 此方大補氣
血無忌枯涸之田 逢甘霖之滂沛 生机勃勃 水滿平疇
而蝗虫之類 自消于無形矣

刑杖門

有腿受官刑 皮肉腐爛 死血未散 疼痛呼號 以宜用膏藥
末藥外治爲佳 然受刑深重 不急內消 常恃外治 則逍
遙膜外 安能衛心 使惡血不相犯乎 此內治不宜遲也
世人以外治之方多有神奇 而內治之方絶無應驗 往

往有一時心亂而死者 雖犯法遭刑 多緣惡積第保無
受冤者乎 冤氣在心 則肝葉開張 肝氣塡急 尤善引血
入心 使無辜之人 一旦輕死 原非醫士之罪 而治之無
法 是誰之愆 余傳異方 凡受官刑 即時煎服 服後用膏
藥末藥內外兼治 瘡口易愈 必無性命之憂矣 衛心仙
丹大黃三錢 當歸一兩 白芥子二錢 紅花三錢 生地一兩
丹皮三錢 木耳三錢 桃仁三十粒 水煎服之 惡血散矣
不必二劑 再以膏藥貼之 名護心仙丹 大黃一兩 沒藥
三錢 乳香三錢 白蜡一兩 骨碎補五錢 松香五錢 當歸

一兩　三七根末三錢　敗龜板一兩　射香五分　爲末以猪
油一兩將白蜡松香同在銅鍋內化開再下各藥拌爲
膏貼傷處外用油紙包裹以布纏住輕者一張重者二
張足矣夾棍重傷不須四張即可行步二方至神至奇
內方使惡血盡散外方使死肉速生合用之何至損命
嘆醫治之無術哉

驚痓吐瀉門

幼科之病驚痓吐瀉爲多其中又有分別大約因痓成吐
因吐成瀉因瀉成驚故小兒口內流涎乃痓之兆也起

手即治痓而吐瀉之症不作又何至驚症之生也惟夫
治痓症而胃氣受傷矣小兒純陽原無損于陰氣胃氣
者陽氣也陽傷而陰亦傷矣傷陰者傷脾氣也人之後
天以脾胃爲主脾胃兩傷無氣以養心而驚症起矣是
驚乃虛症非外風之入也然則吐瀉驚俱脾胃之虛寒
而痓乃脾胃之實熱耶不知小兒因多食水果以致口
熱而成痓口熱似乎陽旺也然而陽極則變爲陰矣故
痓症既久而作吐正陽變陰之驗也可見驚痓吐瀉俱
是虛症補脾胃而四症易愈也世人醫分驚爲風分痓

爲熱分吐瀉爲寒亦未深知症耳不知單治脾胃之虛而四症不必治而奏功也用活兒丹人參三錢白朮一錢甘草一錢茯苓二錢巴戟天一錢陳皮二分白芍一錢柴胡二分當歸五分山查五分神曲五分水煎一服而四症無不即安二劑全愈不再發也此方健脾開胃又能平肝使肝無鬱滯自通疎土氣變剋土之肝爲益土之肝矣脾胃無非生氣而吐瀉自止何至四支無養變成角弓反張乞急慢驚風哉

小兒生疳上下牙床盡腫口角流涎咳嗽不已咽喉腫痛

人以爲疳症乃脾熱也誰知胃火上升乎夫既是胃火即宜瀉火矣瀉而不效者以火過盛將陽變陰矣故用降火之藥以瀉火而火不降轉至困憊者內經所謂壯火食氣也蓋少火宜瀉而壯火宜補不補胃以治火反瀉火以損胃安得不困憊哉治法補胃氣之虛少加息火之味則疳症不治自愈矣用平肝湯茯苓三錢白朮一錢陳皮一分神曲五分麥冬二錢元參二錢桔梗一錢蘇葉三分人參三分枳殼二分黃芩三分水煎服二劑大輕三劑疳愈不四劑也此方補胃散火火自平者以

火出于土中也土健則火藏土衰則火現故補土而火藏于下又何上升于口頰乎況有解火之味在補之內小兒生疳之後飲茶水則吐後則不喫茶水亦吐困弱之至人以爲熱吐也誰知熱變爲寒而吐乎夫疳症本熱也疳久則寒者以胃土之傷土衰則火旺火旺則土更衰土益衰而前火之旺自滅火土兩衰安得不寒乎小兒所喜者生冷也土衰加以生冷自然作吐矣故止吐以健胃爲主單用止吐吾未見其能止也即偶止一時未必不吐于後日惟有健胃胃强而吐不發也加味大君子湯人參一錢白朮二錢茯苓二錢甘草一片半夏五分神曲三分白豆蔻一粒陳皮三分水煎一服吐止二劑全愈此方健胃以止嘔治大人尙有成功小兒乎小兒嘔吐世人視爲輕症不以爲意變成大症而不可救以胃氣傷不能生養四支而角弓反張之症作乃陰虛而成之也此方扶其胃氣胃健而飲食能受既無嘔吐之傷自有灌注之益又何至有驚風之病哉

小兒大吐後又忽大瀉吐止而瀉不止倦怠之至人以爲

Do not copy. Property of the Estate of Prince Jong Yi Library

吐變瀉則其氣順矣。誰知氣愈逆乎。夫吐乃傷胃。而瀉乃傷脾也。氣順宜吐止而愈矣。今吐止而大瀉。乃胃傳于脾矣。由腑入臟。是由表入裏也。較吐更甚。蓋吐症補胃可愈。而瀉症宜兼補脾。必補脾。但吐後作瀉。則補脾胃雖有同治之法。補胃自湯治之。人參三錢　白朮三錢　茯苓五錢　肉桂一錢　甘草三分　神曲五分　附子一片　水煎一服瀉止。二劑全愈。倘服之不應。不必治之矣。此方治兒瀉。效應如神。十人可救其九。彼不應者。乃陰陽兩絕也。非方之過。世人見參附如酖毒。有用之者。動輒詆毀。因循瞻顧。以至死為可痛也。

小兒上吐下瀉。目上視。死亡頃刻。狀似慢風。人以為驚風也。誰知乃脾胃之氣將絕乎。小兒至此。亦入鬼閉也。若作慢風用牛黃等丸。下喉即死矣。夫脾胃之氣將絕。是陰陽之氣欲脫也。非急救氣。何能存活。救氣之味。舍參無第二味也。此症必須多參。然用參四五錢。以救兒之吐瀉。無論今人無此胆氣。即古人亦無此方。毋怪小兒之多亡也。予逢異人訓余救兒垂危之症。惟多用參。可

變危爲安。余試之奇中。活兒非一人矣。小兒脾胃虛寒。何禁吐瀉。至危症也。安兒至寶湯。人參五錢　白朮五錢　茯苓三錢　巴戟天三錢　附子一錢　麥芽一錢　枳殼三分　柹三分　車前子二錢　扁豆二錢　白豆蔻三粒　蘿卜子一錢　水煎一服吐止二劑瀉止三劑全愈。此方全在多用參附。所以能奪命于將危。以人參能回陽于無何有之鄉。以附能續陰于已絕之後也。然非羣藥佐之。則陰陽不能分清濁而積穢亦不能祛除耳。且有參朮補氣。少少祛除。偏易祛除。否則已傷而再傷。已絕而重絕乎。世人但尙祛除。不知補中用攻之法。所以百戰百敗也。

小兒吐瀉後。角弓反張。時而驚悸。牽搐人以爲驚風也。誰知非風也。乃肝剋脾胃之土。土氣欲絕。耳此時萬不可治風。一治風。以定驚則立亡矣。蓋既經吐瀉。則陰陽兩亡。所存者幾微之氣。不急救脾胃以續氣。反去散風邪。以損氣。欲不走于陰得乎。且補脾胃之土而不補命門心包之火。而脾胃欲絕之時。則土寒而陽不可以遽回。陰不可以驟長。故必補火以生土。補土以止驚之爲得也。續氣湯人參一兩　肉桂一錢　遠志二錢　生

柬仁三錢茯苓五錢菖蒲三分丁香三分柴胡五分白芍三錢巴戟天五錢甘草二分干姜三分附子三分半夏一錢水煎二服安三劑全愈此方以十歲爲律准每歲減二分無論慢驚急驚此方投之無不立效蓋急慢驚風俱是虛症非急爲風而慢爲驚也世人以驚爲風悞矣不作風治十人九活一作風治十人十死以虛而兼風治則十人八死以大虛治而絕不治風則十人十活也喻嘉言謂驚風二字前人乃鑿空之談勸醫士絕口不道雖過于憤激然亦深憫小兒之悞死于非命不得不大聲以救之也但嘉言所立之方尚兼風治猶未洞達底裏不能直補土以救驚并補火以生土也

小兒驚症有慢急之分世以急驚屬之風慢驚屬之虛以此分別治之生者頗多似其說不可易矣誰知似是而非亦殺人之說也蓋小兒從無驚風之症此岐天師之所未及而雷公之所不論者也驚風二字乃末世創言以殺小兒者也自此言出殺小兒不下數百萬矣何嘗有風一作風治千人千死殺運未除天亦聽之亂治代天司殺嗟夫天心仁愛何忍使小兒不識不知任其天

殤同于金刃之傷殘耶余受昇傳救小兒驚症絶不治風無論急慢立刻奏功無不危者復安死者重生初意亦欲自秘以神吾術然救一家之子孫何若救萬世之赤子乎故書于冊以聽世人公用也名曰保赤定驚丹

人參三兩　白朮八兩　茯苓三兩　半夏一兩　廣木香三錢　檳榔五錢
柴胡一兩　白芍三兩　山查一兩　枳殼一兩　石菖蒲五錢
麥芽五錢　神曲一兩　甘草一兩　薄荷葉五錢　干姜一兩
麥冬一兩　荆芥五錢　炒黑爲細末蜜丸龍眼珠核大凡有急慢驚症用一丸以人參三錢煎湯泡開送下無不全愈輕者一丸重者二丸但必用參湯泡開若不用參不能十分之捷然亦可免死亡也願人共信吾言萬勿執爲風症爲殺人之醫也

便虫門

小兒便寸白虫或蛕蛔虫或吐長短虫種種不一人以爲濕熱虫也誰知脾胃之傷乎小兒喜食生冷自是濕熱無疑然脾胃氣健雖有濕熱自易分消惟是脾胃氣傷則難運化不生津液而生虫矣倘徒治虫而不補脾胃則脾氣不能化虫且安居無恙何能殺虫

哉惟補脾胃則氣旺自能殺虫又佐以殺虫之味虫將何逃乎治法必補中用攻也用治虫丹白朱三錢茯苓三錢甘草三分白微二錢枳殼五錢史君子十個白芍三錢白部一錢檳榔五分黃連二錢半夏五分水煎服三劑化虫為水矣但服藥後必忌飲湯水茶茗此方殺虫之味居多驟入之健脾平肝劑內則正氣無傷虫又盡殺乃兩得之道也

小兒糞門拖出長虫不下又不肯進入直腸不痛不癢人以為虫咬住也誰知乃祟憑之乎夫虫咬住必然作痒今安然如故豈虫口自咬耶虫既不咬宜隨糞而俱下今只留半截非祟憑而何宜非藥可治然人有一念之悔心醫即有一種之治法方見吾道之大況父母未有不愛子者也見畏神作祟安有不遷善悔過而為請禱者哉余得異傳用藥外點虫身則立化為水矣名點虱丹用　水銀一錢　冰片一錢　硼砂一分　雄黃三分　薄荷葉三錢　樟腦一錢　輕粉三分　白芷一錢　為細末以不見水銀星為度水調少許點虫頭或身上少刻則盡化水但點藥時必處叩上天然後點之則驗否則亦有不驗者不須

內服煎藥至奇之方也余授异傳故書辨症論後异人者余遊南岳所逢道士自號雷公狀貌殊異傳余活人錄奇方最多此方其一也

瘡門

小兒將出瘡也身必發熱口必發渴眼必如醉此時以表藥散之則火毒大解無如世人因循多日見點始用表散有形之解與無形之解大有不同所以輕變重重變死也然見點不用表藥則火毒又將安解豈不藥得中醫可望其自愈乎不知善能用表散正自有功耳凡瘡初出時不可不用表散又不可全用表散當于補中表散之則正氣無傷而火毒盡解也用至慈湯人參三分柴胡一錢當歸三錢生甘草二錢茯苓二錢陳皮三分麥冬二錢元參三錢天花粉一錢炒黑荊芥三錢水煎服一劑火毒少散二劑全散不三劑也已出點則重變輕死變生矣此方以柴胡荊芥疎通表裏元參去浮游之火甘草敗毒妙在參歸麥冬俱補氣補津佐各味以充其力使無壅閉之憂以達其至隱之毒也世人怡瘡一見用補無不驚惧誰知火毒非補萬不能由內而發外

DO NOT COPY
East Asian Library
Princeton University

能于補中用表散何愁小兒之不登壽考也此方以十歲爲准如週年小兒用十分之一每歲增加可也若十歲之外宜加入參餘味不必加也

小兒已出痘一身上下盡鮮血之點粒粒可數此至佳之痘也不必發散只助正氣自然飽滿貫漿收靨亦速不待九日而始回矣然純用補劑又恐呆補無疎通之氣恐速于成功未免有升上而不能降下之患非善治也

安幼湯當歸三錢荆芥一錢元參三錢陳皮三分熟地三錢麥冬三錢生甘草五分生地二錢黃連一分丹皮一錢貝母三分水煎一服而定不二劑也此方妙在補中帶散則痘力足無內陷之憂散中寓補則痘大泄少外阻之禍世人不知怡法一味是補所以多留後患耳

若一味呆散未有不將佳痘而變爲惡瘡者每至死亡犹以爲胎毒未淨也仍用散火敗毒以至不救謂非醫殺之而欲免於陰報也得乎

小兒出痘痘色紅盛煩渴大便乾燥小便短澁黃赤脉洪大不倫舌上生瘡此陽症也忌用溫熱又不可見爲大熱而用寒涼恐火熱太盛驟得寒涼而火不肯遽退熱

East Asian Library Digital Collection
Do not COPY
Visit the Gest Library

不肯驟解反至生變者有之。怕法宜用寒之中佐以火熱之品用涼之中輔以散火之味。則不違火熱之性。白不得寒涼之益也。全痘散火湯。元參三錢　黃芩一錢　枝子一錢　生甘草一錢　桔梗二錢　生地二錢　荊芥三錢　炒黑當歸一錢　水煎一服。熱毒火毒盡散。此以苓枝清火元參退浮游之火。妙在荊芥桔梗引火外出而生地當歸滋脏腑之燥。則雨潤風吹有不變火宅而清涼者乎。所以獲解散之功。無違背之失也

小兒出痘痘瘡虛空色。又清白發癢中塌身寒而顫。咬牙不已。腹中虛脹。吐瀉。脉沉細微弱。此陰症也。乃內寒之極。不能發出。必須大補氣血。佐以溫熱之味。則痘無水凍之虞。倘不知其故。亦用寒涼。則痘內陷而死亡頃刻矣。是陰痘戒用陰分之藥明甚。然有似是而非者。不可不辨。以痘之善變也。色白虛也。而發癢。又有寔症。身寒涼也。而發顫。又有熱症。腹脹虛寒也。而吐瀉。又多寔熱之症也。既非虛寒也。用溫熱安得不死乎。何以辨之。吾辨之于舌焉。舌紅者熱。舌白者寒也。舌紅帶白者。熱中之寒。舌白微紅者。寒中之熱。舌大紅而燥。熱極也。舌純

白而滑寒極也舌白滑陰症無疑用祛陰救痘丹人參一錢當歸三錢白朮三錢附子三分黃芪三錢荊芥一錢水煎服一劑色白變紅陽回而寒盡散矣此方以參芪歸朮補氣血血足而陽自可復氣旺而陰自難留益以附子則奏功如神加荊芥者以附子攻內非荊芥不能引附子外散耳

痘初出隱于肌肉之間不見點粒人以爲痘毒內藏不肯遽出也誰知乃氣虛不能推送以發外乎用升麻桔梗羌活之味亦能外發然不補氣惟用散藥恐元氣益虛

痘發之後未必無他病之生非善治也發痘散當歸一錢生黃芪二錢甘草五分桔梗一錢荊芥一錢防風二分水煎服一劑見點粒二劑盡出也不必再服藥矣妙在桔梗荊防散藥而寔得歸芪補氣之力則易於推送所以火毒不能隱藏一齊盡出也

痘已見點後熱氣太盛痘粒過多人以爲火毒太甚誰知血虛不能以潤乎若只用發散不用補血則火盛水乾痘難灌漿矣故必于補血之中少佐以解毒也養痘湯當歸二錢川芎一錢連翹五分麥冬一錢天花粉三分

木通三分甘草二分水煎服一劑熱退二劑痘粒明淨盡行貫漿矣此方妙在以歸芪麥冬為君少用喬通花粉為佐使則血旺而火不過炎熱消而毒不內隱故能速于收功又無後患也

痘已出四五日後大小不等根窠不甚紅澤色暗頂陷不能起發者人以為火毒倒塌也誰知乃氣血之虛欲出不能欲發不得乎倘用化毒毒反不消倘用催漿漿反不貫變生不測往往有死者必于補氣血中佐以化毒催漿之味也催痘湯

人參三錢當歸二錢牛旁子一錢川芎一錢黃芪二錢茯苓一錢桔梗五分陳皮二分連喬三分肉桂半分水煎一服色紅二劑頂突貫漿矣此方妙在用參芪歸芎之多而發散化毒為佐使氣足而不怯于中血足而不陷于內自然痘色潤澤而肥滿也

痘至六日毒宜化漿宜行矣乃色不紅綻肥滿是氣血大虛也切勿徒攻其火妄用敗毒之味必于補氣血為主

護痘萬全湯

人參五分黃芪一錢當歸二錢川芎一錢白朮二錢茯苓一錢陳皮三分大力子三分桔梗五分花粉三分水煎一服紅潤肥滿矣不二劑矣此方妙在

East Asian Library, UCLA
NOT to Be Posted on the Internet
Digitized by the Internet Archive

不去消毒攻火。但補氣血。痘自外發。且補中有散。而非呆補。更易奏功。有益無損。而收萬全之效也。

痘至七八日。漿宜滿足矣。今痘平漿薄。飲食少減。人以爲毒氣內陷也。誰知乃氣血不充乎。氣血不充者。由于脾胃氣弱也。脾胃弱則肝血不生。肝血不生則脾胃之氣更弱。又何能致漿足而瘡突乎。必大補脾胃。少佐補血之品。氣血旺而脾胃自健。健則痘瘡安得不充滿乎。用

以保痘湯。人參一錢 白朮二錢 黃芪二錢 當歸二錢 麥冬二錢 陳皮五分 荆芥二錢 如癢加白芷三分 蟬退二分

不癢不必加也。如痘色白而薄。倍加參芪。服一劑。不白不薄矣。此方純補氣血。而補氣尤重者。以血得氣而生也。氣足血旺。何愁漿薄哉。自然飲食倍加。漿足靨結矣。

痘至九日十日後。漿稀痂薄。人以爲痘毒內蘊也。誰知仍是氣血之乎。夫氣虛補氣。血虛補血。又何碍乎。然而氣血雖虛。而痘毒未清。不兼顧火毒。一味呆補。則火毒內藏。恐痘愈後。有回毒之患。必于補中微散。爲得也。用

全痘湯。人參二錢 白朮二錢 茯苓三錢 陳皮一錢 銀花三錢 當歸三錢 通草一錢 大力子一錢 甘草五分 荆芥

三錢水煎服。一劑漿厚靨高矣。此方用參不用芪者。以黃芪過于補氣恐有脹滿之虞。不若多用人參。既補氣又無增悶之嫌。尤妙用大力銀花于補中散毒。得補之益。獲散之利。眞善後妙法也。

瘡至十一二日。身發潮熱。飲食不思。當靨不靨。痂落無托。人以爲毒氣猶存也。誰知乃氣血之虛。而毒未化乎。化瘡仙丹治之。當歸三錢白芍二錢人參一錢山查五粒黃芪三錢牛旁子一錢荆芥一錢防風三分甘草一錢銀花三錢水煎服。一劑胃氣開。思飲食矣。二劑全愈。此方妙在金銀花。與荆旁用于參芪歸芍之中。則胃氣不傷。脾氣大旺。肝血既潤。不復劫土。則火毒全解。又安有留餘之患哉。凡瘡不補。則火毒不出。而瘡純補。則火毒亦不盡出也。今于補中用散。所以未出者出。而既出者盡出也。瘡已見形。又出一層紅斑者。此夾疹之瘡也。或似斑非斑。或零星錯雜。皆是夾疹症也。人以爲瘡毒深。前未發出。而後再發也。誰知瘡將出時。又感寒風。使內熱留中閉塞腠理。激動腑毒而並出乎。治法宜脏腑並治。然治脏不若先治腑也。蓋瘡毒出于脏。疹毒出于脏。疹毒出于腑。腑之毒淺。

脏之毒深淺毒先散而深毒亦难留故治痘必先治疹也用分痘湯升麻一錢元參三錢麥冬三錢當歸二錢生甘草一錢青蒿二錢半夏五分生地三錢荆芥一錢水煎一服疹全散矣此方退陽明火而解肺熱妙在多用升麻引火外發于皮毛雖曰消疹而寔所以成痘也又何必治疹之後再行治痘哉

痘症已全數日後身復發熱一身發出紅斑癢甚愈爬愈盛先出大小不一如粟狀漸漸長大如紅雲一片人以爲痘毒尚存前未暢發故爾如此誰知全無痘毒乃收痂大愈之後放心縱欲飲食過傷又兼風熱而成之乎此名蓋痘疹似痘非痘也治法散其風熱不必顧痘毒風熱既解即有痘毒亦無不解矣用安痘湯元參五錢當歸三錢連翹一錢白芍二錢丹皮二錢荆芥二錢升麻五分花粉一錢水煎一服斑輕再劑斑散矣此方化毒而不耗氣解熱而不損血所以風熱全消痘無變症耳

痘五六日後色變純黑或炭灰之色頭陷下不起飲食到口即吐死症無疑所謂壞症也然死中可以求生勿

以壞症而輕棄之也夫小兒純陽陽氣易漓陰氣难絶倘有一線之陰可續則引陰可以接陽往往死者重生我受異人之方敢不以救萬世小兒乎用起死救兒丹

人參 三錢　元參 一兩　金銀花 一兩　白朮 二錢　當歸 三錢
麥冬 三錢　甘草 一錢　天花粉 二錢　荆芥 二錢　茯神 三錢

水煎一服黑変爲紅再劑陷者起乾者潤飲食知味矣此方之妙全在銀花與元參之多既能解毒又善散火又助以參朮歸冬足以濟二味之力成其祛除之功所以能轉敗爲勝起死變生也切勿驚葯料之重用參之多而減去分兩蓋葯不重火毒難消參不多則陰陽難復願人加意此方以救小兒危險也

小兒痘瘡治不得法多致不救誰知可以不治治之乎夫兒已出痘何以不治治之所謂不治之者服吾方可使之不出痘不必用葯以治痘也兒之出痘者感父母之淫氣以生之也解其淫氣又助以化毒之品安得而出痘哉前人亦知此意曾造稀痘丹或截痘法然亦有不驗者未能深窺痘毒之源與解毒之葯也蓋解毒之品未有不損人元氣者元氣一虛毒即難解且毒成于

火而淸火必用寒涼之藥。但小兒脾胃最忌寒涼一服寒涼土氣匱乏。火毒又安能外泄乎。所以服之不效也。余逢異人之傳。方法平平而取效寔奇。名止痘丹。元參一兩　金銀花三兩　貝母五分　苦參三錢　丹皮三錢　黃芩二錢　生甘草一錢　撿天赦日以水二碗煎至一碗。又重熬至三分。用茯苓五錢。爲細末。將汁調丸如米粒大。俟半週時。將藥同蜜拌勻。與小兒食之。二日服完。必下黑糞。永不出痘矣。痘既不生。何有死亡之痛哉。異人秘傳此方。原約廣傳人世。今附于此書之後。使天下之人均可受益。以不負異人之傳云。

疹門

小兒發熱二三日。肌膚間隱隱發出紅點。如物影之搖動。時有時無者。此影疹也。人以爲發斑傷寒。誰知是出疹發表熱毒外散。偶遇大寒大風。生冷之犯。故皮膚寒風。毒氣內攻。壅住於腠理之間。乎皮膚之際。片片皆紅。紅或變白。白或轉紅。紅或轉紫。氣喘腹滿。甚而作痛。毒氣入胜。欲出不能。存亡頃刻。至危症也。治法必須化斑。不必治疹。蓋疹與斑總皆熱毒耳。消斑化疹湯元參五錢

歸尾三錢石羔三錢白芍五錢丹皮三錢地骨皮三錢荆芥二錢木通一錢青蒿三錢升麻一錢麥冬三錢甘草一錢水煎一服。斑消瘡化二劑全消。此方不多用大寒之品。止用微寒之味者。以斑瘡雖起于大熱。然亦因脏腑之乾燥。內無水制而外現也。今滋其津液。則水充足以制火。又得引火解毒之味。直走皮膚。火毒欲內攻而不可得。安得不外泄而解散乎。以元參爲君。能清浮游之火。何必多用寒凉之甚者。以撲滅炎威。而傷脏腑乎。所以奏功既神。又無大害耳。

小兒出疹。口中大瀉。暢與之水。快甚。遂恣飲之。乃嘔吐不止。因變瀉痢。喘嗽不安。小便不利。囊浮腫。脇疼。筋軟膨脹。人以爲大熱不解也。誰知飲水過多。水蓄不消之症乎。夫心火亢炎。因而作渴。飲水必入于心。心不受水。而傳于脾。爲嘔吐瀉痢矣。傳于肺。爲咳嗽矣。傳于腎。爲小便閉。囊腫矣。傳于肝。爲脇疼。筋軟膨脹矣。夫水本剋火。然水多則滯火。反得水以沸騰。疹消而他症生焉。治法不必治疹。惟在分消水勢。水涸疹亦痊矣。用分水消疹散。茯苓三錢　木通二錢　猪苓二錢　芫仁一兩　桔梗一錢

車前子三錢荊芥五分白朮三錢水煎一服水由小便出矣二劑水盡而愈此方前治水也以桔梗荊芥少提其氣不但水氣因升提而下行倍速且使餘瘡亦由膀胱下泄也但二味既是提氣何以不用升麻不知升麻提氣必使瘡毒由皮毛而出反足以掣利水藥之肘不若桔荊雖提氣而不走皮膚反能佐二苓各味共走膀胱水瘡共治也

小兒發瘡後牙根潰爛肉腐出血臭穢冲鼻人以爲餘毒未盡遊熱不退誰知皆醫士治瘡而不治浮火之故使熱積皮膚不用解散清涼以致火毒入胃久而不散因作祟也必須仍散其火熱之毒倘不知治法縱而恣食肥甘濕熱動虫勢必變爲走馬牙疳穿腮落齒或面頰浮腫環口青黑唇崩鼻壞生瘡作癢肉腐而不可救者矣救瘡散毒湯元參三錢甘草五分黃芩一錢茯苓三錢白果十粒麥門冬三錢白薇一錢青蒿三錢陳皮三分荊芥五分生地黃三錢干葛一錢水煎服之大輕三劑全愈此和解之方不用大涼者以瘡既愈其勢雖盛火毒寔輕不可以外症之重用重瀉之味刦奪之也世

人見此症輕用苦寒瀉葯往往輕變重重變死豈不惜哉

喫泥門

小兒數歲後好喫泥土人以爲胃氣熱也誰知肝木之旺乎肝木過旺來剋脾胃之土土虛不敵思得土以助故見土卽食也治法平肝之旺補脾胃之虛則土氣無虧自然見土不食矣六君子加減以治之人參一錢茯苓三錢甘草五分陳皮五分半夏三分白朮五錢白芍葯五錢黃芩五分黃土三錢水煎一服肝氣平二劑脾胃氣轉四劑不食土也此乃健脾胃之聖方加黃芩清火此白芍平肝而脾胃自得其養矣尤妙加入黃土借土氣以安脾投其所好而六君子諸味益足以展健運之功力耳

胎毒門

小兒生半歲或二三歲忽身上手足上肚腹上臂上或頭面上長成大瘡久變爲毒百計治之不效此非兒毒乃父母之毒也當日結胎或感楊梅毒氣坐胎之後或感淫氣火邪以至貽害小兒治不得法多半死亡吾遇異傳治此症已數十人矣吾不傳方則負異人之善心而

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Digitized by Google
Not to be copyrighted

小兒無方失救不猶吾殺之乎用金銀花二兩生甘草三錢人參二錢天花粉三錢黃藥三錢錦地羅三錢水煎服二劑毒全消倘外口不愈另有外治之方用蝸牛三錢生甘草三錢冰片一錢兒茶三錢輕粉一錢射香三分樟腦三錢黃丹三錢水粉三錢枯凡三錢地龍糞五錢為細末麻油調敷數日瘡內生肉瘡口外斂眞神方。輕者用前方。不必外治重者內外合治無不速痊。余從萬世起見將仙方輕易傳世願人廣傳。體余之心為心。勿自視為奇秘而不傳以受天譴也。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library