PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

C83/2867
v.2

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

立從大便出以上經驗方

吹喉散

冰片三分 殭蚕五分 硼砂二錢五分 牙硝七錢五分

共爲末用葦管吹喉內患處神效

治喉啞奇方

硼砂一兩 元明粉二錢 膽星二錢 百藥煎二錢 柯子肉二錢

冰片三分 共研細末再用大烏梅肉一兩搗如泥丸龍眼

核大每用一丸噙化

治魚骨鯁喉 食橄欖卽下或以橄欖研末急以水調服自下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

本冊中縫甚緊無法開展

又方　含硼砂一粒徐徐嚥之

治喉內生毒堵塞頸項腫脹危急之症

癩蝦蟆一個白礬三錢同搗爛敷之如乾再換　集驗良方

喉閉　症有十八種多因火勝熱結而成用山豆根含汁嚥之

即開

喉症手足厥冷氣閉不通

白礬三錢煅火熬化入去殼巴豆研爛者二粒候乾去巴豆取礬研

末用少許吹入喉中頑痰出立愈

鎖喉嚥津不下　土牛膝根即鼓槌風根搗爛取汁男左女右

滴入鼻中少頃鼻中有紅絲出立愈

又方　桑樹上所出黃菌名桑黃搗汁漱之血愈如乾者磨水

漱之

喉嚨腫痛　甘草　貝母　黃芩　黃連　菹荷　川芎各一錢

桔梗三錢　玄參二錢　水煎服

喉痺　冰片五分　生礬三分　麝香半分　石膏一錢　爲末吹患處

涼即愈

喉癰腫脹　若水穀不進者膽礬三厘含口內吐出惡涎自愈

魚骨硬　獨頭蒜塞鼻中自出　或鹿角剉屑含津嚥之　如

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

七日不出燒鯉魚鱗皮以水服之

鷄骨硬　舊靴皮燒灰服之玉簪花根吞之或甘草二錢威靈仙五錢宿砂三錢水二碗煎八分入口噙漱近喉呵氣即愈

鷄魚骨硬　苧蔴根搗汁灌下即愈

一方　用苧蔴根搗碎丸如龍眼大魚骨魚湯下鷄骨鷄湯下

悞吞銅錢　食荸薺核桃化

悞吞鐵骨之類腸中不能轉送覺墮者　多食青菜猪脂自然送入大腸與糞同出

悞吞銅鐵　用堅炭爲末熟猪油調服二三錢即出以上經驗良方

急喉痺內外俱腫名纏喉風不俱大人小兒俱效

用遠志爲末水調敷項立愈

七寶丹　治雙單乳蛾及喉風腫閉

殭蚕炒　全蝎去毒各十個　牙皂去子弦　硼砂　雄黃　白礬各一錢

膽礬五分　爲細末每吹一次入喉立愈

咽中結塊不通水食危困欲死　百草霜蜜丸茨實子大新汲水化服一丸灌下甚者不過二丸名百靈丸普濟方

雙單乳蛾喉癰風腫吐嚥不下死在須臾

玄胡粉吹入喉中用井華水噙嚥即愈神效濟世方

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又方　覔頭上紅疙瘩用針挑破即愈急救方

喉痺口禁不開　猪皂一條用蜜調和水煎如急立服緩則露一宿尤妙口噤斡開灌之垂危立甦保元方

諸骨硬咽　人指甲燒存性爲末吹入喉中立效急救方

又方　山查水煎膏投入鷄骨即化爲度能消一切骨硬急救方

○頭痛門

諸頭痛　生蘿蔔汁一蜆殼仰卧注鼻中左痛注左右痛注右愈

偏正頭風　不論男婦連筋痛極者用茯神搗末每服二錢湯酒任下數服愈

痰火眩暈　大黃酒浸九蒸九晒爲末水丸如菉豆大每服百丸食後臨卧清茶送下神效

治偏正頭風立刻止痛方

硫黃一錢　川椒炒取椒紅三分　右二味拌勻溶成小餅左疼塞左鼻涕從右孔出右痛塞右鼻正痛左右俱塞清涕流出盡即愈神驗

又方　白芷炒二兩半　川芎炒　甘草炒　川烏半生半熟各一兩

共爲末每服一錢細茶菹荷煎湯調下

又方　石菖蒲根搗汁酒冲服即愈至多不過三四服如無鮮者即以乾者水浸搗汁

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

○眩運門　附麻木

遍身麻木不仁　用芥子末醋調擦之

手足麻木不知痛痒　霜降後桑葉煎湯頻洗　救急方

頭眩運倒方　老年人更妙

鮮白菓二個去殼衣　研爛空心開水冲服至重者不過三五服即
愈　普門醫品

○癱瘓風濕門

治筋縮不行疼痛不止仙方

當歸一兩　白芍　生地　元參各五錢　柴胡一錢
水煎服即愈　如脚膝轉筋加木瓜五錢極效

又提便止脚氣痛方

用鹽揸痛處少時却熱湯洗之　若有人患脚氣諸藥不效
後得此方常用鹽揸後以熱湯浸洗竟永除其患

治風癱大病　十餘年不能行動者手戰脚軟

金毛狗　全身者用黃
酒洗去毛淨　咀片黃酒三斤煮三炷香埋土七日退
火氣空心日服三次數日即能行走

又外治方　用黃瓜藤煎水熏洗

藥酒方　治男婦身受風濕筋骨手足疼痛不仁服之神效

當歸一兩　川芎七錢　生地一兩半　芍藥八錢　防風八錢
川杜仲一兩　桑寄生八錢　桂枝五錢　白朮一兩　白茯苓五錢
淮牛膝一兩　秦艽八錢　炙甘草六錢　炙黃芪一兩　川獨活七錢
虎骨炙二兩　膠更妙　黃松節七錢　即茯苓心木
用好乾燒酒十五斤醇娘酒五斤布袋盛藥浸三日隔水
蒸一炷香久取出退火氣隨量飲數杯

○痿痺門

一切手足風痛及酒脚痛

葱汁蒜汁各一碗醋一小碗牛皮膠八兩熳火同三味煮成
膏用青布攤痛處即止一盞更佳

一方　加蒜汁急性花汁各一盞更佳

風腰脚痛不可踐地　松葉搗一升酒三升浸七日每服一合
日二服或細切爲末酒下二錢或蜜丸俱可　按松節浸
酒行血中之風治脚膝酸痛中風口眼歪斜及歷節痛風
俱宜服

脚腿紅腫　熱如火炙俗名赤遊風　用鐵繡水塗解之

鶴膝風　用何首烏煎酒服以醉爲度渣敷患處數次而愈

白殿風　硫黃佗僧爲末薑汁調搽

汗斑　硫黃　蛇床子　蜜佗僧　各研生薑汁調將茄蒂蘸藥揸之

○腰痛門

腰痛難忍　用絲瓜根燒存性爲末酒下二錢立止

男婦腎虛腰痛　小茴香爲末煨猪腰子服

男婦腰痛如刺面腫垢黑氣血虛憊髮落齒枯唾涕痰涎腰脊痛不能行立　鹿角剉屑四兩炒黃爲末酒下二錢加牛膝爲丸更效

腰痛并或時閃剉

杜仲　破故紙　核桃肉各等分酒煎服

諸閃凡閃肭打傷閃腰并手足傷損不出血但有青紫內傷者先以葱白搗爛炒熱將痛處擦遍隨用

生大黃研末薑汁調敷盡量飲以好酒即三月半年不愈者皆神效　以上經驗良方

腰痛并或時閃剉又方　糯米一二升炒極熱盛囊中縛於痛處細研八角茴香三錢以鹽酒隨時服之皆效　經驗良方

○脹滿腫蠱門

鼓腫及四肢腫脹

乾鷄屎一斤炒黃酒三碗煮一碗濾過飲之少頃腹中動作

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瀉一二回次日以田螺二個滾酒淖熱食之即止按本草鷄屎白微寒無毒治中風痰迷療瘕癥鼓脹利大小便用之有奇妙此等方不宜與病人知之

白鷄屎半斤酒一斗浸七日日飲三杯或爲末下二錢

又鸕鷀鳥焙乾爲末服甚效

小兒腹脹

鷄屎一兩　丁香一錢　蒸餅丸米湯下一錢按以上四方治一切水腫濕腫氣腫肚腹四肢發腫皆效不可以其賤穢而忽之或醫者權用不與病人親故知之亦妙此峩眉山僧奇方也

十種水病腹滿喘促不得卧

土狗五枚焙乾爲末白湯服一錢小便利爲效

消河餅治水腫臌脹小便淋閉

大田螺四個　大蒜去皮五個　車前子三錢　三件爲末研成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃水漸從小便中出其腫立消

火丹　芥菜搗爛敷之

蚕沙　山梔　黃連　黃芩　黃栢　大黃　寒水石

共爲末水調敷上立效

治五種蠱　楝樹皮焙爲末米飲調服二錢

又方　雄黃白礬各半爲末黃蠟化溶爲丸每服七丸

又方　胡荽絞汁半升和酒服之立下神效

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

中諸蠱毒

白礬細茶等分爲末新汲水調下二錢瀉吐卽效未吐再服

婦人血蠱

馬鞭草及劉寄奴煎湯服治血蠱之神藥或爲末服按嶺南有此病而此物亦易得以其有解毒消熱之功也

試臌法　用鹽四兩炒熱絹袋包放臍上水臌鹽化水食臌變紅色血臌紫紅色氣臌紫黑色氣虛中滿鹽本色

治遍身黃腫方

百部　洗搗罨臍上以糯米飯半斤拌酒半合以布包往蓋在藥上一二日口中有酒氣則水毒從小便出腫自消矣

○黃疸門

黃疸通治方　枸杞根搗汁熱生白酒冲服

又方　土牛膝四兩生白酒三碗煎沸六七次空心連服三日除根

又方　白芥子二錢小兒止用五分研碎燒酒調用白布攤之貼臍下小肚上一週時起泡爲度須戒鹽甜之物

黃病　六味地黃丸料　加綠礬卽膽礬二兩醋炒紅爲末煉蜜丸如桐子大白湯早晚服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

○脾胃門

心膈飽脹腹中又饑又痛　胡椒七粒研末好酒冲服立愈

治傷米食積　用白麪一兩白酒麯二丸炒爲末每服二匙白湯調下如好食油因誤吞髮入胃用雄黃五錢研末水調服

治食後吐酸水　用乾薑吳茱萸各二兩爲末酒服以上集驗方

吞酸方

蘿蔔生嚼數片葉亦好乾者熟者鹽醃者皆可用瀕湖集簡方

又方　胡桃嚼爛以生薑湯下立止本草綱目

三聖丸　治饋雜　白朮炒四兩　黃連炒五錢　橘紅一兩

爲細末神麯糊丸菉豆大每服五十丸食遠薑湯下東垣方

論饋雜之症倏爾腹中如火空無物似辣非辣似饑非饑似痛非痛而有懊憹不自寧之狀得食暫止或兼噯氣或兼惡心乃火動其痰也用二陳皮湯加薑汁炒黃連炒梔子宜多加青黛　凡吞酸饋雜惡心久而不治皆成噎膈翻胃

○飯逆門

飯逆不止　川椒四兩去閉口及子炒研　麪糊丸梧子大每服十丸食遠醋湯下神效邵以正經驗方

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

又方　荔枝七個連皮核燒存性爲末食遠白湯調服立止楊拱醫方摘要

又方　黃蠟燒烟張口薰二三次卽止摘要

上氣欬逆　砂仁炒研　生薑連皮　等分搗爛熱酒食遠泡服二錢神效簡便方

胃冷飽逆氣厥不通　母丁香三個　陳橘紅一塊焙　水一盅煎半盅食遠熱服十便良方

○嘔吐門

橘皮湯　治男女傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷

橘皮四兩　生薑一兩　水二升煎一升徐徐呷之卽止仲景方

凡人嘔吐服藥不納者必有蚘在膈間蚘聞藥則動動則藥出謂之蟲嘔○于嘔吐藥中加炒川椒十粒服之蓋蚘見椒則頭伏也戴原禮方

胃冷惡心食卽欲吐

白豆蔻三枚炮　取子搗細酒一盞溫服並飲數杯佳凡作惡心者嚼白豆蔻子最妙張仲景備急方

乾嘔不止　甘蔗汁入薑汁四分之一溫服半升日三次本草綱目

惡逆　頻嚼生薑自止本草綱目

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

○噎膈翻胃門

反胃吐食

樹上黃香圓　糞內浸七日再用童便浸七日風乾煎湯服

乾柿餅　每用三枚連蒂搗爛用酒服甚效

又方　甘蔗汁一升入生薑汁二合溫熱作五次服皆效

甘蔗汁　又治中酒毒乾嘔者

噎食不下　鳳仙花子　即急性子　酒浸三宿晒乾爲末糊丸菜豆大

每服八丸溫酒下不可多用　摘立方

又方　人乾屎入蘿蔔內火煅三炷香取研每服三錢黃酒下

三服　海上名方

又方　寡婦木梳一枚燒灰煎鍮匙湯調下二錢　生生編

反胃轉食　灶心土年久者爲末米飲湯服三錢　百一選方

又方　韮汁二杯薑汁牛乳各一杯細細溫服　本草綱目

又方　乾柿餅乾飯日日同食之絕不用水飲如法食之其病自愈　經驗方

治噎食神驗方

生薑不拘多少五月五日午時用布袋裝好浸于不見天日之東廁內四十九日取起掃去穢物懸空吊晒極乾爲末

病二年者用薑末三分病一年者用二分入麝香一二厘衝白滾水與病者吃下只一服而愈服藥後不可輕叫病人吃飯須先飲米湯一日方可少吃稀粥五六日後漸漸吃飯總以少吃爲妙忌葷腥鹽醬並醬小菜五十日永不再發此方極效無比有力者宜預製以救人最妙

噎膈方　患此症者胸前必有二小骨漸漸交合則不能食而死矣熟鵝血不用鹽飲之則胸前二骨俱化飲食可進

治膈食屢驗方

小兒胎髮一個以陰陽瓦焙焦存性研細末陳酒送下即愈

翻胃奇方　藕二枝風乾三四日去其頭二三段節吃藕稍一段吞汁吞渣一日一服二日服完即愈

膈食驗方　大豆即羅漢豆或炒或煮頻頻食之久則自愈蓋此症諸物不能下咽惟食此無碍以其相畏也

○血症門

治衄血方　用線紮中指根節上左鼻出血則紮左中指右鼻出血則紮右中指兩孔出血則左右並紮隨紮隨止

又方　血餘燒灰吹之立止永不再發男用母髮女用父髮

又方　蘿蔔菜乾二兩猪精肉四兩濃煎飲之即止果效

治衄血不止　用麥冬去心生地各五錢水煎服立止

治衄血　眞茶豆粉一兩細茶二錢爲末涼水調服

又方　大蒜二箇搗貼足心右患貼左左患貼右兼治虛火上升眼目腫痛大有神效

治暴吐血方

廣陳皮　生甘草各五錢爲末每服一錢五分燒酒調服立刻止血

用買仲五錢爲末頭髮五錢燒灰存性

側柏葉搗汁一碗將藥末入內大碗盛之重湯煮一炷香取出入童便一酒鍾黃酒少許徐徐服之

治吐血方　用鷄蛋一個打開和三七末一錢藕汁一小鍾再入酒半鍾隔湯頓熟食之不過兩三枚自愈以上俱集驗良方

又方　百草霜五錢山村人家專燒草鍋底者更妙槐花二兩炒白茅根煎湯下此藥火中有水性輕浮無毒毋不傷臟腑

又方　亂髮燒灰水服二錢一日三服止下諸血通治或吐血或心劒或內崩或舌上出血如簪孔或鼻劒或下便出血並皆治之

引血歸經方　當歸酒洗三錢白芍酒炒二錢熟地五錢川芎一錢荆芥穗炒黑一錢生地酒炒五錢麥冬去心二錢茜草一錢甘草一錢水煎

服極穩效

○痞積門

痞積　生鵝血殺時乘熱好酒泡滾盡量冲服隨症新久多寡自消化無形病深多服數次

又方　痞塊慰法以葱蜜同搗攤在布上貼于患處用熨斗微火慰之痞立下

腹中痞積　觀音柳即垂絲柳煎湯露一夜五更空心飲數次痞自消

食積血痞　木賊草末三四分白湯空心服即消年遠不過二服

諸蟲作痛　口中必有涎流出湯飲不能進危在旦夕者用烏梅花椒生薑煎湯服

治大人小兒痞積　水紅花子爲細末以麪糊和作一處少加麝一厘放痞上以慰斗烙之數次即愈

又方　每日清早生服三錢滾水下多服自消

治痞　透骨草一味貼患處一灶香或半灶香即掀去皮上起泡而愈

○癲癎門

猪羊癎方

牙皂角八兩去弦取不落水猪肝一具同煮一二灶香取出猪肝

將牙皂晒乾加明礬四兩檳榔二兩共爲末神麴爲丸如菉豆大每早晚各服一錢細茶湯送下羊癇用羊肝

化痰丸 治風痰癇病

生白礬一兩入猪膽內陰肝北細辛五錢爲末蜜丸桐子大一歲十丸茶湯下大人服五十丸久服痰自大便中出

癇病神方 昔一婦人病狂十餘年遇異人授此方初服心間如有物脫去神氣漸然至再服而愈亦治男婦抑鬱顛狂及風痰迷悶

鬱金七兩明礬二兩爲末麪糊丸滾水下三錢藥完病愈

○疝氣初起 鳳仙花陰乾等分燒酒浸服日飲二三鍾

疝氣 旱蓮草搗汁一盞酒半盞和勻熬熟服立效按此方治酒腫痛不論老少新久俱效以旱蓮草能行血治血故也

諸疝舉發痛不可忍 用堅炭燒紅放碗內將好燒酒半碗澆下速以碗蓋之飲此酒即愈

小腸氣痛遶臍衝心 水爪散

連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒調下甚者不過二三服即消

寒疝攻痛及偏墜

不論老少病在左荔枝核一歲一粒慢火煆存性研末空心好酒調服如年紀多不妨作數次服須一日服之

病在右小茴香鹽水炒研末空心燒酒調下三錢

陰腫核痛大如升者　搗馬鞭草塗之

陰囊爛盡只留二子

鳳仙花子甘草等末麻油調敷即生肉囊癰乃陰虛濕熱流注於囊結而為腫至潰後睪丸懸掛者猶不傷人以其毒從外發治當補陰清利濕熱取效者十有八九

陰囊腎莖肛門瘙癢難忍

陳葫蘆燒灰存性擦摻患處立愈以上經驗良方

疝氣腫痛　小茴二錢　荔核　橘核各一錢　研碎末酒調服

立消斗大疝氣方

沉香　紫蘇　蘇木　南星各五錢　老香椽一箇切碎

雄猪尿胞洗淨入藥于內好酒四五斤煮爛搗麪糊為丸

梧子大酒送四五十丸藥盡胞縮

○脚氣門

濕脚氣　足痛脛腫洗方

菜服秧即蘿蔔菜　連根煎湯洗如無鮮者晒乾者亦可用

East Asian Library and Gest Collection Princeton University Library

又方　明礬二兩地漿水見諸藥食毒　十大碗煎六七沸將一半浸脚一半徐添入上以衣被圍身畧有微汗則愈隨與薄粥飲之如不愈前方內加硫黃三錢○枸杞葉搗汁將鵝毛塗患處數十次自愈

風寒暑濕脚氣

鳳仙花葉晒乾煎湯熱洗仍以葉搗爛敷患處

脚氣發腫　馬鞭草煎湯洗二三次愈○粘米飯同陳年好酒糟搗爛裹在患處止露出脚指頭

遠行兩脚腫痛　細辛　白芷　防風　草烏　各等分爲末摻在脚底內如底乾卽以水微濕過摻藥著脚行走不再腫痛（以上俱經驗方）

○驚悸門

預知散　治健忘驚悸

虎骨（酥炙）　白龍骨（煅）　遠志肉（製）

等分爲末生薑湯調服二錢日三服久則令人聰慧（永類鈐方）

治夜不得睡　用燈草煎湯代茶飲卽得睡每日向晚以後不可飲茶

治健忘補中益心志聰明耳目

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蓮子泡去心皮爲粉粳米二合煮粥候熟入蓮子粉攪勻再煮二三沸食易簡方

○自汗盜汗門

盜汗

桑露採桑葉焙乾爲末每服二錢食遠米飲調下冬月不落葉更妙

枯白礬二錢爲末津唾調塗塞臍內以膏藥封之自止

又方　用經霜桑葉煎水飲卽止　經驗方

又方　蓮子七個黑棗七個浮麥一合馬料豆一合用水一大碗煎八分服之三劑全愈

諸虛自汗　鬱金研末卧時密調塗於兩乳上

又方　何首烏末津調封臍中

○二便門

一便不通

烏桕舊根煎湯服其功神效兼能下水腫不可多服

一方　用桕葉搗貼臍上卽通

二便脹閉　葱白三升搗帕包熨小腹上氣透卽通

生蜜一大杯滾湯一碗調玄明粉三錢服之卽通快不損脾

胃此方統治一切秘結

大便閉　皂莢研末將蜜煉滴水成珠時入皂莢末丸如棗大塞肛門內即通

又濡腸湯　治老年血虛大便秘結

熟地八錢　歸身四錢酒拌　肉蓯蓉酒浸洗去鱗甲四錢　水煎服數劑效

腸風下血　烏梅數個炭火煆存性為末用生烏梅煎湯下二三錢立愈有下血症宜常用之加梔子炒黑三錢同服更妙

一方　槐花炒黑四兩為末生羊血和勻作餅每個重三錢晒乾遇有下血吐血痢血等病磨滾水服一丸甚效

小便澁痛　牛膝濃煎酒冲服

石淋痛甚　白扁豆根數寸煎水服即愈

小便血　苧麻根煎湯大效亦治諸淋

又方　木耳一兩炒黑芝蔴五錢水煎作茶飲

赤濁　益母草子莖葉取汁一盞空心服妙

白濁　生白果仁十枚擂水飲日一服取效止

冬瓜仁炒為末米飲下五錢亦治白帶按冬瓜仁久服悅顏色益氣血補肝明目治五勞七傷

韮菜子一兩炒為末空心酒調服一錢三分兼治夢遺

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

藕節不拘多少蜜拌飯上蒸熟連服三四次愈

車前草四兩搗爛生白酒攪汁入鹽少許空心熱服一二次愈小便疼者更佳

遺精　白朮六兩苦參　牡礪各三兩共爲末猪肚一具水煮爛搗丸桐子大每服四十丸日進三服酒下

蓮子心二錢硃砂一分共爲末空心服愈

白濁玉蘂痛方

韮菜子五錢車前子三錢白酒煎露一宿空心熱服

○消渴門

濁燥方　治久病血枯

白蜜奶酥油各一斤鎔化一處每日不拘時服數次

治消渴方

用纖絲湯飲之如無即以原藥殼煎湯亦可渴則飲之大效

崔氏八味丸　治消渴第一良方

熟地黃八兩　白茯苓三兩　丹皮三兩　山藥四兩炒　澤瀉三兩炒

山萸四兩　製附子一兩　肉桂一兩

煉蜜丸桐子大每服二錢漸加至三錢以上集驗方

○陽痿門

治男子陽痿囊濕女人陰痒　用蛇床子煎湯洗之愈

治囊濕搔痒方　蘆甘石蛤粉等分為末撲之　俱集驗方

○口舌門

治口瘡

生黃栢蜜炒研末塗之甚好

又方　用兒茶口中嚼化即愈　集驗良方

治舌腫神方　此疾卒然舌大腫硬咽喉閉塞即時氣絶至危之症

皂礬不拘多少以新瓦火煆變紅色放地上候冷研細將病人撬開牙齒以藥摻其舌即愈

又舌上生瘡方　生黃栢八分　生黃連五分　兒茶一分　研末揩之

治舌出血　用槐花末敷之即止　俱集驗良方

○牙齒門

治走馬牙疳　馬鳴散兼治小兒疳後餘毒走馬牙疳黑爛流血漏頰穿喉落牙損命之症百發百中

人中白五錢　蚕退紙二錢半　五倍子生用一錢炙一錢用砂白礬同炒枯用為末擦患處

擦牙固齒經驗方

猪牙皂　五味子　白茯苓　北細辛　等分共為末每早

晚擦之

治虫牙方

五倍子一個鑽一小孔塡鹽滿火煆研末擦數次永不發

治牙疼方

烏梅一個生甘草七分冰片五厘研搗爲丸含口中涎出即愈

○耳門

治大人小兒耳內流膿腫痛一切火症

番木鱉一個磨水滴耳內即愈

又治耳出膿方 蛇退不拘多少新瓦焙黑存性研細末先將小竹條絞綿絮撚淨膿水吹入蛇末少許二三次愈

耳閉作痛方 田螺去蓋入麝香五厘自化成水滴入耳即愈

○鼻門

治鼻淵 用老刀豆文火焙乾爲末酒服三錢重者不過三服即愈

又方 陳香圓木香扁栢砂仁川芎各一錢水煎服

治鼻赤方 用硫黃取豆腐水煮三次淨二錢輕粉一錢蜜陀僧一錢白芷一錢白礬五分共爲細末以津唾揸之晚揸日洗去

治鼻中息肉 用藕節有毛處一節燒灰存性爲末吹患處立效

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

治鼻中流黃水不止　用絲瓜近根三五寸燒灰存性酒調服
以上集驗良方

治鼻塞不知香臭
皂角　辛夷　石菖蒲　等分為末綿裹塞鼻中

治中年兩目昏花視物如雨皆由腎虛不
明目益腎還睛丸　治足少年酒色過傷病目者用此最效
○眼目門
當歸四兩　麥冬二兩　白芍二兩　生地二兩
酒洗　醋炒　酒炒
山藥二兩　川杜仲二兩　川牛膝二兩　百部二兩　知母四兩　鹽
炒　酒炒　酒炒　水炒

陳皮二兩　川黃柏二兩　鹽水炒　甘菊花二兩　黃芪一兩
蜜丸桐子大早晚白湯服二錢　酒炒

雀目日落不見
石決明二兩　夜明砂二兩　豬肝一兩　白羯羊肝一兩
將肝二片中間盛藥麻紮定淘米泔水一碗砂罐煮少半
卧時一並食之

治眼痛神效方　龍膽草一味　用瓦器熬成膏點久眼內瞽目
俱能點去雲翳不可以平淡而忽之也　林開宗傳

飛絲入目方　不拘三五日　泪腫如桃者俱可治

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

細刮指甲末　唾津和點其絲即出

又一切物入眼中　用燈心點指甲末於上即出　又頭坭點入亦出

一子丹　仙翁治赤眼翳膜等症

大訶子一枚以蜜磨點目中

報恩丸　一官治罪囚出活之後囚因病死矣官患目疾爲內障所苦喪明年餘適夜半獨坐嘆息聞堦下悉窣之聲官問爲誰荅曰是昔蒙活困今來報恩乃告一方

川黃連一兩　白羊肝一具去筋膜忌鐵器

以連末和肝於沙盆內研令極細爲丸如梧子大每服以滚水下三十丸連作五劑言訖不見於是修服數日復明矣凡目疾皆可治忌猪肉冷水雄鷄

洗眼不昏花聰明神效方

白礬五分　細牙茶七分　大黃豆七粒　共研粗末用滚水一茶杯入飯碗內泡出汁飯上蒸過亦好不時勤洗效驗如神

洗眼仙方　不論雲翳昏花風火時眼一切目疾弁瞽目久洗復明如初　皮硝六錢　桑白皮二兩生用　白水煎熟每月止洗一日須洗數十次洗列後　正月初五　二月初二

Do NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三月初三　四月初九　五月初五　六月初四
七月初三　八月初十　九月十二　十月十二
十一月初四　十二月初四
凡閏月總照本之日洗　以上吉日乃光明之期也效驗如神

邪祟門

○秦承祖炙鬼法　治一切驚狂譫妄踰垣上屋罵詈不避親疎等證以病人兩大拇指用細麻繩縛定以艾炷於縫中即際兩角上下共四處着火艾本兩炷以在兩縫中則爲四處火着也名鬼哭穴炙二壯神驗　李子豫方

卒用邪魔　雄黃飛過少許吹鼻　集驗方

鬼擊身青腫　金銀花一兩水煎飲之　李樓怪病奇方

夜魅鬼魘　雄黃帶頭上及繫左腋下終身不魘　張文仲方

又方　以犀角爲枕　本草綱目

又方　卧時以鞋一仰一覆則無魘及惡夢　起居雜記

○怪症門

血餘症　十指皆斷壞惟有筋連每節內虫出如燈心長數寸遍身綠毛用胡黃連白茯苓赤茯苓等分每服三錢水煎服卽愈

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又餘血症　口生肉毬有根如線吐出乃能飲食捻之痛入心

用麝香水研服三日根化卽愈

臍虫　腹中如鐵石臍內出水旋變作虫行繞身體甚癢難忍

技掇不盡用蒼朮爲末入麝香少許水調服又將蒼朮煮

濃湯浴之

離魂症　卧時覺身外有一身一樣無別但不言語名曰離魂

蓋卧則魂歸於肝肝虛邪襲魂不歸舍也用人參一錢龍

腦卽薄荷二錢赤茯苓一錢水煎濾淸調飛過硃砂一錢睡

時溫服每夜一服三日後魂歸氣爽

渾身虱陣　臨睡渾身虱出約四五升隨致血肉俱壞每宿漸

多痒極難言惟飲水卧床晝夜號哭舌尖出血不止身齒

俱黑唇動鼻開用鹽醋湯飲之十日卽愈

脉溢　毛竅出血不止皮脹如皷須臾口鼻耳目被氣脹合用

薑汁飲之自安

眉毛動搖　目不能交瞚喚之不應但能飲食用大蒜搗汁酒

調飲愈

傷寒狂走　鷄子殼出過小鷄者煎湯服卽醒

夜多惡夢　好硃砂大塊者帶在頭上便解

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

治男女爲精怪所迷　以桐油塗男女之陽陰數次自絕

病后失精　凡男子病後傷於交接卵腫或縮入肚內絞痛欲死者即取本婦陰毛燒灰爲末服仍取洗陰水飲之遲則悞矣

意痛毛　男女大脚指縫中生毛拂着痛不可忍用桐油煎滚乘熱滴入一點于患處毛即脫忍痛少頃無恙

鼻繩　一人鼻中出毛晝夜長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去更生此因食猪羊血過多而然也用硼砂乳香等分飯爲丸水下十粒早晚各一服病去乃止

炙瘡飛肉　一人因艾灸訖火痂便落瘡內鮮血片片如蝴蝶樣騰空飛去痛不可忍此是血肉俱熱之故用大黃芒砂等分爲末水調下微痢即愈

發斑髮硬　一人眼赤鼻漲大喘渾身出斑髮如銅鐵絲硬乃熱毒結於下焦也用白礬滑石各一兩水三碗煎一碗半不住口飲數服乃愈

血擁　一人遍身肉出如錐痒痛不能飲食名曰血擁用赤皮葱燒灰水淋汁洗內服淡豆豉湯數盞而愈

垂睛　一人眼珠垂下至鼻大便血出名肝脹用羌活水煎服數次即愈

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

血潰　一人眼內白黃俱黑見物依舊毛髮直如鐵條不語如醉名曰血潰延醫治之百藥不效後遇一道人云此症可治因拜求之遂令用五靈脂酒調下二錢而愈

傷寒併熱霍亂　一人氣喘不能言語口中流涎吐逆齒皆搖動氣出轉大即悶絕名傷寒併熱霍亂用大黃人參各五錢水二盞煎一盞服

肉刺　一人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜自愈

蛇光熱　一人頭面發熱有光色他人手近如火炙用蒜汁半兩酒調下吐物如蛇遂安

多腸　一人小便出屎大便出尿名交腸用舊幔頭燒灰酒下五分愈

腎漏　一人陽舉不痿精流不歇痛如針刺為腎漏病用韮菜子破故紙各一兩為末每服三錢水煎日三服即止

肉腫如蛇　一人身及頭面肉腫如蛇狀用濕磚上青苔一錢水調塗立消

小兒流水　一小兒生如魚泡又如水晶碎則流水用蜜佗僧研極細末摻之

兒生無皮　一小兒初生遍身無皮俱是赤血肉掘土坑卧一

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

宿長皮或用白早米粉乾撲于身上候生皮乃止

厚皮　一人大指忽麻木皮厚如裹鍋已遇一道人教以苦參
用酒煎吃外敷苦參末而愈後本人見一女子遍身患皮
厚仝上卽服苦參酒外敷苦參數斤愈

喉內腫臭　一人喉間生肉層層相疊漸腫起有竅出臭氣用
臭橘皮葉煎服愈

人面瘡　苦人患人面瘡於臂上滴酒瘡口卽面赤與物食之
卽肉脹獨臭貝母則斂眉閉口若苦楚狀乃煎貝母以葦
筒灌之數日而愈

蒜之蛆出盡絶根　一小兒瘡爛生蛆以柳條帶葉鋪地將兒卧其上
蛆盡出而愈

腦風　一人患頭風症耳內常鳴頭上有啾啾鳥雀聲此頭腦
夾風也用芎歸湯而愈

舌出　一人傷寒舌出寸餘連日不收用楊花腦抹舌上應手
而收重者五錢方愈

木舌脹滿　一婦人木舌脹滿口諸藥不效以排針砭之五七
度腫減三日方平血出盈斗

身發痒　一人田間收稻忽然遍身痒入骨髓用食鹽九錢湯泡三碗每進一碗探而吐之三探三吐卽愈

小兒身痒　一小兒遍身痒以生薑搗爛布擦之而止

盤腸產　一盤腸產者臨產子腸先出而後產子產後而腸不收用酷半盞冷水七分調勻噴婦面三噴三收其腸收盡此良方也

舌脹滿口　用蒲黃乾薑等分爲末乾擦卽愈

舌腫不能言　用蔴子四十粒紙上取油將油紙燃燒烟薰舌卽消舌出血用藁鼻中自止

黑丹方　人面忽生黑丹如芥子狀不治患將遍身卽死鹿角燒灰存性猪油調敷愈

產後舌出　一婦人產後舌出不能收以硃砂傅其舌令作產兒之狀用人扶住壁外潛將瓦器崩隨婦聞响聲而驚舌卽收

眼中出血　一婦女眼中血出如射或沿鼻流下月經不行乃陰虛相火之症用當歸生地各酒炒白芍酒炒黃連黃柏知母條芩各炒側栢葉木通柴胡紅花桃仁去皮尖各一錢水二鍾煎一鍾食前服

產婦腹中痒　一產婦腹中痒用箭幹及鏃安所卧床蓆下勿

令婦人知而愈

飛絲纏　一人患飛絲纏陰腫痛欲絕用葳靈仙搗汁浸洗而愈

一婦人月經流出皆作禽獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶將沒藥一兩白滾湯調下即愈

一女年十四腕中軟處生物如黃大豆半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效用水銀四兩白紙二張揉熟蘸水銀擦之三日自落愈

○雜方門

不餓丸　芝蔴三升　紅棗三斤　糯米三升

焙燥磨末蜜丸彈子大每服一丸湯水任下或遇荒年或經遠出皆足備急一時自濟濟人其功不小

治牛猪病方

大黃　黃芩　黃栢　枝子　連喬　柴胡　蒼朮各三錢

用水三大碗煎至一大碗灌之自愈

治猪瘟方　大黃五錢　朴硝五錢

共泡湯一罐傾出候溫竹筒灌下瀉出毒即愈

又方　貫衆三兩　猪牙皂一二兩　水四五碗煎二三十沸外入朴硝末三兩煮如前法候溫灌下亦效

Last Asian Library Do NOT COPY Gest Collection Princeton University Library

又方　以蘿蔔葉切碎飼之　又割去其尾尖出血即愈

○婦女門 調經

骨蒸調經方

當歸一錢　白芍　地骨皮各八分　黃芩酒炒　甘草各四分　白朮

橘紅　白茯苓各七分　枳殼五分　半夏酒製三分　澤蘭葉二錢

水二碗紅棗二枚煎服

月水久閉　用蚕砂四兩炒半黃色入無灰酒一壺於砂鍋內

沸過取起以磁器盛之去蚕砂溫飲數盞即通

經閉不行至一年者臍腹痛腰腿沉重寒熱往來　用白芥子

二兩為末每服二錢熱酒食前服

治月經久閉血從口鼻出者　先以好京墨磨水一盞服之其

血立止次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分服

經血逆行吐血　用韮菜搗汁一盞入童便半盞頓熱服即止

血崩不止不拘冷熱　蓮蓬殼荊芥穗燒存性各半多為末每

服二錢米飲送下

又方　老絲瓜燒灰棕毛燒灰即結几棕毛等分用酒或鹽湯下

白帶不止　槐花炒牡礪煅等分為末每酒服三錢取效

崩漏不止赤白帶下　烏梅燒灰存性研末滾湯調服止後將

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

蓮子燒灰存性香附炒爲末和勻每服二錢淡醋湯調下
即男子小便尿血此方亦效

赤白帶下年深諸藥不能療者　貫仲一個全用只揉去毛及
花蕚以好醋蘸濕慢火炙熟爲末空心米飲下每服二錢
甚效

小便不通　鯽魚一尾搗爛用少許搽臍內即解

治血崩不止　陳棕棉花子二味燒灰存性黃酒送下即止

治血淋　白鷄冠花燒灰存性米飲調下

治婦人白帶　用烏豬莧搗汁三大合和鷄子青二枚微溫頓
飲之不過再服即愈

治婦人經血不止　用白芍炒香附炒熟艾葉各一錢五分水
煎服

行經腹痛方　兼能種子
眞蘄艾　紅花　當歸　益母草各三錢　酒煎另用鷄蛋一個
刺數孔入藥礶內同煮熟即以藥汁同鷄蛋吃下不過三
個痛止即受胎

血崩不止方　棉花子燒存性酒下三錢立止

○婦女種子

DO NOT COPY
Ease Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治婦人子宮受冷久不生育及臍腹疼痛效方

蘄艾三錢　蘇葉三錢　黃酒煎服每日一次服數劑即效

加味地黃丸　治婦人經水不調不能受孕即受之亦不全美宜常服此方

熟地四兩　棗皮　山藥各二兩　丹皮　白茯苓各一兩五錢　澤瀉一兩　香附童便浸三次一兩　右為末煉蜜丸梧子大每服三錢白湯下

○婦女保胎附小產

治孕婦腹痛　砂仁二兩　條芩酒炒一兩五錢　白朮土炒一兩

共為細末每服三錢紫蘇湯調服

治孕婦咳嗽方　川貝母去心麩炒黃去麩為末砂糖為丸茨實大口中含化一丸極效

治小產方　用絲綿一兩入磁罐內封口燒灰存性熱酒空心冲服須於月內服完永不再墮

治孕婦痢疾秘傳妙方　荷葉蒂七個燒灰存性研末酒下

胎死腹中　死胎只宜佛手散服之自下或不下再用平胃散一服加朴硝二三錢能令化下極易耳古人立法各有精義且經屢驗不吾欺也勿用奇方怪藥以傷母命方見下

死胎下血其疼痛搶心者用葱白煮濃汁飲之未死即安已死

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

即出兩服見效增方

或問胞衣不下何故曰總是臨盆草之故當產之時骨節開張壯者數日而合怯者彌月方合今不待其開而强出之故胎出而骨眼隨閉以致胞出不及耳

胞衣不下令產婦自己頭髮塞口中打一惡心即下矣

一方用灶脚下泥敷臍眼內將甘草一味煎湯服之即下

又方　用蕓蒜子四十九粒或與產婦年紀同去殼研塗兩脚心衣胞即下立時洗去若忘却洗則腸出可速將蕓蒜子洗去急貼頂心縮回其腸俟腸入仍洗之平穩神效增方

大全方曰婦人懷孕七八個月生者有一年二年及四年而後生者不可不知

當歸散　婦人懷孕宜常服之臨盆易產且無諸疾

當歸　川芎　白芍　黃芩各半斤　白朮四兩　爲末溫酒調服

安胎飲

黃芪蜜炒　杜仲薑汁炒　茯苓　阿膠珠各一錢　續斷八分　黃芩一錢五分　白朮生用五分　甘草三分　糯米百粒　陳酒杯水二杯煎服

如腹痛用急火煎服　胸中脹滿加紫蘇陳皮各八分　下紅加艾葉地榆各一錢阿膠倍加

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

安胎銀苧酒　治孕婦胎動欲墮腹痛不可忍及胎漏下血

苧根二兩如無苧之處用茅草根五兩　紋銀五兩　陳酒一碗水一碗煎一碗熱服

黑料豆三合炒焦熟　白酒一大碗煎至七分空心服

紫酒治孕娠腰痛如折　屢試神效保產無憂方　此方家傳專治一切產症有胎即能安胎臨產即能催生懷孕者不拘月數偶傷胎氣腰酸腹痛一服即安再服全愈孕滿足臨盆十分艱危者一服即下甚而橫生逆養六七日不下與嬰兒死於腹中命在頃刻者一服即下再懷孕者於七個月服起七月服一劑八月服二劑九月服三劑十月亦服二劑臨產服一劑斷無難產之患其效如神

紫厚樸七分薑汁炒　當歸一錢五分酒炒　川芎五分　枳殼六分　荊芥穗八分　川貝母一錢去心淨爲末將藥煎好投入服　丹皮一錢　斷艾七分醋炒　生黃芪八分　甘草五分　兎絲子一錢揀淨酒泡　白芍一錢二分酒炒冬月只用一錢

生薑三片水二大鍾煎八分預服者空心服如臨產及胎動不安並勢欲小產者皆臨時熟服如人虛極加入參五分

鯉魚湯　孕婦五六個月腹大異常高過心胸者乃胎中蓄水

如不治子母難保此方主之

當歸酒洗一錢五分　白芍一錢五分　白茯苓二錢　白朮炒二錢五分　陳皮三分

用鯉魚一尾重半觔之上去鯉魚腸白煮熟去魚留汁二盞加薑三片同藥慢火煎至一盞空心服如未愈再服

胎衝上心危急方　白朮五錢　條芩二錢　白芍四錢　枳殼一錢

水煎服如人壯健單用枳殼五錢煎服亦可

止啼湯　治姙娠兒在腹中啼

黃連二錢　甘草一錢　水煎服立愈

阿膠丸　治姙婦大便閉　枳殼麪炒　阿膠炒　等分為末蜜丸

梧子大六一散為衣清湯下二十丸未通可加至五十丸

胎前產後下痢方　用敗龜甲以米醋炙為末調服自愈

○婦女臨產

臨產　六字真言　一曰睡　二曰忍痛　三曰漫臨盆

初覺腹痛先自家拿穩主意要曉得此是人生必要之理極容易之事如瓜熟蒂落水到渠開哺鷄日足自能啄殼而出固毋庸勉強更不用驚慌但看疼一陣不了又痛一陣一連疼五七陣漸痛漸緊此時要生乃可與人說知以便伺候若痛得漫則是試疼只管安睡穩食不可亂動試痛

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

正生何以分別只看痛法一陣緊一陣者正生也一陣漫一陣或乍緊乍漫者皆試痛也此處極要着意留心乃是第一關頭不可忽畧若以試痛認作正生胡亂臨盆則錯到底矣

前太僕卿霍山張公三君葆華繼夫人年輕體壯孕必八個月而產產必數日苦而後下屢生俱妖迫後又孕八個月坐草二日不下飛輿請元基黃公診之脉未離經人餘殘喘穩婆在傍問之曰兒頭已抵產門不得出耳子急令安臥且戒勿擾與安胎飲明晨主人出問之曰好了子曰昨言兒頭已抵產門今若何曰不見了大笑而別後此百二十日計十二足月生男謂元基公為父始知前皆尚未及正生之萌錯候臨盆勉強生出以致皆妖母命以體壯年輕得幸存耳安胎飲方見前

程邑庠寵人坐草二日而不生亦與安胎飲越十六日生女太學戴時濟與黃公璘好先是戴弟媳一產三男母子俱隕一猶在腹今又婢孕其腹膨脖頗患之比產時先令安臥與加味芎歸湯每隔半日而產積日半三子俱生

黃公同里之陳氏妻生產九日夜不下一息尚存踵門求藥

黃公問之亦曰頭逼產門不得出諭令安臥再來取藥强而後去繼與加味芎歸湯明日生下母子兩全　按此皆產母用力逼令橫在腹中耳豈有人倒懸十日而尚得生者乎

昔一婦產兒手出不得入穩婆礪刃以須黃公見而惻然急令安臥與大劑芎歸湯徐徐托之手入明早生下母子皆安右臂紫黑數月而後消

薛院使云欲產之時覺腹內轉動即當正身仰睡待兒轉身向下時時作痛試捏產母手中指節或本節跳動方與臨盆即產矣

大旨云大凡生產自有時候未見時候切不可强服催生藥又云切不可坐草及令穩婆亂動手

加味芎歸湯　百試百驗萬叫萬靈真神方也

當歸一兩　川芎七錢　龜板手大一片醋炙研末　婦人頭髮如鷄蛋大瓦上焙存性

水二碗煎一碗服如人行五里即生死胎亦下

薛云交不開者陰氣虛也用此方如神

佛手散　治六七個月後因事跌磕傷胎或子死腹中疼痛不已口噤昏悶或心腹飽滿血上衝心者服之生胎即安死

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胎即下又治橫生倒產及產後腹痛發熱頭疼逐敗血生新血能除諸疾

當歸一兩　川芎七錢　水七分酒三分同煎七分如橫生倒產子死腹中者加黑馬料豆一合炒焦熟乘熱淬入水中加童便一半煎服少刻再服

平胃散蒼术才泔炒　厚樸薑汁炒　陳皮去白各一錢　甘草炒一錢三錢　水煎溫服如下死胎可加樸硝二三錢

濟生湯　治難產如神俟腰痛即服易產即三四日不生服此自然轉動生下此方催生第一穩效

枳殼麩炒　香附襲炒　大腹皮薑汁洗炒　各一錢　炙草七分　當歸二錢半　川芎二錢　蘇葉八分　水煎空心服

又方　於潔淨空室內紙書本府或本州本縣官姓名燈上燒灰水調服下即產神奇之極屢試屢驗

治胎死腹中方　芒硝二錢用童便溫調服立下有一猫孕五子一子已生四子死腹中用此湯灌下即下矣又治一牛亦下此方功效甚奇不可忽視

治死胎不下　皮硝二錢壯者三錢寒月加熟附子五分酒半盞童便一盞煎二三沸湯服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

治胎衣不下方多見上保胎論內　又方用牛膝三兩葵子五
另有列在產後欵內
錢水煎服

治子死腹中不出　黃牛屎炒熱醋調敷母臍即出

○婦女產後

治產後二三日瘀血積於子腹小腹一塊疼痛俗名兒枕痛
南山查肉二兩水煎一鍾加砂糖五錢好酒二小杯食前
服催下敗血即安

治產後惡露不行心痛腹痛
眞蒲黃一錢　五靈脂一錢五　煎膏醋調服

華陀愈風散　治婦人產後中風口噤手足拘掣及角弓反張
或產後血暈不省人事四肢強直或心頭倒築吐瀉欲死
荊芥穗除根不用　每服二錢童便調服口噤則挑牙灌之齒
焙乾研末　噤則不研末只將荊芥以童便煎放微温灌入鼻中其效
如神用黑豆酒更妙

回生保命黑龍丹　此方治產後淤血沁入心脾問命在垂危
百藥不救者神效　五靈脂二兩　全當歸二兩　大生地
二兩　川芎二兩　良薑二兩　以上五味入砂礶內紙筋鹽泥
封固煆紅冷取研細再入後藥

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

百草霜二錢　乳香二錢　生硫黃二錢　眞血珀二錢　花蕊石二錢

右五味同前藥和勻米醋煮麪糊丸如彈子大每服一丸炭火煆丸通紅用生薑汁浸碎以陳酒童便調服不過二服神效

失笑散　此治產後惡露不行腹痛腰痛或血迷心竅不省人事牙關緊閉及尋常腹內瘀血月水不調痛欲死者服之立效

五靈脂水淘去沙醋煮　眞蒲黃炒各等分　水一碗煎至七分冲陳酒三分熱服痛甚者加川芎肉桂玄胡索各二錢煎服

一方爲細末每服三錢熱酒冲服

通利大小便方　此治產後五七日大便結塞切不宜妄服藥餌　大麥芽微炒研末　每服三錢滾湯調下與粥間服

又胞衣不下　用蟬蛻瓦上焙乾爲末清湯下一刻即落神效

又方　小貝母七個去心煎服立下

血暈方　此物須預備　韮菜一把寸斷入酒壺以滾醋泡之空大口觸鼻即醒如昏迷打呵用人參一錢虛則多用韮菜根煎入醋半小杯服之立止

子腸不收方　枳殼三錢　煎服即收

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
PO Box 1000 Copy

血塊痛方　伏龍肝三錢研極細黃酒調下立愈

○婦人産後傷寒多有要緊危急難治症候因未得簡易良方故無附錄間有遇此惡症祈留心延醫求方調理庶可保安耳

○婦女雜症

乳汁不通　麥芽二三兩炒研煎湯常服并可治癰

乳結腫痛寒熱交作惡心嘔吐

慈白切碎炒熱搗爛敷乳上以帛包之冷則易自愈

結核腫痛難忍者　廣陳皮浸去白晒燥乾麵炒微黃共研末入麝香少許再研每服二錢熱酒調下搽之即散

治乳結硬疼　鯽魚一頭燒灰酒服一二錢汗出即瘥

乳癰初起　芙蓉根切片以無灰酒煎服盡量飲即內消

又方　京墨猪膽玄參三樣和勻搽上立效

熨法膏治吹乳乳癰

火葢慈上一時蒸熟出汗立愈

吹乳癰腫痛不可忍吹乳者乃産後孩子吃奶含乳睡著爲孩子口氣所吹遂令乳汁不通蓄積腫硬因而成癰　生山藥搗爛敷上即消消即去之遲則肉腐矣

鷄爪風　婦人月家得此不時發手足拘攣拳束如鷄爪頗疼

Fast Asian Library DO NOT COPY Digitized by the Internet Archive Princeton University

痛急於左右膝骨兩旁各有一小窩共四穴俗謂鬼眼各灸三壯立愈

婦人顛疾歌唱不時踰墻上屋乃營血迷心

當歸一錢　白芍炒一錢　白朮去蘆八分　茯苓八分　柴胡五分　生地一錢二分　遠志去心一錢　桃仁六個去皮尖　蘇木八分　紅花八分　甘草三分　半夏八分　黃連一錢　辰砂五分研末入藥

共一劑加薑一片水二鍾煎一鍾服

治乾血勞奇方過三年不治

用白鴿子一隻去肝腸淨入血竭一年者一兩二年者二兩三年者三兩以針線縫住用無灰酒煮數沸令病人吃之瘀血即行如心中慌亂者食白煮肉一塊即止

治婦人小便不通　用杏仁七粒去皮尖麵炒黃研細水調服立通

下乳簡便方　紅砂糖煎豆腐不用油鹽以黃酒共食之

治乳頭腫硬　鹿角尖燒灰存性研末酒調服外用葱白搗爛敷之

治乳巖　此病先因乳中一粒大如豆漸漸大如鷄蛋七八年後方破破則難治矣宜急服此藥　生蟹殼砂鍋內焙焦爲末每服二錢酒調下日日服之不可間斷

治乳巖已破

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

當歸　川芎　白芍酒炒　白朮土炒　白茯苓　陳皮　製半夏　砂仁炒　香附炒　厚樸薑汁炒各一錢　甘草三分　生薑煎服

治乳癰良方　兼治各種大毒

大當歸八錢二分　生黃耆五錢　金銀花五錢　炙甘草一錢八分　桔梗一錢五分　黃酒二碗煎八分半饑半飽服

通乳方　治產後乳汁不通

木通二個　猪前蹄一個　煮爛并汁食之即通

產後無乳方　凡乳母不宜吃猪肝

黑芝蔴炒焦爲末二錢熱酒冲服　或用猪蹄湯冲服更妙

止乳方　婦人子壞而乳不收恐生乳病者用之

麥芽一兩水煎溫服乳即收止

正心化妬丸　治婦人妬妾誤夫無子　天冬去心　益智仁各二兩　赤黍米去殼微炒　苡仁炒各四兩　百合　茯神各一兩

蜜丸梧子大每食遠白湯服九十丸婦人常服有子則不妬

○小兒門

一小兒初生急用軟絹或絲綿包指摳出口中惡血煎甘草黃連湯灌之待吐出惡沫方喂乳日後出痘稀少

一包裹小兒宜用七八十歲老人舊裙褲改作小兒衣衫雖

Last Asian Library Princeton University Library
DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection

富貴之家切不可新製綾羅等類服之不惟却病抑且惜福即三朝滿月受賀宴賓若姿意宰殺更非所宜

生下即悶　須看兒上腭有泡急用銀針挑破將軟紬包指拭去惡血即活切不可使兒吞血下喉

生下週身無皮　可速取白米粉乾撲兒身俟生皮乃止

又方　用陳壁土研細末擦之即生皮

初生遍體如魚脬又如水晶破則水流旁又生者以蜜陀僧研擦之內服蘇合丸

頭門腫陷　腫用黃柏末水調塗兩足心即消　陷用生半夏末水調塗兩足心即起

去胎毒法　小兒初離母腹口有穢毒啼聲未出急用軟絲綿裹指拭出口中惡汁用甘草浸汁飛過硃砂少許加煉蜜二茶匙調和成膏如小豆大乳汁化服三日內止服三粒以除胎毒之患

治小兒一切胎毒并解諸毒　金銀花晒乾研細　白洋糖二兩　末四兩

二味拌勻磁瓶收貯不拘時任小兒調服

初生便閉　兒初生二便不通以致腹脹欲絕急令老成人漱淨口吸咂兒前後心背兩手心兩足心臍下共七處凡三

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

五次以紅赤爲度須臾自通

又方　甘草　枳壳各一錢　水煎服卽通

初生小兒面赤眼閉不開二便不通不能進乳總由胎中熱毒所致急以糞清灌之陳久者佳

小便不通　用木通茄兒蒂煎服立通

又方治尿血　甘草一錢　升麻三分　煎湯調六一散服卽愈

小兒遺尿　大甘草頭一味煎湯夜夜服之

如一歲小兒尿血者用　大甘草秤足一兩二錢

水六碗煎至二碗一日服盡卽愈

小兒脫肛　猪脂二兩煉去渣入蒲黃末一兩絞成膏塗肛上卽縮八

陰囊腫痛　小兒陰囊忽腫如琉璃啼哭疼痛用

蟬退一兩　煎湯一碗洗腫處再用紫蘇葉搗成泥包之卽愈

陰莖腫痛方　小兒陽物頭馬口忽腫出小便時腫痛甚者只用燈草煎湯不拘時服之腫消痛止小便且清

又方　川連　木通各一錢　水煎服莖腫立消

偏墜方　腎子一大一小是也

香茹　厚樸薑汁炒　枳壳麩炒　木通　扁豆　生薑　車前葉各等分　水煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
PO NOT COPY

預防小兒臍風馬牙簡驗神方

枯礬二錢　硼砂五分　硃砂二分　冰片　麝香各五厘

共爲細末凡小兒下地洗過即用此末摻臍眼上每換尿布仍摻上摻完一料此兒永無臍風等症

臍風撮口方　乃初生七日內病也臍內受風以致面赤喘急啼聲不出且下身必發青筋一道須臾行至肚邦生兩筋稍遲則行至胸矣急用

獨蒜切片安放臍上灸二三壯再看青筋起處速灸三壯或行至兩筋盡處各灸三壯青筋自消或以燈火灸之亦可內服萬億丸二三粒方見以泄胎毒筋行至心則不能救後

又方　紫蘇　前胡　殭蠶各五錢炒

水煎去渣溫用綿花蘸藥滴口中頻頻滴之以口開爲度開後切勿即令吮乳益此症亦由吃乳太多所致非但臍風也故小兒月內吃乳倍兒不宜

臍腫出汁　枯礬末敷或黃柏末敷或枯礬與冰龍骨研末和勻敷皆效水龍骨即船板縫乾油灰陳年朽爛者佳

兒臍出血　小兒初生未滿月多啼叫致臍中血出用白石脂研末敷之愈如未愈微炒過放冷再敷仍不得剝掉

兒臍久不乾　當歸焙乾頻敷臍中愈

又方　棉子燒灰摻上即愈

馬牙　初生小兒唇內牙齦生白點名馬牙不能食乳此由胎熱所致與鵝口不同稍緩即不能救急用

針縛筋上將白點挑破出血擠出如半米樣隨用青絹絞出涎以好京墨磨薄荷湯遍塗滿口勿令食乳待睡片時醒方與乳無不立效若爲兒護痛多致妖傷

又屢驗簡易方　用針挑破白點出血擠出抹去血涎以糖塗之即效或用京墨塗亦良

小兒走馬牙疳方用　女人溺桶中白以火煆過研末一錢銅碌三分麝香一分共爲末揸患處即愈

又方　黃連一兩硼砂胆礬各一錢冰片五厘共爲細末摻之

小兒口舌生瘡乳食湯藥不能咽下者方用

生明礬　吊吊灰即灰塵吊　各等分爲末以鷄蛋清調成餅敷兩脚心布包過夜即愈

又方　人中白炒爲末拭口內即愈

小兒鵝口滿口白爛

枯礬一錢　硃砂二分　爲末以少許摻之日三次神效

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

又口瘡舌瘡　桑皮中白汁摻之立愈　又方生黃栢末塗之

又口疳腐爛方　薄荷六錢　黃柏五錢　青黛水飛四分　白硼砂三分

冰片一分　硃砂水飛二分　共研細末瓦礶收貯每用少許摻

之數日愈

小兒舌膜　初生小兒有白膜皮裹舌或遍舌根急用指甲入

兒口內刮破舌膜令血出即以枯礬末少許摻之若不看

治兒後必啞

又重齶重齦重舌　口上齶皮腫如囊盛水名重齶　牙床腫

起名重齦　二症先以大針刺患處出惡血用生蒲黃末摻之

重舌乃舌下生舌亦先用大針刺舌下紫脉血出摻蒲黃末

即愈　如舌腫滿口亦用蒲黃末摻之更妙

又治重舌　又名雀舌用巴豆半粒飯粘四五粒同搗餅如黃

豆大貼眉心中間待四圍起小泡去之即愈

治木舌　舌下生薄膜如石榴子中間隔皮之狀有連舌尖絆

住不能吮乳正在舌下總筋之上治法用針橫刺膜中直

勒至舌尖上斷此膜舌即能伸須看仔細下針勿穿在總

筋之內刺後血出用蒲黃末塗之或京墨亦可

安神散　治小兒內熱心燥夜啼

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蟬退四十九個止用茯神二錢共爲細末分作四服用鈎藤前後半截去足湯調藥不拘時服合藥時不可令婦女小兒見之

燈花散　治同前症　燈花七枚　硼砂一分　辰砂一分

右研末蜜調塗兒口中或塗母乳上令兒咂之如無燈花即用燈草燒灰亦可

蟬花散　治夜啼不止狀若鬼祟　蟬退後半截爲末十四枚　薄荷煎湯四分加酒少許調服二三分即止　一方加硃砂二分

又方　五倍子炒研末津唾調塡臍內

又方　鷄糖養塗臍中極佳男雌女雄

小兒不乳及小便不通用

人乳一合　葱白一寸以銀器煎熟分四次灌下立愈

乳隔方　治小兒食乳過多傷食不乳神效

黑豆十九粒　茅草根七節每節長一寸許　赤金　紋銀不拘輕重

用人乳一杯煎五分與兒食之即愈

吐乳方　木香蚯蚓糞爲末米湯調服即安

又吐乳方　白蔻仁七粒　炙甘草　生甘草各一錢

共爲細末頻揉兒口中任咽下即愈

小兒吐瀉燒針丸治吐瀉如神　黃丹水飛硃砂水飛白礬火煅等分

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

右爲末紅棗肉爲丸黃豆大每服三四丸針尖上放燈焰上燒存性研爛涼米泔水調服瀉者食前服吐者不拘時服外用鷄蛋清調和眞菉豆粉作膏吐者塗兩足心瀉者塗顖門神效

水瀉外止方　慈菰搗爛入黃丹爲丸如豆大每用一丸填臍內以膏藥蓋之卽止

又方　白麵炒飯鍋巴爲末白糖調食作餅更妙

又泄瀉方　乾山藥半生半炒爲末每服二錢沙糖水調服

治火瀉方　凡小兒身熱如火口渴喜飲冷而不喜熱湯者是也

車前子二錢　茯苓　白芍各一錢　黃連三分　澤泄五分　猪苓三分　麥芽一錢　枳殼二分　水煎服一劑卽止此治火瀉之聖藥也

治寒瀉方　寒瀉者腹痛而喜手按摩口不乾而舌滑喜熱者是也　人參　白朮各一錢　茯苓二錢　肉桂　乾薑各二分　此方健脾補氣分濕利水

小兒感冒風寒方　柴胡五分　白芍二錢　當歸八分　白朮一錢　祛寒之聖藥自然寒瀉立止　甘草一分　砂仁一粒　神曲五分　茯苓三分　陳皮二分　半夏三分　炙草三分　水煎熱服一劑卽愈不必再劑　一方有桔梗黃芩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

萬全湯　凡小兒感冒發熱無論夜早晚用之無不神效

柴胡五分　白芍一錢　當歸五分　白朮三分　茯苓二分　甘草一分

山查三粒　黃芩三分　蘇葉二分　麥冬一錢　神曲三分

水煎熱服　冬加麻黃一分　夏加石羔三分　春加青蒿三分

秋加桔梗三分　有食加桔壳三分　有痰加白芥子三分　瀉

加猪苓一錢　吐加白蔻一粒　小兒諸症不過如此萬不可

作驚風治　有驚者加人參三分即定驚

治小兒咳嗽方　蘇葉五分　桔梗二錢　甘草一錢

水煎熱服之劑全愈有痰加白芥子

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library