PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

善成堂

痘疹經驗全集

善成堂自在蘇
杭浙閩檢覆古
今書籍寫覆

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

CS3/744
V.1

光緒三十二年冬月鐫

古桃韓文博配坤氏輯

痘疹經驗全集

善成堂板

PHOTOCOPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

昔孔聖答武伯云父母惟其疾之憂凡人子有疾父母未有不憂者至於孩提更甚孩提疾病痘疹更甚真人鬼大關也余少習朱藝時往往閭里中有患痘疹二症致父母晝夜不寧者有老年獲子孀居孩兒竟以是症終遺父母憂者余心惻然者久矣後余肄業信都郡南得痘疹驗方一書不禁欣然曰吾二十年前願庶可如也於

是玩其理詳明確切試其方神妙奇驗真
渡小兒一寶筏也余後輟舉業因專事此
窮致效文宣陸公活人之一術至若携此
射利持此望報不惟鄙衷所痛惡轉恐見
罪於陸公庚子年余又檢視原本篇什破
殘惜無目錄不便按閱因命侄子宗潞表
侄賈可喜編次目錄繕寫數卷以借鄉鄰
救難之一需非敢有私意焉抑凡余所活
小兒吾不敢別望特望其成人時稍體父
母之心於萬一勉成孝子不虛余之所活
乃余所深願云
乾隆四十五年歲次庚子冬十月古桃韓
文博配埠氏謹識

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

自序

余自閱痘疹驗方後診視小兒其症間有書本及言者因將余所經歷援筆誌之非薄前賢而不遵也總以症候難定須謹慎診視庶免愆咎至於鄙衷所得焉敢吝以自私若云冀與前賢媲美並傳不朽則吾豈敢庚子年驗方成本既已抄出編爲上卷侄子宗潞清將余所集編爲下卷余思

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

之再三始許之因歸集一帙以便披閱吾
焉敢云此可紹繼前賢抑思世之同心君
子應諒我云古桃配坤氏又序於忠恕堂

跋

佛經云救人一命勝造浮圖七級救人之
事尚矣然望報者皆出於假不望報者始
出於真 潞 少時即記 叔父診視小兒痘
疹不問貴賤亦不問風雨有求即應至凡
愈者無不銘恩而 叔父轉淡然忘之及
潞 長時見里中曾有無禮於 叔父者小兒
疾甚亦造門來求亦即前救自病初至疾愈

Eric Abrahamson NOT COPY
Arthur Murray and the Gest Collection
Princeton University Library

往返數十次絕無怠意噫非要譽於鄉黨亦非以德報怨誠心救人心切他不暇顧後又見所獲秘書奇才凡有借觀者毫無吝色誠爲救人真心務求博施而後快歟

庚子年命 潞 編次痘疹驗方目錄卷成因請所集編爲下卷 叔父曰吾非好名者比況吾所見豈敢與前賢並集哉請之數次言及以手救人者其澤微末若以書壽世者其德大始允所清波心救人爲名而借此射利者使聞 叔父之志翻然自改亦心救人爲心豈非大幸也哉

乾隆四十五年歲次庚子冬十一月 胞侄

宗潞謹識

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

范文正公爲布衣時揖相士曰吾能爲宰相否以不能對繼問能爲名醫否相士駭然曰先生何前問尊而後問卑也文正公言天下惟宰相名醫可以救人相士喟然曰此卽宰相志也必宰相吾　表叔嫺習痘疹汲汲救人所活小兒甚多已須符文正志更不惜心苦心所得筆諸書以授人將見救於今日者有窮而救於後日者無窮

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

吾　表叔雖無友正公之遇合其心則一云
曾聞之諺云仁人恩澤布於一時者短而
流於萬世者長此之謂歟
乾隆四十五年歲次庚子冬十一月古桃
賈可喜勝任氏謹跋

跋

綺　自束髮受書不克仰承家學滋愧深矣
然憶　高祖早歲淑庠於經史子集靡不
洞曉而尤致意於痘疹一書蓋痘疹爲小
兒大關　高祖既精其奧理復衍爲成書
佛心之稱久已翕然交頌至數傳後　先
君璞公葆守此編恐成蠹簡屢謀付諸梨
棗奈有志未逮當終之頃舉是編以授　綺

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

曰此書分上下卷上卷是汝　高祖所輯
下卷是汝高祖所著卷後又附以雜方先人
手澤汝好珍之　綺　即跪而受曰唯唯敢不
惟命是聽今有坊友題公鄭先生以痘疹
一科所繫最重因堅請謀梓以公於世　綺
即欣然出之且抄且校以爲　高祖保赤
之深心可流傳於百世即　先君子珍重
是編之意亦當少慰九泉下矣謹綴數言
僭置簡端心質世之覽是編者

旹

光緒十八年歲次壬辰病月上浣　元孫　雲
綺謹識

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

痘疹經驗集上卷卷一 目錄

痘疹辨　痘義解
發熱症　治表症
發汗解表藥　裏症
清熱解利藥　發熱中症
和解清利方　報痘中症
解毒藥　補血氣方
起脹中證　和血理氣解毒方　二
治瀉痢方　二　化痰止喘方
貫膿中證　和血和氣方　二
調氣調血助膿方　虛實辨

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

虛症　補虛方
實症　解利方
治虛痒方　治實痒方　二
解利方　二　加味甘桔湯
收靨中證　清涼解毒湯　二
解毒方　二　解散方
散毒退火方　發熱下證
報痘下證　起脹下證
十神解毒湯　葛根升麻湯
保元湯　無憂散
蟬化散　香砂平胃散
預解痘毒兔血丸　預解痘毒元兔丸
預解痘毒方　臨時解毒方
升解散　痘初出一日至三日治法
升麻葛根湯　二　參蘇飲
胡荽酒　一熱即出症
不可止瀉症　出痘瀉泄症
升芍湯　出痘驚搐
出痘嘔吐　舒舌膽服
犀角地黃湯　見形定吉凶　四症
十全大補湯　大小便不通
夏日中暑傷熱　欬嗽

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

上唇腫　痘初出目腫
甘露散　辰砂化痰丸
痘出四日至十日治法　滋榮助痘湯
痘出細小乾枯　赤紅乾枯
活血消毒飲　頂陷不起
四君子湯　保元湯
六君子湯　痘不起發
八牙散　夾痘疹
痘變紫色　四聖挑疔丹
痘血虛氣虛七日至九日治法
四物湯　灌膿遲
排膿托裏湯　頻湯不畏
痰嗽　白朮散
水穀不化　木香散
四苓散　痘發微痒
寒戰咬牙　痘疔
蓋痘沙　眼目腫閉
膿不滿足　收遲收早
痘出十日至十二日治法托裏消毒散
陡然乾枯　收遲不結痂
陷伏　二　結痂後出紅瘢
犀角汁　結痂後諸症

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

結痂後眼目腫閉　平肝消毒飲
活血消毒湯　十宣散
惺惺散　瀉清丸
犀角消毒丸　大安丸

補遺

綿繭散　敗草散
解毒湯　立效散
導赤散　附驗方
三豆湯　痘後腦疽
三仙膏　千金內托散

疹瘡纂要

升麻透瘢湯　透瘢和中湯
青肺解毒湯　解毒化滯湯
解毒和中湯　清肺消毒化痰湯
化瘢湯　小柴胡湯
大柴胡湯　前胡枳殼湯
黃芩芍藥湯　犀角化毒丸
附驗方　小兒疹不出
治疹不出旋出旋回兼咳嗽無鼻方
化毒散　補中益氣丸
治咽喉作瘡　治痘瘡
治瘢後眼疾　神功散

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

附經驗良方

治走馬諸症疳瘡　治產後諸症
治月間疾　治經閉奇方
治婦人乾勞　治吹乳方　二
治乳不下方　治難產方
治陰寒神效方　治破傷風方
治衄血不止方　治肺熱咳嗽
治勞傷　治無名腫毒
蟬殼明目散　治大便便血
治噎疾　治瘧疾三聖丸　三方
八寶散　治陰症良方
治傷寒　蒙石散
治咳嗽喘急　治心疼方

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

面部報痘圖

太陽
天庭
大陰
方廣
方廣
印堂年壽準頭
左肝
右肺
中
地角
地角
承漿

地角屬腎稠曰托頤
左腮屬肝片紅主泄
印堂屬心稠曰蒙頭
右腮屬肺片紅主喘
年壽屬脾稠曰抱鼻

報痘須看準頭旁人中上下辨陰陽印堂疏朗多吉慶地角承漿主壽長上觀目分下觀囊聲音响亮定吉祥三者

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

若還有一件縱到荒郊也不傷

面部報痘辨

按面部爲諸陽聚會之處遇此痘症總以十神解毒湯爲主蒙頭加酒炒黄連黄芩洩心經之火抱鼻加飯蒸大黄麩炒枳殼洩脾經之火托頤加山豆根元參防咽喉之痛左片紅加龍胆草青皮柴胡洩肝經之火右片紅加桑白皮桔梗黄芩洩肺經之火若虛寒之症宜先服葛根升麻湯即以保元湯補之切忌清涼之劑

五臟六腑詳解

五臟

何爲臟臟者臟也

何爲五臟心肝脾肺腎也

何以爲藏　肝藏血　心藏神　脾藏意　肺藏氣

腎藏水

六腑

何爲六腑

胆肝之腑也　謀慮出焉諸臟腑皆取決於胆

小腸心之腑也水液下行爲便者流於小腸

胃脾之腑也爲水穀之海諸臟腑皆受水穀之氣

膀胱腎之腑也

大腸肺之腑也

三焦爲水穀之道路也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹經驗集上卷卷一

古桃韓文博配坤氏輯　　元孫雲綺校字

按前人論痘疹總爲一科治以一方細思之殊爲未當蓋痘疹雖同爲胎毒各有其原夫人禀二氣以生其臟腑內莫不蘊毒臟爲陰腑屬陽痘出自臟乃臟毒也陰毒也雖出於陰必資陽以成之何也蓋成形者血也而長而膿而靨皆氣以爲之綱維也初感輕重不等有熱一二日而出者有三四日而出者由發熱而放標而起脹而貫膿而收靨而落痂遠者彌月近者不減十五日然後可成疹出自

DO NOT COPY
Past Aspan Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腑乃腑毒也陽毒也雖出於陽必資陰以成之何也蓋蒸熱者氣也而潤澤不枯出收及時皆血以爲之滋息也其初感亦輕重不等有熱五六日而出者有七八日而出者有熱燒血乾七八日不出而斃者見形之後不起脹不貫膿或朝出而夕淡或夜出而晝退吉凶在十日之內茲二者其賦形既異其治療豈同當分爲二科治痘專以和氣和血爲主而兼之以升發解毒之劑治疹專以滋陰退陽爲主而用清涼之劑二症原殊不可一律治也用藥少差禍不旋踵罹其害而不知其由可不愼哉

痘義解

痘繫胎毒同臟僻於一隅必因時邪外感內蒸以致邪火薰蒸癸水逆流而上水火相尅五臟之邪內應乎外自裏達表故其邪流布周身必見五臟之症而後痘始見矣其症發熱驚悸面燥腮赤者心也目直叫哭呵欠頓悶者肝也嘔吐或瀉手足稍冷者脾也乍冷乍熱咳嗽噴嚏者肺也耳與尻冷者腎也表裏薰徹三四日而齊紅點既齊變成水泡漸長漸綻變成膿泡亦三日而齊膿泡長極漸轉蒼蠟色漸靨漸脫痂死亦三日而完始終十四日而愈矣古謂神瘡豈虛語哉

按前人論痘以順逆險三者分可治不可治之名愚謂不若以上中下目之則人易曉蓋上者純吉固不容治治之反凶下者純凶亦不必治治之無益中者吉凶相參宜慎

East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University Library. DO NOT COPY

治之但症不一律有用藥一二劑而愈者有數十劑而愈者總名之曰中在視痘者愼辨之

痘症愈稀愈佳疹症愈密愈良蓋痘稀則毒必輕疹密則毒盡洩也各有攸宜不可一律視之

痘有發搐者此心經受病若搐於未出之先無害倘搐於既出之後者難治痘症最爲酷烈用藥不宜怠緩屬虛寒者或延至十日之外屬實熱者僅在十日之內七日之前臟腑尚全及時治之七日之後臟腑有傷治之緩矣凡當藥之痘決勿失時必大劑濃煎一日夜必進三四劑方可不然病勢迫急盃水何能救車薪之火也痘初出時有至稀者不可遽以爲稀真假須辨如微熱三四日微汗四五度而報痘稀者此爲真稀若至虛者氣弱無力不能送痘出皮熱甚者血氣壅遏不得疏暢宣洩均似非稀宜急審辨虛者補之實者解之則痘出不伏庶可照症調理虛者皮不溫熱痘色灰白昏睡不省乳食不進或瀉或痢皆虛也實者壯熱頰紅面赤腹脹痘紫狂言二便秘結皆實也若不早圖見稀守稀終爲稀悞矣又有一症未發熱即報一二粒於腮頰口唇之側長盛紅腫突然高起根腳開闊暈紅帶紫五六日後似膿非膿七八日後似靨非靨次第陷塌延至二十日內外惡毒一發蒸熱搐搦日四五次甚有傷生而不知者又有一症痘發熱猛暴一二日間報痘五六粒其形色亦如前樣致兒日夜不安驚狂發搐斯二

Dr. Nitty Collection
Rasu Asian Library and Oriental Collection
Princeton University Library

者一緩一急俱係惡症非真稀也必將此痘逐箇挑破去其毒血用艾灸八九壯再投以解毒之藥彼毒退而羣痘得出庶可回生治痘無奇惟於初出二三日間細看是何等痘除上等下等不治外凡中等可治者先用摧提解毒之藥輕者一二劑重者三四劑驅毒於外然後將合補之藥漸增分兩仍加升解之藥直至徧身膿滿而後止待收靨之時量用清解解利之藥二三劑以洗滌其餘熱以散消其餘毒斯痘易成亦無後症治痘之法無以出此若曰吾有秘方可以免痘不足憑信也

大端當已出未出之時最宜和解當起脹貫膿之時最不宜瀉當收靨落痂之後最不宜補此三者至要切不可違

違之則分外之雜症起矣愼之愼之凡大疾病大瘡症後俱不能任痘蓋氣虧也視痘者宜知之

發熱症

按痘症吉凶全兆於發熱之始熱甚者痘必重熱微者痘必輕此一定之理前人當此時有切禁汗下者有言當汗下者竊思非汗則表不解非下則裏不解倘症未明固不敢輕易用藥若痘氣盛行未痘之兒偶然發熱或呵欠或嚏噴或面赤微驚或乍寒乍熱或徧身俱熱耳尖中指不熱凡此等症俱已明顯熱之輕者固無事藥熱之重者非藥何以解散必詳察表裏症狀表症甚者急解其表裏症甚者急解其裏庶幾有可轉移不然任毒猖獗一成而不

Dust Adam Library and the Gest Collection Princeton University Library

可變後難措手矣

表症

表症謂燒熱乾燥面赤頰紅頭身作痛手足無措喜涼當風乳食不進坐卧不寧當服發汗解表之藥

發汗解表方

麻黃一錢　蘇葉七分　羌活一錢　防風一錢　葛根一錢
柴胡七分　黃芩一錢酒炒　升麻一錢　川芎八分　白芍七分酒炒
細辛五分　荊芥六分　白芷七分　甘草七分

右用葱白三寸薑三片水一鍾半煎半鍾溫服

裏症

裏症謂口舌乾焦面目紅赤氣熱痰喘譫語狂亂大便秘結小便赤澁腹飽悶昏當服清熱解利之藥

清熱解利方

黃連一錢酒炒　黃芩一錢酒炒　黃柏一錢酒炒　梔仁一錢炒　大力子一錢炒
木通一錢　葛根一錢　桔梗一錢　枳殼一錢麩炒　生甘草七分
麥冬一錢去心　滑石二錢水飛

右用水一鍾半煎半鍾溫服

發熱中症

發熱二三日見痘或煩燥不寧或乳食少進或少有驚悸或形色過紅或譫語狂亂急服和解清利之劑

和解清利方

升麻一錢　葛根一錢　白芍一錢酒炒　生甘草七分　山查一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

木通一錢　防風一錢　蟬退七分去土翅足　大力子錢半炒　川芎七分
紫蘇六分　黃連一錢酒炒　羌活七分　紫草茸一錢半　梔仁七分
葱白三寸薑三片水鍾半煎半鍾不拘時溫服如腹
飽加麩炒枳殼一錢無汗加麻黃一錢身熱加酒炒
黃芩一錢此藥已出未出俱宜服之

報痘中症

報痘顆粒稍稠而色涉深紅者或紅中有帶紫色者此內
有熱毒宜急解之

解毒方

黃連一錢酒炒　黃芩一錢酒炒　防風七分　升麻一錢　鼠粘子七分
羌活七分　山查七分　荆芥五分　木通七分　生甘草七分
蟬退七分去翅足　梔仁一錢　滑石二錢　紫草茸一錢　山豆根一錢
葱薑水煎溫服

又

痘色灰白身不溫熱懶語嗜卧者此血氣俱虛也宜補之

補血氣方

陳皮七分　川芎七分　當歸一錢半酒洗　白芍七分酒炒　黃芪一錢
升麻七分　人參七分　紅花六分　木香三分　桂枝三分
生甘草七分
葱薑水煎不拘時溫服

起脹中症

當起脹時有頂陷而色紅紫者此血熱而氣不足也急宜

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

和血理氣解毒

和血理氣解毒方

川芎七分 當歸一錢 白芍八分酒炒 甘草七分 羌活七分
紅花六分 蟬退七分去足 麥冬一錢去心 升麻一錢 山查七分
梔仁六分 人參一錢 黃芪錢半 木香三分 黃連一錢酒炒
黃芩一錢酒炒 大力仁七分炒
葱白三寸薑三片水一鍾半煎半鍾不拘時常服紅
紫色退則去芩連梔仁

又

起脹時有頂陷而色灰白者此血氣俱虛也

治血氣俱虛方

川芎七分 當歸一錢 白芍七分 陳皮七分 人參一錢
黃芪錢半 甘草七分 升麻七分 紅花六分 蟬退六分去翅足
桂枝三分 木香三分
葱白三寸薑三片水煎溫服

又

起脹時有瀉痢者恐痘內陷惡治勿緩

治瀉痢方

條芩錢二炒 白芍一錢炒 升麻一錢 山查七分 陳皮七分
人參一錢 黃芪錢半 槟榔一錢 當歸錢二 木通一錢
木香三分
水煎溫服如不止加訶子肉一錢肉豆蔻五分燒熟

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

去油

又

起脹時有痰喘咳嗽者宜清肺化痰止嗽

化痰止嗽方

片芩一錢 橘紅一錢 貝母一錢去心 麥冬一錢去心 五味四分搗

丹皮一錢 前胡一錢 桔梗一錢半 梔仁七分 桑皮一錢

生甘草七分 瓜蔞仁一錢

薑一片水煎溫服

貫膿中症

痘無雜症有當膿而膿不起者此血氣不足不能充滿也

當和血和氣仍加升提之藥

和氣血升提方

升麻七分 山查七分 蟬退七分去殼 川芎七分 當歸一錢

白芍七分 陳皮七分 人參一錢半 黃芪二錢 桂枝二分

生甘草七分

葱白三寸薑三片水煎溫服

又

貫膿時有痘色紅而膿不振揚者此熱毒牽制也急清其

熱仍調氣血以助膿

調和氣血助膿方

川芎七分 當歸一錢 白芍七分 甘草七分 人參一錢

黃芪一錢半 升麻七分 黃連一錢 黃芩一錢 麥冬一錢去心

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

山查一錢 蟬退七分去翅足 紅花五分 石膏二錢煅 丹皮一錢
木香三分
葱薑水煎温服如色變膿起去黃芩石膏丹皮涼藥
若山豆根更不可用

虛實辨

貫膿時有寒顫咬牙者切勿作寒治當辨虛實用藥虛則補實則解

虛症

虛症謂膿不滿身不熱痘色白或吐或瀉或嗜卧懶語或畏寒或乳食不進頂陷皮薄漿清皆虛也可用補藥

補虛方

川芎一錢 當歸錢半 白芍七分 炙草一錢 人參二錢
黃芪三錢 升麻一錢 陳皮八分 山查七分 桂枝三分
紅花六分
葱白三寸水煎温服症退乃止

實症

實症謂膿滿身熱痘色赤口舌乾大便秘小便赤腹飽痰喘煩燥坐卧不安皆實也宜服解利之劑

解利方

連翹一錢 枳殼一錢 黃連一錢 黃芩一錢 麥冬一錢去心
蟬退七分去翅足 甘草七分 柴胡七分 薄荷五分 芥穗五分
大力子一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

葱白三寸水煎温服症退乃止

虛痒方

川芎八分 當歸錢半 人參一錢 黃芪錢半 炙甘草一錢
陳皮一錢 白芍一錢 防風七分 蟬退七分去足 芥穗七分
桂枝三分 木香三分

葱白三寸薑三片水煎温服

實痒方

連翹二錢去心 麥冬一錢去心 蟬退八分去翅足 山查七分 芥穗七分
黃芩一錢 丹皮一錢 白芷七分 梔仁八分炒 甘草七分
防風一錢 升麻七分 薄荷五分 滑石二錢 大力子二錢
地骨皮一錢

水二鍾煎半鍾温服如腹飽者加麩炒枳麩一錢

又

貫膿時有瀉痢者急止之宜服前起脹時止瀉痢之方以防內陷有大便秘結者切不可下恐痘亦隨之陷只宜解利之

解利方

條芩錢半 山查錢半 鼠粘二錢 枳殼一錢 紅花七分
槟榔一錢 桃仁五分 麻仁三錢搗 紫草茸二錢

水二鍾煎半鍾温服連用二劑自能潤開若不開再加枳殼一錢麩炒

又

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

貫膿時有喉腫痰壅咳嗽者宜服加味甘桔湯

加味甘桔湯

桔梗三錢　甘草二錢　麥冬二錢去心　前胡二錢　片芩錢半

橘紅錢半　五味五分　大力子二錢　桑白皮錢半

薑三片水二鍾半煎半鍾溫服有痰加貝母瓜蔞仁各一錢腹飽加麩炒枳殼七分

收靨中症

痘至半靨之時雖無內外雜症有留滯熱毒當服清涼解利之藥斯無後患

清涼解利湯

連翹一錢去心　黃連一錢　芥穗六分　山查七分　麥冬七分去心

川芎七分　升麻七分　柴胡七分　甘草六分　白芍一錢

羌活七分　蟬退六分去翅足　前胡七分　獨活七分　梔仁七分

大力子一錢

水二鍾煎半鍾溫服如有痰加橘紅一錢貝母一錢喘者加桔梗一錢嗽者加桑白皮一錢五味三分搗飽者加枳殼七分麩炒

又

痘後有腫毒者任其自發不必攻擊只宜解散慎勿輕補亦勿貼膏藥蓋痘後內虛貼藥則毒入內也

解毒方

川芎七分　歸尾一錢　芥穗六分　赤芍一錢　生地一錢酒炒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

黃連一錢酒炒　銀花二錢　皂鍼一錢　甘草一錢　黃柏一錢
防風六分　花粉一錢　連翹一錢去心　羌活七分　柴胡七分
水二鍾半煎半鍾溫服如痛者加乳香沒藥未各七
分俱不見火如腿腫加牛膝一錢防已一錢

又

痘後有目腫生翳者不可輕點只宜解散

解散方

防風一錢　黃連七分　菊花七分　蟬退七分蠢足　谷精草一錢
檳榔一錢　木賊一錢　連翹一錢去心　柴胡七分　龍胆草七分
羌活七分
水一鍾半煎半鍾或食遠服或卧時服忌葷酒生冷
怒氣蘿蔔茄子王瓜豆腐諸物切不可食

又

痘後目中有努肉紅腫者此目中原有痘也宜服散毒退
火之藥

散毒退火方

黃連七分　連翹一錢　黃芩七分　柴胡七分　歸尾一錢
赤芍一錢炒　生地七分酒洗　菊花一錢　麥冬七分去心　甘草五分
防風七分　薄荷五分　芥穗六分
水二鍾煎半鍾不拘時溫服忌生冷腥酸油膩等物
切戒暴怒

發熱下症

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

發熱猛暴或眉目不開或腹背腰腿疼痛或喊叫呻吟驚悸不寧或狂言妄語或乳食不進或米穀不化或晝夜不眠或沉迷昏睡或動失常性或熱毒壅盛血不循軌上自口鼻下自二便得竅湧出或壯熱一日即見痘形或偏身細小或色樣過紫或皮膚青黎俱凶

報痘下症

報痘初密如蠶子或青黑紅紫成片相連或紅腫突起或漫紅無粒或紅腫如雲頭或心胸高起或腹痛不止或聲啞失音或舌捲腎縮或折頂搖頭或譫語狂顛或不時驚搐或已出復沒或頭溫足冷或倦怠無神或身不溫熱或沉眠昏睡或乳食不進或喊叫不停或頭面四肢虛腫俱凶

起脹下症

當起脹時或全然平塌或頭虛腫而痘不腫或痘頂黑陷紫陷或偏身頂陷或頂中有黑孔而昏睡不食或妄有見聞或腰腹疼痛或瀉痢不休或腹滿不消或頭溫足冷或皮薄灰白或明如水珠或偏身浮腫或抓破無血或口出臭氣或顛倒不眠或沉頼不消俱凶

又

起脹時或面上腹背四肢先有數粒似貫膿者此非真膿乃荒痘也後多不能成就宜知

十神解毒湯

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

歸尾　生地炒　赤芍　桔梗　木通

連翹　川芎　燈心　丹皮　腹皮

如壯熱加葛根前胡荊芥牛旁　渴加天花粉竹葉

石膏　小便赤加犀角山梔　小便秘加滑瞿麥

大便秘加黃連桃仁　吐血乾嘔加黃連犀角　煩

燥加麥冬天花粉狂亂譫語加知母麥冬石膏嘔吐

加猪苓澤瀉防風

葛根升麻湯

升麻五分　葛根五分　白芍四分　炙甘草三分

夏加香薷　冬加麻黃　腹脹加山查　四肢冷加

桂枝薑棗水煎溫服

保元湯

人參五分　黃芪一錢酒炒　炙甘草五分

水煎溫服痘初出用生甘草既長用炙甘草須看症

候加減

無憂散

人牙五分燒存性　雄黃五分　珍珠五分

右爲細末每服三五分用荔枝煎湯

蟬化散

蟬退一兩微炒　地骨皮一兩炒黑

右爲細末每服一錢水酒送下治痘疹徧身作癢抓

破皆治之

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

香砂平胃散

陳皮一錢 蒼朮一錢 厚朴一錢 甘草五分 神麯七分炒

麥芽六分炒 枳實八分 香附七分 砂仁五分搗 花粉七分

水煎溫服

痘疹經驗集上卷卷二

古桃韓文博配坤氏輯　元孫雲綺校字

預解痘毒兔血丸

臘月初八日取生兔一隻取血以蕎麥麪和勻加雄黃末五分丸如綠豆大初生小兒三日後取三丸乳汁下徧身發出紅點爲驗有終身不出痘疹者雖出亦稀少也

姚雲齋宦遊傳來元兔丸方極效驗宜珍重不可輕忽視之也

預解痘毒元兔丸

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

元參　兎絲子酒浸蒸熟搗爲餅晒乾用

右等分清小爲丸如綠豆大每月初一十一二十一食遠煎水服一劑小兒每一歲上等稱一分若遇寅申之年相火司天正小兒生痘之年尤宜製服

預解痘毒方

小兒初生時用硃砂三分黃連二分甘草一分煎湯候半溫少少灌之待便下胎毒然後開乳則能稀痘或有終不出者硃砂不可見火研爲細末納入黃連甘草湯內服之

臨時解毒方

凡遇痘毒流行之時但看小兒忽然暴熱面燥腮赤睡中有驚醒時有顫煩燥焦啼未見紅點疑似之間就將水飛辰砂三五分用升解散去升麻撮一劑煎汁調辰砂服之半日後但大便一去將所服辰砂便出挑起如痰涎之狀其毒即解輕者可以不出重者雖出亦稀少也但既出之後須服保元湯數劑以助元氣成收斂之功

蓋小兒痘未見形暴熱煩燥驚搐者毒氣盛也急服升解辰砂散否則出如蠶子難成難收斂後悔無及矣若熱不甚輕輕而來則不必服

升解散此治痘要方

升麻三分　生地三分　甘草三分　白芍五分酒炒　木通五分

黃芩四分酒炒　川芎六分　茯苓五分

水煎入辰砂三分服之兒大者入五分

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

發熱初出一日至三日治法

凡發熱輕輕而來三四日始見紅點頭面稀疎周身亦少漸漸長大顆顆伶俐根紅頂尖光澤紅活身熱漸退神氣安寧飲食如常二便如常此順症也不必服藥只宜謹慎將護調節飲食若三四日不見紅點熱亦不退疑似之間當服升麻葛根湯以微表之是痘則出感冒亦解矣

升麻葛根湯

升麻五分　葛根五分　白芍四分　炙三分

薑一片葱白一寸水一鍾煎半鍾食遠溫服

又

一痘發熱之時不能飲食者此因內傷飲食而發也當服參蘇飲去人參加炒神麯炒麥芽與青皮山查各三分以和中解表

參蘇飲

人參二分　枳殼二分麩炒　葛根四分　前胡四分　桔梗四分

陳皮四分　半夏四分薑製　炙草三分　茯苓五分　蘇葉四分

薑一片棗一枚水煎食遠溫服

又

一痘發熱三日始出不紅活及頂平而色淡或不甚起發者此不必畏乃日之未至也若五六日間猶不起發只須於飲食中治之如老雞肉葡萄黃酒少與食之以助發長外用胡荽酒煎令氣薰蒸更以酒敷周身即能明潤發長

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

矣但不可敷頭面再以酒灑房室或焚棗乳香等物更能避去穢惡

胡荽酒

胡荽不拘多少用酒煎數沸乘温敷兒身及灑房室

又

一痘發熱二日而出者此毒畧盛可十全八九宜用升解散服過三日有嚏噴出熱退身涼不必再藥以後升解散俱用全劑不用辰砂若見別症另爲加減

又

一痘發熱一日半出者此症危險可十全二三但看面不赤不煩燥人事清爽身熱漸退睡不驚悸顆分明有嚏噴猶不足慮若乾枯赤燥不起發連片者宜用升解散加牡丹皮必得大便以洩其餘熱即時身涼前症漸減似可治療若熱似前不解變症無窮矣

一熱即出症

一痘發熱一日出者此乃九死一生之症謂熱盛毒亦盛一發便出也急用升解散二三劑倘熱減驚悸退猶可望生若用藥後仍如前發熱煩燥難保其全也

不可止瀉症

一痘初出瀉洩者此心火用事心與小腸爲表裏內熱蘊積小水不利大便方瀉只宜治痘不可止瀉此一二日有餘之症也若出後瀉者止之

Do NOT copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

出痘瀉泄症

一痘出不拘稀稠但頂陷肉色白乃脾胃虛弱也或兼瀉泄者當用升芍湯一劑須瀉止起發紅活而止若暴注大瀉亦以升芍湯加澤瀉猪苓白茯苓炒黃芩瀉止痘斯起發矣

升芍湯

升麻五分　白芍五分酒炒　白朮四分土炒　雲苓四分　人參三分

川芎三分　生地三分　木通三分　炙草三分

薑一片棗一枚水煎不拘時溫服

出痘驚搐

一痘發熱連連驚搐或時作時止待痘一出其搐即止不妨若痘出後發搐者多凶

出痘嘔吐

一痘初出嘔吐者此毒流入於胃故也方發頭面四肢此時胃氣正清偶然毒氣侵之故多吐或有傷而吐者不妨若四五日不止者毒氣隨嘔而入內必有腹脹之病甚危

舒舌瞪眼

一痘發熱驚搐舒舌瞪眼不省人事者此乃毒盛必火上炎逼舌在外不收急用犀角地黃湯加水飛辰砂治之若投風燥藥或表散藥必致夭傷慎之慎之

凡治痘毒太盛面黃糞黑驚搐等症皆宜用犀角地黃湯不可任意妄用以致悞事慎之慎之

Past Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

犀角地黃湯

生地五分酒洗 赤芍三分酒炒 丹皮三分 生犀角三分

先將地芍皮三味煎成再將犀角錯爲末納入湯內不拘時溫服如熱甚者加黃芩三分

見形定吉凶論

一痘一二三日見形瘡出將齊必有噎噴噴止其熱即退再不加添痘之吉凶從此定矣在皮膚者即出出者即長若見形無噎噴者此毒氣盛也身熱不退其症必凶

又

一痘似熱不熱二三日出輕輕而來所出不多顏色淡紅頭面稀少者爲上不須調治若色赤形小面肥赤當用升解散治之若紫赤乾枯全無生意或如蠶子赤紅連片不起發者以升解散合犀角地黃湯治之二方見前

又

一痘見形一二日不食者此痘多因內傷有惡心者凶不惡心者可治用升解散加炒神麯炒麥芽山查肉青皮若內熱秘結肚腹膨脹狂躁譫語以升解散加麩炒枳殼酒煨大黃微下之此死中求活也

又

一痘見形發渴不食者多凶在三日內身熱用升解散治之四日後身涼用大補湯去地黃治之

十全大補湯

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

炙芪五分　白朮五分土炒　當歸五分酒洗　川芎五分　茯苓五分
白芍五分　熟地五分　人參三分　炙草三分　肉桂二分
薑半片棗半枚水煎食遠溫服

大小便不通

一痘初出大小便不通或小便赤澁此毒盛又兼平日積熱宜清心利小便用升解散去升麻加竹葉治之若不早出恐心火上炎必發搐難治

痘遇夏日中暑傷熱

一痘初出遇夏日或中暑或傷熱痘形乾燥昏迷不省人事痰涎壅阻或大作狂燥以升解散調甘露散治之

痘遇喘嗽

一痘初出痰涎潮塞喘嗽先用辰砂化痰丸後用升解散治之

痘出上脣腫

一痘初出三日內忽然上脣腫起其勢甚危用升解散加連翹丹皮治之若腫消者可治不消者過七八日危矣

痘出眼目腫

一痘初出目便腫者甚危急用升解散治之若至六七日目腫者不妨

甘露散

石膏堅白有牆壁手不可折者佳一兩　生甘草錢半
寒水石微輭青黑中有細紋者佳一兩

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

共爲細末每服或一錢或五分量小兒大小酌用沸湯調下

辰砂化痰丸

辰砂一錢　枯白礬一錢　半夏麯五錢　胆南星二錢

共爲細末薑汁打麵糊爲丸如蘿蔔子大每服十五丸淡薑湯下

痘出四日至十日治法

一痘自見紅點爲始至四日紅點初長其形已分其色尚赤多爲血泡至五日六日其形漸大其色漸白而光潤名爲水泡若本來稀疏肥滿光潤紅活明淨不須服藥只宜調節飲食謹避風寒可也

一痘稍多形色不充潤或形雖掀起其色尚不光澤或色光澤而形尚細小當服滋榮助痘湯外用胡荽酒兼治之

滋榮助痘湯

當歸五分　川芎五分　白芍三分　天麻三分　防風三分

升麻二分　葛根二分　荊芥一分　紅花一分　炙草三分

桔梗三分　全蝎分半去尾火煨　薑蠶分半酒洗去上去嘴

薑半片棗半枚不拘時水煎溫服如有稀痰加白茯苓五分製半夏三分

痘出細小乾枯

一痘若細小乾枯全無活潤生意當服滋榮助痘湯合犀角地黃湯治之

DO NOT COPY
Gest Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘赤紅乾枯

一痘若稠密細小赤紅乾枯全不起發仍煩燥焦熱者當服活血消毒飲以治之

活血消毒飲

當歸五分 川芎五分 白芍五分 生地五分 荆芥三分 防風三分 連翹三分 黄芩三分 甘草三分 牛旁子四分炒搗

水煎不拘時温服

頂陷不起

一痘若其形細小其色淡白皮軟頂陷不起發者用藥助痘湯合四君子湯服之或單服保元湯亦可蓋四君子湯治痘色淡白不起屬氣虚者若保元湯治痘六七日至十日不甚充滿光澤者當日用一劑此藥平和最爲穩當痘瘡要藥也

四君子湯

白朮五分土炒 白茯苓五分 人參五分 炙草三分

薑一片棗二枚不拘時水煎温服

保元湯

黄芪一錢酒炒 人參五分 炙草三分

水煎不拘時温服若燥渴加麥冬五分去心若頭面不起加川芎三分若四肢身體寒冷痘色白平陷全無生意加官桂二分若五六日間痘色俱好大便溏

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

瀉當服六君子湯若肢冷水瀉無度米穀不化屬虛寒者加肉豆蔻三分煨訶子三分木香一分

六君子湯

白朮五分土炒 茯苓五分 人參五分 山藥五分 陳皮三分 甘草三分 升麻三分 白芍三分炒 川芎三分

薑一片棗二枚水煎溫服

痘不起發

一痘若至五六日不起發全無生意雖服前藥亦不發長先以人牙散刼之繼以滋榮助痘湯調之再以保元湯補之

人牙散

人牙燒存性不拘多少血竭少許

共研爲細末每服一二分糯米湯調下量小兒大小斟酌加減用之

痘夾疹

一痘若五六日間痘出勻漸長發肌皮間又起紅點細細徧身此名夾痘疹也宜用滋榮助湯倍加升麻葛根服之一二劑後紅點色淡即愈矣止服

痘變紫色

一痘若已出勻忽然有變紫色痘下有根名爲痘疔不急治則諸痘皆變難救矣急用滋榮助痘湯加翻白地丁草服之外用銀鍼刺破出紫血淨點四聖丹以轉紅白色爲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

吉

四聖挑疔丹

珍珠大者十四粒 豌豆四十九粒燒存性 亂髮三錢酒洗燒存性 乾胭脂不拘多少

共爲極細末點疔內卽愈

痘出七日至九日治法

一痘自見紅點至七日若痘本稀疎漸轉白膿至八日稠黃膿九日蒼蠟色肥滿光澤紅活明淨不須服藥惟謹愼調理當此之際有氣血兩虛者更宜辨之觀其色白嫩爲血虛頂陷不起爲氣虛宜用八珍湯十全大補湯治之氣虛者四君子湯爲君血虛者四物湯爲君此諸藥加倍用

四物湯

當歸五分 川芎五分 熟地三分 白芍三分

薑一片棗二枚水煎食溫服四君子合四物爲八珍湯再加酒炒黃芪五分肉桂二分名十全大補湯大補氣血

灌膿遲

一痘若頂陷色白嫩平塌不起發灌膿遲以保元湯排膿托裏湯治之

排膿托裏湯治痘七日至八九日色白膿不足滿者

黃芪一錢酒炒 人參七分 白朮五分土炒 白芍五分炒 茯苓五分

川芎五分 桔梗四分 白芷三分 防風三分 炙草四分

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

當歸七分

水煎不拘時徐服之

痰嗽

一痘若六七日間有痰嗽胃氣不和也當服六君子湯即四君子加陳皮五分薑製半夏五分即辰砂化痰丸亦可服

又

一痘若忽然瀉出青黃紫黑粘膩之物膿痰皮痂之類乃毒出也雖頻不足畏但不可不固脾氣當服白朮散若瀉溏糞乃脾氣虛也亦宜服白朮散

又

一痘若瀉水穀不化當觀其疾之新久若新暴瀉宜服白朮散加四苓散若稍久腸滑瀉清水虛脫之甚手足或冷口鼻氣微當用木香散合白朮散

白朮散 治痘正貫膿時瀉泄恐痘內陷急服此藥以止之

白朮七分土炒 茯苓五分 人參五分 乾葛五分

藿香三分 陳皮三分 炙草三分 木香一分不見火

水煎溫服

四苓散 治痘水瀉小便不利

白朮七分土炒 茯苓五分 猪苓五分 澤瀉五分

水煎食遠溫服

木香散

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

木香二分　人參四分　前胡四分　炙草二分　丁香二分
青皮二分炒　肉桂二分去皮　赤苓四分　訶子肉四分　腹皮四分黑豆
湯洗

水煎不拘時溫服

寒戰咬牙

一痘若膿將足時微有寒戰咬牙當服十全大補湯

痘發微癢

一痘若發微癢只燒乳香薰之如癢甚當服十全大補湯
內熟地換生地再加蟬退白芷各三分

蓋痘沙

一痘若膿成熟轉蒼色將斂之時忽皮膚間發紅瘢如雲
俗謂蓋痘沙若淡紅而微不必治若赤紅盛或帶紫色急
服十全大補湯加防風荊芥連翹牛旁子各三分有發極
成泡泡破見肉或膿水不乾者以滑石粉敷之或地龍末
或蒲黃皆可敷

痘疔

一痘若本體好忽變紫黑痘疔用銀鍼挑破血淨點四聖
丹內服四物湯加翻白地丁草方見前

膿不滿足

一痘若勢稍多膿漿雖有而八珍湯大補湯七八日間亦
當日服一劑以防內虛作變保元湯尤妙

眼目腫閉

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一痘若稍多眼目腫閉不可輕動九日方開亦有十四五日者太遲則用乳汁潤之濃茶洗之

凡痘出十日至十二日治法

一痘自始出至十日當收斂結痂疕全愈矣但中間有遲速不同若痘不多不少膿貫滿足必依期而收其痘原肥滿光澤脫痂之瘢亦肥滿光澤充足此爲上吉不須治療只宜謹風寒節飲食而已何也以痘後百脉虛損故也

收遲收早

一痘若少則收早而速若多則收遲而緩痘出不多不少灌膿滿足雖早收一二日亦無害即遲收一二日亦無害

陡然乾枯

一痘若正盛時陡然焦乾遂至徧身如蕎麥皮樣全無活潤血色此爲收斂因元氣不充而痘毒大盛也急服托裏消毒散

托裏消毒散 治痘十一二日間半收半斂時毒氣盛大

炭芪一錢 白朮七分土炒 茯苓五分 陳皮四分 防風四分 連翹四分 當歸五分 桔梗七分 荊芥三分 炙草三分 牛蒡三分炒搗

水煎不拘時溫服

陷伏

一痘若正盛時偶然陷伏而不結痂此中氣虛而脾寒宜服托裏消毒散加保元湯

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

收遲不結痂

一痘若無別症只是收遲些或因覺熱些或煩燥些此是熱氣薰蒸故不結痂當以犀角汁解之

犀角汁

用犀角一塊水磨一二分令小兒服之自愈

結痂紅瘢

一痘若已收斂結痂偶然徧身出紅瘢亦謂之蓋頭沙當服活血消毒湯

結痂後眼目腫閉

一痘若已結痂眼目尚腫閉當服犀角消毒丸或活血消毒湯外以乳汁潤之濃茶洗之乳汁潤眼屢試極效

結痂後諸症

一痘若大便燥肛門腫痛者宜服瀉清丸

一痘若結痂後作瘡疽瘡節服犀角消毒丸或活血消毒散亦可消散

一痘若成膿不能即愈當服十宣散

一痘若結痂後傷食不能尅化不思飲食當服大安丸

一痘若痘後傷風或發熱抽搐等症當服惺惺散

一痘若痘後餘毒入目或紅腫或生白翳當服平肝消毒飲

大抵痘後餘毒未盡或發熱或病眼或生瘡節或口舌生瘡一切熱毒皆當服犀角消毒丸此藥最能清熱散毒真

DO NOT COPY East Asian Library and Gest Collection Princeton University Library

極妙藥也

活血消毒飲

當歸五分 川芎五分 白芍五分 生地五分 荆芥三分
防風三分 連翹三分 黄芩三分 甘草三分 牛旁四分炒搗
水煎温服

平肝消毒飲

當歸六分 川芎六分 荆芥六分 防風六分 菊花六分
蟬退六分 赤芍六分 生地六分 甘草三分 胆草六分
黄連六分 穀精草六分
水煎温服量小兒大小斟酌分兩不可執一

惺惺散

白朮五分土炒 黄芩五分 白芍五分 花粉五分 桔梗五分
人參三分 川芎三分 炙草三分 細辛二分 薄荷葉二分
薑一片棗二枚水煎食遠温服

十宣散

炙芪五分 當歸五分 人參三分 川芎三分 厚朴三分薑炒
防風三分 桔梗三分 白芷三分 炙草二分 官桂分半
水煎不拘時温服

犀角消毒丸

犀角三錢爲末 生地三錢 當歸三錢 連翹三錢去心 牛旁三錢炒
桔梗三錢 荆芥二分 防風二分 白芍二分 甘草一錢
黄芩一錢 薄荷一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

共爲細末煉蜜爲丸如酸棗大每服一丸沸湯化下或作小丸數個下之亦可

瀉清丸

羌活一錢　川芎一錢　山梔一錢　當歸一錢　胆草一錢　防風一錢　大黃一錢溼紙包火煨

共爲細末煉蜜爲丸如酸棗大每服一丸或半丸竹葉煎湯同沙糖化下

大安丸

山查八錢去核　神麯二錢炒　半夏二錢薑製　蘿蔔子一錢炒　陳皮一錢　連翹一錢去心　白朮四錢土炒　白茯苓二錢

共爲細末粥爲丸如綠豆大每服十五丸煎水送下

補遺

一治痘疹身體生疳蝕瘡膿水不絕症用綿繭散

綿繭散

用出蛾綿繭不拘多少將生白凡搥碎塞內以炭火燒化白凡汁出同收研爲細末敷瘡口上卽愈

一治痘外靨渾身破爛膿水淋瀝用敗草散

敗草散

用多年土牆上爛草搗爲極細末敷之或牆上乾綠苔研敷更妙

一治痘疹熱毒膿血痢疾用解毒湯

解毒湯

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

梔仁五分 黃連五分 黃芩五分 黃栢五分

水煎溫服

一治痘瘡餘毒牙根破爛出血或成走馬牙疳用玄效散

玄效散

人中白一錢入消銀鍋內用瓦蓋固以火燒透候冷定再用 銅綠三分 射一分

共爲細末先以茶漱口淨再以指敷藥於牙上即愈

一治痘症熱盛小便赤澁煩燥多渴用導赤散

導赤散

生地一錢酒洗 木通一錢 黃芩一錢 甘草一錢 竹葉五片

水煎溫服

附驗方

凡小兒出痘始終宜三豆湯藥易辨而小兒又喜食真扁鵲神方也此藥屢試屢效不可以粗淺視之

三豆湯

大黑豆三錢 赤小豆三錢 綠豆三錢

同入沙鍋內煮爛連湯帶豆令小兒乘熱食之切忌冷食若痘後毒癰即搗三豆爲末醋調塗之最效

痘後癰疽

凡小兒痘後餘毒結成癰疽連珠不已用三仙膏塗之

三仙膏

馬齒莧搗汁 猪油 蜂蜜各一碗熬膏塗之兼治年久惡瘡並頭上禿瘡

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

又方

小兒腦疽用酵發白麵作圈唾津粘固瘡愈麵落其效如神

治寒戰咬牙抽風痘黑用千金內托散此極驗方也

千金內托散

黃連五分酒拌炒黃　川山甲二錢火崩　全蝎三錢酒洗炒　硃砂五分

各爲細末共入一處黃酒調服

疹瘡纂要

疹者痘之未疾也如天地沴戾不正之氣故曰疹也然有未痘而先疹者痘後必復疹惟痘後疹者方爲結果在南方稱爲沙子又曰醋子在北方稱爲膚瘡又曰糠瘡赤瘡醫書稱爲疹瘡名雖不同其症則一也疹雖非痘之比亦由胎毒藏於脾肺二經蘊於肌肉皮毛待外邪而作初發則面燥色赤目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴手足稍冷夜卧驚悸故與痘與傷寒大同小異然必大熱五六日始見紅點三日之間從面至胸背從胸背至手足隨出隨沒以遍身紅點爲美

凡疹初熱疑似之間切不可輕易用藥縱有他症必待五日腮下見疹方可用藥

凡疹多連嚏噴鼻流清涕或鼻血甚流飲食略減好飲涼水只宜調理飲食戒麵食香油葷腥辛辣熱物

凡疹初發最怕泄瀉然亦有始終瀉而不妨者禀之强弱

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

異也若瀉早者其嗽必減必變喘嗽大抵肺實則嗽肺虛則喘得嗽者出得喘者入故疹喜嗽而畏喘

凡疹熱起至收完但看右手一指脉洪大有力雖有別症亦不爲害此定存亡之要訣

凡疹始終有嗽鼻要有清涕若二三日間鼻乾待收完看毒輕者清涕即來就思飲食此不必藥若清涕不來不思飲食須服清脾解毒湯待清涕來方止 方有後

凡疹出二三日間忽大瀉嗽多者急用透班和中湯若喘嗽搖頭悶亂者凶

凡疹見後大便下膿血或因瀉而變痢或徑自痢者但看疹出遍身色紅又多嗽者只宜表疹用升葛透班湯疹收後痢宜服解毒和中湯如腹痛甚或純下血宜服黃芩芍藥湯

凡未出疹之先平日過用麵食者及正出時吃麵食者或收後胃氣復即思麵食而用早者因動胃火以致清涕不來身體作熱兩眼看手咬指摳鼻撕口舌唇及撕眼劄毛此乃疹後食傷之爲病也惡心不食而熱者當服解毒化滯湯若止身熱鼻乾無涕者宜服清肺消毒湯

凡疹熱六日而出者一定之規也初熱決不可用汗下藥必待熱五日後見疹方用升麻葛根湯徐徐升表每用藥一劑必作十二三次服蓋疹在皮裏膜外若一

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

劑作一次服藥性摧之太急致令煩燥譫語宜慎之

凡疹熱一日至五日者個個都有腹痛之症此大腸之火鬱于皮竅之中故作痛不妨若認作傷食用攻尅藥或用手揉爲害甚重斷不可揉慎之慎之

凡未出疹之先有胃火及出疹之後有餘毒或牙根上下及口唇生瘡者每日用温米泔水洗十餘次急服解毒湯若不洗不藥恐變走馬疳若成疳急用立效散

凡疹出多五六日不飲食此毒氣侵胃胃爲邪氣所養故不食也疹出盡毒氣漸解即思飲食不可吃麵食先吃米粥可也

凡疹出始終喜飲涼水切不可禁但每飲宜少而頻則毒氣漸解

大抵痘瘡內關五臟疹瘡惟脾肺二臟所以治療之法惟辛涼解利二經之火而已色紅赤者吉紫黑者凶雖有吐瀉決不温補初熱尤不可大汗只用升麻葛根湯微表之可耳始終喜嗽怕喘雖收後多嗽不妨蓋餘毒須假多嗽而散也但嗽而有清涕者妙鼻乾而嗽當服清肺湯疹後或有餘毒發熱瘡癤等症當服犀角消毒丸

一初出不紅現熱轉甚身痛煩燥宜服升麻葛根湯

大凡治疹以此方爲準外視症候斟酌加減

一寒熱并作頭痛背强前升麻湯加羌活防風連翹

DO NOT COPY
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一頭項面腫升麻湯加牛旁子白芷防風荊芥

一自汗煩渴太甚氣粗脉數者服化瘢湯

一熱甚小便赤澁譫語服導赤散

一咳嗽甚或喘嗽鼻口乾咽痛音啞宜服清肺消毒化痰湯

一喘甚服小柴胡湯去人參加五味子

一小便短少大便瀉清水服四苓湯

一熱甚鼻衄或便血溺血服犀角地黃湯

一大便秘結發熱身痛服大柴胡湯

一腹脹氣喘服前胡枳殼湯

一咽喉不利或腫痛兼熱嗽濁痰等症宜服清肺消毒化痰湯

一寒熱往來似瘧服小柴胡湯如咳嗽去人參

一靨後身熱或生瘡癤餘毒等症服升麻湯加黃芩黃連防風荊芥牛旁子內中白芍換赤芍此湯藥也要吃丸藥即用犀角化痰丸更妙

升麻透瘢湯 治疹初出一日至三日不甚紅見

升麻三分　葛根三分　川芎三分　枳殼三分麩炒　柴胡五分

前胡五分　桔梗五分　茯苓五分　陳皮二分　甘草二分

薑水煎作十二三次服至于藥分兩量小兒大小加減後俱倣此

透瘢和中湯

升麻三分　葛根三分　猪苓三分　澤瀉三分　柴胡五分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

前胡五分 桔梗五分 茯苓三分 半夏二分製 陳皮二分
炙草二分

薑棗煎服

清肺解毒湯 治疹後不思飲食鼻乾無涕此常有之症也謹之記之
防風五分 連翹五分 黃芩五分 桔梗五分 前胡五分
茯苓五分 麥冬五分去心 荊芥二分 枳殼二分麩炒 甘草二分

水煎頻服

解毒化滯湯 治疹後吃麵食太早咬指撕口唇及撕眼瞼毛看手咬人等病症
防風五分 連翹五分去心 黃芩五分 桔梗五分 前胡五分
茯苓五分 荊芥二分 枳殼三分 神曲三分炒 麥芽三分炒
山查三分 陳皮三分 炙草三分

水煎服

解毒和中湯 治疹後腹痛作痢不思飲食
防風五分 連翹五分去心 黃芩五分 黃連五分薑炒 前胡五分
茯苓五分 荊芥三分 猪苓三分 澤瀉二分 陳皮二分
甘草三分

水煎頻服

清肺消毒化痰湯 治疹後喘嗽聲音不清不思飲食眼目不清唇口乾燥舌焦咽痛
防風五分 連翹五分去心 黃芩三分 桔梗五分 貝母五分去心
前胡五分 茯苓五分 麥冬五分去心 牛旁子三分炒搗 枳殼三分麩炒 荊芥三分 甘草三分

水煎頻服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

化瘢湯治疹瘡自汗煩渴

人參五分去芦　知母一錢夫毛酒炒　石膏一錢煅　炙草五分

糯米一小撮水煎服

小柴胡湯治疹瘡喘甚

柴胡五分　黄芩五分　半夏三分製　炙草二分　五味三分搗碎

水煎温服

大柴胡湯治疹瘡大便秘結發熱身痛

柴胡三分　黄芩三分　赤芍三分　枳實三分　大黄五分酒製

薑一片水煎温服

前胡枳殼湯治疹瘡大便秘結腹脹氣喘

前胡二分　枳殼二分麩炒　大黄五分酒煨　炙草二分　赤茯苓二分

水煎空心温服

黄芩芍藥湯治疹後赤白痢

黄芩五分炒　白芍五分酒炒　炙草三分

水煎空心温服如腹痛加麩炒枳殼三分純下血加薑炒黄連三分當歸尾三分口乾加烏梅半個

犀角化毒丸治疹後餘毒作熱口舌生瘡牙根出血流涎作穢或生瘡癤等症

犀角五錢錯　防風五錢　荆芥二錢半　連翹七分　生地七分

當歸七分　黄芩五錢　桔梗五錢　白芍五錢　甘草三錢

牛旁子七分炒　南薄荷葉五錢

共爲細末煉蜜爲丸如棗大每服一丸燈心竹葉煎湯下或丸如黍粒大用數十丸下亦可

East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

升麻葛根湯　導赤散　解毒湯　犀角地黃湯

立效散　四苓散俱見前痘症門　附驗方

小兒疹不出

三春柳五錢一名觀音柳

水煎湯去渣候半温用芫荽蘸擦即出神效無比乳母及兒並可煎湯飲之若洗時切勿塗其頭面勿夜間洗蓋疹晝發而夜斂也

治疹不出旋出旋回咳嗽喘兼鼻不下方

升麻五分　葛根一錢　柴胡一錢　黃芩一錢　元參八分

麥冬一錢去心　連翹八分去心　生地一錢　花粉八分　甘草五分

桑白皮八分　荊芥穗八分

水二中半煎七分温服

化毒散

牛黃二分　珍珠四分生研　冰片一分　黃連一錢　雄黃一錢

赤芍錢半　花粉二分　甘草七分　乳香一錢去油　沒藥一錢去油

大黃炒二錢生二錢　貝母一錢

共爲細末用芝蔴油三兩真鉛粉一兩二錢蜂蠟三錢熬嫩膏黃黑栗殼色爲度待冷將化毒散和於膏內貼一切攢簇怪痘腫毒疔瘡並治一切惡瘡惡毒

補中益氣丸

黃芪一錢　党參一錢　當歸七分　白朮七分土炒　陳皮五分

炙草七分　柴胡三分　升麻三分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

水煎溫服

治痘咽喉作瘡者

人參一錢　桔梗一錢　橘紅一錢　貝母一錢　花粉一錢

五味七分　枇杷葉二分

人乳一茶中煎半中溫服渣再煎溫服

治痘瘡

乳香　沒藥　輕粉　廬干石火煅

治痘後眼疾

金麥即狼尾草子　輕粉等分

右爲末左眼吹右耳右眼吹左耳

神功散治痘毒初起敷之可消

黃栢二錢炒爲末　草烏二錢生爲末　血竭一錢爲末

以漱口水調敷腫處常以漱口水潤之

治走馬皮疳各樣疳瘡

八寶一錢　金丹一分

用蠟油上或吹上

治產後諸病

鰾二兩　熟大黃二兩　薑蚕二兩酒洗去嘴　乾薑二兩　半夏二兩

共爲細末每服五錢用黃酒送下避風見汗

治產後眼黑敗血不下

甘草　枸杞根　宣毛參

水煎服見汗

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治月間病

用滑皮炒爲灰每服三錢黃酒送下

治經閉奇方

細茶七錢　小棗七枚燒存性　核桃仁七個　百草霜一錢

酒煎服連用三付即效

治婦女乾勞

生蒲黃三錢　乾漆三錢炒

爲末用紅花酒煎湯送下立效

治吹乳方

用本人頭油加官粉丸三丸黃酒送下見汗即愈

又方

用鹿角燒灰黃酒送下見汗即愈

治乳汁不下方

用三稜三個水二碗煎一中熱洗乳乳即下

治難產方

當歸一兩　川芎一兩　龜板一個酥炙　產婦頭髮一撮洗去油泥燒存性

爲末每服三錢水一中半煎服

又陰寒效方

胡椒　白礬　紅蒜　雞子清　薑　黃丹

共搗成膏貼臍上即愈

治破傷風

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

水膠三錢燒灰酒送下

治衄血不止

麥冬五錢生地五錢水煎服立止

治肺熱咳嗽

沙參五錢水煎服神效

治勞傷

山藥五兩 藕五兩 蜜五兩 鍋內頓熟熱溫服

治無名腫毒

白凡雞子清調貼上即愈

蟬殼明目散 治眼目風腫生翳膜等症忌熱麵炒烹豆醋醬等物

蟬殼一兩 黃連一兩 白朮一兩土炒 蒼朮一兩 菊花一兩

地骨皮一兩 牡丹皮一兩 龍胆草五錢 甜瓜子半升

共爲細末每服一錢半煎荊芥湯送下食後時臨卧時服

治大便便血真正良方

阿膠二錢 椿白皮一兩爲末

將膠頓開入椿白皮末調勻丸如綠豆大每付三十丸米湯送下

治噎疾

雞不匙五個 夫曲二兩

俱炒乾爲七丸每夜晚服一丸滾白水送下空心溫服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三聖丸 治瘧疾不拘遠近

川山甲 一兩湯浸透取甲剉碎熱灰漫火焙令焦黃色 常山 一兩雞骨樣 椰子 一兩雞心樣

薄剉晒乾爲末糯米糊爲丸如綠豆大黃丹爲衣每付三十丸未發前隔晚用酒空心服重者吃二付

又方

黑礬白麵點水爲丸塞鼻空男左女右在陰不見陽

又方

酸梅二個大棗二個滚白水送下見汗即愈

八寶散 治一切瘡生肌

珍珠 一錢 血竭 五分 没藥 二錢去油 乳香 二錢去油 輕粉 一分

氷片 二分 象牙 五分 兒茶 二錢

共爲細末治漏棗肉爲丸治瘡吹敷皆可

治瘡症良方

麩子炒熱好醋蒸了捲在布內圍在腰間放在小腹上見汗方好

又方

將大塩炒極熱以布包裹放在小腹上塩冷即換熱塩極效

治傷寒方

黑豆 一百零八個 火硝 三分 白礬 三分 胡椒 二十七個

黃丹 三錢 葱鬚 三個

共搗爛爲丸手拿男左女右

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

蒙石散

青蒙石火硝火燒一處爲末薄荷湯送下

治咳喘急

陳皮一錢　半夏一錢　茯苓一錢　甘草五分　黃芩一錢

桔梗八分　石膏二錢煅　麻黃五分　枳殼一錢

薑三片葱白二寸水煎溫服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library