PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

C83/744
V.2

痘疹經驗集下卷卷一目錄

面部吉凶圖　十二經絡
驗出痘之由　看痘法
一日至三日看法　四日至六日看法
七日至九日看法　十日至十二日看法
首尾看法　惡症不治訣
看痘訣　痘形面圖說
部位論　異痘四種
胭脂塗法　油胭脂法
升天散　二抱鼻
三鎖口　四鎖項

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腎經吉凶辨　活血散
水楊柳湯　又詳附異痘三十五症
陶痘　蛇皮
麩皮　壓黎
鐵葉　蚊咬
蚕跡　蚕佈
覆釜　垂珠
拓腮　破黄
板黄　白虎唇
鵝口　蟢窠
蛛蛛　通幽散
泡母　四聖膏
鎖喉　萍痕
揷臂　鋪胸
駢脇　圍臍
毡背　掛腿
雙鎖口　單鎖口
外鎖口　魚嗌嘴
鵝頭　舌尖黑點
鱗坐　青遮口角
絶穀　治痘雜症十五種
夾班丹　元參升麻湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

夾麻疹　倒靨
痘癢　肉脹
參歸湯　發疔
四聖膏　痘癰
大連翹飲　三痘散
臭爛　生肌散
衄血　髮灰散
清肺湯　水泡
口瘡　清上飲
參麥清補湯　赴筵散
失音　千金內托散

喉腫　利喉湯
玉鎖匙　嗌水
目疾　清毒撥雲湯
又治痘後障翳　防小兒痘疹入目

East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

面部吉凶之圖

三五相連恐不吉
四六排牽定凶愁
一二上下皆吉兆
雙單挾處不須憂
此古形圖也
若能預治猶
可轉凶爲吉

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

十二經絡

手太陽小腸　足太陽膀胱　手太陰肺　足太陰脾

手少陽三焦　足少陽胆　手少陰心　足少陰腎

手陽明大腸　足陽明胃　手厥陰胞絡　足厥陰肝

痘疹經驗集下卷卷一

古桃韓文博配坤氏輯　元孫雲綺校字

驗出痘之由

呵欠頓悶煩燥口渴卧而驚悸手足稍冷面燥腮赤身似戰動重則譫語作搐口舌燥絞舌咬唇舌舒昏沉不省人事又發熱一日至三日睡時多驚醒時多戰焦燥啼哭見此數者必爲出痘無疑用藥即將水飛硃砂五分併以升解散去升麻徐服一劑如大便泄出硃砂有痰涎之狀其毒解矣而痘出必快

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

看痘法

初必先以紅帖疊爲紙撚香油浸燃之斜照膚內看其虛實稀稠

一日至三日看法

此時心氣用事用藥宜清心勻氣利小水帶發散解豆毒至兩日之後急求退熱退至三日須望嚏噴早來使毒盡發皮膚之上頭面稀眼無者輕亦有稠多而顆粒明朗色道鮮明者吉雖用藥不過三五劑若熱兩日出者其痘較前多一倍藥須多服更審壯弱施治若熱一日或一日半出者凶多吉少但亦看色道如何如不赤不燥聲音清曉無咳嗽身熱早退急速用藥調理若遂熱遂出其症凶危雖用藥神治不能收功

亦有初熱即帶驚悸不省人事者俗名曰抽痳此症多由驚嚇而得治方當祛風鎮驚理痰平肝解毒爲要

四日至六日看法

此時肝氣用事用藥宜升提解毒平肝養氣和血若發熱三日出者此時肥滿光潤不必服藥若一日一日半或二日熱出者至此亦當起發如欠充滿頂陷窩須急用藥治之毒盛則升提解毒如虛則調和氣血若兼深赤色無光澤有痰嗽有喘乃火毒太盛施治凶多吉少

七日至九日看法

此時肺氣用事正灌膿漿根下紅線緊緊附載色道光澤

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

如珠硬手聲音洪亮此乃薰蒸灌漿之兆飲食如常大便固秘不必服藥須時常隄防若忽然腹鳴撒惡便頻夜煩不睡作痒聲音漸軟須用溫中養氣之劑調理如大補湯白朮散十宣散俱可選用然亦要看毒之散否如所瀉有青紫紅黑等色膿痰皮痂等物乃毒從便出亦不足畏不必用大補固脾以散毒氣停滯仍宜活血消毒

十日至十二日看法

此時脾氣用事若飲食如常收痂如常不須服藥凡有別症見後隨症調理

首尾看法

痘首尾十四日爲完其所以成就者乃在五六七日間使氣盈血附毒化成膿可保萬全倘氣陷血衰毒內伏不成漿者不治

或氣離血散不能制毒而外剝則有變壞之症間有收靨後忽而斃者以毒未出也

大抵五六七日之際痘之虛實要辨毒之輕重又或在於何經要明然後用藥心有主宰或爲匀和氣血或爲解散汗下庶鮮遺悔

惡症不治訣

初出頂陷連肉紅遲至九日一塌空又如血點帶紫色痂症死在六日中發痂黑者在朝夕痂青頂刻去匆匆無膿痒塌期二日不治腰痛及高脚痘根密麻如囚困舌卷囊

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

縮命當終紫泡刺出黑血死飲食挫喉症亦凶難療面腫痘不腫青紫色陷痘無膿二便滑利下腸垢更有吐瀉出蛔虫頭溫足冷渴飲水痘先驚後藥無功氣促泄瀉吐不止目閉無魂毒已攻聲啞或因叫與哭痘色不好也須終有腫氣急亦不治即灌膿滿亦傷風毒滿咽喉嗽失音咬牙時復戰無停身溫腹脹多痰喘煩燥無寧命必傾難治痘瘡一片白不思飲食昏沉沉賊痘灌膿醫不識誰知毒自內攻心灰白痘中疔決有遲穿筋骨去幽冥此痘莫勞虛用藥醫家詳察要分明

看痘訣

天庭太陽要明亮此處總多亦無傷二部若是色慘暗十個孩兒九個亡喉吻之中有痘多若多黑陷死難挪飲食挫喉如水簇七朝端的夢南柯舌尖一穴統心經痘毒多攻紫血淋若黃若白黑疔現此兒三日見閻君面上高處是諸陽痘出紅黃少者良若見鋪氈蚕種樣如何救得命延長死在九朝十二日免勞服藥并燒香

痘形面圖說

出痘要知吉凶須將部倍清詳如從腮頰及承漿口耳鼻邊先放此處俱當為吉其他正額堪防天庭方廣兩眉眶切忌如丹模樣年壽山根尤要緊紅光吉兆黯青殃

部位論

諸陽皆聚於首吉凶善惡尤易見也額屬心火如印堂之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

上髮際以下橫兩日月角位先見紅點先作漿先結靨者此惡候也蓋心爲君主毒發於心故先見於其位君危則十二官皆危其死速矣左臉屬肝木右臉屬肺金如面臉先見紅點磊落者吉如相連作塊其肉腫硬者凶蓋肝藏魂肺藏魄生意既絕魂魄相離故不治也顴屬腎承漿橫抵兩頤先見紅點先發先靨者吉此位雖屬腎然三陰三陽之脉皆聚於此陰陽和故可治也鼻屬脾土若準頭先出先靨者凶蓋脾屬土四臟稟命於脾毒發於脾土敗則四臟相隨而敗故綿延日久而後斃也腎之竅在耳又云心開竅於耳心腎皆少陰君火也又少陽相火之脉行耳前后凡耳輪先見紅點者凶蓋君相二火用事燔灼之熱難以撲滅也惟口唇四圍先出先起先靨者大吉蓋陽明之起脉挾口環唇胃與大腸主之無物不受故也

異痘四種

一蒙頭頭乃諸陽之會若痘出各處稀疎而頭額獨多者謂之蒙頭急用胭脂塗方若痘有半漿形稍尖圓而此處尚平者升天散治之倘治失其時諸陽獨亢精華自萎救無及矣

愚意用銀針根下微挑見血先上以雄黃後以油胭脂敷之

胭脂塗法

先以升麻一味煎濃汁去渣却用胭脂於湯內揉出紅汁

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Library Gest Collection

就以本綿蘇湯於痘輕拭之胭脂乃紅花膏所成取其能活血敗毒也加雄黃赤更妙如瘡不起熱拭之亦可

油胭脂法

全當歸二錢生 赤芍一錢 紫草一錢 紅花一錢 蘇木一錢 紅麻子仁四個 防風錢半 牛旁一錢 甘草一錢 血竭一錢

香油三兩將前藥煮焦去滓入黃蠟一兩任用

升天散

人參 白朮 生黃芪 甘草 當歸 陳皮 山查 羊藿 肉桂 穿山甲 木香 川芎

水煎服

二抱鼻

面上各處俱稀而鼻梁左右蜜如蚕種者名曰抱鼻此毒聚於脾胃也其症甚危當以胭脂塗方以求生愚意亦當以油胭脂敷之

三鎖口

面上俱稀而口角有一黑痘較諸痘獨大者名單鎖口若兩邊各有一粒名雙鎖口皆惡症也俱宜急以銀針挑破以雄黃點之官粉亦可不可令此痘先長而先灌也

四鎖項

頸項者咽喉之管束也咽乃胃脘水穀之道路主納而不出喉胃脘呼吸之門戶主出而不納頸項者又陰陽之道路也三陽之脉自頸而上三陰之脉自頸而還此處貴稀

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

少若各處踈朗纏項而出者獨稠密謂之鎖項宜急服甘桔湯加元參山豆根以防咽喉腫塞倘治失其時必至廢其管束阻其道路音啞水嗆壅塞而斃矣如痘初出有此症即用甘桔等藥水煎不時服之直至灌漿而止總有他症服藥亦不可間此

腎經吉凶辨

腎經見標與變黑歸腎諸書皆言不治者蓋痘屬火腎屬水水來尅火故多言不治然或死中求活相其機而治之早亦間或有生者遇兒之虛弱者難治其壯盛者於未起脹色黑而倒伏者用治血散以踈其滯加麝香以透其竅於已起脹色黑而倒陷者用活血散加川山甲以逐其毒二症用藥後皆以水楊柳湯洗之亦有不致壞事者然則治痘當以意度其理不可窒泥以爲逆概棄之而不治也

活血散

歸尾　赤芍　紫草　川芎　紅花各五分　血竭一錢　木香二錢煨

右爲細末每五歲者服一錢十歲以上服二錢黃酒下

愚意服上藥之後仍宜調理湯藥相機而治爲妥

水楊柳湯 洗痘瘡最妙

水楊柳生於溪邊細小叢生者是也亦有用觀音柳者春冬用枝條秋夏連葉用長流水一鍋入柳在內煎七沸將三分中一分入盆內以手試之不要太熱不要太冷先要

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

服過升表藥或內托藥然後洗洗漸漸加湯洗畢抱置溫
煖處勿令見風候乾以紙撚照看若隱隱有起發之意乃
佳兆也再洗以痘起發光潤爲度若不見起發紅潤則津
液枯矣不必再洗

又詳附異痘三十五痘

悶痘

悶痘初發一二日二日合閉頭後仰脚後抽角弓反張全
無痘形以紙撚照毛孔中微有針尖紅點以手按之皮中
俱粟米粒小疙瘩此痘三日不出而死不治

蛇皮

蛇皮形如蛇皮色白而峭全無痘形脾經重病不治

麩皮

麩皮形如麵麩皮色白而滯脾經危症不治

壘黍

壘黍重重疊疊如黍子細小或色白或色紫脾經逆症不
治

鉄葉

鉄葉形如火龍皮色紫而燥腎經症也後必乾枯焦黑與
鉄葉相似不治

蚊唆

蚊唆形如蚊唆此因六經火熾正不勝邪毒火煎熬氣血
於毛孔內滲出血點氣耗血虧不治

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蚤跡

蚤跡形似蚤跡此由毒太盛元氣不能任毒毒火逼血於皮膚紅如熱天痱子氣離血散不治

蚕佈

蚕佈形似初出蚕子蜜而排佈脾經逆症不治

覆釜

覆釜頭上周圍俱是一片不分顆粒如釜覆其上不治

垂珠

垂珠耳輪上下連綿還轉不斷形如串珠垂耳腎經危症不治

托腮

托腮痘出兩腮顴稠密者雖是腎經部位乃肝經之症也色紅有顆粒而肥潤者可治色滯而頂陷者不治

破黃

破黃人中一粒比衆痘覺大痘雖稀朗轉經之後轉發瀉而死愚意痘初出時見人中有痘者即當以針挑少出血即用胭脂塗之

板黃

板黃兩唇腫硬形似薑黃是見脾土正色亦不治之症將核桃火燒黑取出去殼將仁研碎以夏布包之擰油以油塗其唇轉黃爲紅亦或能生

予嘗用銀針刺出血以胭脂塗之效但亦服除脾火解毒

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之劑

白虎唇

白虎唇口兩旁出二大痘號爲白虎最是難當八九日定主餓死

愚意亦當針深刺毒血外敷雄黃油胭脂大服解毒之劑或可望生

鵞口

鵞口痘正起發時口唇痘先熱內帶黃漿此最惡之症乃脾經火也待諸痘成漿則此痘已靨唇皮揭脫漸變嘔吐不可救矣

予嘗見此痘於未熱之先以針去其殼中毒水根下毒血以雄黃胭脂敷之而愈　內服藿香枝仁石膏甘草防風牛旁黃連黃芩之數

蟢窠

蟢窠不拘頭手足之處痘出一塊一塊中有一大粒外附羣小名曰蟢窠若一二處有內服通幽散外用針挑胭脂塗之若遍身皆有難治

蛷蛛

蛷蛛不拘頭身手足之處痘出一片一片中無一大粒名曰蛷蛛若一二處有亦同蟢窠治法若關節有亦難治

通幽散

當歸　紅花　生地　熟地　桃仁　升麻　甘草

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

麻仁等分

水煎服

泡母

泡母痘出於手足見一二粒比羣痘獨覺白大按之軟而無根乃水泡之母也用針挑破出其清水以四聖膏敷之紅活起發或可望生按之硬而有根者乃白疔也用銀針撥破其根令兒父母嚙水口吸其毒吐出以水漱口外用四聖膏敷之紅點起發則生矣

四聖膏

珍珠　碗豆俱炒存性　髮灰等分　氷片半分

用油胭脂調成膏

鎖喉

鎖喉痘出喉上一條如帽帶樣連綿不斷喉內腫硬難飲水米不下乃肺毒壅塞不治

萍痕

萍痕顆大而頭多初出形如水中之藻後必變紫萍色萍藻乃無根之物如犯此者發痒抓去無痘而死

插臂

插臂痘出左右兩臂如手掌大碎小一片臂乃兩顴所屬亦腎經症也總治之而生亦爲僥倖

鋪胸

鋪胸痘出胸前稠密細小色紅而豔如鋪其上亦心經火

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

毒所發即治之而生乃兒命延長

駢脇

駢脇痘出左右兩脇通紅一片如燒餅大上面痘似熟天
瘡子亦是死症

圍臍

圍臍痘出肚臍中一大粒外面小痘圍之經云一將坐中
軍萬夫皆失色乃不治之症

毡背

毡背痘出背後稠密碎小色紅而赤與毡片相似乃鼻柱
所屬胃經之火也或治之而愈亦命不該死

掛腿

掛腿痘出左右兩腿稠密碎小紅赤一片如獐身寬長腿
乃兩頤所屬三焦經之毒也亦爲難治

雙鎖口

雙鎖口兩嘴唇腫厚按之如鉄硬不轉經而死

單鎖口

單鎖口在嘴唇上連綿不斷周圍有者定主餓死少如間
斷猶或可治

外鎖口

外鎖口在唇之外與單鎖唇無異

魚嘔嘴

魚嘔嘴如魚啅露嘔嘴有聲唇上略見火痕者方有此症

East Asia Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

乃脾經火也若唇皮不破方可治如已破及傷肉者不治

鵞頭

鵞頭痘初長眉頭間即腫似鵞頭乃心經火盛亦危而難治

舌尖黑點

舌尖黑點舌尖先見一黑點乃心經火毒之疔也三日死症不治

鱗坐

鱗坐痘出骻稠密色紫急以針挑胭脂塗失治必硬如魚鱗不成漿而死

青遮口角

青遮口角唇外四圍乃脾土經絡青色屬木木能尅土人以脾胃爲主脾胃受尅焉能得生不治

絕穀

絕穀痘出穀道周圍密排一周失治必至上下不通絕食而亡

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹經驗集下卷卷二

古桃韓文博配坤氏輯　元孫雲綺校字

治痘雜症十五種

夾班丹

痘出三四之內有夾班而出者有紅點而無顆粒多隨出而隨沒又有夾丹而出者紅赤成片如雲頭突起此皆毒火浮遊散漫于皮膚總屬表熱不必驚惶直服元參升麻湯一二劑其遊火自退

元參升麻湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

元參一錢 升麻一錢 甘草八分 防風八分 荆芥八分
牛旁子一錢
水煎服
夾麻疹
亦服上方加桔梗黃芩水煎服之
倒靨
痘初見一二日細小四五日漸大頂平六七日漸開闊頂
愈平陷色白形如豆壳此氣血大虛而漿不行也
宜用參歸鹿茸湯加官桂白朮川芎各八分 木香三
分 鹿茸三錢酒塗炙去毛勿用酥炙 黃芪錢半 當歸錢半 炙草六
分 人參錢二分

薑一片元肉三個同水煎入黃酒一杯溫服
如無鹿茸以人乳一中好酒一中代之
痘癢
自見形至灌膿收結皆有此症治之外用荆芥穗以薄帛
包裹木炭火上燎熱向痒點之立止再用長袖絹衣縛其
袖口使不得抓破爲妙或絹袋裹手亦可有穢氣觸犯而
痒者急燒蒼朮紅棗以避之
肉脹
痘出齊後有面目腫而痘不腫脹者此氣血虛弱不能拘
攝痘毒故散漫妄行于肉分也此爲危症宜用參歸大補
湯補之則腫自消矣

East Asian Library and the Gest Library
DO NOT COPY
Princeton University

參歸湯

人參　當歸　黃芪各錢二分　川芎　桔梗　山查

炙草各八分　防風　白芷　厚朴薑炒　紫草茸各六分

木香三分

薑三片

發疔

痘出齊數日後其間有紫黑腫硬獨大而無根暈者乃是痘疔表實熱毒凝聚故也宜用四聖膏或拔毒散點之

四聖膏

珍珠　碗豆俱燒存性　髮灰等分　氷片半分

共爲細末用時以油胭脂調成膏用銀針挑破痘疔敷之

拔毒散

雄黃末以胭脂水調點頂頭上

痘癰

痘毒發於肌膚血氣不能悉運化以成膿結痂則有蘊熱不散赤腫而成癰者又有不虛悞服補藥不寒悞服熱藥所致者俱宜內服大連翹飲外敷三豆散末內外夾功務紅腫退去爲妙又有作熱作腫而不卽愈者亦服連翹飲

大連翹飲

連翹　柴胡　當歸　赤芍　防風　牛旁各八分

木通　黃芩酒炒　黃連炒　滑石　甘草　蟬退

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

枝子酒炒　車前子　荊芥各五分　大黃錢半如大便溏去此味

水煎服

三豆散

黑豆　赤小豆　綠豆各一中用醋浸脹搗研濃漿以羽翎掃之

臭爛

痘收結後或手足等處仍作熱臭爛出膿水不止者用生肌散搽之

生肌散

地骨皮　黃連炒　黃柏　五倍子炒　生甘草等分

共爲細末

又有餘毒流注各處出清水者用綿繭散搽之

綿繭散用出過蛾繭不拘多少以生礬末填入內燒令汁盡灰研爲細末搽之

衄血

痘有鼻中衄血者毒氣上衝於肺也此乃毒氣外洩亦非惡候不拘已出未出齊俱宜髮灰散治之或清肺飲治之尚有可救其餘諸失血皆死症也小便失血更無救

髮灰散　此方極妙諸血症皆可用

用壯年無病男婦亂髮以水洗淨油氣焙乾用新礶一個將髮填滿以淨瓦片蓋之塩泥封固用炭火圍礶一半煆一柱香取出研爲細末每用二分入童便七分酒三分調服立止輕者只用髮灰吹鼻中亦止

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

清肺湯

花粉　麥冬　甘草　桔梗　當歸　生白芍

黃芩　丹皮　知母

水煎服有髮灰加一錢尤妙

水泡

痘有水泡無膿者乃氣虛血少不能成膿也用參歸鹿茸湯峻補之自成膿矣如膿泡與水泡相半者無大妨若十分中有二三分膿泡者猶可望生惟渾身水泡則危矣然或胃氣好飲食如常亦可望生俱妨發癍耳必多服調養氣解毒之劑

口瘡

痘有舌生瘡者或是熱毒或是虛火當以痘色辨之痘色紅紫湧盛者熱毒也宜服清上飲痘色淡白者虛火也宜服清補湯外用赴筵散搽之

清上飲

薄荷　防風　甘草各四分　粉葛　連翹　桔梗

黃芩　黃連　花粉　麥冬　牛旁各六分炒

水煎服

參麥清補湯此方兼治長年兒女嗜欲久開氣血既耗虛熱不能成漿結痂者

人參　麥冬　花粉　生黃芪　牛旁　山查

前胡　甘草　白芍　赤芍　當歸　紅花　川芎

生地　桔梗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

生薑一片元肉三枚水煎服

赴筵散

蘇薄荷　黃柏等分　青黛少許

共爲細末搽之

失音

痘有音啞者當細辨痘色以分順逆若痘色紅有漿者此喉中有痘也不必治痘靨而聲自喨矣若色灰白虛陷而啞者乃血氣虛弱逆毒不出毒留於肺乃危症也或用參歸鹿茸湯或千金內托散主之

千金內托

人參　當歸　黃芪　白芍炒　川芎　官桂　炙草

山查　木香　防風　白芷　厚朴

水煎服

喉腫

痘有咽喉腫者首尾俱用利喉湯服之外用玉鎖匙以筆管吹之

利喉湯

山豆根　麥冬　元參　桔梗　牛旁子　防風

甘草

水煎服

玉鎖匙

硼砂一錢　朴硝五分　姜蚕二個　冰片少許

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

共爲細末

嗌水

痘有嗌水者順逆不同須當分辨若灌膿時嗌水者乃喉中有痘也不必治若未行漿而嗌水乃毒氣壅塞其喉必痛亦宜內服利喉湯外吹玉鎖匙

目疾

痘後有毒氣入目赤腫而痛不開者有翳膜遮蔽不能視者須用清毒撥雲湯從容調治斷無不愈切不可用涼藥點洗以致失明良足惜也

清毒撥雲湯

黃連酒炒 白蒺藜炒去刺 甘草 當歸酒炒 花粉酒蒸

牛旁炒搗 草決明 桔梗各五分 甘菊 蜜蒙花

川木賊 谷精草 粉葛各四分 川芎 羌活 防風

柴胡 生地酒洗 薄荷 枝子各三分酒炒

水煎服食後服大便秘加酒大黃錢半微利之服一二劑後仍去之輕者十數劑可愈重者數十付始可獲效

治痘後障翳

蛇退一條皂角水洗焙乾 天花粉五分

共爲末以羊肝破開夾藥米泔水煮食之甚效

防小兒痘疹入目

以白芥子爲末水調塗足心可以引毒歸下

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

藥性解

人參味甘大補元氣止渴生津安神健脉治痘托裏排膿

黄芪性温收汗固表托瘡生肌瘡瘍生用補虛蜜水炒用

白朮甘温健脾强胃止瀉除濕治痘發泡漿溢者多加及起脹貫膿之時不可用爲其耗津故也米泔水洗陳壁土炒用

茯苓味淡滲濕利竅化痰利水補中益氣治痘熱瀉小便赤澁

甘草甘温調和諸藥炙則温中生則瀉火

當歸甘温養血行血補心扶虛益損逐瘀生新

川芎味辛氣温能助清氣而利頭目引參芪以補元氣治氣虛血滯

白芍酸寒能收能補瀉利腹痛

赤芍澁寒能瀉能散破血通經止痛解熱毒

生地微苦寒無毒能行血解熱用酒浸洗

熟地微温濕腎補血益髓填精烏鬚黑髮忌鐵器

麥冬甘寒解渴祛煩補心清肺虛熱自安

天冬甘寒治肺氣痿癰消痰止嗽喘熱有功

黄連味苦無毒能瀉心腎二經之邪熱厚腸胃而涼血止痢或酒炒或薑汁炒

黄芩苦寒枯瀉肺火能清大腸而濕陰兼退膀胱燥熱或生用或酒炒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

黃栢苦寒降火濕陰骨蒸濕熱下血堪任或生或酒或蜜或童便或乳炒

梔子性寒解鬱降煩吐衄胃痛大小便生用清三焦實火炒黑清上焦鬱熱又能清屈曲之火

連翹寒苦能消瘧毒氣聚血凝濕熱堪逐

大黃苦寒實熱積聚蠲痰潤燥疏通便閉

石羔大寒能瀉胃火發渴頭疼解肌立妥

滑石沉寒滑能利竅解渴除煩濕熱可療研爛以水飛過

知母味苦能除熱渴骨蒸有汗痰欬皆除去皮毛生用瀉胃火酒炒瀉腎火

貝母微寒止嗽化痰潤心肺開鬱除煩熱湯泡去心用

柴胡味苦能瀉肝火寒熱往來瘧疾均可療治

前胡微寒寧嗽化痰寒熱頭疼痞悶能安 軟者佳

升麻性寒清胃解毒升提下陷牙痛可止 去鬚青綠者佳

桔梗味苦療咽喉痛腫載藥上升開胸利壅 去鬚潔白者佳

葛根味甘傷風發散溫瘧往來止渴解酒 粉白者佳

紫蘇味辛風寒發表梗下諸氣消除脹滿 葉背面紫者佳

麻黃味辛解表出汗身熱頭痛風寒發散 去根節

薄荷味辛最清頭目祛風化痰骨蒸宜服

防風甘溫能除頭暈骨節痺疼諸風口噤

荊芥味辛能清頭目表汗祛風治瘡消瘀用穗

細辛辛溫少陰頭痛利竅通關風濕皆用行血安五臟明

目

羌活微温祛風除濕身痛頭疼舒筋活骨明目

獨活甘苦頸項難舒兩足濕痺諸風能除

白芷辛温陽明頭痛風熱瘙痒排膿通用

藁本氣温除頭頂巔寒濕可祛風邪可屏

香附味甘快風開鬱止痛調經更消宿食忌鉄器

烏藥辛温心腹脹痛小便滑數順氣通用

枳實味苦消食除痞破積化痰沖墻倒壁如鵞眼色黑陳者佳麩炒

枳殼微温快氣寬腸胸中氣結去脹麩炒用

白蔻辛温能去瘴翳益氣調元止嘔和胃去殼取仁用

青皮苦寒能攻氣滯削堅平肝安胃下食

陳皮甘温順氣寬膈留白和胃消痰去白

蒼朮甘温健脾燥濕發汗寬中更祛瘴疫用米泔水浸透搓去黑皮切片炒乾

厚朴苦温消脹泄滿痰氣瀉痢大有功效薑汁炒

南星性熱能治風痰破傷强直風搐自安薑汁泡切用

半夏味辛健脾燥温痰蹶頭疼嗽嘔堪入薑汁泡製

霍香辛温能止嘔吐發散風寒霍亂爲主

檳榔辛温破氣殺虫祛痰逐水專除厚重

腹皮微温能下隔氣安胃健脾浮腫消去

香薷味辛傷暑便澁霍亂水腫除煩解熱陳久者佳

扁豆微涼轉筋吐瀉下氣和中能化酒毒微炒調脾煖胃通利三焦降濁升清止渴止瀉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

猪苓味淡利水通淋消腫除濕多服損腎 削去黑切片

澤瀉苦寒消腫止渴除濕通淋陰汗自遏 去毛

木通性寒小腸熱閉利竅通經最能去滯 去皮切片

車前子寒溺澁眼赤小便能通大便能實

地骨皮寒解肌强陰涼血 去皮

丹皮苦寒破血通經血分有熱無汗蒸骨 去骨

沙參味苦消腫排膿益肝益肺退熱除風

龍胆苦寒能消肝經熱煩療眼赤腫下焦濕腫

防已氣寒消癰散腫兼治風濕脚痛熱積膀胱

地榆沉寒血熱堪用血痢帶崩金瘡止痛如虛寒水瀉宜忌

茯神補心善鎮驚悸恍惚健忘兼除怒恙 去皮木

遠志氣溫能豁驚悸安鎮心令人人多記 甘草湯浸一宿去骨晒乾

乾薑味辛表解風寒炮苦逐冷虛熱尤甚

三稜味苦利血消癖氣滯作痛虛者當忌 去毛火煨切片醋炒

木香微溫順氣散滯和胃諸風能調行汗瀉肺

砂仁性溫養胃進食止痛安胎通經破滯

肉桂辛熱善通血脉腹疼虛寒溫補可得 不見火妊娠炒用

桂枝小便橫行手臂止汗舒筋治手足痺

吳茱萸辛熱能調疝氣臍腹寒疼兼治酸水 去梗湯泡微炒

山查味甘消化肉食療疝催瘡消膨健胃

神曲味甘開胃進食破結逐痰調中下氣 炒黃色用

Last Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

麥芽甘溫能消宿食心腹膨脹行血散滯炒用孕婦勿服

莪朮溫苦善破痃癖止渴消瘀通經最宜去根火煨切片醋炒

蘇木甘鹹能行積血產後月經兼治撲跌

桃仁甘寒能潤大腸通經破瘀血瘕堪嘗去皮尖

鬱金味苦破血生肌血淋溺血鬱結能舒

金銀花甘療癰神效未成則散已成則潰

蟬退甘平消風定驚除熱退翳侵睛殺疳

木鱉甘寒能追瘡毒乳癰腰疼消腫最速

大力子辛能除瘡毒隱疹風熱咽疼可療

紅花辛溫最消瘀熱多則通經少則養血

百合味甘安心定胆止嗽消浮癰疽可啖

紫苑苦辛痰喘欬逆肺癰吐膿寒熱並治

蒲黃味甘逐瘀止崩炒則補血生則破血

欵花甘溫理肺消瘀肺癰喘欬補劣除煩

桑白皮甘溫止嗽定喘瀉肺火風寒新嗽生用虛勞久嗽蜜水炒用

杏仁溫苦風寒喘嗽大腸氣閉便難切忌雙仁者有毒

天花粉寒止渴祛煩排膿消毒善除熱痢

瓜蔞仁寒寧嗽化痰傷寒結胸解渴止煩去油

蜜蒙花甘能明目虛翳青育服之最效酒洗蒸過晒乾

菊花味甘除熱祛風頭暈眼赤收淚殊功家圍內味甘黃小者佳

木賊味甘益肝退翳止經消積

決明子甘能祛肺熱目疼收淚仍止鼻血

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

山豆根苦療咽痛腫敷蛇虫傷可救急用

益母草甘女科爲主產後胎前生新去瘀

紫草茸苦寒能通九竅利水消膨痘疹要藥

穀精草辛牙齒風痛口瘡咽痺眼翳通用

王不留行調經催產除風乳癰當啖即剪金子花取酒蒸火焙乾

京墨味辛吐衄下血產後崩中止血甚捷

巴豆辛熱除胃寒積破癥消痰通痢反牽牛煨用

史君子甘溫消疳消濁瀉痢諸虫可除細火煨去殼取仁

阿膠甘溫止欬膿血吐衄胎崩虛羸可啜要金井者佳蛤粉炒成珠

白礬味酸化痰解毒火煨名枯礬

五倍苦酸療齒疳䘌痔癬瘡膿兼除風熱

通草味甘善治膀胱消癰散腫能翳乳房

枸杞甘溫添精補髓明目祛風陰起陽興

何首烏甘添精種子黑髮悅顏長生

無異甘金瘡折損止瘀止痛生肌有準

牛膝味苦除熱痺痿腰膝酸疼小便淋瀝去芦酒洗

巴戟辛苦大補虛損精滑夢遺强筋固本肉厚連珠者佳酒浸過宿去骨

牡蠣微寒澁精止汗帶崩脇痛老痰祛散左顧大者佳火煅紅研

龍骨味甘夢遺精泄崩帶腸癰驚癇風熱火煅

鹿茸甘溫益氣滋陰泄精尿血崩帶堪用燎去毛或酒或酥炙令脆

鹿角膠溫吐衄虛羸跌撲損傷崩帶堪用

硃砂味甘鎮心養神祛邪殺鬼定魄安魂生飼無害鍊服殺人

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

天竺黃甘急漫驚風鎮心解熱毆邪有功出天竺國

麝香辛暖善通關竅伐鬼安驚解毒甚妙不見火用

乳香辛苦療諸惡瘡生肌止痛心腹尤良去砂石用燈心同研

沒藥溫平治瘡止痛跌打損傷破血通用

生黃味苦大治風痰定魄安魂驚癇靈丹

血竭味鹹跌撲損傷惡毒瘡瘡破血有準

茯實味甘能益精氣腰膝酸疼皆主溫痺

龍眼味甘歸脾益智健忘怔忡聰明廣記

連鬚味甘益腎烏鬚澁精固髓悅顏補虛

陳倉穀米調和脾胃能止瀉痢解渴除煩

竹葉味甘退熱安眠化痰定喘止渴消煩

竹瀝味甘陰虛痰火汗熱渴煩效如開鎖

竹茹止嘔能除寒熱胃熱欬嗽不寐安歇

燈草味甘運利小水療閉成淋濕腫爲最

艾葉溫平毆邪逐鬼漏血安胎心痛即愈

童便味涼打撲瘀血虛勞骨蒸熱嗽尤捷

丹參味苦破積調經生新去惡祛除帶崩反藜苦

五加皮寒祛痛風痺健步堅筋益精止瀝此皮浸酒輕身延年

大茴香味辛疝氣脚氣腫膀胱止嘔開胃

肉豆蔻苦辛氣溫無毒脾胃虛冷瀉痢不休功可立等治

痘咬牙寒戰須麵包火煨熱去油

五味子酸溫生津止渴久嗽虛勞金水枯竭滋肺補腎消

East Asian Library COPY Princeton University Library Gest Collection

痰

烏梅味酸除煩解渴霍瘧瀉痢止嗽勞熱收斂肺氣

澤蘭甘苦瘡腫能消打撲損傷肢體虛浮

枇杷葉理肺臟吐噦不已解酒清上布拭去毛

穿山甲毒痔癖瘡吹奶腫痛鬼魅潛藏用甲剉碎土炒成珠

蔾芦味辛最能發吐腸癖瀉痢殺虫反芍藥細辛人參砂

參元參丹參苦參党參

山藥色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足清其虛

熱固腸胃潤皮毛化痰止瀉痢

用藥加減要記

血藥用四物湯氣藥用四君子湯從來不易矣但以之治

痘則宜詳審藥性生地能涼心血熟地能膩膚痘至貫膿時用川芎助清陽以調血用當歸活血用白芍以斂血使不妄行斯漿易成矣故不敢輕用地黃以澁其血也白朮性燥能耗津液茯苓利水大能滲津痘之作膿全賴乎津可使之耗散乾枯乎故於入物湯中有時而禁地黃白朮茯苓不能常用此竊古意有試而然者識者詳之

人參黃芪俱係氣藥補藥他局方不敢多用今方內多用三錢四錢者似爲駭人蓋以痘症吉凶只在十日之內大非他症可比六日以前恐毒未盡出或不敢多用若八九日後膿期迫矣倘屬虛寒而膿不滿者不進則退勢必倒膿即難挽回非此二味何以鼓氣行血充拓內外以成起

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

死回生之功哉猶恐其力不給必多加分兩又借桂枝之力以翊贊振揚之然後膿可滿功可成也若虞其性頗滯但少加木香以匀氣用山查以解其滯氣用麥冬以清其熱氣斯受其利不受其害此豈無所試而不量虛實卽輕易妄加也哉

桂枝木香其性頗熱痘至貫膿時反加此二味何也蓋桂枝發揚大能推毒參芪借其力乃能振作以成功木香匀氣不使停滯亦宜用而用之也卽不用亦無妨

山查麥冬升麻蟬退時常用之何也蓋山查能疏利且解參芪之滯氣麥冬生津止渴且清肺火升麻主升提且清熱解毒蟬退能催發亦能止痒故常用而不禁也

紫草鼠粘乃痘中要藥貫膿時反不加何也蓋二味能行痘毒亦能作瀉故貫膿時稍禁只首尾用之

合用藥品

凡升提用升麻柴胡蟬退在面亦用川芎

凡發散解表用麻黃葛根荊芥紫蘇柴胡羌活白芷藿香連翹防風葱薑

凡解熱毒用黃連黃芩黃柏梔仁生甘草山豆根

凡補血用當歸川芎白芍紅花若貫膿時生地熟地其性滯且不宜用

凡活血行血用紫草茸紅花茜根川芎當歸桃仁

凡補氣用人參黃芪桂枝若白朮茯苓其性燥滲津貫膿

Last Digital Library DO NOT COPY Princeton University Library Collection

時且不宜用收靨時有水泡者用之再加猪苓澤瀉梔仁以滲水亦可

凡生津用麥冬五味子天冬人參解渴用葛根

凡和中用陳皮甘草亦用厚朴

凡清痰用橘紅片苓貝母瓜蔞仁天花粉在喉用前胡膈用枳實腹用枳殼

凡安心神用茯苓遠志硃砂

凡利大便用枳殼條苓麻仁桃仁大力子紫草若大黃芒硝巴豆牽牛恐太峻

凡利小便用木通梔仁車前子猪苓瞿麥澤瀉滑石

凡行痘毒用紫草茸大力子山查木香

凡止嗽用麥冬五味子桑白皮片苓橘紅桔梗

凡清利用麥冬山查梔仁木通滑石

凡清胃用桔梗麥冬大力子前胡生甘草

凡清胃用牡丹皮石膏清熱用地骨皮連翹黃柏黃芩黃連麥冬

凡清導用神麯麥芽山查香附枳實枳殼檳榔

凡去風用防風羌活獨活柴胡前胡蟬退白芷薄荷荊芥穗

凡止渴用麥冬五味葛根

凡澁藥用阿子肉豆蔻若赤石脂枯礬龍骨恐太峻

右藥品惟陳皮枳殼二味取多年者爲佳乃二陳也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

其餘品味俱宜選揀新鮮者用之以舊藥無力不能取效切不可用以悞事如藥相類者不必品品俱入只取其最要者二三味用之可也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library