PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C86/3054
v. 9

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

西吳朱惠明 著

醫不執方

夫古之醫以名魁天下皆由心通活變用藥神圓所以能濟於世今之醫多惑於方書執一偏之見所以有誤於人余雖錄古今之驗方爲初學之準繩非爲因方以治病也蓋痘有形色順逆人有虛實勇怯藥有辛溫甘苦豈得執一定之方而膠於施治者哉且曰藥不執方合宜而用業是者其可忽諸

南北異法

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

或問北方之醫治痘用凉瀉藥者多用參蓍者間或有之南方之醫治痘用溫補藥者多用凉瀉者間或有之其治異而病皆愈者何也蓋北方風氣剛勁人稟厚痘出多有餘有餘者瀉之故用凉瀉者多也南方風氣柔弱人稟薄痘出多不足不足者補之故用參蓍者多也且如痘毒壅盛雖南方亦宜解利及日久成虛而北方亦宜溫補然地勢雖有南北之分人皆在察形色辨虛實爲要非地氣所稟有厚薄之異哉可拘也

醫道存仁

醫道即佛道也緣世人況疴不起與死爲鄰故忽起慈悲大施濟渡非爲利媒也且人生天地誰無不忍見道傍赤子將墮深淵即素仇讎應不惻然傷者況命有專寄乎凡我同志當思貧窮雖岐死生則一勿沾沾射利而加意顛連重恤無告斯陰功之積於冥冥多矣

行善獲報

先正有云醫所以寄死生而無恒者不可以爲是爲蓋醫道最大醫理難精然業擅者毫不可忽而其要則尤當立心正大也視人猶己救人爲念至於爲財

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

而壞德爲利而損仁不惟爲醫家之玷而覆載所不容也可乎哉古云高低無二藥貧富一般醫若人能以此存心則皇天諒不負也或乃不究書理妄談異說嫉妬忌刻利已損人乘病危急謊求腆貺則財貨爲重軀命爲輕利有方書秘而不傳如此人者近則殃及本身遠則慮及於後天道昭彰疎而不漏亦可懼哉臨江張彦明行醫未嘗以錢帛爲輕凡有求藥期於必効一日城中火災周廻數盡烟焰中獨存其居後且子孫榮貴縣延以此見天道有彰善之報應也余刻意其事常懷戒懼之心一日醫於滙沮晝寢

問夢一神語曰汝可速歸醒而驚異遂辭歸家又夢行溪邊被一老推溺水而甦見房中火光旋繞烟氣冲天隣人喊聲徹地余祝曰自業以來未嘗以爲利而亡人之命未嘗以懈弛而喪人之生豈無陰祐其柴葦爨燄一鉢水洒之即滅衆咸曰此火厄之得解者乃天神祐汝之有醫德也余自後愈加誠心濟物又一年賃居市陌夜夢一老者曰汝今當禱上帝爲汝素有醫德旬日內宜忍耐可解余醒爲奇杜門不出被隣人强飲有座客責不禮敬嘵面辱罵者三余感夢中之言自乾而已人人以爲懦詎意其人遂患

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

疫病六日而斃他日若與抗敵禍能免乎自後益兢兢加勉邑中同道亦修醫德一日城中火災燒至彼房火燄即返而滅可見爲善者降之以祥屢屢驗矣嗟嗟天不僭差蓋有以也

戒不明理不識字行醫

夫稱醫者首軒岐至聖萬世理學文字之祖也嗣是而後苗爰擅美於陶唐倉公獨步於戰國淳于仲景爲先漢之雄元化郭開號三分之傑老師實如求藥王法開則慈門首座子豫以毒鬼著伯宗以徙瘤稱叔和察脉以演經徵宗得意而不作文摯少卿無事藥石元素自爲家法此皆一代名人醫中聖哲闡微彰著垂訓無窮者也可猗休哉其他如緩如和如苟與夫涓子秋夫彦伯之倫或著英於一國或見絶於一長不可勝紀要亦精通名理於玄黓之中妙解章句於象數之外故能緣經而爲論因病以調劑豈直讀古聖賢遺書記成方而已也若乃義理罕明篇章寡識莫辨越人之難罔諧叔和之歌僞認一二舊方遂誇登壇大將寧知君臣佐使敢爲惑世誣民竊希厚利不顧罪愆欲借醫道以肥家竟忘人命爲至重天理難昧此心何安故余謂醫者要當深研經

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

典旁搜書論潛心體認融會終始恍然有悟於古人之微妙則脉理斯精詳藥性斯明悉乃可以行於世然猶恐立意稍差不免誤人若不誦讀義理茫然必不能辨脉尙能知病以情臆度謬用古方是爲凑病豈是治病夫氣運不齊人生亦異古方新病決不相宜譬如田獵不知兎穴多發人馬空地遮圍或冀一人偶有所獲如此療病不亦疎乎假令一藥與病相當他味和同彼此相制氣勢不行安能差病祇損元氣耳是非良方不驗乃醫者之不明理學不解文也故余謂醫學以明心爲本

戒不早決安危

醫之治病也視顏色聽聲音問飲食欲惡而診脉息以參合焉安危可以立判故越人少號太子之死也曰此自當生者越人能起之耳若桓侯之疾不可以湯熨治不可以鍼石治不可以火齊治則望而却走矣今有膏肓之疾醫緩所不可爲者而世醫恐觸病家之諱覬銖錙之利求萬一之効猶豫其說含眞情而不敢吐一旦有敗必受其怨夫觸諱於前於心無怍歸怨於後咎將誰逃請畧言其凡有四弊焉一則熟察

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

其凶強言可治徼倖成功以希聲譽一則術庸識淺偏拘強愎不窺生死門徑謬分安危兩途已言不驗人受其誤一則犯病者天性驕縱調護者專事姑息補緝未完損傷更甚遂以輕而變重始云吉而終凶雖非治者之尤然亦不免被怨故醫者臨病當潛心精思決斷可否毋蹈四弊自貽厥羞景越人之高誼追醫緩之芳踪勿計功而徼利將死生爲戲弄則寧有顛倒安危錯亂順逆一時矇蔽嗤笑無窮者也

痘疹傳心錄卷之十六終

瘦樵程永培校

慈幼心傳說

夫雜症（吐瀉驚痛等症）之與痘疹常相蒙也有前乎痘而先患別症有後乎痘而他症隨之則藥餌難施拙者疑殆余用是疚心無已爲之原本而憂末所謂未痘而葆攝元根既痘而斬絕滋蔓何憚於難症之簡核而俾赤子常有完命余之傳心得爲完書也敢以爲附其無恤於補苴之誚

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

調護法

小兒初生肌膚嬌弱不可衣暖藏腑脆嫩不可乳飽暖則筋骨緩弱汗出表虛風邪易入飽則胃氣有傷乳不易化宿滯難消當薄衣背暖量乳爲佳無過不及調適中和而已凡天氣和暖之時令兒數見風日則氣血剛勁肌肉硬密譬如草木生於山澤之中久耐風寒易成合抱也若藏於重闈之內厚衣溫暖襁抱不着地氣少見風日譬如陰地草木軟脆不堪風寒稍見風日便惡風而發熱也　一小兒襁抱之間當護風池背脊凡風寒皆自此而入護之則免疾病



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一小兒氣稟純陽得陰氣易爲生長故小兒下體不衣裹帛蓋下體爲至陰得寒凉則陰易入而後純陽始和　一小兒號哭者乃泄氣之熱也況渠初生別無伎倆惟善豪哭爲强良耳故啼哭時當辨其所因不可因其哭而遽哺之以乳諺云兒哭卽兒歌不哭不僂儸　一小兒除胎生病外有四種吐瀉驚痢其病之原皆由飽暖而爲之也故曰四時欲得小兒安常要一分饑與寒但願人家依此法自然諸病不相干又曰養子須調護看承莫縱馳乳多終損胃食壅卽傷脚衾厚非爲益衣單正所宜無風頻見日寒

暑順天時

乳兒法

初生芽兒藉乳爲命未乳者血從金化而大寒兒食之肌肉充實然其體爲水若乳傷過多反從濕化濕熱相兼吐瀉之病作矣故曰乳母飲食下咽乳汁便通情欲動中乳汁便少若母爲氣鬱不合乳必滯凝令兒食之疾病立至兒哭未定遽以乳哺氣逆不消或成乳癖夏傷熱乳令兒嘔逆冬傷冷乳令兒咳利母醉而乳令兒身熱腹滿新浴而乳令兒嗽吐新房而乳令兒羸瘦懷娠而乳令兒黃瘦腹大脚軟故乳

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

母最宜謹節至若兒病服藥不效者必察乳母病因先將乳母調治子亦服之無不效矣經曰母病則子病母安則子安正此謂也　張子和嘗授人以養子之法凡食不可過傷衣不可太厚兒未坐時暫臥赤地及能坐時以鐵鈴木壺雜戲之物連以細繩置之水缸中使一沉一浮炎夏之時令坐其傍掬水弄鈴以散諸熱經曰四肢者諸陽之本手得寒水陰氣達於心中則暑熱不中乃不藥之藥也

擇乳母

乳者以其氣血化而成乳汁也立情善惡悉是血氣所生故乳母宜擇精潔純厚篤實及乳濃厚者爲佳若殘疾陋惡及乳清淡者不宜用故曰漸染之久識性一同猶如接木之造化故不可不擇也

望聞問切總論

望聞問切醫者先之古人謂望而知之之謂神望者望正面之五色看虎口三關紋色也若小兒叫怒容變而真色難觀或手弄濁物紋隱而真形難辨必須聽聲聞而知之之謂聖聞者聞其聲之清濁也或中風而迷悶或久病而昏沉或口疳咽痛而失音不得其真必須問而知之之謂工問者問其得病之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

因所欲之五味也然小兒口不能言縱稍長而語不足信詢其父母得病之由則易爲調治多有病家不肯言其致病顛末必須察脈以決諸症切而知之之謂巧切者切脈之浮沉遲數滑澁也蓋小兒骨脈未全血氣未定呼吸至數太過而脈不能察病之要必須四者參詳斯無失手否則何以察不言之疾耶

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

望

五色　青黃赤白黑也形於正面吉凶熟視評論紅心病也因風熱白肺病也寒侵黯黑腎病也痰涎聾盛形瘦氣虧血弱木青肝病也熱盛生驚面黃飲食積多停痛疳元因脾病

觀虎口三關紋脈

蓋嬰兒初生至三歲血脈未定呼吸至數太過不可以脈診當看虎口三關脈紋參詳病之所因虎口者乃手處也三關者近虎口食指第一節名風關第二節名氣關第三節名命關凡脈紋在初關多是紅色

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

易治傳至中關色赤而紫病深難治又傳至末關其色青黑病勢深重若青黑而紋亂者病極重也若純黑者危惡不治也男以左手女以右手側看之其脈勢灣入裡者順病雖重而症順猶可治之若紋勢反出外駸駸靠指甲者爲逆不治也　大抵紅黃而無形者無病也紋紅者風熱咳嗽也赤者主吐利腹痛煩渴也紫者驚熱也青者驚積也青赤相兼驚積風熱主急驚風青兼淡紫伸縮來去主慢驚風青黑相兼似出不出主慢脾風虎口脈紋亂者主胃不和傷乳吐瀉也



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

心主聲從肺出肺絕啼哭無聲多啼肝膽客風驚氣緩神疲搐盛啞音邪熱侮肺聲亮毒火無侵鴉聲癒癥候非輕尅日必歸泉冥、

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

問

兒病皆有因細問便端明兒若好食甘此是脾家病心苦及肝酸肺辛腎鹹症父母言的確藥施無不應

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

切

小兒有病須憑脈一指三關定其息三五歲用一指轉尋三部七八歲移指少許九歲至十三次第尋三關十四五歲與大方脈同浮洪風盛數多驚沉緩元因乳食積弦急因風氣不和緊數風癎驚搐掣浮濇而緊爲傷寒沉細而伏因癖結虛濡氣弱更兼驚實熱弦勞乾脈血前大後小童脈順前小後大氣逆咽洪數脈來苦煩滿緊急腹中痛不歇滑盛皆因濕冷傷弦長客忤皆兒心氣不足遇人客異物則忤而驚也分明說悉數平和六七至此是先賢玄妙訣

五臟生尅主治

心主熱實則叫哭熱渴驚悸導赤散虛則困臥驚悸不安生犀散肺乘心爲微邪喘而壯熱瀉白散肝乘心爲虛邪煩悶壯熱大青膏腎乘心爲賊邪恐怖燥熱補腎丸安神丸脾乘心爲熱邪熱渴多睡瀉黃散

○凡心臟得病先調肝腎蓋肝者心之母腎者心之兒肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣病此心病先求於肝清其源也五臟受病必先傳其所勝水能勝火腎之受邪必傳於心故先治其腎逐其邪也宜退腎氣益肝氣心自平矣診肝腎脈皆和而心自病當審

肺主躁實則悶亂喘嗽瀉白散虛則哽氣不續阿膠散心乘肺爲賊邪身熱喘急地黃丸導赤散肝乘肺爲微邪惡風眩暈昏憒咳嗽羌活膏腎乘肺爲實邪增寒咳嗽人參清肺飲　凡肺臟得病先觀心脾之虛實若心火鑠金當抑心滋肺爲主若脾虛不能生金當固脾土爲主故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實則痞隔中焦其熱毒之氣上蒸於肺而生痰故患肺熱者多脾熱得之若陰虛不能制火火盛而刑金者當壯水之主診心脾脈俱和當察肺家虛熱寒熱而治之

肝主風實則木直呵欠頓悶噫叫搐掣瀉清丸瀉肝散虛則咬牙多欠生地黃丸肺乘肝爲賊邪喘咳微搐瀉白散脾乘肝爲微邪多睡而搐醒脾丸腎乘肝爲虛邪憎寒呵欠而搐羌活膏。○肝病先察其肺腎蓋腎者肝之母金者木之賊肝之病若非腎水不能相生必是肺金來相攻擊故其來在肺先治其肺攻其鬼也其來在腎先治其腎培其根也診肺腎脈俱和當審肝家虛實寒熱而治之

脾主濕實則困臥身熱口渴瀉黃散虛則吐瀉生風面皖白目無神口氣冷肌瘦倒少食體重昏倦多睡

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

痰邪作心金 卷之七十

異攻散六君子湯肝乘脾爲賊邪五更泄瀉四神丸○凡脾病必察心肝之虛實蓋心者脾之母肝者脾之鬼若心氣虧則脾無生氣肝氣盛則土受凌虐故曰盛者損之虧者益之診心肝脈俱和當察脾家虛實寒熱而治之

腎主寒有虛而無實也自病則足脛寒而逆目無精光人之五臟惟腎無實也心乘腎爲微邪煩熱惡寒桂枝湯肝乘腎爲實邪煩悶身寒理中湯肺乘腎爲虛邪嗽身寒百部丸脾乘腎爲賊邪體重泄瀉身寒附子理中湯本臟虛弱乃自己正令不行爲鬼賊所尅當補本臟之正氣也五行之間惟腎臟無盛而反受邪何也肺屬金主皮毛所主者氣腎屬水主骨髓所藏者精若肺熱盛則氣上蒸不能下生於腎腎無生氣則受邪矣宜清金藥主之使肺氣和自然下生於腎此腎病必求於肺也若是脾濕相形於腎當去脾濕腎自平矣診脾肺脈俱和當察本臟而治之

善治者必詳審本臟虛實故曰虛則補其母實則瀉其子假如肺之實當瀉腎水使子來求生於母則肺之實可得而平矣肺虛當補脾上則母來生子則肺之虛可得而平矣餘臟倣此

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胎熱

胎熱者由母娠之時嫉怒氣鬱恣食辛辣煎炒或厚衣焙服睡臥火坑或感風熱悞服温劑致令熱蓄於內薰蒸胎氣兒生之後或壯熱驚啼面紅唇赤眼目赤腫鴟口重舌赤遊丹毒便閉溺赤皆胎熱之症也不可醫求速效當令乳母忌雞魚煎煿辛辣之物又服調養氣血清解之劑釀乳哺之兒服犀角解毒湯合導赤散隨症加減卽止無過

附天弔

天弔者皆由乳母酒食煎煿過殃毒氣入乳兒食之心肺生熱痰鬱氣滯加之客冒風寒故壯熱驚悸眼目翻騰抽掣啼笑喜怒不常甚者爪甲皆青治法解利風熱爲主

犀角解毒湯 導赤等赤散 方俱見十五卷

大連翹飲 治胎熱等症

連翹 當歸尾 赤芍 木通

甘草 防風 荊芥

胎熱加生地胎黃加茵陳目赤加黃連牡丹皮驚啼加蟬蜕燈心薄荷咽痛加元參便秘加大黃枳殼小便赤加山梔車前子淡竹葉

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

胎寒

胎寒者母娠之時喜啖肥甘生冷時果或外感風寒暑濕或治之涼藥內傷胎氣兒生之後旬日內或昏睡呪乳而青唇白腹痛瀉白啼哭不已曲足握拳口噤不乳四肢厥冷皆胎寒之症也治法理中湯主之否則爲慢脾驚或作盤腸內釣

附盤腸內釣

盤腸氣發腰先曲無淚叫啼乾眼哭口開脚冷上唇乾頭上汗珠濕漉漉皆出寒證於小腸故腹痛多啼與內釣相似內釣多啼請細看莫爲蟲痛一般般蟲痛吐涎唇口紫內釣還須要一般但視眼頭紅脈現須知驚候本根源温臟鎮驚施妙手始知醫道有先賢

蛔蟲動痛疑似內釣

凡蟲之生皆由飲食過傷脾虛凝滯不化瘀積而生蟲或愛吃甜味則蟲生作痛撲身啼哭肌肉瘦削面黃唇白時痛時止者是也

備急方

煎葱湯淋洗其腹又用熟艾紙上烘熱以帕子包熨臍腹間頻換其痛漸止

NOT COPY
Do Not Copy and the Gest Collection
East Asian Library and
Princeton University Library

鉤藤膏 治肉弔肚疼

沒藥　乳香　木香　僵蚕各四錢

右爲末蜜丸如豆大鉤藤湯化下

又方 治盤腸內鈎

鉤藤　木香　炮薑　人參

甘草　陳皮　槟榔各等分

右爲末蜜丸如豆大木香湯化下

寒疝

寒疝夜啼更盡復臥哭多睡少天明則已腰曲額汗眼中無淚面青唇白漸入盤腸皆由娠母傷濕冷之氣侵入胎中傳於膀胱留而不散故爲諸疝也治宜理中湯加吳茱萸大茴香水煎服

胎驚胎風

此候皆由娠母驚狂顛撲損傷心血或外挾風邪應之於胎兒生之後面青搐搦口噤身熱潮強目直竄視最爲難治凡胎風眼合不可作慢驚治當疎用溫藥也

豬乳膏

牛黃　硃砂各少許

取豬乳調抹兒口中

胎黃

兒生下遍身面目皆黃狀如金色壯熱便閉溺赤皆由娠母受濕熱傳於胞胎也治以地黃茵陳湯主之

生地　茵陳　赤芍　花粉
赤苓　甘草　歸尾　豬苓　澤瀉　一

水煎服

脾風撮口噤口

三者之候名異而原一也皆由斷臍結縛不緊爲水濕風冷之氣侵入臍中傳之於心蘊蓄其邪復傳脾絡其候舌强唇青口噤搐掣腹滿臍腫多啼皆裡氣鬱結壅閉不通也四肢冷爪甲黑者即死口噤不開者用南星爲末加冰片少許用指蘸生姜汁於牙齦上擦之立開方用藥若唇撮急多不藥穴七壯

撮風散

赤脚蜈蚣一條去足　硃砂　僵蠶
蝎尾各一錢　黃色　麝香少許

右爲末竹瀝調下一匙

又方

用臍帶炙爲末每用五分豬乳調下

變蒸

小兒生下三十二日一變六十四日一蒸變者變生五臟蒸者蒸養六腑也又曰變蒸者長氣血而生精神意智也積五百七十六日大小變蒸畢兒乃成人情性有異於前血脈骨肉皆堅牢也每變輕則體熱微汗其狀如驚耳尻俱冷上唇有白泡起如魚目其重者壯熱不乳哺即嘔吐目白微汗輕者五日解重者十日平又曰兒生三十二日一變二十九日先期而變熱至三十五六日蒸乃畢也凡變蒸時不欲驚動令外人見之宜少與乳哺不可妄投藥餌也

夜啼

小兒生下有三啼一從頭說與知邪熱乘心心肉躁忽然驚叫則悲啼臟腑冷多險氣作或因觸犯惡神祇睡裡哭聲多不歇夜啼之候要須知

其一有胎熱在心心屬火復爲熱所乘故火炎上而啼面紅多淚無燈則稍息見燈則愈啼蓋火者乃陽屬也心熱遇火兩陽相搏故見燈而啼甚也其候手腹熱溺赤治宜涼心安神導赤散加山梔仁薄荷天麻主之

其二胎中受寒或乳母好食生冷或夜失蓋兒腹以

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University

痘疹傳心錄 卷十七 修敬堂 七

致冷氣侵襲遇夜哭多睡少天明則已其候面青白而便亦清白也治法去宿冷溫下焦先用前備急方又芍藥湯主之

又芍藥湯主之其三祟物所侵小兒目有所覩口不能言但睡中驚惕抱母大哭不已面色紫黑治法蘇合丸琥珀抱龍丸主之

又有乳母鬱怒而致乳母宜服散鬱之劑有脾胃虛寒吐瀉少食而啼者宜六君子湯加炮薑木香主之有心血不足而夜啼者安神丸主之有腎氣不足至夜陰虛而啼者六味地黃丸加人參麥冬主之有乳母缺乳兒無乳哺故啼哭也有兒生口瘡重舌要乳吃口不能吮乳便啼不可不辨導赤散六味地黃丸芍藥湯

（方俱見十五卷）

白芍 澤瀉
木香 薄荷
水煎服 吳萸 甘草
驚風總論 大茴香 生薑拍碎水炒

小兒眞水未旺心火獨炎則肺金受制無以平肝木故肝木常有餘而脾土常不足也蓋驚風之候有急

有慢有陰有陽急者陽也慢者陰也皆由外感風寒內傷飲食以致中氣虛損而得之然虛能發熱熱盛生驚驚盛生風風盛發搐是以風生於肝痰生於脾驚出於心熱出於肺又曰心主熱驚風痰熱合爲四症四症已具八候生焉八候者搐兩手伸攩十指開合也反身向外仰引臂若開弓竄目直視睛露不活顫頭偏不正也掣勢若撲也頷上下動也是也又曰熱論虛實實熱爲急驚虛熱爲慢驚慢驚屬陽用藥以涼慢驚屬陰用藥以溫故曰熱論虛實者此也証別順逆左女搐右視右男搐左視男生竄女眼下竄男握指於外女握指於內此則爲順反此則爲逆其指紋灣入內者順出外者逆故順逆証別也有急後治搐先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱若四症俱有又當兼治也急慢驚風綱領如此

急驚

急驚皆由愛護失宜或傷風熱或食辛辣或厚衣衾蓋或人驚跌撲犬吠雞鳴一切所驚其候夜臥不寧身熱頻躁便閉溺赤痰喘咬乳目直上視牙關口噤手足搐搦脈浮數洪緊皆由內有實熱外被風邪心受熱而發驚肝生風而發搐二臟交爭涎痰壅塞關竅不通風氣畜盛而無所泄故暴烈而爲急驚也錢氏曰急驚屬肝木風邪有餘之症治先通關次截風定搐痰熱既降當養血安神若搐定而尚有微邪宜

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

消痰清熱若搐不定仍議下之

慢驚

慢驚多發於大病之後或悞汗下或吐瀉久而脾胃虛弱經曰虛則生熱熱則生痰凝滯咽喉如牽鋸之聲時復瘛瘲口氣四肢俱冷面青白二便利露睛啼哭忽如鵪聲皆脾肺虛弱故也錢氏曰慢驚皆由脾虛不能生金金不能制木木來侮土而爲前症也治宜保脾土爲主瀉生金金來平木其風自定甚不可攻擊症雖有痰只用六君子湯加天麻鉤藤炮姜主之若痰多唇白肢冷如冰不省人事此虛慢之極

用固真湯主之

有慢脾風者皆由慢驚傳變始因吐瀉久而脾胃虛弱經曰脾虛生風風入經絡則手足搐搦痰涎壅盛面色枯槁頂心偏甚昏沉不省最爲難治若驅風則脾間痰涎虛實往來耳治宜附子理中湯若太衝有

夫急驚變爲慢驚

急驚變慢者因以吐利之藥過多與涼驚藥不愈荏苒而致經曰脾虛不實昏睡露睛涎鳴氣急肢冷肚疼時作憎瘧六脈沉微此急變慢也治從慢例

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

慢驚變急者因以溫補太過以煖驚藥不愈體熱涎盛面紅目赤大小便閉忽然搐搦厥脈診洪數此慢變急也治從急例

附驚風所得之因

蓋驚風則一而所因則異詳具於左　有傷風熱致心熱盛而生驚肝邪動而發搐治先發散逼心氣疎肝經安魂退熱之劑　有傷暑熱而發驚搐人事不甦脈沉細數治宜消暑清心湯辰砂五苓散之類　有傷風咳嗽痰涎壅盛而發驚搐者治宜導痰順氣之劑牛黃抱龍丸主之　有胎毒瘡腫卽愈其毒內攻腹脹而發驚搐者治宜百解散主之如瘡再作可治否則喘脹而死　有大人喊叫或犬吠雞鳴原小兒心神未足因驚而發搐者治宜慎驚安神爲主　有飲食傷脾脾弱不化氣血凝泣腹脹而發驚搐者治宜消化爲主　有傷食而過利下傷脾脾弱而爲驚搐者多亡陽而爲慢驚者治宜補脾胃爲主　有傷風寒醫過表散汗而驚搐者治宜鎮心丸安神丸主之　有因食新白果痰涎壅盛而驚搐者宜先吐利又解毒爲主　有

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

小兒氣稟心血不足稍爲驚恐而便掣搐治宜固眞湯安神丸主之　有小兒心神不足獨臥無伴恐懼而發驚者治宜安神養血之劑　有吐瀉久脾胃虛弱而爲慢驚者治宜固中氣爲主　有慢驚傳變吐瀉久不治而爲慢脾風者此虛之極也不治　有大病後脾胃虧損而爲慢驚者不治也　有瘟前毒火乘心心神昏亂而驚搐者治見第二卷驚搐條　有瘟後氣血不足精神疲倦而驚搐者治同慢驚　凡驚風發搐不可抱緊聽其自發自止以其氣得流通而邪易散也

驚風不治之症

急驚目睛不轉口中出血兩足攏跳肚腹搐動或神緩而摸體尋衣或症篤而神昏氣促灌藥不下通關不噤心中熱痛忽大叫者不治也　慢驚四肢厥冷面臥如尸吐瀉痰喘二便不禁脈沉肢冷者不治也

金箔鎮心丸　牛黃抱龍丸　保生錠子
安神丸　奪命丹　天麻湯
辰砂散　醒脾散　牛黃鎮驚丸
白玉餅子 方俱見十五卷

通關散

南星一錢 牙皂二條 赤脚蜈蚣一條
殭蠶一錢 麝香少許

右爲末生薑汁拌擦牙或滴入藥二三點吐出涎
關自開

探生散

牙皂三錢 細辛 川芎 白芷各二錢
蹢躅花一錢五分 麝香少許

右剉爲末用燈心蘸藥點入鼻內得嚏可治
神歸湯 治心氣不足煩燥多驚

人參 麥冬 茯神 當歸
甘草 水煎服

固真湯 治四肢冷不省人事

人參 附子 茯苓 山萸炙
白朮 山藥 黃耆 肉桂

水一鍾加生薑三片大棗一枚煎服

薑半散 治吐不止將成慢驚

半夏二錢製如豆大 生薑去皮一兩切 肉桂去皮二錢

右薑半共炒令香熟下桂再炒微有香氣取出去

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library DO NOT COPY

桂以皮紙攤地上曲火氣爲末每用二錢水一
盞煎半盞陸續服
辰砂餅 治驚風
用蝦蟆膽不拘多少用辰砂和爲一塊用刀刮
下半分或一分薄荷湯化下
消暑清心飲 治中暑驚掐
香薷 瀉瀉 藒豆 黃連
薄荷 猪苓 厚朴 葛根
赤茯苓 甘草 水煎服
寬氣飲 治瘧疾及蓄氣而成掐
枳殼 枳實各一分 人參 甘草各五錢
右爲末淡薑湯調下一錢
生犀散 治心經虛熱
地骨皮 赤芍 犀角
甘草 犀角
右剉水煎服
安神丸 治心血不足驚悸
人參 半夏 棗仁 茯神各三錢
當歸 橘紅 赤芍各二錢 五味子五粒
甘草一錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右爲末薑汁爲丸芡實大每用一丸薑湯下

抑肝散　治肝經虛熱搐逆嘔吐痰涎

小柴胡　當歸　甘草
白朮　川芎
癇症　茯苓　鉤藤
小兒癇病古有五癇三癇顛癇病因不同宜隨脈症分陰陽虛實而治之皆由小兒氣血未充神氣未實或爲風邪所傷或爲驚怪所觸或娠母七情驚怖所致也其候痰湧胸膈熱甚而風燥神思怫鬱燥爛而氣癍四肢柔軟眼直目牽口噤涎流昏冒僵仆發則旋暈顛倒食頃復醒者癇也若一身强硬終日不醒者則爲痙矣大概血滯心竅邪氣在心積驚成癇治法逼心經調血脈順氣豁痰乃其要也

五癇病關五臟　心癇者面赤目瞪吐舌嚙齒心下煩燥氣短息數是也　肝癇者面青唇青眼直上竄手足拳攣抽掣是也　脾癇者面色痿黃露睛直視腹滿自利四肢不收是也　肺癇者面如枯骨驚跳搖頭腰疼反折手瘛吐沫是也　腎癇者面色黧黑口噤流涎目直腹脹不動如尸也

三癇驚風食三種也　驚癇者因震駭恐怖打墜積

驚其始驚叫大啼神魂恍惚是也其病在心宜鎮心丸主之有熱利驚丸下之　風癎者因汗出解脫風邪乘虛而入其初屈指數物熱甚生痰是也目赤發搐是也其病在肝宜驅風散主之有熱四順飲　食癎者因食時得驚停蓄日久氣鬱痰結痰結則風熱生其初吐乳不哺先寒後熱是也其病在脾治宜順氣驅風痰瘵驚積和脾胃爲主也　顛癎者內經言顛不言癎古方或言風顛或言癎或言顛狂所指不一蓋癎病歸於五臟顛病止屬於心也皆由冒熱感風風熱內蓄風痰鬱結上迷心胞心神昏亂而作也宜鎮心驅痰疎風順氣之劑　諸癎症皆由小兒神氣未固驚則神不守舍或飲食失節脾胃受傷積爲痰飲以致痰迷心竅而作治法當奪火奪痰而論前人多用鎮驚清心之藥可以治熱可以清痰有頑痰膠固者此藥未能驅逐在上者先用吐法吐後方宜服此藥有痰實在裡者亦須下之隨症輕重而用之也　又當別之以陰陽其始身有熱抽掣啼叫咬牙竄視是爲陽癎病脈浮數面色光澤病在六腑肌表此尤易治百解散抱龍丸之類其始身無熱手足清冷口噤驚啼吐舌搖頭是爲陰癎病脈沉微面

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

色暗晦病在五臟骨髓此最難治宜用固真湯南星治之或以日發爲陽癇夜發爲陰癇以仰臥屬陽覆臥屬陰亦可參驗蓋陽症不宜用溫藥陰症不可用寒涼藥也

五癇丸

真珠五錢　雄黃五錢　硃砂二錢　鉛一兩溶化入水銀一錢炒結候冷　水銀三分

右爲末窨丸麻子大每朝四五丸金銀煎湯送下

六珍丹

雄黃　雌黃　珠子各一錢　丹砂五分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY