PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

c86/3054
v.11

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之十八 脾胃 腎

瘦樵程永培庚白

脾胃

夫人以脾胃爲主胃屬陽主氣脾屬陰主血胃司受納脾司運化胃爲水穀之海飲食入胃脾乃化生精氣津液上升糟粕下降斯無悞矣至於小兒尤賴胃氣而生若乳食失節則脾胃受傷胃傷則不能納脾傷則不能化脾胃俱傷納化皆難而臟腑俱失所養則病生矣故諸病先觀胃氣人身氣血臟腑百骸皆由胃氣而生也又云有胃氣則生無胃氣則死故東

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

垣發脾胃之論使人常以調理脾胃爲主若面色㿠白目無精光口氣冷少食肌瘦此胃氣虛寒也用小異攻散六君子湯若便溏者兼脾虛也加炮薑藿香溫之中滿者脾不運也加木香開之若喜冷便秘面赤煩渴此胃氣實熱也用瀉黃散清之若命門火衰不能生土者用八味丸補之若稟賦胃氣不足用補中益氣湯八味丸益之若乳母乳汁清稀致兒肌瘦骨立大便溏瀉當易乳母得乳汁濃厚者爲佳宜用小異攻加升麻麥芽主之否則胃氣有傷藥雖對症亦不能運化藥力以成功是以東垣以脾胃爲主也

凡治小兒之病當先審其胃氣至於脾胃泄瀉劉河間則爲瀉屬濕惟用苦溫苦寒之藥若寒瀉濕熱若溫除濕寒泄止後脾胃虛弱方用參术等甘溫之藥補之若初泄而便用參术等藥則甘溫能生濕熱而反助病邪世人不識往往多用此以爲補慢人多矣一兒十三歲嗜食食後飽脹難化此胃火旺脾陰虛也用人參白术枳實芍藥石膏甘草黃連香附木香而愈

一兒泄瀉咸用六君子加澤瀉肉果不効余謂甘溫能生濕熱故不愈用甘草芍藥黃連茯苓陳皮柴

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胡甘寒之藥而瀉止但口渴面色青白此脾胃不足用小異攻散加升麻柴胡而愈

不寐多困

小兒不寐皆由胃氣不和血氣不從故不寐之症生矣治用六君子加遠志酸棗仁又歸脾湯肝腎虛熱者用六味丸心血不足振悸不得眠者真珠母丸精神短乏者人參安神丸膽虛者人參竹葉湯肝火不寧者加味小柴胡湯病後餘熱者當辨虛實治之有因他症不寐各當詳之　又多睡者皆由脾氣虛弱健運之令不行而嗜卧也治當溫補其脾脾氣旺則臟腑清陽之氣升舉於運行何困倦之有治用四君子加木香半夏白朮倍之若脾倦多驚者乃心血虛而火動也治宜安神養血爲主若心脾氣虛有痰者用人參麥冬五味茯苓以補心氣當歸芍藥酸棗仁以養心血橘紅半夏以開痰若脾肺氣虛有痰者用補中益氣湯又膽星天竺丸若飲食停滯而然者四君子湯加山查麥芽神麯若脾虛好睡用歸芍六君子湯若乳母飲酒致兒昏睡者用乾葛陳皮解之不應用四君子加葛根子母並服

人參竹葉湯

East Asian Library
DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

人參　竹葉　甘草　半夏
小麥　麥冬　粳米　生薑
水煎服

加味小柴胡湯
即小柴胡湯加山梔丹皮

膽星天竺丸
膽星一兩　半夏　白附各五錢　天竺黃三錢
天麻　防風各二錢　辰砂一錢
右爲末甘草膏丸芡實大每一丸薄荷湯化下
人參安神丸

人參一錢　當歸三錢　麥冬三錢　黃連二錢
生地三錢　硃砂二錢　茯神二錢　棗仁二錢
右爲末猪心血丸如芡實大硃砂爲衣燈心湯化下

腫脹

小兒腫脹未有不由飲食內傷脾胃虧損而致者其症有二曰氣腫曰水腫氣腫者由脾胃虛弱脾主肌肉肺主皮膚土弱不能生金致虛氣上攻於肺行於面目遍身浮腫也治法調脾行氣爲主五子五皮飲水腫者因上焦煩渴引飲而脾虛不能約制其水水

East Asian Library Princeton University Library and the Gest Collection DO NOT COPY

反侮土土隨水行上衝於肺流走於脾膚而光腫也治法實脾利水爲主胃苓湯至於喘脹兩條須分先後節齋曰先喘而後脹主於肺先脹而後喘主於脾蓋小便之行由肺氣降下而輸化也若肺受邪而喘則失降下之令故小便短澁以致水溢皮膚而腫滿矣此喘爲本而脹爲標也治宜清金降氣而行水兼之脾土惡濕土能尅水若脾土受傷不能制水水既上溢則邪反侵肺氣不能降而生喘矣此脹爲本而喘爲標也治宜實脾行水而清金兼之苟肺病而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清金之藥則脾得寒而脹益甚近世治喘脹但知實脾行水而不知分別脾肺二經慢矣又有脾胃虛弱濕熱積而爲腫者用瀉黃散胃苓湯又有瀉後痢後瘧後痘後諸病後脾虛發腫者宜調補脾胃爲主六君子湯補中益氣湯又有脾腎虛寒不能司攝而水泛行如蠱脹者用加減腎氣丸補命門火以生脾土間服六君子湯又有遍身膿瘡發腫治宜先去濕熱次用敗毒散以解表邪○或問曰小兒水腫俗云河簰用草藥煎洗又用雞子清口含吸臍并手足指頭前後心而愈者何也曰此內症已平但表受水溢浴洗則肌暢

肌暢則微汗邪可散而愈也若內症不平浴洗雖愈未幾必復腫矣

一兒通身光腫余審其能食便調身熱脉浮謂曰內症平和此水氣在表宜解散之用敗毒散去人參加紫蘇陳皮令汗出自漸消而愈總之斯症當辨經絡虛實標本先後而治不可拘泥

一兒瘧後通身浮腫咸謂脾虛用六君子湯加黃連芍藥木通腹皮鱉甲澤瀉木香煨薑不効發熱煩渴或謂土燥而又進以燥劑面目浮腫愈甚宜苦寒之劑潤之用芍藥花粉知母黃連柴胡生地茯苓木通漸愈

草藥方　浴洗水腫

河簰草　車前子　野紅花根　芭蕉葉

枇杷葉　枸橘葉各一把煎湯浴洗

稠柳餅　治水腫

稠柳子梗葉似柳七八月採子甑乾

右爲末每用一兩大米粉和作餅蒸熟食之溺利腫消愈

腹痛

小兒腹痛有飲食停滯而脹痛有積滯作痛有蟲痛

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

有火痛有寒痛有虛痛有腸胃中生瘡毒而痛有盤腸內弔痛不可不辨○飲食停滯而痛者皆由飲食不節或過餐堅硬之物脾弱不易尅化而腹脹痛也其候按之堅痛身熱惡食治宜消化之劑香砂丸消導二陳湯甚則以遇仙丹烏犀丸下之○積痛者皆由飲食自倍脾虛不運停滯中脘久而成積腹痛欲便便下醙臭便後痛減或閉澁其症面色痿黃身熱不思乳食足冷嗜卧治宜遇仙丹下之下後以小異攻散和之若成癖瘕治見癖條○蟲痛者有蚘虫長尺許或五六寸居胃脘之間動則吐清涎撲身啼哭面黃唇白時痛時止治宜安蟲飲烏梅丸又寸白虫居腸胃之間動則傷人精氣又有一虫形若細絲或飲食中誤吞油髮所變亦居胃中動則腹中刺痛不可忍皆由恣食肥甘煎煿濕熱鬱遏所致宜用史君子丸又有血鱉動則刺心而痛面黃肌瘦能食皆由過食堅硬之物不化爲血裹成形漸大而活久則殺人治宜追虫取積散下之○火痛者口中氣溫面赤壯熱飲冷治用瀉黃散利之○寒痛者口氣冷不思飲食嘔逆泄瀉此寒水侮土也治用六君子加炮薑肉桂甚則加附子○虛痛者消導後其腹尚痛按之

DO NOT COPY
Eastern Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不痛是也治用小異攻散補之若痛連兩脇乃肝木乘脾也用四君子加柴胡芍藥主之○腸胃中生瘡毒而痛者皆由脾虛積熱氣血凝滯所致方論見外科條○盤腸內弔痛論見前本條

一女子十五歲胃脘痛甚則號哭嘔吐清涎或半月或月餘而發患此數年醫藥不効余用張叉古文錢◎三分同好核桃肉半個油核桃肉半個同研爛好酒調下其痛反甚漸行下至小腹便行一二次即愈此芝田先生傳也若氣鬱食滯而發者用傳心錄內治心氣痛藥一服利下即愈此僧徹空傳也

一兒歲餘號哭不已醫藥不効余謂色脈俱好審其仰身則哭甚合身稍止活幼曰若嬰兒色脈俱好而病者必有他故細揣背上微紅腫以手按之大哭用針撥開摘出乃竹刺也痛定即安

追蟲取積散　治蛔積

牽牛二兩五錢　雷丸一兩　木香五錢　蕪荑五錢
蓬术五錢　錫灰五錢　大黃一兩二錢　史君子五錢
槟榔一兩　乾漆五錢

右爲末每用一錢好酒調下或麪糊丸麻子大天

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

明猪肉湯送下大小加減

烏梅丸　治蚘虫動痛

烏梅三十箇　細辛　桂枝　黃柏

乾薑　黃連各一錢　當歸　蜀椒

右爲末酒浸烏梅一宿去核蒸之用米飯搗和丸

桐子大每用二十丸空心白滚湯送下

諸熱

經曰陽勝則外熱陽虛則外寒陰勝則內寒陰虛則內熱陰陽相勝則寒熱往來又曰陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也發熱治法宜辨所因有四外感風寒而熱者有感疫毒之氣而熱者有中暑而熱者有注夏而熱者有感濕而熱者有驚風而熱者有飲食停滯不化而熱者有痞積而熱者有五臟之熱有氣虛發熱有血虛發熱有潮熱有骨蒸熱有表熱有裏熱有痘疹發熱有諸病後發熱有瘡瘍發熱有變蒸發熱○傷風而熱者頭疼鼻塞聲重喘嗽痰涎惡風手背熱治宜芎蘇散表散之○傷寒而熱者初發頭疼目痛身體拘急耳聾脇痛惡寒發熱治宜麻黃桂枝湯表之○疫厲而熱者皆由元氣不足感乖疹之氣治宜正氣散

East Asian Library Princeton University
NOT COPY
and the Gest Collection
Library

敗毒散十神湯五瘟丹截瘧丹方見十五卷○中暑而熱者長夏濕熱之令人感之則四肢困倦精神短少胸滿氣促乳食不思身熱頭疼自汗煩渴經曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者用清暑益氣湯中熱者黃連香薷飲十味香薷飲夾食者本方加消導藥暑瀉六和湯益元散○注夏而熱者皆由脾胃不足遇長夏潤濕之令則不能升舉清陽健運中氣又少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰四肢痿弱時卧發熱精神疲倦飲食少思口中無味小便赤澁大便不調名曰注夏皆由禀元氣不足而然也

治宜補中益氣湯去升麻加炒黑黃柏麥冬又生脉散主之○感濕而熱者經曰諸濕腫滿皆屬脾土夫濕之爲病有從外感而得者或處卑濕之地而得者或途遇風雨而得者或汗濕沾衣而得者或恣飲酒漿醴酪而得者或多食柑橘瓜菓之類而得者治宜滲濕湯茵陳五苓散羌活勝濕湯又曰濕在上宜微汗之在下宜利小便使上下分消其濕自除也故曰治濕不利小便非其治也○驚風而熱者論見驚風條○飲食停滯而熱者論見傷食條○疳積而熱者論見疳症條○五臟之熱者心肝脾肺腎也心熱者

Fast Asian Library Princeton University and the Gest Collection
DO NOT COPY

額赤心煩手心熱或壯熱飲水嗜惡巳午時益甚導赤散肝熱者左頰赤便難轉筋尋衣捻物多怒多驚寅卯時益甚瀉肝散脾熱者鼻赤倦怠嗜卧身熱飲水過夜益甚瀉黃散肺熱者右頰赤手指眉目喘咳日西熱甚瀉白散腎熱者頰赤足熱甚骨蘇如蟲蝕夜間益甚六味地黃丸○氣虛發熱者氣短不續面色青白自汗乳食少思手足指冷午前熱甚治宜小異攻散補中益氣湯○血虛發熱者發熱惡寒兩頰赤色唇口鮮紅四肢無力午後熱甚治宜四物湯又地黃丸滋肝腎○骨蒸熱者身體虛羸遇晚發熱微汗方止用補中益氣湯加地骨皮青蒿鱉甲又六味地黃丸主之○潮熱者如潮水之應期而至也有風寒痟積食痞之分陰陽虛實五臟之異各當詳辨○表熱者陽盛則外熱以手輕捫之則熱重按之不熱此皮膚血脉之熱熱在表也壯熱惡風寒爲元氣不足表虛熱也壯熱不惡風寒爲外邪客表表之實熱也○裏熱者以手按之筋骨分則熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在裏也壯熱煩渴飲水溺赤便結裏實熱也壯熱飲水溺數裏虛寒也○痘疹發熱者呵欠悶脊時發驚悸乍涼乍熱兩腮頰赤目淚汪汪噴嚏

Facsimile Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

昏睡嘔噦搐搦耳骯俱冷也○諸病後發熱者當辨虛實經絡而治之○瘡瘍發熱者論見本條○又有乳母七情厚味飲食停滯遺熱於兒而發熱者或小兒恣食肥甘或衣衾過暖或頻浴熱湯積熱於內而發熱者各當詳之乳下嬰兒當兼治其母又小兒未斷乳母復有孕兒飲其乳肌肉羸瘦髮黃壯熱大便不調名曰魃病又曰繼病令兒斷乳用消乳丸導之小異攻散補之又有變蒸之熱輕則發熱微汗其狀如驚重則壯熱吐瀉煩渴啼哭此變蒸也不須用藥○凡治諸熱宜用溫平之藥和其裏則體熱自除但不可用大寒之劑攻之熱退則寒起變爲他症愼之一兒感時氣身熱用發散之劑而熱不退余用甘草芍藥黃芩黃連防風知母花粉元參而愈

滌濕湯

黃芩　黃連　山梔　防己
白术　蒼术　青皮　陳皮
赤茯苓　澤瀉　茵陳　猪苓
水煎服

羌活勝濕湯

羌活　獨活　防風　川芎

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

藁本　甘草　黃柏　蔓荊子
蒼朮　水煎服

痓病

諸痓項强皆屬於濕諸暴强直皆屬於風痓之爲病濕爲本風爲標然小兒痓病多因驚駭停食或乳母六淫七情飲食失宜所致更當審之兼治其母若面目赤色無汗惡寒牙關緊急肢體反張一身强硬痰涎壅甚小便赤澁終日不甦先譫語而發者名剛痓風性剛急故也若大便滑泄不語不渴有汗不惡寒先四肢厥冷而發者名柔痓濕性柔和故也並以小續命湯剛痓去附子柔痓去麻黃若壯熱譫語口渴手足微冷大便溏泄此兼剛柔如無汗用葛根湯有汗用桂枝加葛根湯若痰壅氣盛用南星半夏茯苓以清痰枳實陳皮紫蘇以順氣熱極者用敗毒散熱盛者用小柴胡湯剛痓內熱便秘用大承氣湯下之大柴胡湯解之柔痓用附子理中湯溫之六君子湯補中益氣湯補之若延綿則難治也又有大病後筋脈攣急而爲角弓反張此血脫無以養筋不可作風治宜用黃耆當歸煎亦用四物湯加附子防風羌活小續命湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

麻黃　人參　黃芩　川芎
芍藥　甘草　杏仁　防已
官桂　防風　附子　水煎服

敗毒散

柴胡　前胡　川芎　枳殼
羌活　獨活　茯苓　桔梗
人參　甘草　生薑　水煎服

葛根湯　治剛柔痊無汗惡寒

葛根　麻黃　赤芍　豆豉
葱白

水煎服或加羌活防風

桂枝加葛根湯　剛柔有汗

葛根　赤芍　甘草　桂枝

水煎服或加羌活防風

諸血

經曰肺朝百脉之氣肝通諸經之血又曰氣主煦之血主濡之蓋榮血者水穀之精氣也灌溉臟腑調和百脉若脾胃有傷榮衛虛弱行失常道故血妄行從胃上溢爲吐血從肺上溢爲衄血又吐咯血者出於腎也咳嗽血者出於肺也降下則便血溺血未有不

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

因熱而得也然小兒或稟賦積熱或乳母六淫七情厚味積熱傳兒或兒恣食肥甘煎煿積熱而致或感殄厲之氣而血滲溢所致或居重闇暖閣火氣薰逼不令常見風日積溫成熱所致治法若氣虛者用四君子補之氣血兩虛者用四物加參朮腎虛者六味地黃丸肺胃熱者犀角地黃丸黃連解毒湯衄血者此脾胃傳熱於肺而不能統也宜用六君子加甘桔當歸山梔黃芩吐血者胃中積熱也麥門冬飲清胃湯犀角地黃丸若血去多煩燥脈洪大按之如絲尋衣撮空無氣以動乃血脫也經云血脫益氣宜用加減八味丸又獨參湯加附子便血者糞前見血爲近血乃大腸積熱也用黃連解毒湯加炒槐花糞後見血者爲遠血乃胃中積熱用清胃湯久不止者用補中益氣湯加黃連溺血者如實熱用清心蓮子飲虛熱用六味地黃丸若稟父腎燥者用六味地黃丸乳母積熱者用加味清胃散鬱怒者加味小柴胡湯憂思者加味歸脾湯俱加漏蘆子母並服。凡治失血當審氣血虛實病因隨經施治不可見其血盛以爲熱劇過投涼藥使血受寒不能歸源而妄流其色紫黯而凝滯也

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

一兒痢後脾虛糞後有血久不愈用小異攻散加柴胡升麻黃連愈

一兒十五歲便血身熱謂腸風下血用生地芍藥丹皮荆芥苦參黃連條芩十劑愈

麥門冬飲　治吐血久不愈

五味　麥冬　黃耆　當歸
人參　生地　水煎服

清心蓮子飲

黃芩　麥冬　骨皮　車前子
甘草　茯苓　黃耆　石蓮肉
人參　柴胡　水煎服

歸脾湯　治脾虛健忘驚悸憂思

人參　茯神　龍眼肉　黃耆
棗仁　白术　當歸　遠志
木香　甘草　生薑　紅棗
水煎服

汗

夫汗者心之液內經主於心東垣主於胃蓋心爲君火主熱胃爲中土主濕濕熱相搏爲汗明矣其自汗者無時而出動則爲息屬陽虛胃氣之所司也盜汗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

者寢中通身如浴覺而方知屬陰虛榮血之所主也自汗宜補陽調衛補中益氣湯加麻黃根浮小麥門冬益汗宜補陰降火四物湯加黃蓍小麥黃連蓋小兒氣血未充膚腠未密若厚衣溫暖薰蒸臟腑而生熱熱搏於心爲邪所勝故液不能內藏薰出肌膚則爲盜汗也又有傷於冷熱冷熱交爭陰陽不順亦令睡中汗出其間有虛有實不可不辨。又有脾虛泄瀉自汗身冷而出有時遇瀉則無瀉過則汗此症大虛治宜六君子湯附子理中湯主之。有肺虛自汗因久嗽肺氣虛上壅而汗出治宜補肺調脾爲主。

有慢驚自汗其冷如冰最爲惡候治同慢驚。有客冒風寒發熱汗出治見傷風條。有因傷風醫過表散致表虛自汗者宜保元湯主之

黃疸

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰黃色屬脾蓋小兒黃疸皆由飲食所傷又濕熱之氣蘊積於脾胃蒸發而成也其候面目指爪小便徧身着物皆黃是也治宜去脾家濕熱積滯丑補散遇仙丹之類濕甚者茵陳湯利之又有爪目不黃而徧身皆黃溺赤者乃脾濕勝而爲之黃病治宜瀉黃散等主之。有病後脾

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

虛發黃肢體浮腫者宜六君子湯加茵陳主之

茯苓滲濕湯　治小兒食疸

四苓散合平胃散加黃連山梔仁茵陳山查麥芽枳殼

茵陳湯　治黃疸

茵陳　山梔　大黃　水煎服

瀉黃散　治脾經濕熱

黃連　茵陳　黃柏　黃芩

赤苓　山梔　澤瀉　水煎服

朴硝膏　治小兒大人黃疸

用朴硝四茶匙以雞子一箇攪勻用井水和勻一碗每日空心服用七服爲率弱者間一日服

草藥方　治大人小兒黃疸

地蜈蚣草四兩連根　掛山龍草四兩連根

右剉用白酒連瓶煮熟空心服

小棗丸　治大人小兒黃疸

厚朴四兩　蒼朮八兩　陳皮四兩　甘草二兩

綠礬四兩透明者以黃米粉四合同炒乾

右爲末棗肉丸如桐子大每用五十丸空心清米湯送下

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

惡核瘰癧

皆由風熱毒氣所干與氣血相搏鬱結成核如貫珠於耳項之間不消不潰若復客風熱搏於津液則潰化濃血此屬肝膽二經部分治宜滋腎水清肝火皂角子丸柴胡清肝散若因痟積所致用痟積散六味肥兒丸若脾虛而肝木乘之面色青白用小異攻散加蕪荑柴胡川芎白芍若潰而不斂乃氣血虛也用益氣養榮湯外用松香海鰾鮑爲末香油調搽

皂角子丸　治肝膽風熱瘰癧

皂角仁二兩　連翹八錢　當歸　柴胡

白芍藥　山梔　川芎　膽星

紫背天葵各一兩　龍膽草　甘草

桔梗各四錢

右爲末米糊丸小豆大每用一錢白湯送下

皂角膏　貼惡核

大皂莢去子燒存性八錢　糯米一合焙褐色

草烏　乾薑　赤芍各一兩　南星二兩

右爲末葱酒調塗日易二次

益氣養榮湯　治潰而不斂

參朮四物湯加柴胡貝母黃耆銀花桔梗皂角

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

刺夏枯草水煎服

時毒

小兒時毒因感四時不正之氣致頭面耳項赤腫寒熱頭疼狀如傷寒若邪在表用葛根甘草赤芍升麻牛蒡荊芥薄荷邪在裏用大黃山梔牛蒡枳殼鬱金升麻或用防風通聖散

耳聾

腎通竅於耳由風邪乘於手太陽邪隨其經入於耳內邪正相搏氣停壅滯不能聽於聲者也用通鳴散菖蒲丸又有禀腎氣不足或大病後而耳聾者用六味地黃丸加黃柏知母枸杞

通鳴散

菖蒲　遠志各一兩　柴胡　麥冬　防風各五錢　細辛　葶藶各二錢　杏仁十四粒　磁石一分

右爲末每用五分食後葱白湯調下

菖蒲丸

菖蒲二錢　巴豆

右研爲劑分作七丸每用一丸用綿裹塞耳內一日一易

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

耳內出膿

枯礬　海螵蛸各一錢　麝香少許

共爲末先以綿撚條子揥耳中膿盡摻藥入耳內

齒病

小兒齒病者由風熱邪毒干於手足陽明二經隨經入於齒龈則宣爛臭氣有血或恣食肥甘辛熱而致用清胃湯加石膏又甘露飲又用大皂角一條羊脛骨一具並以火煆烟盡以盆覆之候冷爲末如常揩牙又方用肥皂一箇去子滿塡塩在內炭火燒烟盡放冷爲末揩患處有涎吐出

甘露飲

生地　天冬　麥冬　枇杷葉

枳殼　黃芩　石斛　茵陳草

水煎服

固齒方

七月取旱蓮草連根一觔用無灰酒洗淨用青塩四兩食塩一兩醃三宿晒乾將無油鍋內炒存性把厚汁漸傾入炒乾爲末擦牙嚥下亦妙

口疳瘡

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

皆由胎中受熱或恣食肥甘炙煿積溫成熱熱客心脾薰逼上焦而成口瘡或痳生走馬甚致齒龈黑爛腮頰穿破治法先去積熱用導赤散合清胃散消毒飲牛黃散中白散若乳母味厚七情致兒爲患者用加味清胃散加味逍遙散俱加漏蘆母子俱服又瘡生於口兩角開口則裂痛此脾家積熱也用當歸散又因滯頤涎從口出浸潰頤頦口角生瘡用桑根皮汁塗之又殺羊角燒灰臘猪油調塗又因膀胱移熱下小腸膈腸不便上爲口糜潰爛用凉膈散牛黃散四順清凉飲

消毒飲

當歸　川芎　生地　赤芍
連翹　山梔　黃連　甘草

水煎服

凉膈散

大黃　朴硝　甘草　山梔
連翹　黃芩　薄荷　竹葉

水煎服

牛黃散　兼治痘疹後口瘡

黃牛糞後尖晒乾地上堆定作屋用燈點著

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

原書如此

燒至欲過存性益子合定令作黑灰勿令白研爲末二錢牛黃二分黃柏末二錢共和勻爲末敷之

解顱

解顱者兒生下顱大頭縫不合如開解腎主骨而腦爲髓海腎氣有虧則腦水不足故不合也故曰人乏腦髓如木無根不遠于日終爲廢人此乃無辜之疾治之何益錢氏用六味地黃丸調元散仍用南星末調傅以絹帛焙熱貼之

調元散

人參　茯苓　山藥　白朮

白芍　地黃　當歸　川芎

甘草　水煎服

顖填

顖填者顖門腫起也由乳哺不節飢飽失時或寒熱乘於脾胃致臟腑不調其積熱氣上冲于腦故填脹顖突而高如物填其上也治宜大連翹飲又封顖散掩之

顖陷

顖陷如坑者由病久氣血虛弱不能上充於腦髓也治宜固眞湯又狗骨炙爲末雞子清調敷之

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

天柱骨倒

天柱骨倒乃項軟也由眞氣虛弱客邪侵襲風府傳於筋骨則項軟垂下而無力也治宜祛風散調元散又地黃丸加鹿茸牛膝又附子南星等分爲末薑汁調貼患處

祛風散

防風　川芎　白芷　黃芩
細辛　甘草　羌活　薄荷
當歸　水煎服
五軟

五軟者頭軟手軟肌肉軟脚軟口軟是也皆由胎氣不固生下精髓不充又爲六淫所襲而爲之也○頭項軟者腎主骨腎虛所致也或因吐瀉久脾弱而得者補脾胃爲主六君子湯加肉桂炮薑風邪侵襲者祛風爲主○手軟者兩手筋縮不能舒伸無力以動也宜薏苡仁當歸秦艽酸棗仁防風羌活荆芥等分爲末蜜丸芡實大白湯化下○脚軟者骨髓不滿氣血不充筋弱不能束骨而行遲也宜地黃丸加牛膝五加皮鹿茸虎脛骨爲主○身軟者肉少皮寬飲食不爲肌膚也宜補脾胃爲主○口軟者心神不足則

Rare Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
East Asian Collection

舌本不通而不能言語也宜人參石菖蒲麥冬遠志川芎當歸各二錢乳香硃砂各一錢爲末蜜丸米湯化下又有禀氣不足則髓不能充骨而齒不生者宜補腎丸又十全大補湯加知母黃柏主之

五硬

仰頭取氣動搖難氣壅疼連胸膈間脚手心如冰冷硬斯爲風客命難還　又曰肚大青筋急不寬積氣消除便即安只恐面青心腹硬縱投羌活散難痊

龜胸

此症皆由容感風熱凝泣爲痰停滯心胸咳嗽喘促肺氣脹滿攻於胸膈而漸成龜胸治宜寬氣化痰爲主或乳母過食辛辣或夏哺熱乳亦成斯症

龜背

此症皆由小兒失於護背客風吹背傳入於髓故背脊如龜殼之狀或強令坐早或咳嗽久肺虛腎無生氣腎主骨風寒乘虛而入於筋骨其邪凝滯精血不能流通故背骨凸出而跛治法先驅風健脾兼滋陰壯水爲主得肺氣足而生水精髓固而流通則愈終不能脫然如故

重舌木舌

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

重舌者近舌根生形如舌而小也木舌者其舌腫硬漸漸粗大塞滿於口皆心脾極熱而然也用朴硝紫雪白塩仝研每半錢竹瀝井水調敷

重腭重齦

重腭者口中上腭薄皮腫起如囊盛水○重齦者牙床腫起如核是也以針刺破去血用蒲黃敷之

滯頤

滯頤者涎流出而漬於頤間也脾之液爲涎脾胃虛冷不能收制其津液故流出於頤也溫脾丹主之溫脾丸

半夏　丁香　木香各五錢　乾薑

白术　陳皮各二錢五分

右爲末糊丸黍米大一歲兒十丸米湯送下

鶴膝

此候禀受腎氣不足血氣不充故肌肉瘦瘠兩腿細小其膝腫大伸屈艱難如鶴之狀故曰腎虛則精髓內耗膚革不榮易爲邪氣所襲治宜驅風散又地黃丸加牛膝鹿茸主之又有瀉痢久而爲是症焮腫紅赤作痛成膿以補中益氣湯固脾土爲主愈又有腫硬不痛色白者不治也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

便濁

白濁者尿白如米泔狀也因乳哺不節致傷脾胃故清白不分而溺白也久則成瘖治宜人參甘草當歸木通猪苓赤芍赤茯苓青皮川草薢主之如赤濁者心熱下流滲入於泡治用生地黃小薊木通山梔赤芍滑石甘草黃柏淡竹葉赤茯苓車前草葉水煎服

○有脾虛食積濕熱下注而小便如泔者醒脾丸主之又四味肥兒丸

遺尿

腎主水與膀胱爲表裏經曰膀胱者州都之官津液藏焉腎與膀胱虛之氣虛寒不能約制津液故睡中遺出或常常遺出不覺內經謂膀胱不約爲遺溺用破故子散雞腸散若脾肺氣虛者用補中益氣湯加破故子山茱萸若禀父腎與膀胱虛者用六味地黃丸

破故子散

破故子爲末每用一錢白湯調下

雞腸散

雞腸草一兩 牡蠣三錢 龍骨 肉桂

桑螵蛸 茯苓各五錢 水煎服

諸淋

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

淋者腎與膀胱熱也二經相爲表裏俱主水道水入小腸下行於胞則爲溺若膀胱熱則津液內涸水道不通則小便淋漓小腹引臍連莖中痛也夫淋有五沙淋者腎主水水爲熱結化爲砂石內塞水道痛引膀胱沙出痛止用五淋散氣淋者肺氣壅熱小腹脹滿小便澁滯而痛宜清肺爲主血淋者心熱血散失其常道滲溢入胞五淋散加小薊滑石車前子寒淋者膀胱氣冷與正氣交爭寒氣勝發寒戰而後溺入味丸正勝則寒戰解而溺溺出少澁小腹連莖中痛甚者溺白如膏一名膏淋六味肥兒丸若因乳母情慾厚味積熱傳兒爲患者用柴胡梔子散柴胡清肝散加味清胃散若稟腎熱爲患者先用五淋散又滋腎丸地黃丸又心熱者用清心蓮子飲腎熱者六味地黃丸肝熱者柴胡梔子散脾熱者瀉黃散脾虛者小異攻散脾氣下陷補中益氣湯肺實熱者瀉白散肺虛熱者小異攻散加炒黑山梔此五臟蓄熱所致而治也甚不可輕用寒涼之藥以損胃氣

柴胡梔子散

柴胡　山梔　丹皮　茯苓

川芎　芍藥　當歸　牛蒡

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

甘草　水煎子母並服

柴胡清肝散

柴胡　黄芩　膽草　川芎

芍藥　山梔　連翹　甘草

漏蘆　水煎服

加味逍遥散

當歸　甘草　芍藥　茯苓

白术　柴胡　丹皮　梔子

漏蘆　水煎服

加味清胃散

升麻　生地　丹皮　黄連

當歸　柴胡　山梔　水煎服

五淋散

赤茯苓　赤芍　當歸　甘草

山梔子　燈心　水煎服

瀉黄散

藿香　甘草　山梔　石膏

防風　水煎服

茯苓散　治小兒白濁

三稜　蓬术　砂仁　赤苓各五錢

DO NOT COPY
East Asiana Library and the Gest Collection
Princeton University Library

青皮　陳皮　滑石　甘草各一錢五分

右爲末每用一錢燈心湯調下

君朴散　治白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子　厚朴　黃連各一兩　木香三錢

右爲末每用一錢米湯下

大便不通

小兒大便不通乃肺與大腸有熱熱則津液少而便秘用四順清涼飲又潤燥丸潤字丸若積滯不通者遇仙丹血虛燥熱不通者柏子仁膏若乳母情慾鬱火或厚味積熱傳兒爲患者用加味清胃湯加味逍遥散子母並服若禀賦怯弱而便難者用六味地黃丸

柏子仁膏　治大便不通

柏子仁　松子仁　胡桃仁各等分

右研膏如彈子大白湯化下

通聖餅　治大便小便不通

黃連末一錢　巴豆五粒　獨頭蒜一顆　鹽五分

皂角末一錢

右研爛捻餅子寸半闊貼臍上立通

又方

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

用桐油子大便不通酒磨大頭小便不通酒磨

小頭酒化下即通

小便不通

小便不通由肺燥熱不能生水治當清肺中之熱而滋水之化源用黃芩黃連天花粉知母麥冬茯苓木通甘草若脾濕氣不升治當健脾土而生肺金治先瀉黃散又六君子湯若膀胱有濕澁其流用金沙散木通散五苓散加木通車前子若脾胃氣虛不能通調水道者補中益氣湯加肉桂若禀腎虛陰燥者六味地黃丸若乳母厚味積熱者加味清胃湯子母飲

服一兒脾虛痞滿小便不通用白术澤瀉人參茯苓滑石愈

一兒小便赤澁煩躁睡臥不寧乳經壅熱用導赤散加黃芩麥冬赤茯苓竹葉煎服愈

一兒十五歲怔忡夢泄面白肌瘦用補中益氣湯加麥冬遠志黃柏又六味地黃丸料加黃柏牡蠣間又服佛座鬚丸漸愈

郁李仁膏

郁李仁一兩研 滑石一兩研 大黃一兩酒炒爲末

右和研丸黍米大每用二十丸薄荷湯下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

木通散　治小便不通

木通　滑石　牽牛　燈心
葱白　水煎服

金沙散　治小便淋瀝不通

鬱金　海金沙　滑石　甘草
燈心　地膚子　木通　水煎服

又方　治小便不通

麝香一分　葱白頭　馬藺頭　食鹽

右藥用田螺肉同搗爛作餅貼臍中即通

治小兒小便脹脹

用蚯蚓糞爲末煎甘草汁調塗上

又方

用人屎或狗屎燒灰存性爲末香油調塗

佛座鬚丸　專治夢遺

茯苓一兩　黃柏四兩　砂仁　遠志
猪苓　萊菔肉　蓮鬚　兎絲子各七錢五分
甘草入錢

右爲末山藥糊丸梧子大每用三錢空心白湯下

諸瘡

小兒瘡疥由乳食失節或早嗜肥甘煎煿或外感六

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

滑臟腑積熱或乳母厚味辛辣七情內火所致當分表裏虛實標本調其氣血平其所勝切不可用寒凉化毒之劑有傷眞氣嬰兒當兼治乳母爲上若徧身肥瘡脹痛膿水淋漓肢體虛浮此脾肺濕熱也用瀉黃散四順清凉飲水銀膏若瘡疥乾癢爬搔不寧此風熱與血熱相搏用柴胡清肝飲當歸和血飲大風子膏又頭瘡常有膿血濕汁經歲不愈用松香苦參黃連各五錢大黃胡粉水銀枯礬蛇床子各三錢爲末臘猪油調搽

附胎毒瘡

胎毒之由皆娠母情慾七情六慾妄動辛酸煎煿多嗜蓄毒傳於胎中嬰兒其毒未有中而不發雖至貴至賤莫不皆然若其發也或爲胎剝或爲疥癬或徧身膿瘡糜潰成片或胎毒流注或丹腫遊風或徧體紫黑等症名各不一○稟元氣足者雖毒熾能易化解稟元氣弱者毒雖輕而難治也大法當察其稟之厚薄毒之淺深辭利爲主犀角解毒湯合導赤散蓋解利之藥性清凉而滑潤亦有宜過投何也曰乳兒未受穀氣如萌芽嫩脆稍有不謹遂成泄瀉難以救治故首尾用藥宜固正氣爲主兼利水益脾隨症活潑斯

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

爲王道○亦有乳母素有鬱熱或亦恣食辛辣煎炒生冷雞魚等發物流入乳中令兒哺之血熱相搏發爲瘡腫等症治宜散解乳母之蘊熱兒亦服之可也故經曰母安則子安母病則子病

一兒生下赤溜余用乾荷葉爲末乾摻之如乾用香油調搽

一兒患赤遊丹腫余以磁針砭出惡血以前方治之愈不則延入腹者不治

一兒患胎毒流注余先以發解之劑起者以鐵箍散圍之將起者玉露膏散之又以參蓍托裏散成膿

毒化愈

一兒患症如前只以凉藥塗之腫雖退毒倒陷喘脹搐搦而斃○啟雲先生謂胎毒瘡不宜服藥乳母調適得宜乃不藥之藥也余嘗徧告於人不與藥用余之言無不皆愈儒門事親曰噫班固真良史嘗云有病不治得中醫若病久漸至衰羸當合宜而治不可拘泥

一兒患胎毒瘡發解太過有傷胃氣或以湯藥敷洗瘡雖愈毒反內攻喘脹而卒○有胎毒瘡久而收於滿頭連額有痂或成黃膿何也蓋頭者諸陽所

Fast Asian Library DO NOT COPY Princeton University and the Gest Collection

會之處洪範五行火曰炎上熱毒上攻兩陽相灼而然也法當解陳莝之積熱道心經之煩燥斯可矣百解散合五和湯及四黃散敷之愈

一兒患胎毒瘡徧體潰爛余以甘草苦參防風煎湯浸青布衣二領晒乾令兒換著身上內服清解之瘡愈

一兒患胎毒瘡久稍愈面色枯白瘡痕少神余謂毒盡外出宜補益之否則元氣脫絕慢脾不治以保元湯加當歸芍藥金銀花治之而愈

一兒患胎毒瘡頓然而愈驚搐喘脹咸謂夾食驚風用涼驚消食藥治之愈甚余謂瘡毒倒陷以和解湯治之其瘡復發諸症悉平但面白少神肌肉羸瘦乳食不化謂中氣不足以保元湯合四君子湯加防風金銀花固中氣為主其瘡收至頭上又犀角解毒丸漸解而愈一有不從前治喘脹而卒一有瘡雖發外不以調補漸為痊症不治

胎毒發丹

皆由胎毒內伏或頻浴熱湯或久卧火坑或乳母過食煎煿辛辣或七情內鬱助邪為患或發於頭面或發於四肢胸背色赤遊走不定治以砭出先宜發解

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

必犀角消毒丸大連翹飲中病即止

一見患此乳食如常二便清調余謂毒盡出於肌表宜砭出毒血自愈不從外敷內服皆寒涼藥反毒內攻喘脹而死

一見患此外勢雖輕二便秘結乳食減少余謂毒在臟以百解散發出其勢雖重而內症悉平以大連翹飲及砭法愈

砭法　令尸吮毒血各聚一處用磁鋒以筋頭劈開來之用線縛定令磁芒對聚血處再用筋頻擊刺出毒血爲妙如患在頭者用針挑患處出血爲妙

遲則入腹入腎難治矣

大凡胎毒瘡腫等症當分陰陽虛實而用內治之法不可槩以寒涼敷塗之藥蓋曰血氣得寒則不能運行毒凝滯而不化也

一見胎毒發赤遊丹腫先百解散發之頭目皆腫又犀角荆芥防風甘草牛蒡子赤芍愈

一見百日內胎毒發丹腫傳過咽項耳後項上出膿用犀角消毒飲愈

一見患胎毒徧延頭面赤腫用敷藥塗之火毒入目其目珠突出而瞎

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒患此以敷藥塗之腹脹喘搐而死

一兒患症似前用百解散而復赤腫用犀角解毒丸加人參愈

一兒傷食發丹大便秘結用保和丸四順清凉飲通之愈

一兒因乳母食炙煿辛熱致見爲患者用加味逍遥散加味清胃湯母子並服愈

柴胡清肝飲 治肝經風熱瘡毒

柴胡 丹皮 茯苓 山梔子

川芎 白芍 當歸 牛蒡子

甘草 連翹 水煎服

當歸和血飲 治瘡疥

四物湯加連翹牡丹皮荆芥防風

加味清胃湯

升麻 丹皮 生地 黄連

當歸 柴胡 山梔 水煎服

犀角消毒飲

犀角 生地 當歸 赤芍

荆芥 防風 連翹 牛蒡

丹皮 黄芩 甘草 薄荷

Fast Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

水煎服

赤遊火丹

此候皆由內有積熱蘊發於外被風熱毒之氣所干搏於血氣則皮膚赤腫行走不定若重者隨血氣虛處則流注焮腫赤色如火灼或成膿或乳母愛食煎煿辛熱致兒患此若遊走入腹入腎亦能殺人宜速治之用升麻黃芩連翹大黃朴硝水煎服又方用鬱金桔梗花粉甘草葛根薄荷煎服或用犀角消毒飲又方用生地赤芍當歸川芎荊芥防風黃芩煎服又方用慎火草杵爛敷之又方用馬齒莧杵爛敷之又方螺螄肉搗爛絞汁塗上又水中苔敷上又藍葉杵爛敷上○又有風塊遊走徧體或赤或白或痛或痒由風熱毒於氣血相搏而生也用升麻葛根湯加荊芥薄荷

痱瘡

痱瘡俗名痦子其狀如粟粒芥子色赤而痒搔之亦能成瘡夏月多生頭面或徧體皆由盛熱汗出而腠理開被風熱毒氣干於氣血而生也用冰片一分黃柏五錢白麪二兩臘茶一兩俱爲末以新綿搵藥撲破者敷之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黃水瘡 即浸淫瘡

皆由濕熱與氣血相搏而其瘡初生碎小後有膿汁浸淫漸大膿汁著處便濕爛成瘡用二黃膏松香散敷之

二黃膏

雄黃 雌黃 川烏 松香三錢俱爲末 亂髮一團燒灰存性

右以猪油六兩熬次入下三味煎至髮消盡以綿濾去滓入二黃攪勻磁器盛之塗瘡上

又方

松香五棓黃連海鰾鮑黃丹輕粉雄黃等分爲末摻之如乾臘猪油調塗

天泡瘡

由風熱毒氣客於皮膚搏於氣血而生始生如湯燙作泡皮破漿出成瘡用地黃膏塗之

地黃膏

生地 升麻 藍葉 山梔 大黃各一兩

右剉用猪油八兩文武火煎色變濾去查磁器盛之塗患處

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

又方

柏葉搗汁半盞水解服之

又方

用滑石青黛黃柏甘草各爲末敷之乾則以柏葉汁調塗

湯盪火燒成瘡

切不可用冷物泥塗之恐令熱氣不出伏溜潰爛深傷筋脉用小粉炒黑爲末麻油調塗又用風化石灰炒黃色地上出火毒麻油調塗　又方先以好酒冷洗用雞子十個煮熟去白以黃炒焦黑耵油一盞用生大黃末二兩調勻塗上又柏子房爲末麻油調塗

撲墮損傷

人之氣血循身周流而無停止小兒有因墮床或高處墜下或打撲損傷致血氣失度隨損處瘀凝不散致寒熱疼痛舉動不能用活血散復元散如折傷用乳香沒藥紫木香臘精雄雞熱血調攤紙上貼患處以布包外又以杉木薄板夾定又用布緊縛之骨折如舊

活血散

當歸　紅花　桃仁　甘草

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

柴胡　大黃　生地　蒲黃

水煎服

復元散

土鼈蟲不拘多少用壁喜窠包蟲在內以苧麻線縛定將黃泥包封火煅

紅花爲末五分　大仙人柴火煅醋淬爲末五分　古文錢火煅爲末一錢

自然銅煅三次爲末五分　乳香　沒藥各五分爲末

右和勻每用二分空心好酒調下小兒一分

又方

半兩錢不拘多少火煅醋淬脆研細　麝香少許

右共爲末每用一分好酒調下

治跌傷　用五爪龍草藥搗爛酒漿和貼

附驗方

巨勝子丸　補養氣血漆精固髓人服種子

胡麻炼淨不見水酒淘淨生地酒拌九蒸九晒　肉蓯蓉去中心膜焙乾

兎絲子去沙酒洗淨童便浸二日搗爲餅晒乾

枸杞子乾各十兩人乳浸蒸焙　破故子五兩鹽水拌炒

杜仲五兩去皮童便浸鹽酒炒去絲　茯苓二兩五錢人乳拌蒸

當歸二兩酒洗焙乾　牛膝五兩酒洗焙乾

麥冬一兩五錢去心焙乾　五味子一兩五錢敲碎蜜拌蒸焙乾

人參中年四兩少年二兩童便浸焙乾

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

附子一筒重一兩二錢者用童便甘草防風煮透用濕紙裹慢火煨之

何首烏五兩竹刀刮去皮米泔浸一宿用黑豆上蒸豆熟爲度去豆晒乾如此九次晒乾爲末少年不用

右爲末蜜丸如梧子大每用三錢空心白湯下

治腎虛腰痛

杜仲四兩鹽水炒斷絲　破故子三兩鹽水炒焙乾

川萆薢四兩四製米泔酒薑汁鹽水各浸一宿

胡桃肉八兩湯泡去皮再煮一時去油研爛

右爲末粘米糊爲丸如梧子大每用三錢空心鹽湯送下以食壓之

萬應奪命散　治瘡疽發背疔瘡無名腫毒喉閉

乳香置竹筒內煮自然去油　沒藥製上　丁香

木香　苦丁香　麝香各一錢　牛黃

蟾蜍各五分　血蝎二錢　巴霜五錢

右爲末酒漿糊丸如黍大壯實人每用九厘瘦人七厘小兒三厘臨卧用溫酒送下便利三四次愈

八味蠟礬丸　治瘡疽托裏護臟腑止痛消毒

明礬一兩　蜜蠟一兩　牛黃　眞珠

乳香　沒藥　硃砂各一錢　雄黃五分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

先將蠟溶化離火下衆藥和勻衆手急爲丸梧子大每用十丸加至二十丸溫酒送下日進三服

治驚風痰涎壅盛兼治瘧痢

麝香三分　牛黃　巴霜　砂仁

眞珠各五分　辰砂三錢半爲衣　滑石三錢水飛

右爲末飯丸如麻子大辰砂爲衣每歲二三丸薄荷湯下

截瘧方

大南星一個根上各挖開一孔用白礬末四錢置孔內兩星孔口對合以線扎定泥封固炭火煆存性去泥爲末用細茶白扁豆綠豆粉各一兩飛羅麵和爲丸黍大硃砂雄黃爲衣每用二分臨發日五更送下

治痢疾　初起服之積盡即愈　雁蕩僧傳

大黃　肥皂肉各一觔用好酒五觔煮乾再焙乾爲末

右爲末黃米糊丸如小豆大每用四錢空心生薑湯送下好酒亦可大小虛實加減

治痼氣偏墜小腸氣

薔薇子　黑丑炒　硫黃　荔枝肉　橘核

川練子各一兩　吳茱萸　大茴香

Last Asian Library Princeton University Library and the Gest Collection DO NOT COPY

檳榔　枳殼各五錢　木香三錢

右藥共爲末神麯糊丸如梧子大每用二錢空心薑湯送下

眞珠丸　治遺精白濁

眞珠一錢另研　玉蛤蜊殼四兩煅　黃柏末四兩鹽水炒

知母四兩鹽水炒

右爲末蜜丸梧子大青黛爲衣每用二錢空心鹽湯送下

治善貢頭一名軟癤

萊油一兩　黃蠟五錢　瀝青一錢　黃丹五分

羊骨髓一具

右藥同沙鍋內熬成膏紙上攤貼

又方

用鱉甲煆爲末飛麵和勻醋調塗上或用干槌膏貼之

治凍瘡　多生兩耳手足

黃柏　白芨　白斂等分

右爲末先以童便洗淨以麻油調塗

治陰囊生瘡痒搔黃水出

礬燒枯　五倍　細茶各等分　膩粉少許

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

右爲末先以醬水慈白川椒煎湯洗之用藥敷上

又方

黃連　胡粉各一兩　枯礬

右爲末敷之

治面上生瘡如火燒兼治火丹

氷片三分　黃柏末七錢　輕粉三錢

右爲末淨猪膽調塗濕則乾摻

又方

用鯽魚頭燒灰研末醬油調塗如出黃水乾糝

上一日一易

治小兒口傍生瘡

枯礬　蛇床子　髮灰　黃連

故絮灰等分

右爲末敷上

治咽喉一切諸病

五月五日午時取蝸牛十四條同陳白梅肉一

兩研爛入大黃末礬燒火馬勃末各一錢研爲

丸如圓眼大每用一丸綿裹含化下或以淨水

磨化灌之

治蛇咬

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

以人尿厚敷之用綿裹即消

治蜈蚣咬

以醋磨生鈹汁塗之

治天蛇頭

蜈蚣 全蝎 雄黃 等分

右爲末 油調敷

治汗斑

殭蠶 貝母 硫黃

右等分爲末薑片蘸藥擦

又方

窰陀僧海鰾鮪硫黃等分爲末薑片蘸擦

犬咬

先以小便洗用尨上青苔屑拔患處或牛糞塗之

杖瘡

大黃末水楊根蜒蚰如無用田螺肉同搗爛用白蘿蔔汁調以鵝翎擔上不可用熱湯浴又不可用冷藥

治刀斧傷

五月五日午時採芝蔴葉連根葱莖鹽醬石灰

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

花椒一同搗爛如泥作餅貼壁上候乾爲末聽用

治赤鼻

枇杷葉　白菓肉　芽茶　芭蕉葉各四兩

右爲末密九如黍大每用二錢白湯送下

又方

用明礬敲如米大每用八分空心白湯送下

治詐腮　即腮癰

用萱汁猪膽好醋濃磨京墨頻塗患處使半一日不乾立退

加味逍遥散

當歸　甘草　白芍　白术

茯苓　柴胡　丹皮　山梔

生薑三片水煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

痘疹傳心錄卷之十八

痘疹傳心錄卷之十八終

修敬堂

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library