PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

12

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

TC86/3054
v. 12

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之十九附種痘

朱純嘏輯
瘦樵程永培校

痘疹原於胎毒

易曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生夫乾爲父資始者氣之始也坤爲母資生者形之始也人之受氣于父成形于母是父精母血之毒已凝結于陽施陰受之時故曰胎毒不論富貴貧賤毒皆有之及兩間之雜氣交攻于五臟夫然後命門之胎毒外透矣始焉一點紅者血之色也血本水也天一生水地六成之水屬北方之坎在人身即腎也腎水充足

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

而更得水火土金之氣相長相養而成氣與血焉是血之源于腎也明矣雖分屬于心生血肝藏血脾統血籍令腎中水枯則心何自而生肝何得而藏脾何從而統哉合之五臟同一氣血也故痘出齊之後次第起發其漿漸充漿者毒之所化也迨膿成則毒解矣漿轉褐色回水結痂之候痂結蒼蠟色此一十二日之成功也俗不論陰陽五行之正理且曰惟腎無候又曰痘之變黑始歸腎也此皆不經之談予不得已故著說以辯之

種痘採痂法

凡採痂須擇極順之症其險症逆症之痂斷皆不可用若春秋二季一月之痂可種若夏五六月半月之痂可種冬月嚴寒四五十日之痂亦可種蓋以寒則氣聚熱則氣散故有不同耳

凡一歲之兒女可用痂三十粒於淨磁鍾內以柳木作杵研此痂爲細末用潔淨棉花些須又用潔淨之水春秋溫用夏則涼用冬則略帶熱用滴三五點於鍾內乾則又加幾點總以研勻不乾捏成棗核樣以紅絲線拴定約留寸許長餘則剪去納於男左女右之鼻孔內線露在外以防吸上未滿一歲者種六箇

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

時辰取出若二三歲者十箇時辰取出即十二箇時辰亦可

種苗取出後約計五日而五臟傳遍至七日身必發熱發熱三日苗必現焉見苗三日而出齊出齊之後痘必次第長漿漿長三日而膿漿充足旣曰足漿則回水結痂之候也以發熱三日應天時正二三月春令發生之時見苗出齊應四五六月夏令長養之時長漿足漿應七八九月秋令成熟之時回水結痂應十月十一月十二月冬令收藏之時也若未出齊以及灌漿未足不妨多一日以象閏月此在人神而明之也

續補種豆之法乃後人之變法也其法造一銀管約長五寸其管之孔略小于鼻之孔可以入得鼻內先著痘痂末於管內對上鼻孔輕輕吹入鼻中此續補之一法又有以出痘之衣當長漿足漿三四日內痘氣充盛取其貼身裹衣與未出痘之兒女穿二三日夜間亦不脫下至九日十一日始發熱曾見七日發熱者十中不過一二此乃衣傳然恐氣薄不透多有不熱不出若夫狂妄之輩挑破痘漿而作種者此乃不仁之人所爲也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄　卷一

其種痘之法總以上好痘痂爲之藉其天地陰陽之正氣以氣相傳順而又順凡一切麝香等味俱不用

謹記謹記

痘苗取出三五日之後男左女右頸項之下與咽喉相隔不遠微有小疙瘩此痘苗將發之候也然此說不可一槩而論亦有無疙瘩者其苗亦發若痘長漿之時必用藥催漿得漿充足疙瘩自消散若消散不盡勢必凝結而爲痘毒矣

凡種痘甫及一歲者爲上若長至五六歲知識漸開未免任其性情不依調理不肯服藥難於種痘學種痘者當先知之

凡所種之幼稚男女必要辨別其精神夫所謂精神者面部有精采喜色明亮透達印堂山根年壽無青暗之色滿面紅光純粹者吉所謂神者兩目視瞻平正愈看有神至於神之完固乍見奇異而不驚就看熟識而必要神情安逸嬉笑自如更兼目有精光者吉若目無神思昏蒙倦怠者不種更要詳察其形氣夫所謂形氣者頭面胸背手足形也體之各具者也必要詳看其骨肉相稱肥不見肉瘦莫露骨肉色要緊微帶紫黑色者吉若鬆寬如發麪樣者不種所謂

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

氣者體之充也天柱端正頸不歪斜手執物件把持有力站立懷中脚不倦怠小便遠而長腎囊緊小微帶紫黑色如荔枝殼者吉若形氣倦怠呼吸之氣不均勻出入粗細不一者不種　目無神者　面無喜色者　皮肉如發麪樣者　形氣瘦弱者　內有痞積者　病後虛弱者　吐瀉纔愈元氣未復者　渾身有疥瘡者　生大毒正氣未復者　聲音不亮并不長者俱不可種

辨別七暈論

痘出而根脚有暈其名有七焉辨之不可不早也痘粒之尖圓者氣充也實也痘粒之平塌者氣弱也虛也若以暈言之老紅也紅紫也紅紫乾枯也淡紅也焦紅也鋪紅也淡白也此七暈之分別也其中有順險逆之分焉

老紅者暈色紅而老不嬌妖也不閃爍也不乍紅而乍淡也亦不帶紫也此老紅之暈必發熱三日而始見痘苗也身體必平和不甚熱也必能飲食也二便必調也精神必清爽也此順症也痘出必稀疎即多

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

有百十粒亦順症也

紅紫者痘色深紅而帶紫也必發熱二日即見痘苗也身必熱微煩燥也當以敗毒和中散主之看其出齊即用清毒活血湯催其長漿漿足亦歸於順

紅紫乾枯者初見痘苗即見如此暈脚其症多係逆症必發熱一日即見痘苗報痘必稠密必大熱蒸蒸煩躁昏沉不省人事唇焦口渴此危症也其症多不可救若大便結燥二三日不解小水短澁又黃此毒火內盛急宜下之以清其毒火仍宜用敗毒和中散加熟大黃以利之毒火必從此而少減看其出齊即以清毒活血湯催其長漿向之所謂紅紫乾枯者今見根脚紅活漿在汎起此尚可救若仍復乾枯不見起長不見泛漿加之身熱蒸蒸煩躁頓悶譫語昏沉不省人事不思飲食痘乃平塌中有黑靨此必不可救也

淡紅者暈脚四圍淡紅有嬌嬈之色以紙燈照之若有紅色若紅色不定將來必變淡白色此乃氣血俱虛若初見痘苗之時見此淡紅暈脚寒涼之藥切不可用倘或身不退熱微有煩躁宜用敗毒和中散去苓連紫草茸加羌活蘇葉白芷以托其苗俟其出齊

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

以千金內托散催其長漿漿足仍歸於順若先悞用寒涼暈轉淡白急用參歸鹿茸湯以救之緩則成灰陷矣此淡紅之暈易於變淡白不可不知

焦紅者初見痘苗頂乃先焦根脚紅紫有芒角不見滋潤暈脚不圓且又帶紅紫乾枯此乃毒火內盛若初見痘苗急用敗毒和中散倍加芩連紫草茸以托之俟其出齊熱不減不能食兼之神昏不省人事煩躁頓悶水漿不入則不可救矣倘或熱少減神氣稍清能食不甚煩躁急以清毒活血湯催其長漿若漿足仍可歸順此在神而明之存乎其人也

鋪紅者痘無紅暈痘粒淡白通身皮肉盡紅故名曰鋪紅良由毒火內盛氣不能統血散漫於皮膚之間也若神清能食痘稀疎者可治若人事昏沉則不可救矣

淡白者痘之根脚四圍無一絲紅色止見有淡白之痘而亦不見其有暈也蓋因氣血兩虛或因久病之後或因吐瀉之後或因生母有病以致折乳或因內有積患或因生大毒膿血出多元氣傷洩之後故出此淡白之痘初見痘苗宜用加味參蘇飲以托之俟其出齊即用千金內托散催其長漿如或漿不足即

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

用參歸鹿茸湯以催之今日不足來日再催予曾治此等氣血兩虛之症竟至一十二日成滿漿者今之庸醫見八九日漿不滿而平塌者盡委而去之皆因內無學問知識平常未見久吾聶氏活幼心法之書又不能親敬高明未免自以爲是予業痘疹有年此七等之暈辨別極其詳細得之於心而應之於手雖前哲未曾分晰明言今特表而出之以開示後學沉潛玩味廣其知識一臨此等七暈之症內有一定之主意外用合宜之藥味舉斯世之幼稚咸出險途而躋壽域豈非仁人君子之存心哉

逆症一十三條論

蒙頭一也面部身上及手足俱稀疎獨頭上以至髮際形若蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

蓋面二也他處俱稀疎獨面上形若蠶種無絲毫空處此逆症也若稠密有地界又當別論

托腮三也他處俱稀疎獨兩腮頰及地角相連一片形若蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

鎖項四也他處俱稀疎獨項間形若蠶種無絲毫空處此逆症也若稠密有地界又當別論

雲錦鋪胸五也他處俱稀疎獨胸前一處上連咽喉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

之下下及兩乳之間形若蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

雲錦鋪肩六也他處俱稀疎獨兩肩及後頸窩形若蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

前後補服七也他處俱稀疎獨心窩之下肚臍之上脊背鳳翅骨之下脊後腰之上前後如職官穿補服樣或方或圓一片形若蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

斷橋八也他處俱稠密不分地界獨脊背腰之上下及臍之上下前後不見痘粒此逆症也猶橋之有梁而中斷也若上下別處所出之痘有地界猶可望生又當別論

蠶蟇瘟九也徧身上下痘出稠密不分地界惟胸腹之間不見痘粒有似於蠶蟇形狀故名蠶蟇瘟此逆症也若稀疎又當別論

無根十也通身上下痘俱稠密不分地界獨兩手心兩足心無痘蓋以手足爲諸陽之本陽經則兩手心兩足心皆不出痘此逆症也若通身出痘稀疎又當別論不得拘泥於此也

枯樹挂蛇十一也有單挂有雙挂有挂在手肱者有

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

挂在腿股者他處俱稀疎獨挂處如蛇形而纏繞之密如蠶種此逆症也倘稀疎有地界又當別論

束帶橫腰十二也他處俱稀疎獨後腰及腰周圍如束帶形密如蠶種闊不過二寸此逆症也倘或稀疎又當別論

形如瓜瓠十三也痘初見標尚未出齊以及將出齊之際痘未見起發而面部腮頰以及兩目俱皆腫脹形如瓜瓠此毒氣內盛先攻脾肺此逆症也煩躁頓悶昏沉不省人事者決不可救

之業幼科者遵子之定論不待其出齊而用藥催漿不亦失之於太早乎予應之曰善哉爾之問也既云出痘按一十二日之期應天時一十二箇月令有春令發生夏令長養秋令成熟冬令收藏之義焉倘未出齊遲一日以象閏月也若明此閏月法則長漿不能及時充滿亦可遲一日以象閏月則痘漿未有不成者也予故曰其中有至理存焉何前代名醫於此不深講究也今特表而出之以與業幼科者共明此一十二日之至理也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘分十二論

治痘計日有一十二日之期乃按天時十二箇月令也其中有至理存焉發熱三日應天時正二三月也見苗以至出齊應四五六月也長漿以及足漿應七八九月也回水結痂應十月與十一十二月也此一定陰陽造化之權衡也世人不明陰陽造化之理而乃除去發熱三日不算乃於見痘苗之日算起乃曰出三日長三日灌漿三日回水結痂三日是將十五日作十二日也何其不明之甚也若曰出三日者無大關係猶可混得過去若謂長三日則長何物殊不

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

知長者長漿也既云長漿又曰灌漿不亦重疊而言之乎庸醫執此當長漿三日之際總不言漿且曰長得痘之顆粒好亦不用藥催漿及後面部轉褐色乃回水之候彼方用藥催漿痘不甚稠密尚可延捱若毒火內盛及氣血虛弱鮮有不悞事者此皆長三日之一言悞其時日不能催其長漿以致膿漿不成變症蜂生雖有明醫難保其後矣或問之曰子言一十二日必連發熱三日而算以合天時正二三月也若痘出稠密倘爲風寒所束出得遲滯三日不能出齊者有之予今乃曰見苗以至出齊應四五六月倘後

痘科緊要成方藥之分兩多少俱以半歲孩童爲式大者添之再小者減之

加味升麻葛根湯

白粉葛一錢　升麻三分　牛蒡子五分揀淨炒香研碎

小川芎七分　蘇葉六分　桔梗六分　山查肉八分　赤芍五分　防風七分去蘆　甘草二分生去皮

生薑三片同煎熱服取微汗

升麻葛根湯十味　赤芍防芎甘桔是

歌曰　山查蘇葉及牛蒡　體氣壯强斯藥治

加味參蘇飲此乃初發熱時所用之加味參蘇飲也

人參二分或無亦可倘元氣虛必要　蘇葉七分　前胡一錢

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

小川芎七分　山查肉八分　桔梗五分　白茯苓八分去皮　白粉葛八分　陳皮七分　半夏三分　牛蒡子五分揀淨炒香研碎　甘草二分生去皮

生薑三片同煎熱服取微汗

歌曰　加味參蘇白茯苓　前陳甘桔半芎平　牛蒡查肉和乾葛　體氣虛羸用此靈

以上二方即是傷感而非痘疹服之發汗亦無妨

敗毒和中散

連翹七分去心研碎　防風七分　荊芥七分　黃連一分不用酒炒　牛蒡子七分製同前　桔梗六分　陳枳殼五分

炒　前胡一錢　紫草茸五分酒洗研末　小川芎七分　升麻三分　木通七分　蟬蛻十二隻如有閏月十三隻洗淨曬去頭足　麥門冬一錢去心　甘草二分生去皮

生薑一片燈心五十寸同煎服

如大便秘澀加酒炒大黃八分微利之不秘者勿加　如毒火盛加酒炒黃芩二分

歌曰　敗毒和中翹桔草　牛蟬前麥芎連好　通麻芩殼紫荊防　便秘蒸黃微利早

升消平胃散

小川芎七分　香附一錢炒　蒼朮六分炒　紫蘇七分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

厚朴六分薑汁炒　藿香五分　砂仁五分研碎　白芷六分

陳皮六分去白　麥芽八分炒　山查八分去核　甘

草二分炙

煨薑三片同煎帶熱服

歌曰　升消平胃朴陳芽　白芷蘇芎藿附砂

吐瀉內傷兼腹痛　須加蒼朮草山查

參砂和胃散　即香砂六君子湯

人參三分去蘆　砂仁七分研碎　半夏五分　陳皮六分

白朮一錢炒去蘆　白茯苓八分去皮　藿香六分　甘草

三分炙

煨薑去皮三片同煎服

歌曰　胃氣中虛嘔吐頻　參砂和胃散尤靈

陳皮白朮煨薑引　藿半隨甘白茯苓

朮苓調脾散

白朮一錢炒去蘆　白茯苓八分去皮　眞神麯八分炒　白

芍六分酒炒　白萹荳八分薑汁浸去殼炒　砂仁六分炒研　香附

七分炒　厚朴六分薑汁炒　甘草三分炙　或加人參三分

煨薑三片大棗一枚去核同煎服

歌曰　脾土中虛泄瀉作　朮苓調脾萹荳朴

砂仁草附或加參　神麯煨薑炒白芍

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

清解散

防風七分　荆芥七分　蟬蛻十二隻去頭足如有閒十三隻
桔梗六分　小川芎七分　前胡一錢　連翹七分
去心　乾葛八分　紫草茸五分研末　升麻五分　木
通七分　黃芩五分酒炒　山查肉八分　牛蒡子七分
製同前　黃連二分酒炒　甘草三分生去皮
生薑三片同煎溫服

歌曰　清解荆防升葛通　芩連甘桔茸川芎
前胡蟬蛻蒡翹共　查肉生薑引有功

蘇解散

防風七分　荆芥七分　蟬蛻十二隻去頭足如有閒十三隻
桔梗六分　小川芎七分　前胡一錢　乾葛八分
升麻五分　紫草茸五分研末　木通七分　紫蘇
七分　連翹五分去心　牛蒡子五分同前製　白芷七分
羌活五分　山查肉八分　甘草二分生去皮
生薑三片同煎帶熱服

歌曰　蘇解前羌白芷同　荆防升葛紫翹功
牛蒡蟬蛻山查肉　甘桔淮通及撫芎

溫中益氣湯

人參五分　白朮一錢　黃耆八分生　防風七分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

當歸身七分酒洗　白茯苓八分　南木香三分
川芎七分　山查肉八分　白芷七分　官桂二分
甘草三分炙
生薑一片大棗一枚去核同煎服
歌曰　溫中益氣用生耆　參朮歸身官桂宜
白芷防芎查肉草　木香應與白苓俱
調元化毒湯
緜黃耆一錢生　當歸身八分酒洗　牛蒡子七分炒研　人
參三分　白芍七分酒洗　連翹七分去心　木通七分
黃芩五分酒炒　黃連二分酒炒　防風七分　荊芥七分

桔梗六分　前胡一錢二分　蟬蛻十二隻去頭足如有閏十三隻
紅花三分酒洗　紫草茸五分酒洗研末　生地黃一錢酒洗　山
查肉一錢　甘草二分生去皮
生薑一片同煎溫服
歌曰　調元化毒參耆芍　紅紫牛蟬荊芥著
歸地前通查肉翹　芩連草桔防風度
加減參蘇飲與前加味參蘇飲不同
蘇葉一錢　人參二分　陳皮七分　羌活六分
小川芎八分　防風七分　荊芥七分　桔梗
五分　白芷六分　甘草二分生去皮　冬月加麻黃

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三分

生薑三片同煎熱服但不可出汗

歌曰　驚搐休云作等閑　風寒外束出艱難
參蘇羌芷芎防芥　甘桔陳麻笑解顏

平和湯

人參三分　當歸六分　桔梗六分　白芍五分
紫蘇六分　黃耆一錢生　防風七分　白芷七分
官桂二分　沉香二分　檀香二分　藿香二分
乳香二分燈心同研

生薑一片同煎溫服

歌曰　穢氣相衝不可當　教君急用平和湯
參耆歸芍蘇防芷　桂桔沉檀乳藿香

薑附湯

白附子三錢　老生薑二錢

濃煎湯灌下一二酒杯出微汗即愈

歌曰　痘出傳風眼直斜　牙關緊閉襲風邪
此時勿用驅風藥　白附薑煎汁當茶

清毒活血湯

紫草茸七分研末　當歸八分酒洗　前胡一錢　牛蒡子七分炒研　木通七分　桔梗六分　生地黃一錢酒洗

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

連翹七分去心　人參五分去蘆　生白芍五分酒洗　黃芩五分酒炒　黃連二分酒炒　生黃耆一錢五分　甘草二分生去皮　山查一錢去核

生薑一片同煎服

煩渴者去參耆加麥冬一錢五分去心　花粉七分

歌曰　清毒活血紫參耆　牛子當前白芍宜　生地芩連翹桔草　山查薑引木通提

參歸鹿茸湯此方有起死回生之力分兩因人之大小加減

鹿茸三錢酒塗炙稍可用酥炙更好　嫩緜黃耆五錢蜜炙　甘草五分炙　人參三錢去蘆　當歸身一錢酒洗

薑一片好龍眼肉三箇同煎去渣入好酒一杯溫服

兒能飲酒者濃煎藥汁與酒相半和服亦好

如困倦手足冷飲食少者加廣木香三分公丁香三分官桂三分砂仁三分

如漿不足九十日之間或有作寒戰咬牙者再加官桂二分熟附子三分

如大便泄瀉膿漿難成去當歸加麪炒白朮一錢酒炒白芍七分白茯苓八分木香三分丁香二分肉桂二分肉荳蔻五分麪裹煨熟搥去油

Dr. Ashish Library and the Gest Collection
Princeton University Library

用柯子肉二分煨熟

倘瀉不止另用參术散　兼用七味荳蔻丸

歌曰　參歸鹿茸用三錢　蜜炙黃耆貴嫩緜

甘草炮來薑一片　禍元好酒服安然

千金內托散

人參五分去蘆　當歸身一錢酒洗　嫩緜黃耆二錢五分蜜炙

大川芎七分　山查肉一錢　南木香三分　白

芍五分　官桂三分　防風七分　白芷七分

厚朴七分炒　甘草三分炙

生薑一片好龍眼肉三箇同煎入好酒和服

隨症加減法同參歸鹿茸湯

歌曰　千金內托十二味　歸芍參耆防芷桂

木香甘草及川芎　厚朴山查薑酒是

參耆湯

人參一錢五分去蘆　黃耆三錢蜜炙　官桂五分　甘草一錢炙

生薑一片同煎溫服

歌曰　血泡通紅不作漿　惟有參耆四味湯

炙草一錢官桂五　管教服藥得安康

參麥清補湯

人參五分　麥門冬一錢酒蒸曬乾　白花粉八分酒蒸曬乾

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

前胡一錢　生黃耆三錢　牛蒡子八分炒研　炙甘草三分　生甘草二分　酒炒白芍五分　生白芍三分　當歸身七分酒洗　紅花五分酒洗　大川芎七分　桔梗七分　生地黃一錢酒洗　山查一錢去核

生薑一片好龍眼肉三箇同煎頻頻溫服

歌曰　參麥清補甘草芍　半生半熟紅花著　生耆歸地桔川芎　花粉前蒡查肉度

梔連二陳湯

黃連三分汁炒薑　白茯苓七分　梔子二分薑汁炒　半夏二分薑製　炙甘草二分　陳皮五分去白

生薑一片同前緩緩服吐止即勿服

歌曰　行漿作吐兩般云　毒火梔連合二陳　困倦參砂和胃散　共間痘色要分明

加味四苓散

猪苓七分　木通七分　澤瀉八分　黃芩五分酒炒　黃連二分酒炒　赤茯苓七分　牛蒡子五分炒研　車前子七分炒

燈心五十寸同煎食前服

歌曰　行漿作瀉甚難當　小便紅黃毒氣猖　加味四苓車木共　芩連牛子一齊嘗

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

參朮散

白朮一兩用裹白無油者去蘆炒　人參五錢去蘆　砂仁五錢炒

白茯苓五錢去皮　炙甘草五錢去皮　南木香二錢　廣

陳皮四錢洗淨去筋膜曬　山查肉五錢炒　家蓮子五錢炒去心

肉荳蔻四錢麪裹煨熟去麪切細用紙包打去油　柯子肉四錢煨去核

眞神麯五錢炒　薏苡仁五錢炒熟

共爲極細末每用二錢清米飲調食前溫服兒有不肯服者入稀粥內和服亦可

歌曰參苓砂草薏苡仁　蓮肉山查五麯神

南木三陳柯蔻四　其間白朮兩分明

七味荳蔻丸

肉荳蔻五錢製同前　柯子肉五錢煨去核　白龍骨五錢煅

南木香五錢　赤石脂七錢煅五次　枯白礬七錢

砂仁五錢炒

麪糊爲丸如菉荳大每服用清米飲下或二十丸或三十丸量兒大小與之兒有不能吞丸者將丸研碎化入粥內服之亦可

歸耆湯

當歸身三錢　黃耆二錢蜜炙　酸棗仁一錢五分炒研

白水煎服

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

歌曰　漿足身涼汗不止
惟有歸耆酸棗是

養胃開痰湯

人參一錢去蘆　白朮一錢五分土炒　白茯苓一錢　桔梗五分　家蓮肉一錢去心炒　山查肉一錢　山藥一錢炒　陳皮八分去白　半夏五分薑製　甘草五分炙

生薑一片同煎溫服

灌漿時忌用朮苓半夏恐其燥乾津液膿漿不行也至將靨時可用矣

渴者去半夏加麥冬一錢去心　北五味九粒研碎

吐逆者加藿香七分砂仁七分炒研

此時有欬逆者乃胃氣上越也取真黃土鼻邊聞之立止

歌曰

養胃開痰參朮草　茯苓山藥山查寶
蓮肉陳皮半桔奇　渴服麥冬五味早
若還吐逆藿香砂　黃土鼻聞須論討

建中湯

人參三錢去蘆　黃耆三錢蜜炙　乾薑五分炒　肉桂五分
白朮一錢五分土炒　當歸身一錢　大川芎八分　公
丁香五分　大附子五分製熟　甘草三分蜜炙

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

生薑一片同煎溫服

歌曰　咬牙寒戰建中湯　參朮黃耆熟附當
肉桂炮薑須炙草　川芎薑引用丁香

溫表調中湯

黃耆一錢五分蜜炙　人參一錢去蘆　白茯苓一錢　白朮一錢土炒　官桂三分　大川芎七分　防風五分
白芷五分　丁香三分　當歸身七分　乾薑五分
熟附子三分　炙甘草三分

生薑一片同煎溫服

歌曰　溫表調中參朮耆　丁香熟附桂當歸
曰　茯苓甘草乾薑共　白芷防芎一處施

清表散毒湯

地骨皮一錢　麥冬一錢五分去心　花粉一錢酒炒　牛蒡子八分炒研　連翹七分去心　當歸八分　猪苓七分
澤瀉七分　黃芩七分酒炒　甘草三分生

水煎溫服

歌曰　清表散毒地骨冬　牛蒡花粉草翹宗
炒芩澤瀉猪苓共　歸與同煎用木通

消毒散血湯

牛蒡子一錢炒研　生白芍六分酒洗　桃仁一錢炒研去皮尖

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

大黃一錢酒炒 乳香五分燈心同研 沒藥三分 紅花五分酒洗

水煎溫服

歌曰 靨時腹痛著中脘 消毒散血湯莫緩
炒過桃仁熟大黃 紅花沒乳芍牛上

清毒保目湯

柴胡一錢 連翹七分去心 梔仁三分炒 黃芩五分炒
荊穗七分 防風七分 赤芍七分 牛蒡子七分
炒研 蟬蛻十二隻去頭足如有鬥十三隻 當歸八分 甘草三分
生川芎七分 升麻五分 薄荷五分 桔梗八分

引用燈心五十寸

歌曰 清毒保目荷柴蟬 翹桔荊防赤芍緣
升麻牛子歸芎草 酒炒梔芩降火全

大連翹飲 此方內涼藥多俱要製過斟酌用

連翹一錢去心 牛蒡子七分炒研 山梔子五分酒炒 柴胡八分去蘆 當歸八分 赤芍七分 防風七分 木通八分 荊芥七分 黃芩七分酒炒 滑石五分末
蟬蛻十二隻去頭足 車前子八分炒 甘草三分生去皮
生薑一片同煎服

大便秘加酒炒大黃一錢微利之

歌 大連翹飲炒梔芩 柴滑荊防赤芍勻

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

曰 通牛蟬蛻歸車草 便秘蒸黃耆意尋

補中益氣湯 此方專治痘後元氣虛弱者

人參五分 黃耆一錢蜜炙 白术八分土炒 柴胡五分

升麻五分 陳皮七分 歸身八分 甘草三分炙

生薑一片同煎溫服

虛湯者加麥門冬一錢去心五味子九粒研碎

寒熱似瘧者加炒白芍五分製半夏五分

歌曰 參耆歸术

升陳柴草

元參升麻湯

元參一錢 升麻五分 防風七分 荊芥七分

牛蒡子七分炒研 甘草三分生去皮

水煎溫服

有夾痲疹而出者加桔梗七分酒炒黃芩七分

同煎服

歌曰 赤點紛紛號夾斑 如雲冥起又名丹

碎碎紛紛名夾疹 三症分明在此間

升元湯草牛防芥 夾疹須知芩桔關

參耆實表湯 此方專治痘作瘡者

人參五分去蘆 黃耆一錢五分蜜炙 甘草三分蜜炙 官桂三分

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

防風七分　白芷七分　川芎七分　當歸七分
桔梗五分　南木香三分　厚朴五分薑汁炒
生薑一片同煎溫服

歌曰　參耆實表保元湯　官桂芎防芷朴當
甘桔木香薑作引　氣虛作癢賴安康

參歸大補湯

人參五分　當歸八分　蜜炙黃耆一錢五分　川芎七分
桔梗五分　蜜炙甘草三分　山查肉八分
紫草茸五分研碎　南木香三分　防風七分　白芷七分
厚朴六分薑汁炒

生薑一片同煎溫服

此方專治痘不起脹而面白頸項腫如瓜瓠此危症也急以此方連進二三劑治之必要腫消痘起方有生機

歌曰　參歸大補炙黃耆　紫茸川芎白芷宜
桔梗山查防厚朴　木香甘草用休遲

四聖膏治痘疔聖藥

珍珠生研　豌豆燒存性　亂髮燒灰　冰片各等分

用油胭脂和成膏先將金銀簪撥開疔口將藥填入疔內即紅活

© NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

拔毒散 此散治痘疔及賊痘紫浮萍其効如神

明雄黃

不拘多少研細末又將滚白水炮緜胭脂取濃汁調點疔頭上

三荳漿 敷痘毒聖藥

黑荳 菉荳 赤小荳

各一合研爛爲末用醋研濃漿時時以鵞翎掃之紅腫退去其効如神

生肌散

地骨皮 黃連炒 黃柏炒 五倍子 生甘草

各等分

共爲細末乾摻之

緜繭散 治餘毒流注各處出清水者

出蛾緜繭不拘多少用生明礬末塡在內燒令汁盡成灰爲末乾摻之

髮灰散 治痘出未齊而鼻衄不止

用少壯無病人亂髮不拘男女用肥皁洗淨油垢氣又用溫湯洗淨肥皁氣焙乾量髮多少用新瓦礶一箇將髮塡入內令滿用淨瓦片蓋口鹽和泥封之又全封瓦礶曬乾用木炭火圍礶一半煆一

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

炷香久取出候冷其灰成塊研令極細每用二錢童便七分酒三分調服立止輕者只用灰吹鼻亦止

此方極妙不惟可用之痘瘡凡諸血症皆可用

清肺湯

花粉一錢酒炒　麥門冬一錢五分去心　天門冬一錢去心皮酒蒸

桔梗六分　當歸一錢不用尾酒洗　生白芍七分酒洗　黃芩七分酒炒　知母七分蜜炒　丹皮七分酒洗　甘草三分生

生薑一片同煎服　人髮灰一錢調服尤妙

歌　毒氣薰蒸鼻流血　毒氣亦因從血泄

曰　天麥丹皮知母芩　當歸白芍花甘桔

清上飲

薄荷七分　防風七分　桔梗六分　連翹七分去心

白粉葛一錢　牛蒡子七分　麥門冬一錢五分去心

黃連三分酒炒　黃芩七分酒炒　花粉八分酒炒　甘草三分生

生薑一片同煎溫服

歌曰　口舌生瘡名熱毒　細察痘苗分所屬

清上荷防草麥牛　芩連花葛桔翹逐

赴筵散

薄荷葉三錢蘇州者佳　黃栢五錢川中者佳

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

各等分爲末人青黛一分和勻搽之

利咽解毒湯

山豆根五分　麥門冬一錢五分去心　牛蒡子一錢炒研

元參一錢　桔梗一錢　防風七分　甘草五分生

生薑一片同煎食後良久分二三起緩緩溫服

利咽解毒麥元參

歌曰

甘桔防牛山豆根

玉鎖匙

硼砂一錢　朴硝五分　殭蚕三條　片腦一分

北爲細末以竹管吹之

導赤散

木通一錢　赤茯苓八分　車前子一錢微炒　麥門冬一錢五分　生地一錢　人參二分去蘆可有可無　甘草三分

燈心五十寸同煎饑時服

清毒撥醫湯

黃連三分酒炒　當歸一錢酒洗　花粉七分酒蒸　桔梗七分

川芎七分　防風七分　薄荷七分　柴胡八分

牛蒡子七分炒研　草決明七分研　羌活五分　甘菊

花七分　蜜蒙花七分　白蒺藜七分炒研去刺　穀精

草七分　川木賊五分　生地黃一錢五分　白粉葛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

七分 山梔子 五分酒炒

生薑一片同煎食後良久服

大便秘澁者加酒炒大黃一錢五分通仍除之

歌曰 清毒撥翳草連梔 牛賊蒙精決蒺藜

生地羌防柴菊葛 川芎花粉荷當歸

痘與疹避忌

避穢氣

腋下狐臭氣 房中淫液氣 行遠勞汗氣

溝糞濁惡氣 婦人經候氣 諸瘡腥臭氣

砒硫蚊烟氣 誤燒頭髮氣 吹滅燈燭氣

柴烟魚骨氣 葱蒜韮薤氣 煎炒油烟氣

醉酒葷腥氣 麝香燥穢氣

守禁忌

生人往來 詈罵呼怒 對梳頭 對搔癢

勿掃地 勿對荒言 勿使僧道師巫入房

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

勿對飲食謌樂

以上諸避忌謹之則重可變輕不謹則輕變重矣

小兒相法

欲知小兒壽殀當於相法推詳若夫富貴貧賤善惡窮通雖由祖父之積德累仁有以栽培善根而富貴通達隨之而至然能膺此福澤其形容氣質天資穎悟必有大過人者所謂天之報施不爽也　聲喜清喨悠長最忌豺狼音韻聲如病貓不壽又喜聲如洪鍾氣能接續　頭欲圓有骨格前天庭宜高聳日月角宜峻峭兩傍頭角要崢嶸頭後枕骨分品字偃月

髮長宜稀而黑髮際宜高不宜低　五官宜正不喜歪斜　人中宜深地角宜方而圓　眉喜清秀而

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

高　眼喜黑白分明視瞻平正一身之精神全在兩目決斷最嫌雞眼羊眼以及斜視上下露白更加昏矇無神俱非吉兆　耳愛有垂輪廓分明　鼻喜端正豐厚如垂膽如截筒　口宜濶大切忌弔唇　面要豐滿大怕偏陷　身肥胖不喜純見乎肉必要骨格相稱且肥胖者肉宜緊密不喜如發麵模樣色雖白必要帶些紫黑色　身瘦削不喜脊骨稜崢必要肉勝於骨　腎囊宜緊細紫色如荔枝殼者壽寬大白色者多疾　又有看小便之法若小兒尿得遠且又長此長壽之徵也若尿最近乃腎氣不充必不壽

手腕宜長手指宜纖手背宜厚　足骨宜短足背宜厚　肩欲平正背脊及腰俱喜豐滿　臍窩宜深腹要下垂　鼻梁不喜帶青色紅黃色最吉青色主有疾　兩口角宜朝上不宜平而向下　男子八個月長門牙女子七個月長門牙先長下牙者吉凡男女能享長年良由幼小之時形容體格有以基之斷非僥倖勉强而致之者矣

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

痘疹傳心錄卷十九

痘疹傳心錄卷十九終

余既刻朱濟川痘疹傳心錄因思種痘一法得以預爲調理乘春秋之和爽避冬夏之寒暑不使風寒外侵飲食內積故其所施百不失一暇日流覽醫書如赤水元珠張氏醫通間有附載皆不甚詳茲見朱純嘏痘疹定

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

論彼以種痘知名官太醫二十五年南自豫章以至鴨綠江北各隨土地施治無不奏功其技妙入神矣此書曾刊于康熙癸巳時年已七十八採痘下苗諸法俱備有發前人所未發并種法之不可少者悉照原本以付

剞劂附于痘疹傳心錄之後至于調治用藥乃遵聶久吾活幼心法不出朱濟川之範圍故不復採蓋種出者與自出者同治耳讀是書者毋以兩科歧視可也

乾隆丙午仲春瘦樵程永培志

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library