PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

3

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2557
V.3

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

訂補明醫指掌卷之二

○眞中風一

歌 府中風邪顯六經。面加五色表之形。若還中藏多便閉。絕症臨之命必傾。半身不遂喎斜口。此是風邪中在經有表汗之須續命。六經加減認教眞須知在裏溲便秘。實者尤當三化行。原無表裏秦艽治大要清心靜養神

論 經云。風爲百病之長也。善行而數變。或爲寒中。或爲熱中。或爲寒熱。或爲偏枯。或爲薄風。皆爲風也其變莫測。然八方之風邪。中人則有中府。中藏。中

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

經脉之分。所以別其邪之淺深也。中府者。有表症面加五色。脉浮弦而惡風寒。拘急不仁。現六經形証。治宜汗之。亦不可過汗。損其衛氣。中藏者內閉九竅。故唇緩失音。鼻塞。耳聾。眼瞀。大小便秘。故可下之。亦不可過下。損其榮血。中經脉者。外無六經形症。內無便弱阻隔。故治之在經。無表裏症。不可汗下。宜靜勝其燥。是養血也。大秦艽湯。其有痿痺。癱瘓偏枯。痛痒。頑麻。中痰。中氣。似風而非風也。故另立類中風條以別之。

脉　中風浮吉。滑兼痰氣。其或沉滑。勿以風治。或浮或沉而微而虛。扶元治痰。風未可疎。浮遲者吉。急疾者殂。

○中府

中府者。廢肢節。審其六經形症。用加減續命湯。初中先須理氣。烏藥順氣散。對星香散。若兼中藏大便秘。三化湯。失音舌強。大秦艽湯。痰涎盛者。稀涎散竹瀝湯。荊瀝湯。

加減續命湯

麻黃去節　人參去芦　黃芩去腐　川芎

芍藥酒炒　甘草炙　杏仁去皮尖麩炒

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

防己去皮　桂枝爭炒　防風去芦各一錢

附子炮去皮臍五分

右㕮咀。生薑三片。水二盞。煎至一盞。通口服。逵按古人以此方混治中風。未詳其証。蓋麻黃杏仁麻黃湯也。仲景以之治太陽証之傷寒。桂枝芍藥。桂枝湯也。仲景以之治太陽証之中風。如此言之。則中風而有頭痛身熱脊强者。皆在所必用也。人參甘艸四君子之二也。局方用之以補氣芍藥川芎四物湯之也。局方用之以養血。如此言之。則中風而有氣虛血虛者。皆在所必用也。風淫末疾故

佐以防風。濕淫腹疾故佐以防己。陰淫寒疾故佐以附子。陽淫熱疾故佐以黃芩。蓋疾不單來。雜症而至。故其用藥亦兼該也。如治中風不審六經之形症加減。雖治與不治無異也。宜以此湯隨症加減治之如左。

○如中風無汗惡寒　麻黃續命湯主之

依本方　麻黃　杏仁　防風各加一倍

宜針至陰出血穴在足小指外側瓜甲角針二分　崑崙舉蹻穴在足外踝後跟骨針透太谿

○如中風有汗惡風　桂枝續命湯主之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

依本方　桂枝　芍藥　杏仁各加一倍

宜針風府穴在頭後入髮一寸針入三分禁灸

已上二症皆太陽經中風也

○如中風有汗身熱不惡寒　白虎續命湯主之

依本方加石膏知母各二錢甘艸再加一倍

○如中風有汗身熱不惡風　葛根續命湯主之

依本方加葛根　桂枝　黃芩再加一倍

宜針陷谷穴在足大指次指本節後陷中針入五分去陽明之賊

兼刺厲兌穴在足次指內側去陽明之實

已上二症皆陽明經中風也

如中風無汗身冷　附子續命湯主之

依本方　附子加一錢　乾薑加二倍

甘艸加二錢

宜針隱白穴在足大指內側甲角去太陰之賊

此太陰經中風也

○如中風有汗無熱　桂附續命湯主之

依本方　桂枝　附子　甘艸各加一倍

宜針太谿穴在足內踝後跟骨上陷中針透重谷

此少陰經中風也

○如中風六經混淆繫之勢少陽厥陰或肢節攣痛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

或麻木不仁。　羌活連翹續命湯主之

依本方加羌活連翹也

少陽之經絕骨（穴在外踝上三寸灸五壯）灸以引其熱

厥陰之井大敦（定在足大指甲聚毛間）刺以通其經

烏藥順氣散

烏藥　陳皮（各二錢）　麻黃（去節）　川芎

枳殼（去穰麩炒）　白芷　桔梗（各錢）

僵蠶（炒去絲）　乾薑（炮五分）　甘草（炙二分）

右剉一劑。生薑三片。棗一枚。水煎溫服。按本方以順氣名者。蓋通身麻痺。表氣不順也。故治以麻黃川芎語言蹇澁。裏氣不順也。故治以烏藥陳皮枳殼。口眼歪斜。面部之氣不順也。故治以白芷僵蠶。喉中氣急。甘草可緩肺氣去逆。桔梗可下痰之爲物。寒則結滯。熱則流通。佐以乾薑行其滯也。此治標之劑也。然必邪實初病之人方可用。

中風一身俱麻。加人參。白朮。當歸。川芎。麥門冬。○久患左癱右瘓。去麻黃。加天麻。防風。羌活。半夏。南星。木香。當歸。○口眼喎斜。加生薑。○虛汗。去麻黃。加黃芪。○中風面目十指俱麻。乃氣虛也。補中益氣湯。加木香。香附。羌活。防風。烏藥。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

對星香散　治中風體肥痰盛。口不渴者。此方主之

牛膽　南星 入錢　木香 一錢

右㕮咀每服四錢。生薑十片。水一大盞。煎七分溫服 遠 按本方用南星。燥痰之品也。曰體肥。曰痰甚。曰不渴。則宜燥也可知矣。故以南星主之。而必入牛膽者。制其燥也。佐以木香。利痰氣也。

○中藏

中藏無別病。大便秘者。用三化湯。老弱之人。以滋潤湯代之。　若口開眼合。撒手。遺尿。汗出如油。搖頭直視。面赤如裝。聲如鼾。睡脉急大實者。皆不可治

不省人事用通頂散。或半夏末。吹鼻中取嚏。如無嚏者。死。痰涎盛用稀涎散。或蝦汁吐之。痰多有熱荊瀝湯。

三化湯　治中藏者以此通其滯。調以十全四物。

大黃　枳實　厚朴　羌活

右㕮咀等分每服一兩水煎服。

滋潤湯　治風中在藏。大便秘結。

當歸　生地黃　枳殼 去穰　厚朴 去皮

檳榔　大黃　火麻仁　杏仁 去皮 各一錢

羌活 七分　紅花 各一錢 三分

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

右剉水煎。空。溫服。

通頂散　治病人初中風。昏憒不省人事。口噤不能開者急用之。

藜蘆　甘草生　川芎　細辛

人參各一錢　石膏五分

右爲末。吹鼻中一字。就提起頭頂心髮立甦。有嚏者可治。無嚏者不可治。

稀涎散　治中風忽然如醉。形體昏悶。四肢不收。涎潮搐搦。用以吐出痰涎便醒。

明礬一兩半生半枯　皂角四條去黑皮炙

每服三錢。溫水調灌。風痰自出。逆按本方治中風暴仆。痰涎壅塞者。蓋濁邪在上。風盛氣壅而然也。經曰。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。故不與疎風補虛而先吐其涎。白礬之味鹹苦鹹能軟堅。苦能去濕。皂角之味辛鹹。辛能利竅。鹹能去汚。名之曰稀涎。固奪門之兵也。師曰。凡吐中風之痰。使咽喉疎通。能進湯液便止。若攻盡其痰。則無液以養筋。反令人攣急偏枯。此大戒也。

荊瀝湯　方見類中風內

○中經脉

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

無表裏症口眼喎斜半身不遂宜靜勝其燥是養血也大秦艽湯汗吐下後初症既定宜靜藥養之牛黃清心丸痰涎盛竹瀝湯口眼喎斜瓜蒂散或蝦汗吐之血虛四物湯吞活絡丹

大秦艽湯　治中風手足不能運動舌強不能言風散見不拘一經者此方主之

秦艽去芦　石膏各三兩生用　甘草　川芎
當歸酒炒　羌活去芦　獨活　防風
黃芩酒炒　白芍藥酒炒　吳白芷　白朮
生地黃酒洗　熟地黃　白茯苓去皮各二兩

細辛五錢

每服一兩水煎陰雨濕勝時加生姜七片春夏加知母七分心下痞加枳實錢煎服○按中風虛邪也許學士云留而不去其病則實故用驅風養血之劑以秦艽爲君者攻一身之風也以石膏爲臣者去胸中之火也羌活散太陽百節之風疼防風爲諸風藥中之軍卒三陽數變之風邪青之細辛三陰內淫之風濕責之苓朮去厥陰經之風則有川芎去陽明經之風則有白芷風熱干乎氣清以黃芩風熱干乎血涼以生地獨活療風濕在足

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

少陰。甘屮緩風邪上逆于肺用歸芍熟地者所以養血于疎風之後。一以濟風藥之燥一使手得血而能握足得血而能步也

牛黃清心丸 方見癇症

竹瀝湯 方見類中風條下

瓜蒂散 方見痰症

四物湯 方見血症

活絡丹 治中風口眼喎斜。半身不遂。及諸風痺手足拳攣。筋肘不舒。皆風邪濕毒。流滯經絡渾身走注疼痛。脚心釣痛。腿臂間忽一兩點痛。並宜服之

南星炮 川烏炮 草烏炮 地龍各六兩

乳香 沒藥另研各二兩二錢

右爲末酒糊丸如梧子大。每服二十丸。空心滿下。荊芥湯亦可。

增補省風湯

治中風口眼喎僻痰涎壅盛者主之。

半夏一錢薑製 防風一錢 全蝎二錢去刺足

膽星 甘屮炙 生白附 生川烏

木香各五分不見火

以省風名者省減其風之謂也。蓋風壅其痰干于

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

面部則口眼喎僻塞于胸中則痰涎壅盛是方也防風白附全蝎川烏可以活經絡之風痰而正口眼膽星半夏甘草木香可以療胸次之風痰而開壅塞者焉

恩按 補

醫學指迷云夫木必先枯也而後風摧之人必先虛也而後風入之氣虛之人腠理不密故外感易襲血虛之人肝木不平故內風易作蓋虛之所在邪必輳之腑虛則中腑藏虛則中藏血脉虛則中血脉中藏多滯充竅故口噤不開目瞑無視夜音不語大小便不通中府多着四肢故半身不遂手足不隨痰涎壅盛喘聲如雷然目猶能視口猶能言大小便不閉以此爲別爾若口眼喎斜沉沉欲睡者中血脉也此爲最輕中府者易治中藏者難治中府者宜汗從乎陽也中藏者宜下從乎陰也中府後幸而得愈若不戒酒色不避風寒必復中中必在藏雖神仙亦莫能治蓋由淺以及深也

類中風二

歌 卒倒原從氣分虛濕痰能中右邊肢左邊死血併無血不語涎多吐最宜口噤筋攣風熱甚四肢不

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

舉屬於脾更兼痿躄與麻痺休作風邪眞中醫

論河間云風病多因熱盛俗云風者言末而忘其本也有風者亦非外中之風良由將息失宜而心火暴甚腎虛不能制則陰虛陽實熱氣怫鬱心神昏冒故卒倒無知亦由喜怒悲憂恐五者過極而卒中皆爲熱微則偃仆氣血流通筋脉不攣發過如故甚則熱氣大盛鬱滯不通陰氣暴絕陽氣後竭而死故痰涎者偏枯者口噤者筋急者筋反縱者皆爲燥熱之說故主乎火也西北氣寒爲風所中誠有之東南氣溫多濕有病風者非風也皆由濕生痰痰生熱熱生風經所謂亢則害承廼制也古方以風痿滚同論治故多以治風藥通治痿痺不知痿因肺熱葉焦傳入五藏散爲諸痿如四肢不舉舌本强足痿不收痰涎有聲悉屬於土爲濕熱以風治之非也故主乎濕東垣云言中風者皆由元氣不足則邪湊之益氣則風自除故卒倒偃仆皆由氣虛故主乎氣許學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得此疾便覺延潮昏塞牙關緊急脉伏身寒此名中氣若中風則身溫爲異耳然諸家之說皆非外中之風故曰類中

Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

風

氣虛　附血虛

僵仆卒倒氣虛也六君子湯加黃耆竹瀝薑汁或濃煎人參湯加竹瀝薑汁○血虛八珍湯地黃須用薑汁炒則不泥膈

六君子湯

八珍湯　方並見氣虛證

四君子加竹瀝薑汁方

人參三錢　白朮一錢　茯苓二錢　甘草五分

竹瀝半盞　薑汁五匙

按丹溪曰半身不遂在右者屬氣虛以此方主之氣虛者宜補之以甘故用參朮茯甘四味稱其爲君子者謂其甘平有中和之德而無尅伐之性也其加竹瀝爲能行痰其加薑汁所以行竹瀝之滯而共成伐痰之功耳

四物加桃仁紅花竹瀝薑汁方

當歸酒洗　川芎酒洗去蘆　白芍酒炒　熟地酒蒸

桃仁去皮尖　紅花各等分　竹瀝半盞　薑汁五匙

按丹溪曰半身不遂在左者屬瘀血以此方主之用芎歸芍地生血藥也新血生則瘀血消而易去

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

用桃仁紅花。消瘀藥也。瘀血消則新血清而易生
一然亦加夫竹瀝薑汁者。以痰之物靡所不之。無分
左右而爲患也

中氣

痰氣若厥逆身冷。脉沉伏勿作中風治以蘇合香
丸灌醒。然後調治續用烏藥順氣散八味順氣散
蘇合香丸　治男婦中風中氣。牙關緊閉。口眼喎斜
不省人事。并傳屍骨蒸勞瘵。卒暴心疼。鬼魅瘟疫
小兒急慢驚搐。婦人產後中風。赤白痢疾。一切氣
暴之證。最能順氣化痰

沉香　木香　丁香　白檀香
麝香另研　香附　白朮　安息香酒熬膏
訶子肉　蓽撥　硃砂水飛　烏犀角鎊各一兩
乳香　片腦　蘇合香油入安息香內酒熬各五錢

右爲末。研勻。用安息香膏并煉白蜜和劑。每服旋
丸如桐子大。取井花水溫冷任意下四丸。老人小
兒服一丸。溫酒化下○按病人初中風喉中痰塞。
水壅難通。非香竄不。能開竅。故集諸香以利竅。非
辛熱不能通寒。故用諸辛爲佐使。犀角雖凉。凉而
不滯。訶黎雖澁。澁而生津。世人用此方於初中之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

時。每每取効丹溪謂辛香走散眞氣。又謂麝腦能引風入骨如油入麪。莫可解也。醫者但當用之以救急愼勿令人多服也

烏藥順氣散　方見前眞中條

入味順氣散　治中風正氣虛。痰壅盛者此方主之

白朮土炒　茯苓　青皮炒　陳皮去白

烏藥　白芷　人參各一錢　甘草五分

按經曰邪之所湊。其氣必虛故用四君子以補氣治痰之法利氣爲先。故用。青皮陳皮台烏白芷以順氣氣順則痰行而無壅塞之患矣。此標本兼施之法也

痰火

痰涎盛。偏枯口噤。筋急拘攣。筋反縱。脉數。燥火爲病。牛黃清心丸主之在表。防風通聖散在上。凉膈散昏冒發熱。不惡寒不安臥。此風熱煩躁。瀉青丸痰火熾盛煩渴便秘脉數大。三黃枳實湯滾痰丸

牛黃清心丸　方見痛症

防風通聖散　治中風。一切風熱。大便秘結。小便赤澁頭面生瘡眼目赤痛或熱生風。舌強口噤或鼻生紫赤風刺癮疹而爲肺風或成風癘而世俗呼

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

爲大風或腸風而爲痔漏或腸鬱而爲諸熱譫妄驚狂並皆治之

防風　川芎　當歸　赤芍藥酒炒

連翹　薄荷　麻黃各四分　石膏煅

桔梗　黃芩各八分　白朮　山梔子酒炒黑

荊芥各三分　滑石二錢四分　大黃　芒硝各四分

甘草一錢

右薑葱豆豉同煎。○自汗。去麻黃。自利。去大黃芒硝○按本方有防風麻黃。解表藥也。風熱之在皮膚者。得之自汗。而泄荊芥薄荷。清上藥也。風熱之在頭頂者。得之出鼻而泄。大黃芒硝。通利藥也。風熱之在腸胃者。得之出後而泄。滑石梔子。水道藥也。風熱之在決瀆者。得之由溺而泄。風淫於肺膚受邪。石膏桔梗。清肺膚也。而連翹黃芩。又所以祛諸經之遊火。風之爲患。肝木主之。芎歸芍藥。和肝血也。而甘草白朮。又所以和胃氣而健脾焉

涼膈散

瀉青丸　二方並見火證條下

三黃枳實湯

黃芩　黃連　大黃晨各一錢　厚朴

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

甘草各五分　枳實二錢　○右水煎熱服。不拘時

礞石滾痰丸　方見痰飲條下

濕痰

口眼喎斜。半身不遂。涎多不語。中於右。屬痰。稀涎散吐之。痰盛胸滿。導痰湯肥人痰厥。口眼喎斜。手麻木。化痰丸。四服不效。心神恍惚。不知人事。六君子湯。加竹瀝薑汁。熱多。荊瀝湯。或加二陳湯。或青州白丸子。痰火甚。滾痰丸

稀涎散　方見前眞中風條

導痰湯　即二陳加南星枳殼

六君子湯　方見脾胃

二陳湯　方見痰飲

竹瀝湯　治中風四肢不收。心神恍惚。不知人。不能言

竹瀝二升　生葛汁一升　生薑汁三合

相合。作三服。

荊瀝湯　治中風有痰多熱。宜常服此。

荊瀝二升　竹瀝二升　生薑汁二合

相合溫服

青州白丸子　治小兒驚風。大人諸風牙關緊急。或

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

痰喘體麻。

生半夏 七兩　生白附 二兩　生川烏 去皮 五錢

生南星 二兩

右爲細末。盛絹袋中。以井水中擺出末。更將手時揉之令出。如有查。再爲末。再入絹袋中再擺揉。以盡爲度。放磁盆中。日晒夜露。每朝晨要換新鮮水。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水晒乾如玉片。研細。以大米粉煎粥飲。丸如菉豆大。每服三五丸薄荷湯下。風癱溫酒下。服不拘時

◎ 按前證。若少壯之人。氣血未虛。眞水未竭。適因怒動肝火。火畏水。不能上升。所以身涼無痰涎。須臾便醒者。水旺。足以制火也。此名中氣。老衰之人。氣血俱虛。眞水已竭。適因怒動肝火。火寡於畏。得以上升。所以身溫有痰涎。然多不能治者。水竭無以降火也。此名中痰。雖然少壯之人。亦有不治者。男子乃色慾過多。下元水虧。不能制火。女人乃經後產後去血過多。不能配氣。適因忿怒動火。而陽氣無所依附。則隨火而發越矣。陰也。血也。豈不爲陽氣之根本乎。

中寒三

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

歌 胃虛膚豁中寒深厥逆身凉麻細沉要辨內傷無外感理中薑附倍加參

論 有卒中天地之寒氣者屬外因有口食寒物而得者屬內因然胃氣太虛膚輳疎豁故寒邪直入於中其病即發手足厥冷脉息細微身踡不熱或有微熱而不渴倦言動者是也當急溫之遲則不救并若傷寒之邪循經傳裏之緩也東垣云內傷者多外傷間有之西北極寒多外感東南溫和多內傷外感者五積[illegible]中薑附麻黃細辛之類內傷者從補中益氣湯[illegible]溫散之[illegible]

[illegible]中寒緊澁陰陽俱盛法當無汗有汗

外因

若平素怯弱之人外中寒邪而得者蓋虛人腠理疎豁氣血內損故寒邪直中于中不作熱手足厥冷用麻黃附子細辛湯五積散房勞而中寒厥逆者四逆湯三建湯主之外用溫臍法

麻黃附子細辛湯 治少陰始得之病反發熱脉沉者此方主之

麻黃 細辛各四錢 附子炮二錢半

按病發於陰者當無熱今少陰病始得之何以反

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

發熱也。蓋其病本由太陽傳來者。腎虛。則眞寒直入而脉沉。表有餘邪。因發熱。故用麻黃以發太陽之汗。用辛附以溫少陰之經。

五積散

桔梗十二兩　蒼朮米泔浸去粗皮二十四兩　陳皮去白

麻黃去節　枳殼去穰麩炒各六兩　厚朴薑製

乾薑各四兩　白芷　川芎　甘草炙

茯苓　肉桂　芍藥　當歸

半夏湯泡七次各三兩

按本方治寒客經絡。內傷生冷。頭身俱痛。嘔吐痢疾惡寒拘急者主之。○每服四錢。水一盞半。生薑三片。葱白三根。煎七分。熱服。○挾氣。加吳茱萸。

四逆湯

甘草炙二兩　乾薑半兩　附子去皮臍半兩

按右方治寒中太陰。受病即發。脉微不渴。四支逆冷者主之。以生附配乾薑。補中有發之意也。○每服五錢。水一盞。煎七分。溫服。不拘時。

三建湯

大川烏　附子　天雄並泡等分

每服四錢。加生薑十片。煎服。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

溫臍法

用麝香。半夏。皁莢。各一字爲末。塡臍中。將生薑切薄片貼之。放大艾火於薑片上。蒸灸三七壯。灸關元氣海二十壯。熱氣通於內。寒氣逼於外。陰自退而陽自復矣。

內因

虛弱人。口食生冷寒涼之物。手足厥冷。臍腹絞痛。脉脫或遲。人參理中湯。薑附湯。因房勞內傷元氣。重中於寒。脉脫者。三建湯。因勞役內傷元氣。復感於寒者。補中益氣湯。加薑附主之。

人參理中湯　治太陰有病即發。自利不渴。寒多而嘔。腹痛鴨溏。蚘厥霍亂等證。

人參　乾薑炮　甘草炙　白朮各二錢半

右剉作一劑。水煎溫服。○如吐多。去白朮。加生薑○下多。倍白朮人參。○寒多。加乾薑一錢半○有動氣。去白朮。加肉桂二錢○脉沉微而遲者。加炮附子二錢。名附子理中湯。

薑附湯　治中寒昏不知人。身體强直。口噤不語。四肢逆冷。臍腹冷痛。霍亂轉筋。一切虛寒。並皆治之

乾薑一兩　附子生去皮臍細切一枚

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

每服三錢。水一盞半。煎七分。食前溫服。○挾氣不仁。加防風。○挾濕。加白朮。○筋脉拘急。加木瓜。○肢節痛。加桂二錢。

補中益氣湯 方見勞役內傷條

○按經云。夫寒陰氣也。寒中陽經。陽猶能抗陰。其病易愈。寒中陰經。兩陰相遇。膠固難愈。故病太陰少陰者。必重且危。病厥陰者多死。有等亡命之徒。既跌撲鬬毆。內傷於血。復輕生投水。外著於寒。血得寒而凝結。寒得血而深入。未有能生者也。

中暑四

暑者陽氣分汗如傾。身熱頭疼躁不寧。所感必須分動靜。陰陽二證自然明。

論東垣云。靜而得之曰傷暑。動而得之曰中熱。富貴人避暑於涼亭廣厦。房室陰寒。所遇暑火不侵。故曰靜而得之。辛苦人。負重作勞。勤耕力役。大暑行途者。此動而得之。王安道以靜得者即是陰證。非暑也。然大暑炎熱流行。無所不至。雖外以風扇寒涼抑之。終非禀剂之寒邪。但外寒遇暑火不侵。此寒爲標。熱爲本。故先以辛溫治其標寒。繼以清涼治其本熱。無不愈者。若便作陰證名之。用辛熱

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

劑可乎。學者宜臨時參究脉證可也。

脉暑傷於氣。所以脉虛。弦細芤豁。體狀無餘。

動而得之

冒暑作勞。身熱頭疼。自汗煩渴。面垢脣焦。或身如針刺此熱傷分肉也。人參白虎湯主之。素有痰火復冒暑氣。而惡心眩暈吐嘔者。黃連香薷飲主之有痰。加膽星半夏虛加人參。內外挾火相灼。卒倒不知人事者。名曰暑風。此暑氣入而鼓激痰火。塞碍心竅故也。治宜吐之。

人參白虎湯　治伏暑發渴。舌燥生芒刺。身熱。脉虛。自汗等證。

人參一錢半　知母一錢　石膏五錢　甘草炙一錢

右方入粳米一撮。水一鍾煎八分。不拘時服。○若腹痛吐瀉飽悶者。石膏切不可用。○熱極。小便遺尿不止。加炒黃栢。○煩躁。加辰砂末。酸棗仁。

黃連香薷飲　治伏暑引飲。口燥咽乾。或吐或瀉。

黃連薑炒四兩　厚朴薑炒六兩　扁豆微炒半觔　香薷去土一觔

每服三錢。水一鍾。酒少許。煎七分。沉冷。不拘時服

○若卒中昏冒僵仆。角弓反張。不省人事。手足或發搐搦。此爲暑風。不可作風治。以本方加羌活三

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

之。○瀉利。加白朮。茯苓。○脉虛弱。加人參。五味。麥冬。○虛汗不止。加黃耆。白朮。○心煩。加梔子。辰砂末。○渴加乾葛。天花粉。○胸滿。加枳殼。桔梗。○小便不利加赤茯苓。滑石。○嘔吐。加藿香。陳皮。薑汁。

十味香薷飲　消暑氣。和脾胃。

香薷一兩　人參　陳皮炒　白朮土炒

黃耆蜜炙　匾豆炒去殼　甘草炙　厚朴薑炒

木瓜　白茯去皮各半兩　○脉虛加麥冬五味。

右爲末。每服二錢。熱湯冷水任調下。

靜而得之

一避暑于深堂大廈。爲陰寒所渴暑不得越乎足厥逆者。大順散。霍亂者。六和湯。桂苓甘露飲。

大順散

乾薑一錢炒　甘草八分蜜炒　肉桂去皮　杏仁去皮尖各六分

右爲粗末。水煎溫服。如煩躁井花水調下。○按本方治夏月引飲過多。脾胃受濕。清濁相干。陰陽氣逆。霍亂吐瀉。腹痛脉遲者主之。用乾薑肉桂。溫胃而建中。甘草杏仁。調脾而利氣。非治暑之藥。乃治飲冷受傷之劑也。若非飲冷。切勿執方。

六和湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

桂苓甘露飲 二方並見霍亂

○達按暑與熱。同義而異名。中暑。卽中熱也。何分之有。歷代醫家。乃有中暑中熱之分。吾不知其所謂。假如道中行人。酷日趲程。野中農夫。暄天勞力。津竭汗盡。咽喉如燒。饑未得食。渴未得飲。勞未得息。卒然昏冒。不省人事。身體發熱。名爲中熱。雖謂之中暑。亦可也。至於素享富貴之人。其性不耐寒暄。每至暑月。卽池亭水閣以安其身。浮瓜沉李以供其口。環氷揮扇以祛其熱。藤簟竹牀以取其涼。炎蒸不來。清風滿座。內有伏陰。外受涼氣。汗不流而肌理密。陰愈侵而陽不發。卒然昏眩。寒熱交作。嘔吐腹痛。乃爲夏月感寒。非中暑也。法當溫以理其中。辛以散其表。不可執中暑之說。而用治暑之劑也。宜以生薑。葱白。木香。陳皮。羌活。紫蘇之類。

濕證五

歌 東南土薄濕多生。風雨山蒸屬外因西北地高濕疾少。乳醪濕麪內因成。腰如石墜頭如裹。聲壅如同甕裏鳴。肢節痛兮兼痿痺。四肢緩縱不能行。脉來沉緩無疑惑。疸腫虛浮泄利頻上下分消施汗泄。若然濕鬱取風升。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

論　夫濕有自外入者。有自內出者。必須審其方土。東南地土卑下多陰雨濕氣。必從外入。多自下起。故重腿脚氣者多。治當汗散。久則滲泄。西北地高無濕。人多食濕麪潼乳酒醪。以飲多快食爲尚。或酒後寒氣怫鬱。濕不得越。病從內生。故多腹皮脹滿。水鼓浮腫。按之如泥之病。治須通利二便。甚則逐水驅之。責其根在內也。然南北方土。其內外所因感。亦互有之。但有多少之殊耳。不宜執一見也。

脈　濕則濡緩。或兼澁小。入裏緩沉。浮緩在表。若緩而弦。風濕相搏。

外因

一濕從外受在上。羌活勝濕湯。升陽除濕湯。在下。四苓散。平胃散。風濕勝。脈浮。汗出身重。防己黃耆湯調之。在下。氣實。大小便不通者。導水丸。

羌活勝濕湯　治脊痛項強。腰似折。項似拔。上衝頭痛。及足太陽經不行。

羌活　獨活各一錢　藁本　防風

甘草　川芎各五分　蔓荊子三分　水煎溫服。

如身重腰沉沉然。乃經中有濕也。加蒼朮二錢。黃栢一錢。附子五分。○按經曰。風能勝濕。故用羌防

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

等諸風藥。如卑濕之地。風行其上。不終日而濕去矣。又曰。無竅不入。惟風爲能。故凡關節之病。非風藥不可。用甘草爲佐者。以風藥悍燥。用以調之。此之謂有制之兵也。

升陽除濕湯　治脾虛不能運化。濕勝濡瀉主之。

升麻中　柴胡中　防風中　蒼朮上

澤瀉中　猪苓中　陳皮下　神麯中

麥芽中　甘草下　水煎。食前服。

按經曰。清氣在下。則生飧泄。故先用升麻柴胡。以提清氣。又曰。濕勝則濡瀉。故用蒼朮防風以發汗。猪苓澤瀉以利水。此上下分消之法也。夫瀉雖生於濕。然必從飲食而得者。故用麴糵陳甘。以消食健脾。脾能健運。則濕自除。而瀉自止矣。

防已黃耆湯　治風濕相搏。客在皮膚。四肢少力。關節煩疼。脉浮身重。汗出惡風。

防已一兩　甘草炙五錢　白朮七錢半　黃耆二兩

右㕮咀。每服一兩。棗一枚。薑三片。煎服。

內因

飲食人。濕從內生。二陳湯加蒼朮白朮。平胃散。飲食內傷停濕。胸滿腫脹發黃。茵陳五苓散。實者舟

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

車丸。若飲酒動濕。升而汗之。解酲湯。

陳湯 方見痰飲

四苓散 治內傷飲食有溼。小便赤少。大便溏泄。

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉

按經曰。溼勝則濡泄。故濕生於內者。令人水泄。濕併於膀胱。故小便不利。白朮性燥。燥則健脾。茯苓本淡。淡能滲濕。猪苓有滲而無補。澤瀉潤下而兼滲。丹溪云。治濕不利小便。非其治也。故以此方主之。○加桂。名五苓散。加茵陳。名茵陳五苓散。

平胃散 治脾胃不和。土濕太過。腹脹不食者主之。

蒼朮 君米泔浸 厚朴 臣薑汁炒 陳皮 臣 甘草 佐炒

按經曰。谷氣通於脾。今山嵐障氣。谷氣也。令人不服水土而腹脹。是土濕太過也。故用蒼朮燥濕為君。厚朴陳皮。寬中泄氣為臣。甘草和諸藥為佐。濕氣去。則胃氣平矣。○右為末。每服五錢。薑棗煎服。

葛花解酲湯 方見內傷條

導水丸 主瀉濕熱。通利二便。必高燥之地。黑瘦之人。膏粱之家。熱燥之病。服之切當。若下濕之地。肥白之人。淡食之家。寒濕之病。猶未當也。

大黃 黃芩 各一兩 牽牛 滑石 各四兩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

右爲細末。水丸。如菉豆大溫水下二十丸。日三服。

舟車丸　治濕勝氣實

大黃二兩　甘遂　大戟　芫花

青皮　陳皮各一兩　牽牛頭末四兩　木香五錢

右爲細末。水丸。白湯送下。隨病加減。

燥證六

【歌】燥甚津衰血不充。大腸乾澁故難通。若然皴揭併乾勁。蓋是陽明燥氣鍾。

【論】經云。諸澁枯涸。乾勁皴揭。皆屬於火。同陽也。燥濕寒同陰也。又燥濕雖屬秋陰。而異於寒濕。反同其同

風生則風能勝濕。熱能耗液。而反[illegible]實陰虛。則風熱勝於水濕而爲燥也。熱燥在裏。耗其津液。故大便秘結。消渴生焉。夫風勁清肅。燥氣在表。鍾於皮膚。則皮毛燥澁。皴揭乾疥。爪枯之病生焉。東垣云。饑飽勞役。損傷胃氣。及食辛辣厚味之物。而助火邪伏於血中。耗散眞陰。津液屬少。故大便結燥。然燥結亦有風燥。熱燥。陰結。陽結之類。治法。以辛潤之。以苦瀉之。則結散燥除也。

風燥

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

血弱不能養筋。筋燥。手足不能動。指爪枯槁。大秦艽湯。大腸風閉燥結者。搜風順氣丸

大秦艽湯 方見眞中風條

搜風順氣丸 治腰脚疼痛。四肢無力。惡寒下注。風氣脚氣。常服潤三焦。和五臟。潤腸。除風濕

大黃 五兩半生半熟用 麻仁 微炒去殼另研 山茱萸 去核 山藥 各三兩 槟榔 郁李仁 另研 兎絲子 酒蒸 牛膝 酒浸二兩 車前子 二兩 枳殼 麸炒 川獨活 各一兩 防風 半兩

右爲末。蜜丸如梧子大。每服三十丸。茶酒任下

火燥

脾胃伏火。大便秘結。潤腸丸。脾約麻仁丸。五內火熾盛。燒灼津液。煩渴燥甚。白虎湯。燥熱結者。清涼飲子

潤腸丸

桃仁 去皮尖另研 麻仁 炒去殼各一兩 大黃 煨 羌活 當歸梢 各五錢

○如風濕。加皂角。秦艽。○如脉濇氣滯。加郁李仁。○右爲末。煉蜜丸如梧子。白湯下。

脾約麻仁丸 治腸胃熱燥。大便秘結。

厚朴 薑製 枳實 麸炒 芍藥 各八分 大黃 一兩六錢 酒蒸焙乾

Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

杏仁 去皮尖炒 麻仁 炒去殼另研各五錢

右爲末。蜜丸如梧子大。每服二十丸。臨臥溫水下。

潤麻丸 能潤血燥。大便不通

麻仁 當歸 桃仁 生地

枳殼 各一兩

右爲末。蜜丸如梧子大。每服五十丸。空心白湯下。

白虎湯 女見火症

清凉飲子

大黃 當歸 赤芍 甘草

右各等分。水煎服。

虛燥

陰虛火盛。下焦燥熱。小便澁數者。六味地黃丸。

補陰丸 虛秘者。蜜導法。膽導法。無虛乾涸臟結者。元戎四物湯。通幽湯。或蜜導法

六味地黃丸

大補陰丸 二方見虛損

元戎四物湯 治臟結閉澁

四物加煨大黃桃仁等分煎服

通幽湯 治幽門不通。上衝吸門。吸門不開。則爲噎塞。治在幽門。以辛潤之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

生地 熟地 各五分 甘草 炙 紅花 各三分

升麻五分 當歸身 桃仁泥 各一錢

右剉。水煎。調槐榔末五分。稍熱服。

蜜導法

以蜜煉如餳。捻成指大。長二寸許。納穀道中。

火證七

五行各一。火惟二。君相之火心腎是。或因喜怒憂恐悲。擾亂妄動名五志。腎經一水奚能勝。七火奔騰何可制。因而陽盛陰常虧。所以丹溪把陰濟。治火之法非一端。補虛瀉實發鬱滯。更有陽火陰火名。故立正治與從治。河間推廣火之機。泄漏軒岐千古秘

論 夫五行各一其性。惟火有二。君相是也。此二火出於天成。又有五志過極擾亂妄動。五臟之火隨起名曰五志之火。出於人爲。丹溪所謂一水不能勝七火。所以火之爲病甚多。內經病機一千九條。而屬火者五。河間又推廣其說。火之致病甚悉。如喘嗽嘔吐。暴注下迫。轉筋。小便渾濁。腹脹大。鼓之如鼓。癰疽瘍疹。瘻瘤結核。吐下霍亂。瞀鬱腫脹。鼻窒衄血。血溢血泄。淋閉。身熱惡寒戰。慄驚惑。悲笑譫

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

妄。衄衊血汚之病。皆手少陰君火之爲病也。如瞀瘛暴瘖。冒昧。躁擾狂越罵詈驚駭腑腫酸疼。氣逆衝上禁慄如喪神守。噎嘔瘡瘍喉痺。耳鳴及聾嘔湧溢。食不下。目昧不明暴注瞤瘛暴病暴死。此皆屬手少陽相火之爲病也然火病既非一端治法難拘一理。當審其虛實之候究其受病之由。隨其陰陽之性。委曲調治則火易伏否則激薄其性反致燔灼莫能禦也。

【脉】虛火浮數實火沉去隨其所見細數爲害。

君火

君火者。心火也。可以濕伏。可以水滅。可以直折。黃連解毒湯。三黃丸。梔子金花丸。實者可以硝黃水水正治君火熾甚用寒藥直折其火。其火轉甚者。須用薑汁。或酒製炒則火自伏。此寒因熱用之法也。又云。心爲君主。自焚則死。故多暴死之證。

黃連解毒湯　治三焦實火。內外皆熱煩渴溲赤。口舌生瘡便秘脉數者主之。

黃連炒　黃芩炒　黃柏炒　山梔炒等分

右水煎熱服。水法爲丸。名梔子金花丸。茶湯吞下。

三黃丸　又名三補丸　即前方減去山梔是也

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

按經曰壯火食氣少火生氣。蓋少火之火無物不生壯火之火無物不耗故少火宜升壯火宜降故以黃芩清上黃連清中。黃栢清下。則三焦之壯火自伏而氣得其生。血得其養矣。故曰三補。雖然。火有虛實。是方但可以治實火若虛者用之則火反盛謂降多亡陰也

相火

相火者龍火也不可以直折惟黃栢可以治之隨其性而伏也若以水水寒涼正治立死宜大補陰丸坎離丸氣從下而衝上者內挾相火腎水虛不能制之宜生地丹皮玄參知母之類以壯水

大補陰丸 方見虛損

坎離丸 一名滋腎丸 治腎火起於湧泉之下。

黃栢 十兩酒浸 知母 六兩酒浸 肉桂 五錢

水丸。空心淡鹽湯送下○按是方。知母黃栢。性味苦寒。水之屬也。故能滋益腎水。肉桂辛熱。火之屬也。故能假之反佐。正所謂坎離交而爲既濟也。

鬱火

鬱火可發。當看何經。四肢發熱。肌痺熱。骨髓中發熱如燎。捫之烙手。此血虛而得之也。或胃虛多食

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

冷物。抑遏陽氣於脾土。升陽散火湯。手心熱。屬熱鬱。用火鬱湯。或用梔子香附白芷半夏川芎麴糊丸服。若因醇酒厚味膏粱積熱者。清胃散主之。

升陽散火湯　治過食冷物。抑遏少陽之火。鬱於脾部者。

升麻　乾葛　獨活　羌活各五錢

防風二錢半　柴胡三錢　人參　白芍藥五錢

甘草半生半炙六分　每服五錢。水煎熱服。

按前方升柴羌獨乾葛防風。皆辛溫上行之物也。用之以升少陽之氣。清陽既出上竅。則濁陰自歸下竅而食物傳化。自無抑遏之患。芍藥味酸能滋土中之木。人參味甘能補中州之氣。生甘草能瀉鬱火於脾。從而炙之。則從胃而和中矣。

火鬱湯

即升陽散火湯去獨活。加葱白是也。

清胃散　治醇酒厚味。致唇齒作痛。或齒齦潰爛。或連頭面頸項作痛。

升麻二錢　生地　丹皮　當歸各一錢

黃連炒一錢半

右水煎服　加犀角。連翹。甘草。名加味清胃散。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

五志之火

諸氣憤鬱。屬於肺火之升也。又悲哀動中。則火起於肺。經云。肺苦氣上逆。急食苦以瀉之。黃芩葶藶苦酒之類是也。瀉白散。清金丸主之。

諸風掉眩。屬於肝火之升也。又大怒火起於肝。柴胡黃連龍膽草瀉之。或回令丸。

諸濕腫滿。屬於脾火之動也。醉飽火起於脾。宜芍藥黃芩石膏瀉之。

諸痛癢瘡瘍。屬於心火之動也。又怵惕思慮。則火起於心。瀉心湯。泰赤散瀉之。

諸逆衝上。屬於腎火之動也。又房勞則火起於腎。惟黃柏知母。順其性而伏之。

瀉白散　治肺火爲患。喘滿氣急者主之

桑白皮一兩　地骨皮一兩　甘草五錢

右爲粗末。每服二錢。水一盞。煎六分。食前溫服。

清金丸　治肺火

黃芩不拘多少。炒爲末。水丸如菉豆。每服一錢。

瀉青丸　治肝經風熱實火

羌活　防風　山梔酒炒　龍膽草酒拌蒸晒

當歸　川芎　大黃酒拌蒸晒

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

右等分爲末。蜜丸如彈子大竹葉湯入砂糖調服

回令丸　一名佐金丸　治肝火

黃連六兩　吳茱萸一兩湯煑少時

右爲末。粥丸。白朮陳皮湯下。每服一錢

瀉心湯　治心熱　黃連爲末。水調服

三黃瀉心湯　即前方加大黃黃芩。等分煎服

導赤散　治小腸實熱

生地　木通　甘草等分　入竹葉煎溫服

虛火

虛火可補。若飲食勞倦內傷元氣。火與元氣不兩立爲陽虛之病。宜補中益氣湯甘溫之劑除之。經云。溫能除大熱是也。若陰微陽强。相火熾甚。以乘陰位。日漸煎熬。爲血虛之病。以甘寒之劑降之。宜四物湯加黃栢知母。用藥須稍加薑汁製之。此從治之法也。若房勞內傷。眞陰失守。無根之火泛上氣從足上而起。爲陰虛之病。或從足底心起者。又虛之極也。難治。須大補氣血。兼溫散藥。宜丹溪大補陰丸大補丸。以附子末醬湯泉穴。引火伏下。

補中益氣湯　方見內傷條

四物湯　方見血虛

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

大補丸　治陰火　黃栢炒褐色爲末。粥丸一法水丸

實火

實火可瀉。若臟腑積熱。爲陽强之病。如口舌生瘡痰實不利。煩躁多渴。腸胃秘澁。便溺不利等證。凉膈散。人壯氣實火盛顛狂。大便秘結者。黑奴丸。陽明火熾甚。煩渴熱燥者。白虎湯。火盛者。寒凉藥稍加溫劑。或酒炒。則邪易伏

凉膈散　治火鬱上焦。大熱面赤者主之

大黃　朴硝　甘草各二兩　連翹四兩

梔子　黃芩　薄荷各一兩

右爲末。每服二錢。加竹葉七片。蜜煎服

按經曰。熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘。故以芒硝爲君。大黃爲臣。黃芩梔子連翹薄荷甘草爲佐。不[illegible]汗[illegible]液而作散者。取其泥膈而成功於上也。

黑奴丸　治陽毒發斑。煩躁。大渴倍常。時行熱病。六七日未得汗。脉洪大或數。面赤目脹。身痛大熱。煩躁。狂言欲走。渴甚。又五六日已上不解。熱在胸中。口噤不能言。爲壞傷寒。醫所不治。素爲死人。精魂已竭。心下纔煖。撥開其口。灌藥下。稍節活。

黃芩　釜底煤　芒硝　麻黃

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library