PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2537
v. 5

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

訂補明醫指掌卷之四

內傷一

〔歌〕飲食勞形是內傷。或因饑飽過行房。其形即與傷寒似。誤汗令人病臥牀。

〔論〕夫飲食勞役之證。當補而不當瀉。外感風寒客邪。當瀉而不當補。二者若霄壤之不侔。內傷之證。亦有頭痛發熱之候。粗工多作外感治之。大發其汗。其誤甚矣。禍不旋踵。東垣云。人迎脉大於氣口爲外傷。氣口脉大於人迎爲內傷。外傷則寒熱齊作而無間。內傷則寒熱間作而不齊。外傷惡寒。雖近

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

烈火不除。內傷惡寒。得就溫煖則解。外傷惡風。乃不禁一切風。內傷惡風。惟惡些少賊風。外傷證顯在鼻。故鼻氣不利。而壅盛有力。內傷證顯在口。故口不知味。而腹中不和。外傷則邪氣有餘。故發言壯厲。且先輕而後重。內傷則元氣不足。故出言懶怯。且先重而後輕。外傷手背熱。手心不熱。內傷手心熱。手背不熱。內傷頭痛。時作時止。外傷頭痛。常常有之。直須傳裏方罷。內傷則怠惰嗜臥。四肢不收。外傷則得病之日。即著牀褥。非扶不起。筋攣骨痛。外傷不能食。然口則知味。而不惡食。內傷則惡食。而口不知味。外傷三日以後。穀消水去。邪氣傳裏必渴。內傷則邪氣在血脉中。有餘故不渴。若饑餓內傷。房勞太過。比之內傷飲食。尤爲不足中之不足。當大補回陽。猶恐或遲。若誤作外感治。重發其汗。寧不死歟。

脉內傷勞役。豁大不禁。若損胃氣。隱而難辨。內傷冷食。滑疾而沉。內傷熱食。數大濇侵。

過食傷

飲食過傷。保和丸。麴蘖枳朮丸。傷熱物。三黃枳實湯。傷冷物。木香見睍丸。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

保和丸 方見傷食

麴蘖枳朮丸 方見脾胃

三黃枳實湯 方見傷食

木香見睍丸 方見傷食

饑餓傷

年饑缺食。或多事餓久。致傷脾胃。元氣弱。四君子湯。或黃耆建中湯。或補中益氣湯加山藥。去柴胡。

四君子湯 治脾胃虛弱。飲食少思。或大便不實。體瘦面黃。或胸膈虛痞。痰嗽吞酸。或脾胃虛弱。善患瘧痢等證。

人參 去蘆 白朮 去蘆油 茯苓 去皮各二錢 甘草 炙一錢

右剉一劑。生薑三片。大棗一枚。水煎溫服。○加陳皮名異攻散。再加半夏。名六君子湯。

黃耆建中湯 治汗多亡陽。尺脉虛弱者用之

黃耆 上 芍藥 中 桂枝 中 甘草 下

右水薑煎。臨服加膠飴。○元氣虛甚。加人參。

勞役內傷

負重作勞。致傷元氣。補中益氣湯。調中益氣湯。或黃耆建中湯六君子湯。勞者溫之。非溫熱藥也。宜溫養之謂也。夏月勞碌內傷。復冒暑汗泄。虛弱脉

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

微者清暑益氣湯。

補中益氣湯　治形神勞役。并飲食失節。勞倦虛損身熱而煩。脉洪大而虛。頭痛。或惡寒而渴。自汗無力。氣高而喘。

黃耆蜜炙一錢五分　人參一錢　甘草炙五分　歸身酒洗一錢
陳皮不去白五分　白朮五分　柴胡三分　升麻三分

右剉一劑。生薑三片。大棗二枚。水煎溫服○按經曰。五味入口。甘先入脾。是方參耆歸朮甘草皆甘物也。故可以入脾而補中氣。中氣者。脾胃之氣也。升麻引胃氣上騰而復其本位。柴胡引少陽之氣上行。而助春升之令也。用陳皮者。一能疏通脾胃。一能行甘溫之滯也○如汗多。去升柴加酸棗仁。夜間不寐亦如之○頭疼如蔓荊子川芎○如善嚏者。乃腠理不密。外邪所搏。加白芷川芎○如腦痛。或巔頂痛。加藁本細辛○如口乾或渴。加葛根○有痰加貝母。前胡○泄瀉。加白芍。澤瀉。茯苓○心胸覺痞悶。去黃耆。升麻柴胡。加枳實薑炒黃連○如嗽加桑白皮五味子○如用心太過。神思不寧。或怔忡驚悸。加茯神。遠志。酸棗仁。石菖蒲。栢子仁。○如飲食少或傷飲食。加神麴麥芽。山查枳實

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

○如胃中濕痰。加半夏○如大病後元氣未復而胸滿氣短者。加橘皮枳實白芍。○如有熱加芩連

調中益氣湯　治證同前

即補中益氣湯去歸身白朮。加蒼朮黃柏木香

六君子湯　人參　白朮　茯苓　甘草

即四君子加陳皮半夏薑棗煎服

清暑益氣湯　治長夏濕熱蒸人。人感之。四肢困倦精神減少。懶於動作胸滿氣促腹節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便溏而頻或利或渴不思飲食自汗體虛

黃耆蜜炙　蒼朮米泔製　升麻各一錢　人參

白朮土炒　陳皮炒　神麯炒　澤瀉

黃柏酒炒　當歸　青皮去穰　麥門冬去心

乾葛　甘草各三分　五味子九粒

右剉一劑。水煎溫服。

房勞內傷

強力入房。致傷元氣自汗乏力。人參養榮湯。十全大補湯。因而陽脫者二建湯。急灸關元氣海百壯可復元。

人參養榮湯　治積勞虛損氣血虧。肌肉削。四肢倦

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

人參　黃耆蜜炙　陳皮　白芍藥酒炒

當歸酒洗　甘草炙　白茯　五味子

遠志　白朮　桂心　熟地黃

右薑棗煎服。

十全大補湯

即八珍湯加黃耆肉桂

三建湯方見中寒

飲酒內傷

酒乃無形之物。大熱有毒。多飲則傷胃嘔吐。葛花解酲湯。縱飲熱酒煩躁中酒毒。黃連解毒湯主之

葛花解酲湯　治飲酒太過嘔吐痰逆。心神煩亂。胸膈痞塞。手足戰搖。飲食減少。小便不利。

葛花　砂仁　木香　白豆蔻

人參　茯苓　陳皮各五分　神麯炒

白朮炒　青皮　澤瀉　乾生薑各三分

按葛花性寒。能解中酒之毒。澤瀉味淡能利中酒之濕。砂仁豆蔻木香青陳之辛。能行酒食之滯。生薑開胃止嘔。神麯消磨炙膩。而人參白朮之甘。所以益被傷之元氣焉。

黃連解毒湯　方見火證

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

瘧疾二

歌　瘧疾由來匪一端。六經五臟有形參。連朝間日知深淺。陽分邪輕陰分難。風暑感人從外至。內因食積與停痰。汗多汗少求虛實。弦數弦遲定熱寒。實可祛邪行截法。虛宜養正自痊安。先寒後熱名寒瘧。但熱無寒號曰痟。溫瘧從來先作熱。若還暑瘧汗漫漫。山嵐瘴瘧宜祛逐。痎瘧休吞鬼哭丹。

論　內經云。夏暑汗不出者。秋成風瘧。又云。夏傷於暑。秋必痎瘧。蓋邪氣客於風府。陰陽上下交爭。虛實更作。邪併於陽則陰實陽虛。故寒作。邪併於陰則陽實陰虛。故熱作。此陰陽相移也。邪氣舍於皮膚。與衛氣居。衛氣者。日行於陽。夜行於陰。此氣得陽而外出。得陰而內薄。是以日作。此受之淺也。其氣之舍深。內薄於陰。陽氣獨發。陰邪內著。陰與陽爭。不得出。故間日作。此受之深也。邪與衛氣客於六腑。而有時相失。不能相爭。故休數日乃作。此受之最深也。然瘧之狀不一。足太陽瘧。令人腰痛頭重。寒從背起。先寒後熱。熇熇然熱。熱止汗出難已。足少陽瘧。令人身體解㑊。寒不甚。熱不甚。惡見人。見人則惕惕然。熱多。汗出甚。足陽明瘧。令人先

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

洒淅寒甚。久乃熱。熱去汗出。喜見日月光火氣。乃快然。足太陰瘧。令人不樂。好太息。不嗜食。多寒熱。汗出則善嘔。嘔已乃衰。足少陰瘧。令人嘔吐甚。多寒熱。欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰瘧。令人腰痛。少腹滿。小便不利。如癃。非癃也。數便。意恐懼。氣不足。腹中悒悒。此六經之瘧也。肺瘧者。令人心寒。寒甚熱。熱間善驚。如有所見。心瘧者。令人心煩甚。欲得清水。反寒多。不甚熱。肝瘧者。令人色蒼蒼然。好太息。其狀若死。脾瘧者。令人寒。腹中痛。熱則腸中鳴。鳴已汗出。腎瘧者。令人洒洒然。腰者痛。宛[illegible]

大便難。目眩眩然。此五臟之瘧也。東垣云。寒瘧屬太陰。熱瘧屬陽明。風瘧屬少陽。溫瘧屬厥陰。又云作於子午卯酉日者。屬少陰。作於寅申巳亥日者。屬厥陰。作於辰戌丑未日者。屬太陰。蓋三日一作故耳。丹溪又有食。痰。風。暑。老瘧。瘧母等名。蓋不越五臟六經之所主也。但所感不同者。然附其所挾而立名也。今併及之。以備參考。善治者。審其受病之淺深。寒熱之多少。發作之蚤晏。時月之炎涼。元氣之虛實。淺者發於處暑前。謂之近而暴者易治。發於霜降後。謂之遠而痎者難治。故痎瘧不可截。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

截之轉虛但養正氣氣充自已斟酌調之。

謹按瘧之爲狀。熱如爐。振寒如氷。頭痛如破。咬牙嚼齒。有暴虐之勢。從病從虐。故名瘧。諸病惟瘧近乎邪。故厲法治之亦偶中。然求其原。必內有痰食。外感風寒。故凡初發時。便以消食化氣開痰散風等藥。大劑服之。後雖發亦輕。不過二發即止矣。

脉 瘧脉多弦。弦而數者多熱。宜汗之。弦而遲者多寒。宜溫之。弦而緊實者宜下之。弦而虛細者宜補之。弦而實大者宜吐之。弦短者多食。弦滑者多痰。瘧脉遲緩者病自愈。久瘧不愈者。脉必虛。宜養正

外因

若避暑於風涼處。閉其汗孔。熱不泄。作風瘧。暑瘧。皆當發汗。風瘧。小柴胡湯。加葛根升麻。暑瘧。川芎。白芷。青皮。草果之類。暑瘧無汗。小柴胡湯加葛根香薷。渴加天花粉。暑瘧自汗煩渴。柴胡白虎湯。但熱不寒者。柴葛解肌湯。熱多寒少。清脾飲。寒多熱少。人參養胃湯。

小柴胡湯 治少陽經瘧。能和解表裏。

柴胡 黃芩 人參 甘草

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

半夏　生薑　如初瘧去參甘加青皮草果

按右方治瘧發時耳聾脇痛寒熱往來口苦善嘔脉弦者主之蓋柴胡黃芩能解少陽之邪半夏生薑爲嘔家聖藥用人參甘草者補其中虛使邪無容地而出矣

柴胡白虎湯　即小柴胡加石膏知母少陽陽明二經藥也

柴葛解肌湯　治三陽經瘧頭額目痛脉浮洪弦數

乾葛　柴胡　羌活　黃芩

白芷　甘草　桔梗　芍藥無汗去之汗多倍用

一方水煎加生薑三片葱白搗汁三匙熱服

清脾飲　治瘧疾熱多寒少脉弦數口苦咽乾溺赤

柴胡一錢二分　半夏　黃芩　白朮腹脹滿者去之

陳皮各一錢　茯苓　厚朴各八分　青皮七分

草果六分　甘草四分　生薑三片　大棗一枚

按右方曰清脾者非清涼之謂乃攻去其邪而脾部爲之一清也故用青皮厚朴消去脾部之痰半夏生薑燥去脾家之濕柴芩清熱朮甘補虛而草果又能清膏粱之疾也

內因

惡飲食者從飲食上得之必胸滿噫氣二陳湯加

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

山查。枳實神麯。厚朴。柴胡。青皮。大抵無痰不成瘧。若內傷挾外邪同發。內必生痰。痰滯於中。寒熱不已。脉滑者。二陳加柴胡黃芩草果常山以吐之。吐中就有發散之意。但常山性暴悍。非痰盛氣實者。不可用也。

二陳湯 方見痰證

虛瘧

虛人患瘧。飲食少進。四肢無力。汗多。怠惰嗜臥。六君子湯。人參養胃湯。汗多煩躁而渴。白虎湯加人參。汗多不煩渴柴胡桂枝湯。元氣漸虛不思食而多汗者。四獸飲截之。虛瘧久不止。[illegible]養正。不可[illegible]多服補中益氣湯自止。

六君子湯　即四君子加陳皮半夏

人參養胃湯　本方加香附砂仁。名香砂養胃湯。即平胃合二陳。加人參。藿香。草果。烏梅。生薑煎。

按人之饑飽。皆足以傷胃。胃傷。則榮衛虛而穀氣乖。乖則爭。爭則邪正分。寒熱作而瘧成矣。方中有參茯甘草之甘。可以補胃之不足。陳蒼厚朴之辛。可以平胃之有餘。半夏醒脾。藿香開胃。烏梅之酸。可使收陰。草果之溫。可使消滯焉

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

補中益氣湯 方見內傷

白虎湯 方見火證

四獸飲 治虛瘧久不愈

即六君子湯加草果烏梅生薑大棗等分煎服

實瘧

暴瘧寒熱往來。脉弦數。必熱多也。清脾飲。脉弦遲必寒多。七寶飲。發五六次不止。不二飲截之。無汗要有汗。發散為主。小柴胡去人參加葛根。蒼朮。青皮蘇葉。大便不通。大柴胡湯下之。

七寶飲 治一切瘧疾。及山嵐瘴氣。寒熱如瘧。

常山 草果 檳榔 厚朴薑炒

青皮 陳皮 甘草各等

每服五錢。水酒同煎。露一宿。稍溫。空心向東服。

不二飲 截陰瘧老瘧神効

柴胡 黃芩 常山 檳榔

知母 芍藥 青皮 甘草

右用短水白酒二鍾。煎八分。發前五箇時服。忌熱茶湯飯一日。只可食溫涼者。

按右二方。惟脉來浮大弦滑者可用。蓋浮為表。大為陽。弦為飲。滑為實故也。若脉來沉細澀微者。與

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

之則逆矣。慎之慎之。

大柴胡湯　即小柴胡去人參甘草。加大黃枳實。

瘴瘧

瘴瘧者。感山嵐瘴氣作瘧。實者藿香正氣散。虛者人參養胃湯。

藿香正氣散　方見霍亂

痎瘧

痎瘧者。三日一發。或連二日發。間一日者。或作於霜降後。或下年陰分。俱不可截。柴胡養陰湯。黃耆鼈甲湯。補中益氣湯。呷獸飲。皆可服之。

柴胡養陰湯　秘方　治陰分虛。邪氣盛。無汗而瘧者。

柴胡　四錢　當歸　錢　陳皮　一錢　知母　一錢

黃耆鼈甲湯　秘方　治陰陽俱虛。正不勝邪。多汗而瘧者。

黃耆　二錢　蜜炙　陳皮　一錢　少　鼈甲　一錢　炙　何首烏　三錢　蒸熟忌鐵

瘧母

痎瘧久不止。必生瘧母。在脇下。大如杯。令人面色痿黃。寒熱不已。用川芎芍藥柴胡各一錢。人參五分。水煎。送下鼈甲丸二錢。外以阿魏膏貼之。神効。

鼈甲丸　秘方　治久瘧不愈。脇下有塊。俗名瘧母。

鼈甲　酒炙半斤　蓬朮　醋煮三兩　青皮　醋煮三兩　穿山甲　土炒二兩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

右爲末。用醋煮當歸爲膏。拌前藥丸如黍米大。每服二錢。煎藥送下。

痢疾三

歌　濕蒸熱瘀而成痢。後重裏急出氣滯。下迫窘痛火爲殃。未虛芍藥併承氣。下後雖寬痢不清。香蓮化滯應須繼。若還久病補兼升。虛坐努責和血是。表裏有熱內踈之。小水不通可分利。身寒嘔逆脉細微。水液澄徹製溫劑。苦汁魚腦半死生。塵腐純血皆難治。噤口多因胃不升。若然不禁須兩住。

論　痢者。古名滯下。以其積滯不行故也。蓋人日受飲食之積留滯於內。濕蒸熱瘀伏而不作。偶或調攝失宜。復感酷熱之毒。至秋陽氣始收。火氣下降。蒸發蓄積。而滯下之病作矣。故濕熱之積。干於血分則赤。干於氣分則白。赤白兼下者。氣血俱病也。苦汁色者。濕勝也。如五色之相染。五臟俱病也。純紅者。熱毒入深也。魚腦色者。脾虛不運。陳積脫滑下凝也。如鼻涕膠者。臟腑虛冷脫滑也。如白膿者。虛坐努責而出。氣受熱邪瘀結也。如屋漏水。腐腐色者。元氣憊弱之盛也。後重裏急。至圊不能便。下迫窘痛。大腸經滯不通。濕熱內盛也。初病元氣未虛。

Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

裏急甚者下之。下後餘積未清。不可驟補。宜化滯清熱蕩滌之直候積盡。方可調補氣血。今人不問新久。便兜澀。爲患匪輕。善治者。審其冷熱虛實氣血之證。而行汗吐下清溫補兜澀之法可也。○達按痢之作也。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。蓋平素飲食不節。將息失宜。油膩生冷。恣供口腹。醉之以酒。勞之以色。遊行冒暑。奔馳忍饑。塵事關心。凡言生惱。七情六慾。日夜交攻。以致氣血俱傷。飲食停積。濕熱薰蒸。化爲穢濁。足太陰脾經之病。傳於手陽明大腸經。大腸爲肺之腑。肺主清化。脾土受病。則不能生金。而肺失清化之令。臟不受病。而病其腑。故大腸受之。大腸於五行爲金。於時令爲秋。故痢多發於秋也。痢之初作時。須先服大劑消血化積之藥。浮動其根。次服下劑蕩滌腸垢。旋爲調補。以收全功。然又必分在氣在血。白者傷於氣。赤者傷於血。赤白混雜者。氣血俱傷。若無赤白。惟見黃色稠濁者。以食積治。後重者以火治。雜下散血者以傷治。凡初痢皆屬於熱。宜凉解。久痢不愈。則變爲寒。宜溫補。肛腸下者。宜補氣兼升。經年累月。時愈時發者。名休息痢。宜調胃氣。服大補之

East Asian Library and the Best Collection
© NOT COPY
Princeton University Library

劑。此治痢之大要也。凡痢身不熱者輕。身熱者重。能食者輕。不能食者重。絕不食者死。發嘔者死。直腸自下者死。久痢忽大下結糞者死。小兒出痘後即發痢者死。婦人新產。即發痢者死。

脉濇則無血。厥寒爲甚。尺微無陰。下痢逆冷。又曰。無積不痢。脉宜滑大。浮弦急死。沉細無害

熱盛肉實

初病後重裏急。下迫窘痛。芍藥湯。下後痢止。熱甚而渴。便赤者。黃芩湯。腹痛不通快。裏急。香連化滯湯。三黃丸。

芍藥湯　治痢初起。腹痛裏急後重。數至圊。不能忍

芍藥　當歸各錢五分　黃連　黃芩各錢二分

肉桂四分　檳榔一錢　木香六分　甘草四分

大黃量人虛實臨時斟酌　加厚朴一錢　枳殼一錢

青皮五分

右水煎溫服。○如後重小便澀。加炒滑石一錢五分。○如腹痛甚。加砂仁一錢。再加當歸木香各五分。○食積加山查枳實各一錢。○紅痢。加川芎桃仁泥各一錢。○白痢。加茯苓陳皮砂仁各八分。○紅白相雜。加川芎桃仁以理血。滑石陳皮蒼朮以理氣。○如嘔吐。食

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

不下。加軟石膏炒山梔各一錢 陳皮八分 入薑汁緩緩呷之。以瀉胃口之熱。○如色赤黑相雜。此濕勝也。小便必赤澀短少。加木通澤瀉茯苓各一錢 炒山梔仁五分 以分利之。○如血痢。加川芎桃仁生地炒槐花各一錢 去大黃檳榔肉桂。○有一樣寒痢。去大黃黃芩。加乾薑縮砂厚朴各五分 以溫之。○孕婦不用大黃。加山梔二錢 倍加芩連枳殼。

黃芩湯 治協熱下利 一名黃芩芍藥湯

黃芩炒二錢 芍藥炒一錢半 甘草一錢 水煎溫服

香連化滯湯 治積滯不行。裏急後重。頻上圓而去

即芍藥湯去大黃桂。加青皮枳實滑石陳[illegible]

挾風邪

外挾風邪。宜汗之。蒼朮防風湯。惡寒發熱。身首痛。神朮湯。風邪乘虛。入於腸胃。下清血。胃風湯。方見泄瀉

蒼朮防風湯

蒼朮三錢泔製 防風一錢五分 加黃連 木香各五分

厚朴 陳皮 枳殼各一錢 甘草四分

右生薑七片煎服。○如頭痛身疼發熱。加川芎羌活柴胡黃芩各一錢 腹痛。加當歸炒芍藥砂仁各一錢

裏急後重。加檳榔一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

神朮散　治四時瘟疫。頭疼項强發熱憎寒。身體疼痛。傷寒鼻塞聲重。咳嗽頭昏。

藁本　羌活　甘草　白芷

細辛　蒼朮　川芎

右薑葱煎服

方治疫痢。一人有病。他人即傳染者是也。

用蒼朮一兩。水三鍾。煎至二鍾。去蒼朮。入防風白朮芍藥羌活人中黃各一錢。煎至一鍾。溫服。

挾寒

挾寒者。所下清冷不渴。小便清白。手足冷。無熱證。脉沉遲。理中湯過食生冷。及服寒涼藥多。本方加附子。病久。所下若鼻涕凍膠。脉遲弱。形體虛怯。四肢倦怠。除濕湯

理中湯　祛寒。止嘔逆泄利。定心腹冷痛。溫脾固胃

人參　甘草炙　白朮　乾薑炮等分

右水薑煎○加附子。名附子理中湯

除濕湯

厚朴薑汁拌炒　蒼朮米泔浸炒　半夏各一錢　藿香葉三分

陳皮　茯苓　白朮各五分　薑棗水煎。溫服。

食積痢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

下痢腹痛。飲食不化。脹滿。保和丸。原有食積腹脹
裏急。香連化滯湯。急痛。枳朮丸加黃連。木通。神麯
麥芽。芍藥。木香。檳榔。

保和丸　方見傷食

枳朮丸　方見脾胃

虛弱痢

久病氣血虛。神不足。錢氏白朮散。久病便清血。胃
風湯。倦怠食不進。衛生湯。脾氣陷下。虛坐努責不
出。補中益氣湯

錢氏白朮散　方見濕證

異功散　即四君子加陳皮

衛生湯　即異功散加山藥。黃芪。芡仁。澤瀉。黃連等分

補中益氣湯　方見內傷

王節齋治久痢方

紅痢久。胃弱血虛。或下後未愈。用四物湯加阿膠
陳皮。白朮。芩。連。甘草。

白痢久。胃弱氣虛。或下後未愈。用四君子湯加黃
耆。陳皮。縮砂。木香。乾薑等分。芩。連減半。煎服。

氣血俱虛而痢者。用四物湯加人參。白朮。陳皮。黃
連。黃芩。阿膠。以補之。而痢自止。氣下陷。加升麻

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

滑脫

久病滑瀉不禁。氣虛欲脫訶子散。元氣脫弱。大孔如竹筒。直出無禁。眞人養臟湯。或可十全一二也。

訶子散　治泄痢久不止

木香五錢　甘草炙　黃連各三錢　訶子一兩半生半蜜

末之。煎芍藥白朮湯調服二錢。

眞人養臟湯　治久痢不止。滑泄不禁

人參　當歸　白芍　甘草各四分

肉果　訶子各三分　木香七分　肉桂三分

白朮二分　罌粟殼去蒂蓋蜜炙一錢　臟寒加附子

噤口痢

噤口痢者。大虛大熱。以人參薑炒黃連。煎湯時時哈之。更以田螺搗盒臍中。或以石蓮子煎湯頻飲之。此病得之熱毒氣侵胃口。猶有可治之理。至於胃弱氣脫。絕不思食者。則難治也。

治噤口痢秘方

一用香連丸。石蓮肉。二味等分爲末。米飲調下。

一用乾山藥一觔。畧炒。煮湯。時時呷之。

一用石蓮肉晒乾爲末。陳食米煎湯調下二錢。便覺思食。仍以日照東壁土炒眞橘皮爲末。薑棗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

煎服。

一用木鼈子爲末。和麪作餅。貼臍中。

泄瀉四

歌 濡瀉如傾濕所侵。分消利水便安寧。完穀不化名飧泄。內挾風邪發散平。腸垢稠粘爲協熱。寒如鴨糞水澄清。熱當伐火黃芩治。寒用溫中香桂行。不禁直須訶子散。脾虛久瀉朮參苓。

論 夫人之泄瀉。乃水濕所爲也。由脾土受濕。則不能滲泄。致傷闌門。元氣不能分別水穀。併入大腸而成瀉。故小便澀而大便反快。腸鳴腹痛之候。王[illegible]

[illegible]所謂濕多而泄。腸走若雷奔是也。古云治不利小便。非其治也。故世俗治泄瀉。多用淡滲之劑。利其小便。利而不已。則以燥劑兜澀之。此一偏之治也。殊不知瀉雖生於濕。亦有協風寒熱虛實之不同。如飧泄者。濕兼於風也。故完穀不化。腸鳴脉弦之候。腸垢者。濕兼於火。所下稠粘垢穢。小水赤澀。脉數之候。鴨溏者。濕兼於寒。故所下澄澈清冷。如鴨鶩糞。小便清白。脉遲之候。濡瀉者。濕自甚也。故所下多水。小便不利。腸鳴漉漉有聲。脉沉緩之候。脾腎瀉。虛也。故朝瀉暮已。久而神瘁肉削。滑

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

泄者。濕勝氣脫。所下不禁。大孔如竹筒之候。又有積濕成痰而瀉者。東垣云。一人久病。泄而神瘁小便少而赤。脉滑而類弦。肺悶食減。因悟此久積成痰。流於肺中。宜大腸之不固也。以茱萸等湯溫服一碗許。探喉中痰出吐半升而利減半。次朝復飲一碗又吐痰半升而泄止。病有若此之不同。豈可執一而治乎

謹按泄者。大便溏清。瀉者大便直下。略有輕重。總是脾虛。若小便短少。當利小便以分其水。若小便自利。不必再利惟實脾而已。若口渴求飲。須滋泄液。不可純用燥脾之藥。亦不可純用利小便之劑也。若糞中有積如稠膿。須消化為上。糞深黃穢臭者。以熱治。青白者。以寒治。完穀不化者。以火治。夫火能消穀。今反以不化為火者。何也。蓋脾火和緩。自能化穀。今脾已虛。真火不熾。而邪火得以客之。火性急遽。不及傳化而自出矣。然亦有寒而不化者。何以別之。視小便之赤與不赤耳。纔進飲食。少頃即瀉出者。為氣虛不能收攝。名曰直腸。患者多死。痛一陣。泄一陣。泄復澀滯者。火也。痛一陣。泄一陣。泄後覺通快者。食也。腹中絞痛。下無時者。氣食

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

交併也。腹中覺冷。隱隱微痛。下如稠飲者。痰也。

脉瀉脉自沉。沉遲寒侵。沉數火熱。沉虛滑脫。暑濕緩弱。多在夏月。

濡瀉

濡瀉者。腸鳴多水。胃苓湯主之。腹痛加芍藥縮砂。水泄渴而小便赤澀。熱也。益元散水調服。

胃苓湯　治脾胃不和。腹痛泄瀉。水穀不化。陰陽不分者主之。

即五苓合平胃也。○小水赤澀。加滑石○腹痛後重。去桂。加木香黃連楮椰。○久泄。加升麻○濕

脉加防風。○食積。加麴蘖山查○氣虛。加參朮

益元散

滑石六兩水飛　甘草一兩　末之。每服二錢。水調服。

飧泄

飧泄者。所下完穀不化濕兼風也。升陽除濕湯。外傷於風。有表證者。加發表藥。元氣不足。風入腸胃泄利清血。加減胃風湯。

升陽除濕湯

升麻　柴胡　防風　神麴炒

澤瀉　猪苓各半兩　蒼朮一兩　陳皮

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

甘草炙　麥芽炒三錢　每服一兩。飲後熱服。

加減胃風湯　治風冷乘虛。客于腸胃。水穀不化。泄瀉注下。腹脇虛滿。腸鳴疼痛。及腸胃濕毒。下如豆汁。或下瘀血。並効

人參　白朮　茯苓　當歸

川芎　白芍等分　去肉桂。加升麻秦艽。

右剉。入粟米一撮。同煎溫服。

腸垢泄

腸垢。熱泄也。所下粘垢。小便赤澀。脉數煩渴。黃芩芍藥湯。痛一陣。瀉一陣。下迫窘痛。白湯。火也。

火四苓散。加黃芩。木通。協熱自利。身熱脉數。白頭翁湯

四苓散　即五苓散去桂

白頭翁湯　治協熱自利。小便赤澀。

白頭翁　秦皮　黃連

鶩泄

鶩泄。即鴨溏。所下澄澈清冷。小便清白。寒也。胃苓湯。加木香砂仁。瀉利腹痛。不渴。脉逆脉沉遲。理中湯。方見中寒　肢節寒甚。泄不止。脉沉遲者。朮附湯。

朮附湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

白朮　甘草炙　熟附子等分　薑棗煎服

虛泄

脾虛氣弱。闌門元氣不足。不能分別水穀。衛生湯自汗沉困。脉遲久瀉黃耆建中湯方見惡寒脾腎不足久瀉不止。形瘦。腎氣丸。四神丸兼服之。

衛生湯方見痢疾

腎氣丸方見虛損　一名六味地黃丸

四神丸　治脾胃虛弱。小便不實。飲食不思。或泄利腹痛等證。兼治腎泄。清晨溏泄一二次。經年不止

破故紙四兩酒浸一宿炒　肉豆蔻二兩麪裹煨

五味子二兩去梗　[illegible]茱萸一兩泡過炒

右爲末。用生薑八兩切片。同大棗百枚。煮爛去薑取棗肉丸如梧子大。每服一錢半。淡薑湯送下。

滑泄

瀉久不止。大孔如竹筒。直出無禁者。氣將脫也。訶子散方見痢疾　老人元氣衰。滑泄無禁。四君子湯加肉蔻訶子。若元氣下陷。加升麻。

四君子湯方見脾胃

錢氏白朮散　治氣血俱虛。或瀉或痢。或吐或渴。

人參　白朮　白茯　甘草

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

木香　藿香　乾葛

右水煎服

王節齋治泄主方

白朮　茯苓　陳皮　甘草

澤瀉　砂仁　神麴　麥芽

寒瀉加木香煨薑。○熱瀉加芩連白芍。○夏月暑瀉加香薷隔豆。○濕瀉加蒼朮半夏猪苓滑石。○食瀉加山查枳實。○久瀉不愈加人參黃耆月麻。○滑瀉不禁加肉蔻訶子。

黃疸五

歌　五疸多因濕熱生分消利水用茵陳若因食積併瘀血陰證虛黃另有形

論　夫五疸皆由濕熱而成黃疸通身面目悉黃也穀疸者食已頭眩心中怫鬱不安饑飽所致胃氣蒸冲而黃也酒疸者身目俱黃心中懊憹足脛滿尿赤面黃赤斑因酒後胃熱醉卧當風水濕得之也女勞疸者額黑身黃少腹滿急小便不利因房事後爲水濕所搏而得之也黃汗者汗如梔子水染衣黃不渴因脾熱汗出入水澡浴所致丹溪云疸病不須分五種同是濕熱如盦麴相似宜利水爲

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

先解毒次之亦有瘀血食積皆令發黃又有陰黃虛黃之證各各不同瘀血發黃則發熱小便自利大便反黑脉芤濇是也飲食之積留滯於胃不得傳化薰蒸胃中濕氣故也必胸脇滿悶脉大是也陰黃者四肢冷自汗泄利小便清白脉沉遲是也虛黃者口淡怔忡耳鳴脚軟怠惰無力寒熱溲白是也學者遇此必審其因而療之勿忽略以悞人也

謹按黃疸之病多起於飲食勞倦致傷脾土脾土不能運化濕熱因鬱無由發泄流於皮肉遍於四肢黃色如染淡黃易愈深黃者難愈焦黃者不治凡鬱鬱不得志之人多生此病雖云濕熱不可純用寒凉必佐之以甘溫君之以滲泄則濕易除熱易解其病自愈若純用凉藥重傷脾土濕未必除熱未必去反變爲腹脹者矣

脉五疸實熱脉必洪數其或微濇證屬虛弱

濕熱黃

濕熱發黃者小便不利大便反泄者五苓散方見濕證

虛者三因白朮湯實者大便不通內熱茵陳湯

三因白朮湯

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

桂心　白朮各一兩　豆豉　杏仁

甘草　乾葛各五錢　枳實炒三錢

右剉。每服四錢。水煎。

茵陳湯　治濕熱發黃。身熱鼻乾。汗出。小便不利。

茵陳六兩　梔子十四箇　大黃二兩

每服一兩五錢。水煎。

陰黃

陰黃脉沉遲。四肢冷。自汗泄利。小便清白。茵陳四逆湯。即四逆湯加茵陳也

虛黃

虛黃耳鳴口淡。怔忡微熱。四肢無力。急惰者。與軟脉沉細。四君子湯。方見脾胃。若兼食積發黃者。小溫中丸。大溫中丸。或用六君子湯。加茵陳蒼朮山藥。

小溫中丸　治黃疸與食積。又可制肝燥脾。脾虛者以白朮作湯作。使

針砂十兩炒紅醋淬七次再炒研　苦參夏加冬減　山查各二兩

白朮五兩　蒼朮　川芎夏減　神麴各半觔

香附一觔童便浸透　吳茱萸一兩冬加夏減

右爲末。醋糊丸梧子大。食前鹽湯送下。

大溫中丸　製同前方

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

針砂十兩製 陳皮一 蒼朮 青皮

厚朴 三稜一 蓬朮 黃連

苦參 白朮各五兩 甘草二兩生 香附一觔

六君子湯 即四君子加陳皮半夏

瘀血黃

瘀血黃者。大便黑。小便利。抵當湯。桃仁承氣湯量人虛實。下盡黑物則愈

抵當湯

水蛭七箇 蟲蟲六箇 桃仁七箇 大黃一兩

末之分作四丸水一盞一丸取七分溫服

桃仁承氣湯 即小承氣加桃仁一錢五分 硝六分 煎服

五疸

穀疸。食已頭眩。心中怫鬱不安。濟生穀疸丸或小柴胡湯加穀芽枳實厚朴山梔大黃

酒疸。身目俱黃。脛滿懊憹。尿黃面黃赤斑梔子大黃湯。茯苓滲溼湯

女勞疸者。額黑身黃。少腹滿急。小便不利。硝石礬石散

黃汗者。汗出如梔子水濟生黃著散

黃疸者。身目悉黃如金。茵陳五苓散。實者茵陳湯

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

搐鼻法

濟生穀疸丸

苦參二兩　牛膽一兩　龍膽草一兩

右爲末。用牛膽汁入煉蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。空心熟水或生薑甘草湯下

小柴胡湯 方見瘧疾

梔子大黃湯　治酒疸

梔子十五箇　大黃一兩　枳實五箇　豉一升

水煎服　去大黃加葛根。名葛根湯。

茯苓滲濕湯　治黃疸寒熱嘔吐。而渴欲飲冷。身體而目俱黃。小便不利。不得安臥。不思食

白茯五分　澤瀉三分　茯苓　猪苓二錢

黃芩　黃連　梔子　防己

白朮　蒼朮　陳皮　青皮

枳實各二分　右剉水煎服

硝石礬石散　治女勞疸身黃額黑。日進三服取汗。

[illegible]石　礬石各燒過等分

右爲末。大麥粥汁調服二錢。

濟生黃耆散　治黃汗

黃耆　赤芍　茵陳各二兩　石膏四兩

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

麥冬去心　豆豉各一兩　甘草炙半兩

服五錢。生薑三片。水煎。食遠服。

茵陳五苓散　即五苓散加茵陳是也方見二卷濕症條下

搐鼻法　治黃疸遍身如金色。

瓜蔕二錢　母丁香二錢　大黃一兩醋炒　黍米半錢

赤小豆五分

右為末。每夜兩鼻搐藥。便睡。次日取下小便即愈。

水腫六

歌　水濕由來脾土虛。不能行水漬於膚。須知陽水并陰水。氣血風形各有論。制水不須行峻利。脾能健運自寬舒。但將參朮常為主。加減。當看所挾施。

論　人藉水穀以生。穀賴脾土以化。若脾土虛。則不能制水。故傳化失常。腎水泛溢。反得以漬脾土。於是三焦停滯。經絡壅塞。滲于皮膚。注于肌肉。而發浮腫。其狀目胞上下微起。肢體重著。咳嗽。怔忡。股間清冷。小便黃澀。皮膚光腫。手按成窩。舉手即滿是也。然有五腫十水。名狀不一。而致病之由。不過如此。丹溪云。水病以健脾為主。使脾氣得實而氣運則水自行。并五苓神祐禹功之行水也。而宜以參朮為君。視其所挾之證而增減。無不效。若苟徒快

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

利行水。多致不救也。悲夫。如風腫者。皮粗。麻木不仁。走注疼痛。氣腫者。皮厚。四肢瘦削。腹脇脹滿。血腫者。皮膚間紅縷赤痕。陽水腫者。身腫消渴。溲赤煩躁。便秘脉數。陰水腫者。身冷不渴。便清脉遲。風水者。中有水氣。面目腫大。有熱身體反重而酸。或惡風自汗。外證骨節疼痛。脉浮不渴。皮水者。外證附腫按之成窪。不惡風。其腹如鼓。發汗之證。裏水者。脉遲。外證自喘。石水者。脉沉。外證腹滿不喘。黃汗。風水者。脉浮。外證骨節痛。惡風。大抵腰以上腫者。當發汗。是開鬼門也。腰以下腫者。當利小便。是

潔淨府也。此上下分消其濕治水之良法也。

謹按水腫之病。多起於外觸怒氣。內傷飲食所致。蓋肝常有餘。觸怒則益脹而下於脾。脾常不足。傷食則不運而生濕。濕鬱盛則化爲水。上達於頭。下流於足。中滿於身之前後。浮腫如匏。堅實如石。寒冷如氷。行坐又難。眠臥不得。病而至此。蓋亦危矣。論治法。本當專利小水以寬其脹。但腫勢太盛。內而膀胱。外而陰囊。相連緊急。阻塞道路。雖加利水之劑。苦無一線之通。病何由去。必開其大便。以逐其水。隨下而隨補。則病已去而脾無恙。漸爲調理。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

庶可得生。苟病勢已極。而猶守舊規。吾恐閉城門而欲其盜之出也難矣。如腫勢未盛。還是利水爲上。男子之腫。從上而下者爲順。從下而上者爲逆。男子先陽而後陰故也。女子之腫。從下而上者爲順。從上而下者爲逆。女子先陰而後陽故也。水氣面黑者不治。爲陰勝陽也。不進飲食者死。爲無胃氣也。脛股間黃水出者死。膕破脾絕故也。氣喘不定。缺盆平者死。肺氣絕故也。

【脉】水腫之證。有陰有陽。察脉觀色。問證須詳。陰脉沉遲。其色青白。不渴而瀉。小便清澀。脉或沉數。色赤而黃。燥糞赤溺。兼渴爲陽。沉細必死。浮大無妨。

攻補兼施

加減胃苓湯 健脾。除濕。寬中。利小便。

蒼朮一錢半 陳皮一錢 厚朴八分薑製 赤茯苓去皮

猪苓 澤瀉 白朮各一錢 大腹皮六分洗淨薑製

神麴炒八分 甘草炙二分 山查去核七分 香附子六分薑汁拌炒

木瓜一錢 檳榔八分 砂仁炒研七分

[illegible]剉。生薑三片。燈心一團。煎服。○氣急。加蘇子葶藶[illegible]皮。去白朮。○發熱。去香附。加炒山梔黃連。○瀉加[illegible]芍藥。去檳榔。○惡寒厥冷。脉沉細。去檳榔

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

加木香五分。官桂少許。○腹脹。去白朮甘草。加蘿蔔子

先攻後補

四將軍湯　通便逐水

甘遂　大戟　苦葶藶　大黃各一錢

右水煎服之。待大便行後。隨服補藥

實脾調氣丸

白朮二兩　人參一兩　廣陳皮五錢　神麴一兩

共爲細末。水丸。米飲送下二錢空心服。

純于溫補

按薛立齋曰前證若肚腹痞滿。肢體腫脹手足冷飲食難化。或大便溏瀉呼吸氣冷者。此眞陽衰敗。脾肺腎虛寒。不能司輸。則水之行也。急用加減腎氣丸。否則不治。惟調補脾土。亦自生者。

金匱加減腎氣丸

熟地八兩　山藥　山茱萸各四兩　白茯苓

澤瀉　丹皮各三兩　川牛膝酒洗微炒　車前子

肉桂　附子炮各一兩

右爲末。米糊丸菉豆大。每服百丸。空心白湯送下。

鼓脹七

〔歌〕鼓脹又名單腹脹。外雖堅急內空虛。實人攻下隨

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

宜補。虛者調中更益脾。瘀血可行休有慢。食當消導再無疑。瘦人病此多因火。勿得輕將快利施

〔論〕丹溪云。鼓脹由七情內傷。六淫外侵。飲食不節。房勞致虛。脾土之陰受傷。轉運之官失職。胃雖受穀不能運化。故陽自升陰自降。而成天地不交之否。清濁相混。隧道壅塞。鬱而爲熱。熱留爲濕。濕熱相生。遂成脹滿。外雖堅急。中空無物。有似乎鼓。故名曰鼓。其病膠固難治。有若蟲侵蝕之義。亦名曰蠱。二義俱通。理宜補脾。次養肺金以制肝木。使脾無賊邪之患。滋腎水以治火。使肺得清化。却厚味。遠音樂。無有不安。更審其虛實。辨其所因。調之補之清之利之權。輕重而療之。自愈矣。若喜行快利。不審元氣。而用峻劑攻之。殊不知寬得一日半日。其脹轉甚。病邪轉洙。眞氣愈傷。再不可救。哀哉。惟宜王道藥治之可不愼歟。

謹按前證。多因過傷飲食。勞力怒氣所致。過食則傷脾。勞力則傷血。怒氣則傷肝。三者俱傷。其病必重。藥亦難効。若因久瀉而成者。專以脾虛治一臟受病。猶可施手。扶其脾。利其水。則脹自消矣。此病若眼下如臥蠶者。必發水腫。能食者輕。不能食者

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

重。絕不食者死。脉浮大者生。沉細者不治。胸堂脹滿。臍突出者死

(脉)脹滿脉弦。脾制於肝。洪數陽熱。遲弱陰寒。浮爲虛脹。緊則中實。浮大者生。虛小危急。

實

實者按之堅痛。量人元氣下之泄之。通利後便收拾。用參朮補養脾胃。若內有積塊堅痞。保安丸。廣茂潰堅湯。有因蓄血腹脹。脉濇而芤。大便黑。桃仁承氣湯。下盡黑物。方見血證　有因食積腹脹。內有熱者。木香檳榔丸。方見內有寒者。木香厚朴丸。下[illegible]

砂仁神麯香附。有因大怒腹脹者。膏皮陳皮附木香梔子仁　外寒鬱內腹脹者。升麻乾薑蒼朮防風以解表寒　瘦人腹脹是火。黃連厚朴香附芍藥。　肥人腹脹是濕。平胃散。方見濕證

保安丸　治癥積心腹內結如拳。上搶心痛。臍腹痛。

大黃三兩酒蒸　附子五錢去皮臍炮　乾薑一兩炮　鼈甲一兩半醋炙黃

右爲末。先將醋一升。煮至四五合後。和藥末丸如梧子大。空心白湯下二十丸。取積下爲度。

廣茂潰堅湯　治中滿腹脹有積聚。

厚朴薑汁炒　黃芩　益智仁炒　草豆蔻炒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

當歸各五錢　黃連六錢　製半夏七錢　廣茂炒

升麻　紅花酒浸　吳茱萸各二錢　甘草生

柴胡　澤瀉　廣陳皮　神麯炒

青皮各三錢　渴者加葛根四錢

每服七錢。生薑三片。煎服。不拘時。

虛

腹脹者。朝寬暮急者。屬血虛。四物湯方見血證加厚朴

柴胡山梔丹皮。暮寬朝急者。屬氣虛。四君子去

甘草。加陳皮厚朴半夏腹皮　朝暮俱急者。氣血

兩虛也。四君子湯方見[illegible]加芎歸白芍陳皮厚朴。

歌　五積須知積有年。有形有質有根源。其如六聚無

常處。聚散無時故易差。假物而成名曰癥。積癥成

塊不移遷

論　夫五積者。五臟之積也。肝曰肥氣。在左脇下如覆

杯。有頭足。如龜鼈狀。久不愈。發咳逆嘔。其脉弦而

細。心曰伏梁。起於臍上。至心。大如臂。久不已。病煩

心。身體脛股皆煩。環臍而痛。其脉沉而芤。脾曰痞

氣。在胃脘。覆大如盤。久不愈。病四肢不收。黃疸。飲

食不爲肌膚。心痛徹背。背痛徹心。其脉浮大而長。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

肺曰息賁在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒寒熱嘔逆咳喘發肺癰其脉浮而毛腎曰奔豚發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑六聚者六腑之所成也蓋聚無常形聚散不時非若積之有定處也癥者徵也因物而成質有塊可徵不能移易也瘕者假也假物而成形推移能動也古方治積聚癥瘕多用耗氣峻削之劑又佐以辛香熱藥若輕淺者因以消化根深帶固日久氣虛者寧不損正氣者乎正氣既傷其積轉甚故溫古有養正積自除之[illegible]然溫[illegible]皆君子其中[illegible]小人自不容而出[illegible]言信矣然當審其淺深輕重之機久近虛實之勢可消可補必量其人之虛弱強盛而施之可也

脉 五積屬陰沉伏附骨肝弦心芤腎沉急滑脾實且長肺浮喘卒六聚脉沉痼則浮結又有癥瘕其脉多弦弦急瘕疾弦細癥堅沉重中散食成癖痃積聚癥瘕緊則痛纏虛弱者死實強可痊

積聚

香積丸 治五積六聚氣塊

三稜醋炒六兩 蓬朮炮或醋炒 青皮炒 陳皮炒

枳殼炒　枳實炒　蘿蔔子炒　香附醋炒各二兩

黃連薑炒　神麯炒　麥蘖炒　鼈甲醋炙

乾漆炒令烟盡　桃仁去皮尖　砂仁炒　硇砂

甘草炙　木香　鱉尾各一兩　檳榔六兩

山查四兩　一方去枳實陳皮蘿蔔子加益智紅花柴胡白朮茯苓

右爲丸醋糊丸每服三五十丸空心陳米湯送下

大阿魏丸　去諸積聚痰癖

山查　麥芽　神麯炒　南星

半夏　黃連各　連翹　阿魏醋浸研入

瓜蔞仁　貝母各半兩　風化硝　石醋

蘿蔔子蒸　胡黃連各一錢半

右爲末薑汁浸蒸餅爲丸空心白湯送下二錢

大七氣湯　散聚氣

青皮　陳皮　三稜煨　蓬朮煨各一錢

桔梗　甘草　藿香各八分　香附一錢

益智　官桂各六分

癥瘕

保和丸　治食癥方見傷食

阿魏丸　治肉癥

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

阿魏一兩　山查一兩　黃芩六錢　連翹五錢

右爲末。用阿魏醋煮作糊丸。如梧子大。每服二三十丸。白湯下。

熨癥法　用吳茱萸三觔。槌碎。以酒炒熱。包于絹帛中。乘熱熨患處。冷則易熱者再熨。若癥積移走逐熨之。候癥消乃止。

見睍丸　治婦人石瘕生於胞中。寒客子門。子門閉塞。氣不宣行。惡血當瀉不瀉。日以留止。衄以時下。狀如懷子。月事不以時下。以此丸導之

附子四錢　鬼箭羽　紫石英各三錢　澤瀉

血竭二錢半　肉桂　玄胡索　木香各錢

檳榔二錢半　桃仁七錢炒　三稜五錢　水蛭一錢炒令烟盡

大黃二錢同三稜酒浸一夕焙

右爲末。酒糊丸。如梧子大。每服三十丸。鹽湯送下

石磏丸　治血瘕。血瘕者。血不流而寒澀。則血內凝而爲瘕也。比之石瘕爲輕。用以消之。

海粉　三稜　蓬朮醋炙　五靈脂

紅花　香附　石磏　瓦龍子火淬

右爲末。醋糊丸。如梧子大。白朮湯下。

痞塊

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

謹按痞塊。多在皮裏膜外。並不係於腸胃間。而醫者往往以峻劑下之。安能使此塊入腸胃。從大便而出哉。吾見病未必去。而元氣已耗。經年累月。遂至不治者多矣。歷代醫家。皆曰在左爲死血。在右爲食積。在中爲痰飲。蓋以左屬肝。肝藏血。右屬脾。脾化穀。而痰飲則結聚於中焦也。殊不知肝脾雖左右之分。而實無界限之隔。非謂肝偏於左。而無與於右。脾偏右。而無與於左。在左爲死血。而在右獨無死血乎。在中爲痰飲。而左右獨無痰飲乎。但在左在右在中。皆四肢之所在而入之耳。不可以死血痰飲食積分之也。或先有死血。繼以食積痰飲。或先有食積。繼以死血痰飲。相裹而成者。或單是痰飲。單是食積。單是死血。久不愈。遂爲堅塊。治之惟削堅破結爲主。然當診之以察其病。弦滑爲痰。芤濇爲血。沉實爲食。三脉並見。則當兼治。若夫女人積塊。多是血結。治女病者。以調血爲主。蓋月事正臨。適感寒氣。寒客子門。血凝不行。日積月累而成塊。多在少腹間。發則上攻。痛楚萬倍。面色不澤。是不在皮裏膜外矣。小則下之。大則消之。至於食積。乃是胃家所受。亦豈在皮裏膜外耶。審其病

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

的是食積。或下或消。隨其所用而不可泥也。又有停飲者。按之若有形。與積塊相似。但不堅實耳。然求其因。悉是平日喜飲茶水。或恣食生冷所致。脾家受寒。不能運化。又爲火鬱。化爲清痰。停積日久。隱隱作痛。停於上焦。則吞酸飽悶。停於中焦。則中脘膨脹。停於下焦。則少腹滿急。停於兩脇空隙處。則漉漉有聲。時升時降。或湧之或下之。隨其所在而施之可也。

僊傳化痞丸

鶴鵝一隻用白水煮爛加酒半斤阿魏五錢煮一滾撈起絲[illegible]炙乾骨頭打[illegible]

[illegible]入 五色糖阿魏[illegible]二錢另洋入藥 水[illegible]

神麴一兩六錢 白朮 當歸 陳皮各一兩二錢

急性子 蘆會各七錢 蓬朮六錢 青皮五錢

甘草四錢 枳殼 雄黃各五錢

右爲末。將鶴鵝汁爲丸。如梧子大。每服二錢五分。服藥後。病在左。睡朝左。病在右。睡朝右。

薛氏阿魏膏

羌活 獨活 赤芍 穿山甲

玄參 官桂 生地 兩頭尖

大黃 白芷 天麻各五錢 木鼈子十枚去殼

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

[illegible]花錢　[illegible]　枳杏杏枝各三錢

右用香油二觔四兩。煎黑去柤。入髮煎化。仍去查。徐下黃丹十兩。煎軟硬得中。入芒硝。阿魏。蘇合香油乳香。沒藥。各五錢。麝香三錢。調勻。即成膏矣。將帛絹攤貼患處。內服九藥。黃丹須用山東者効。尾貼膏藥。先用朴硝隨患處鋪半指厚。以紙覆上。用熱熨斗熨良久。如硝耗。再加熨之。二時許方貼膏

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library