PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

**This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:**

**© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University**

**To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or**

**The East Asian Library and the Gest Collection**
**33 Frist Campus Center, Room 317**
**Princeton University**
**Princeton, NJ 08544**
**United States**

**A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).**

6

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/253T
V.6

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

## 脾胃症一

歌 脾胃相通五穀消。輸精脉絡裕三焦。當其健運施生化。能食而肥氣血饒。四時胃氣爲根本。脉實弦洪與石毛。一有所傷營運遠。從茲便覺此身嬌。勞形過食中州損。怠惰貪眠面色焦。水不運行生痞脹食難尅化肉潛消。脾胃既病如何療。要適寒溫飲食調。

論 夫脾爲倉廩之官。胃爲水穀之海。然胃主司納。脾主消導。一表一裏。一納一消。運行不息。生化氣血。



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

滋榮脉絡。四肢百骸。五臟六腑。皆藉此以生養。故四時皆以胃氣爲本。如易之坤厚載物。德合無疆。故萬物資生於坤元也。脾胃論云。人之脾胃盛。則多食而不傷。過時而不饑。脾胃衰。則多食而傷。少食而瘦。過時而饑。此脾胃盛衰可見也。不善攝生者。飲食不節。寒暑不調。喜怒失常。勞役無度。未有不損其脾胃者也。經云。飲食勞倦。則傷脾胃。脾土既傷。不能輸運。則氣血精神。由此而日虧。臟腑脉絡。由此而日損。肌肉形體。因此而日削。故有怠惰嗜臥。四肢無力。面色萎黃。食飲消瘇。腫滿泄痢之病生焉。經云。三損損於皮。則肌肉消瘦。飲食不滿爲肌膚。故損其脾者。調其飲食。適其寒溫。此調理脾胃之良法也

## 脾胃不和

脾不和。則食不化。胃不和。則不思食。脾胃不和。則不思而且不化。或吐或瀉。或脹滿。或吞酸。或噯氣。或惡心。用治中湯。脾不和。不喜食而食不消者。枳縮二陳湯。枳朮丸。胃不和者。平胃散。

治中湯　治脾胃不和。嘔逆霍亂。中滿虛痞。或泄瀉。

人參一錢　甘艸炙一錢　乾薑炮一錢　白朮土炒一錢



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

青皮一錢　陳皮一錢

右剉作二服。水一盞。煎一盞。空心服。

枳縮二陳湯　即二陳加砂仁枳殼。方見痰症條

枳朮丸　治痞消食強胃。

枳實麩炒一兩　白朮二兩　加橘皮名橘皮枳朮丸。

加麴蘖名麴蘖枳朮丸。　加木香名木香枳朮丸。

加半夏名半夏枳朮丸。　加芩連名芩連枳朮丸

右爲末荷葉煮飯爲丸如桐子大。空心白湯送下

五六十丸。

脾胃虛損



脾胃虛損者補中益氣湯四君子湯。脾胃虛。飲食

不進。嘔吐瀉利。四肢無力。怠惰嗜臥。或病後脾胃

受傷。元氣不足。參芩白朮。故建中湯。

補中益氣湯　方見內傷

四君子湯　補脾胃大虛。飲食不思。嘔吐泄瀉等症。

人參去蘆一錢　白茯苓一錢　白朮土炒二錢　甘草蜜炒一錢

右剉一劑。生薑三片。大棗二枚。水二鍾。煎八分服。

○如吐瀉。加藿香白扁豆。○咳嗽。加桑白皮五味

子。○心煩不定。加辰砂酸棗仁遠志。○心熱。加麥

門冬茯神蓮肉。○驚風陰症。加全蝎白附子。○口

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

渴加乾葛烏梅。○胃冷加丁香砂仁木香。○腹脹不思飲食。加白豆蔻砂仁。○喘急胸膈不寬。加枳殼。○盜汗加黃芪小麥。○小便澀。加猪苓澤瀉木通。○水瀉不止。加木香訶子豆蔻

參苓白朮散　調理脾胃受傷。元氣不足。諸虛等症。

白朮二兩十炒　人參二兩去蘆　甘艸二兩炙　乾山藥二兩炒

白茯苓二兩　白扁豆一兩五錢薑汁炒去皮　蓮肉一兩去皮

薏苡仁一兩　砂仁一兩炒　桔梗一兩炒

右爲末。每服二錢。棗湯調下。

建中湯　方見惡寒

脾胃停食

脾胃停食。不能消導。麴蘗橘半枳朮丸。或枳桔二陳湯加山查神麴。或保和丸。脾胃不和。伏痰留飲者。二陳湯加澤瀉猪苓厚朴蒼朮。或利膈化痰丸。

枳桔二陳湯　即二陳加枳殼桔梗　方見痰症

保和丸　方見傷食

二陳湯　見痰症

利膈化痰丸　方見痰症

脾胃虛寒

脾胃有寒。脉遲理中湯。脾胃虛冷。心腹脹滿疼痛



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

厚朴溫中湯。胃寒不進食。香砂養胃湯。進食散。

理中湯 方見中寒

厚朴溫中湯

厚朴薑炒八分 乾薑七分 甘艸炒六分 木香五分

陳皮八分 茯苓八分

右剉一劑。生薑三片。大棗二枚。水二鍾。煎八分。服。

人參開胃湯

人參去蘆一錢 白朮土炒一錢 白茯苓一錢 甘艸炙八分

陳皮八分 半夏薑製七分 神麯炒七分 麥芽炒七分

砂仁炒七分 厚朴薑汁拌炒七分 丁香五分

藿香葉六分 蓮肉去皮 生薑三

右剉一劑。水二盞。煎八分。空心服。

香砂養胃湯 方見瘧疾

脾胃伏火

脾胃鬱火。二陳加芩連山梔。脾胃虛熱津不足。白朮散。脾胃有熱。消穀善饑。三黃枳朮丸。脾熱口臭。瀉黃散。胃火齒痛。清胃散。

白朮散 即四君子湯加木香藿香乾葛。方見前

三黃枳朮丸 即枳朮丸合三黃丸。枳朮丸方見前 三黃方見火症

瀉黃散 見火症

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

清胃散 見火症

脾胃中溼

脾胃中溼者。平胃散。脾胃中溼瀉痢者。胃苓湯。脾胃寒溼脾泄者。椒朮養脾丸。脾溼身腫便澀。五苓散。虛者實脾散。實者十棗湯。

平胃散 方見中溼

五苓散 方見中溼

胃苓湯 方見中溼

椒朮養脾丸 治脾胃虛冷。心腹脹悶。嘔逆泄瀉。

麥芽 炒四兩　白茯苓 四兩　人參 去蘆二兩　蒼朮 泔浸曬乾炒燥一兩

白朮 土炒二兩　乾薑 炮五錢　砂仁 五錢　川椒 去目三錢

甘艸 炙四錢

右爲末。煉蜜丸。每兩作八丸。每服一丸。細嚼薑湯下。

實脾散 治陰水發腫。用此先實脾土。

白朮 土炒一錢　白茯苓 一錢　木香 八分　厚朴 薑汁拌勻炒燥八分

木瓜 一錢　乾薑 炮八分　艸果 八分　大腹子 一錢

甘艸 炙七分

右剉一劑。薑三片。棗二枚。水二盞。煎八分。空心服。

十棗湯 治懸飲內痛。



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

芫花熬　甘遂　大戟等分

右爲末。以水一升半。煑大棗十枚。煎至八合。去查納藥末。强壯者一錢。虛弱人五分。平旦服之。不下。再加五分。下後以糜粥調之。○按本方。乃泄水散飲之聖藥。然有毒不可輕用

傷食症二

【歌】胸膨噯氣爲傷食。氣口緊盛端可識。所傷仍辨熱和寒。元氣要分虛與實。

【論】經云。飲食自倍。腸胃乃傷。故傷食者。氣口脉緊盛左手脉平和。胸膈痞塞。噫氣如敗卵臭。頭疼發熱絕類傷寒。但身不疼爲異耳。所傷之物有辛辣香燥炙煿酒麪熱物者。有傷生冷魚腥水果寒凉等物者。有壯實人縱飲大嚼者。有虛弱人多食不尅化者之不同。更審其所傷多少。酌其元氣虛實。而消之導之。攻之補之。則萬舉萬全。而無誅伐太過之失也。

【脉】氣口緊盛。爲傷于食。食不消化浮滑而疾

傷冷物

所傷一切冷物。如魚腥瓜果之類。胸中痞滿者。二陳湯加香附砂仁神麴紅豆。或治中湯。或木香見



East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

睍丸。仍用炒麩皮熨之

二陳湯 方見痰症

治中湯 方見脾胃

木香見睍丸

巴豆霜五分　京三稜一兩　神麯炒黃一兩　木香二錢

香附五錢炒熟　石三稜五錢去皮與京三稜共煨　升麻三錢

柴胡三錢　艸豆蔻麩裹燒熟取仁五錢

右爲細末。湯浸餅餅爲丸如菉豆大。每服二十丸。白湯下。量所傷多少服之

傷熱物

所傷熱物。如薑椒蒜韭酒麪炙煿煎炒犬肉辛辣之類。致心下痞滿作痛者。三黃枳實湯。或二陳加芩連山查枳實神麯麥芽。食已下。大便不通。大承氣湯下之。

三黃枳實湯

黃芩一錢　黃連一錢　大黃煨一錢　枳實二錢

厚朴五分　甘艸五分

右剉一劑。水二盞。煎八分。空心熱服。

二陳湯 見痰症

大承氣湯



Post Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

大黃三錢　芒硝三錢　厚朴一錢五分　枳實一錢五分

右剉一劑。水二大鍾。煎至八分。熱服。以利爲度

按經曰。脾胃者。倉廩之官。無物不受。一有停滯。則氣不順而生痞滿燥實堅。是方也。厚朴苦溫以去痞。枳實苦寒以瀉濁。芒硝鹹寒以潤燥軟堅。大黃苦寒以瀉實去熱。此土鬱則奪之之意也。

虛人傷食

虛弱人食不化。痞滿者。六君子湯加神麴麥蘖山查。大便不通者。加枳實厚朴。或枳朮丸加麴蘖橘半山查。虛甚者加茯苓人參。

六君子湯　即四君子湯合三陳湯　四君子湯　二陳見痰症

枳朮丸　方見脾胃

實人傷食

氣壯人傷食。痞滿不消者。保和丸。大便閉結不通脹滿者。木香檳榔丸。

保和丸　治食積

山查肉二兩蒸熟　神麴炒一兩　半夏一兩

茯苓一兩　萊菔子五錢　陳皮五錢　連翹五錢

右爲末。神麴糊丸如桐子大。每服三錢。空心米湯下。加白朮名大安丸。



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

木香檳榔丸　治一切氣滯。心腹痞滿。脇肋脹痛。大小便結滯不利者。

木香一兩　檳榔一兩　蓬朮一兩　青皮一兩

陳皮一兩　枳殼一兩　黃連一兩　香附三兩

大黃炒三兩　牽牛生取頭末三兩

右爲末。水發爲丸。食後薑湯送下四五十丸以利爲度

霍亂症三

【歌】霍亂須分溼與乾。吐空瀉盡始能安。若還關格陰陽逆。生死分明反掌間。甚則轉筋仍厥逆。埋中[illegible]附可驅寒。熱多而渴五苓散。暑症香薷藿朴堪。

【論】夫霍亂者。揮霍撩亂也。外有所感。內有所傷。陰陽乖隔。上吐下利。躁擾悶痛是也。偏陽則多熱。偏陰則多寒。卒然而成。危如風燭。得吐利者。名曰溼霍亂。爲可治。蓋所傷之物盡出故也。若上不得吐。下不得利。所傷之物不得出。壅閟正氣。關格陰陽。其死甚速。須用鹽湯探吐。得出則寬。輕者手足溫和。甚者臍腹絞痛。厥逆脉脫。舉體轉筋。當溫補回陽復脉。若暑月多食瓜果泉水以致食鬱于中而成霍亂者。宜辛溫散其標寒。次以寒涼清其暑熱可



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

也。渴甚者冰水解之。

脉 霍亂吐瀉。滑而不勻。或微而澀。或伏驚人。熱多洪滑。弦滑食論。

溼霍亂 即吐瀉

霍亂吐利。藿香正氣散。腹痛厥冷。脉沉。理中湯。轉筋不已。木瓜散。膝腕內紅筋。刺出紫血。炒鹽熨臍。

霍香正氣散 治四時不正之氣。不服水土。脾胃不和。吐利腹痛。飲食停滯。惡心胸滿者主之。

藿香 二錢 白芷 一錢 桔梗 一錢 半夏 一錢 薑製

紫蘇 一錢 陳皮 一錢 白朮 一錢 炒 大腹皮 一錢

茯苓 一錢 厚朴 一錢 薑炒 甘艸 五分 炙

右剉一劑。加薑三片。棗二枚。水煎溫服。○轉筋。加木瓜。○腹痛。加炒芍藥。寒痛加桂。○食不化。加香附砂仁神麴麥芽。○中暑加香薷扁豆。○時氣憎寒惡熱。加柴胡乾葛。○小便不利。合五苓散。○若頻欲登圊不通者。加枳殼。

理中湯 方見中寒

木瓜散

木瓜 二錢 茴香 三分半 甘艸 二分炙 吳茱萸 一錢半

紫蘇 十葉 生薑 五片

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右剉一劑。水二盞。煎八分。空心溫服。

乾霍亂 俗名絞腸沙

不得吐利。臍腹痛甚。躁擾悶痛欲絕。以鹽湯灌下一椀許。探吐。若不得吐不治。更以吳茱三四兩。用鹽數兩炒熱熨臍下。

暑霍亂

暑月霍亂。六和湯。熱而燥渴煩悶。五苓散。或以涼水調益元散。或桂苓甘露飲。或藿薷湯冷服。

六和湯 治冒暑伏熱。煩悶氣不升降。霍亂轉筋。嘔吐泄瀉。寒熱交作。痰喘咳嗽。胸膈痞滿。頭目昏痛。肌體浮腫。小便赤澀。急精嗜臥。及中酒煩渴異食。茲用此湯隨症加減。

縮砂一兩 半夏一兩 杏仁一兩 白扁豆二兩

人參一兩 甘草炙一兩 赤茯苓二兩 藿香葉二兩

木瓜二兩 香薷四兩 厚朴薑炒四兩

右剉。每服一兩。薑棗水煎。○按六和者。和六府也。脾胃者。六府之總司。故凡六府不和之病。先于脾胃而調之。是方有藿香砂仁。香能開胃竅也。半夏生薑。辛能散逆氣也。茯苓木瓜。淡能利溼竅也。參朮扁豆。甘能調脾胃也。脾胃一治。則水精四布。五

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

經並行。雖四肢百骸九竅。皆太和矣。況于六府乎。

五苓散　方見中溼

益元散　又名六一散

滑石六兩水飛　甘艸一兩

右爲細末。水調服。

桂苓甘露飲　治夏月引飲過多。肚腹膨脹。霍亂洩利。小便赤澀。口乾燥渴。

白朮二兩炒　白茯苓二兩　猪苓二兩　澤瀉二兩去毛

滑石研二兩　寒水石研一兩　甘草炙一兩

肉桂去皮五錢

右剉。每服一兩五錢。水二鍾。煎八分溫服。○按右方以五苓利三焦之溼。二石清六府之熱。此河間治溼熱之簡便者。張子和加人參。因其脉虛故也。

嘔吐症四

【歌】得食即吐知爲火。停久而來却是寒。久病胃虛因不納。或緣氣逆與停痰。食塡胃口多生嘔。新穀如何得下關。欲辨熱寒虛實候。大微遲數脉中參。

【論】有聲有物曰嘔。有物無聲曰吐。有聲無物曰乾嘔。皆主於脾胃。有胃寒者。有胃熱者。有胃虛者。有痰隔者。有氣滯者。有食鬱熱之不同。在乎參之以脉。



PO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

驗之以症。則虛實冷熱之形。無所逃矣。

脉嘔吐無他。寸緊滑數。微數。血虛。單浮胃薄。芤則有瘀。最忌澀數。

胃熱

得食即嘔。胃火也。脉必數而口渴。二陳加薑炒芩連。火上冲。食已暴吐。和中桔梗湯。荊黃散調檳榔末。

和中桔梗湯 治氣熱上冲食已暴吐。脉洪數

茯苓一錢 半夏七分 陳皮八分 白朮炒八分

生薑五片 枳實炒八分 厚朴薑炒八分 桔梗八分

右剉一劑。水二鍾。煎至八分。空心溫服。

荊黃散 治上焦氣熱所冲暴吐

荊芥二錢 人參一錢 甘草五分 大黃六分

右剉一劑。水煎。調檳榔末一錢。磨木香五分。溫服。

胃寒

食積為寒所逆。停久而吐者。脉必遲。理中湯加半夏木香薑汁。或紫沉丸。胃寒嘔吐清水者。二陳湯加丁香砂仁。

理中湯 方見中寒

紫沉丸



Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

沉香三錢 檳榔三錢 紫蘇梗五錢 益智去殼炒一兩

神麴五錢 麥芽五錢 白朮五錢 烏藥五錢

香附炒五錢 陳皮一兩 厚朴薑炒一兩 甘艸炙三錢

右爲末。水丸。砂仁湯送下三錢。

胃虛

胃虛不能納食而吐者。脉必微。六君子湯。加丁香砂仁飲食傷脾胃而吐者。枳朮丸。枳朮二陳湯加香附砂仁。飲酒傷胃。嘔吐不止者。葛花解酲湯。

六君子湯 方見傷食

方見脾胃

枳朮二陳湯 即二陳加枳實白朮 方見痰症

葛花解酲湯 方見內傷

食鬱

停食不尅化新穀不下而反出。脉沉。瓜蒂散。或保和丸。食鬱飲食不消。塡塞胃口而嘔吐者。二陳湯加神麴山查薑炒黃連厚朴枳實。

瓜蒂散 方見痰症

保和丸 方見傷食

痰氣

因痰氣壅滯。胃口。食不下而作嘔者。二陳湯加竹



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瀝薑汁枳實瓜蔞。脉沉。瓜蔕散。痰在胸中嘔噦。溫膽湯。氣逆枳桔二陳湯。

二陳湯 方見痰症

枳桔二陳湯 即二陳加枳殼桔梗。

溫膽湯 即二陳加竹茹枳殼。

## 翻胃症五

歌 翻胃多因氣血虛。脉來不足命多殂。是痰是火宜消降。數滑而沉可驗之。更有寒鬱併氣滯。脉來沉伏與沉遲。

論 翻胃成於噎膈。而卒於翻胃。則已危矣。或朝食而暮吐。或暮食而朝吐。其吐必盡所食。日日如此。不變易者。是也。至於吐無時者。嘔吐也。空噦而無所出者。虛嘔也。大抵此病內血槁不能榮潤腸胃。故上不得納。下不得便。如腸結若羊糞者死。然血虛者。則脉數而無力。氣虛者。則脉緩而無力。氣血兩虛者。口中多出沫。但沫大出者必死。亦有熱甚者。則脉數而有力。有痰阻者。則脉滑而有力。因氣滯者。其脉沉而伏。因寒鬱者。其脉沉而遲。皆非血氣衰竭。故可治。學者須審其虛實而斷之。斯無失也。



Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

脉翻胃噎膈。寸緊尺澀。緊芤或弦。虛寒之厄。關沉有痰。浮澀脾積。浮弱氣虛。澀小血弱。若澀而沉。七情所搏。

虛

虛而不　大腸。故便難。蓋幽門不通。上衝吸門。食不能納。年老者難治。年少者猶可保全。四物湯加桃仁紅花麻仁枳殼。結甚者。暫加熟大黃以導其滯。量人虛實用之。中年人四物湯加童便韭汁牛羊乳竹瀝薑汁。氣虛者。參苓白朮散。氣虛有火兼痰者。七聖湯。陰虛火上衝者。四物湯加知母黃蘗薑汁竹瀝若飲食少思。大便不實。胸膈痞悶。吞酸噯腐。食不化而反出。是為脾胃虛寒。即王太僕所謂食入反出。是無火也。用六君子湯加炮乾薑白豆蔻黃連製吳茱萸。如不應。用八味丸補命門火以生脾土。

四物湯　方見血症

參苓白朮散　治脾胃虛弱。飲食不進。嘔吐泄瀉

人參二錢去蘆　茯苓二錢去皮　白朮二錢土炒　乾山藥二錢炒

甘草二錢炙　白扁豆去皮薑汁浸炒一錢五分　蓮肉炒一錢

砂仁炒一錢　桔梗炒一錢　薏苡仁一錢

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

右爲細末。每服二錢。棗子煎湯調下。

七聖湯　治翻胃嘔吐

半夏一錢　黃連一錢　白豆蔻一錢　人參一錢

白茯苓一錢　竹如一錢　生薑三片

右剉一劑。水二鍾。煎八分。空心熱服。

六君子湯　方見脾胃

八味丸　即六味丸加肉桂附子　方見虛損

實

胃中有火。不能停食者。即王太僕所謂食不得入是有火也。二陳湯加竹瀝薑汁炒黃連山梔[illegible]者。四物湯加桃仁紅花枳實黃芩。痰阻者。二陳[illegible]枳殼瓜蔞仁竹瀝薑汁。或用化痰丸。氣逆者。脉浮而洪。食已暴吐。氣上衝胸發痛。用木香調氣散。氣滯者。脉沉而伏。二陳湯加木香砂仁青皮枳殼。食與氣相假成積者。其脉浮而匿。其症或先痛而後吐。或先吐而後痛。治法當以小毒藥去其積。檳榔木香行其氣。下焦有寒者。其脉沉而遲。其症朝食暮吐。暮食朝吐。小便清。大便閉而不通。治法當以通其閉塞。溫其寒氣。大便漸通。復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也。



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

二陳湯 方見痰症

化痰丸 方見痰症

木香調氣散

白豆蔻二兩 丁香二兩 木香二兩 檀香二兩

藿香葉八兩 炙甘草八兩 砂仁四兩

右爲末。每服二錢。入鹽少許。沸湯點服。

一方 治翻胃之要藥

莊汁二兩 牛乳一盞 生薑半兩取汁 竹瀝半盞

童便一盞

右五味和勻頓服。或入煎劑中同服尤佳。

方治翻胃極効。用螃蟹洗淨。入水中。蟹背上水要高三四指。以香油一小盞入水中。將兩指捻白麪撒水上。蟹臍內白沫而出。次日去蟹。留水曬乾爲末。每服五分。淡燒酒下。

## 噎膈症六

【歌】噎膈生於血液乾。或因氣火或因痰。近於咽嗌名爲噎。水飲能吞食物艱。胃脘之間成膈症。食雖能進下關難。要參脉症求虛實。勿泥辛香槩作寒。

【論】丹溪云。噎病生於血乾。蓋胃爲水穀之海。脾爲消化之器。清和則健運。能爲諸經行其津液。稍有不

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

行。則噩滯壅塞。而噎膈之病作矣。世人皆遵局方。但有嘔吐者。便用香燥熱藥。偏助其火。不思此病。原因燥結枯槁而成。復用香燥熱藥治之。其謬甚矣。其始胃液凝聚。其久也脾氣耗敗。傳化漸遲。烏附丹毒。服之積久。血液俱耗。胃脘乾槁。其槁在上近咽之下。水飲可行。食物雖入間或可入。入亦不多。名之曰噎。其槁在下。與胃為近。食雖可入。難盡入胃。良久復出。名之曰膈。漸成反胃。小便秘。大便如羊糞。名雖不同。病出一轍。以血陰也。陰主靜。內外兩靜。則藏府之火不起。金水二氣有養。陰血自生。腸胃津潤。傳化合宜。何噎之有。世人槩用香燥熱藥者。不知此理也。子和引地經三陽結為膈立論。力辨世人熱藥之悞。可謂明矣。又有以承氣治之。失之太峻也。蓋噎有因火。[illegible]。食不得入者。脉數大。有因痰飲阻滯者。脉[illegible]。有七情鬱結者。脉沉澀。有因瘀血積滯。蓋陽無陰不能施化陰失位。陽伏其中。傳化不變而反上行。其脉芤澀。因氣者從氣治。因血者從血治。因痰者導之。因火者壯水制之。豈專以辛香燥劑乎。若脾胃陽火衰微。不能運化者。暫以辛溫藥。開其結滯。仍以益陰養胃



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

爲主。若槩以局方辛香燥熱之藥。以火濟火。重耗其津液。則大便閉結。幽門不通。上冲吸門。而噎膈轉甚矣。此千古之弊也。

達按前症。多起于憂鬱。憂鬱則氣結于胸臆而生痰。久則痰結成塊。膠于上焦。道路窄狹。不能寬暢飲或可下。食則難入。而病已成矣。好酒之徒。患此者。必是頑痰蓋酒能發火。火能生痰。痰因火煎膠結不開。阻塞道路。水飲下咽。亦覺痛澀。若以血槁治。投當歸地黃等藥。血水必潤。反助其痰。病何由愈。若黑瘦之人。眞陰素虛。常覺內熱。又不嗜酒。或遇服香燥熱藥者。當以血槁治。

## 痰氣

喜怒七情。傷于脾胃。鬱而生痰。痰與氣搏。升而不降。飲食不下。氣留于咽嗌者。快氣餅子。四七湯主之。痰鬱者。化痰丸。關格者。必用吐以提其氣。若橫格。不必在乎出痰也。有痰亦宜吐。湧痰湯。其關格者。詳本條內。

快氣餅子　治氣鬱不快。食下則胸膈噎塞疼痛。

萊菔子炒二兩　紫蘇子一兩　橘紅一兩

白豆蔻一兩　白茯苓一兩



Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

右爲細末。煉蜜和薑汁爲餅子。時時噙嚼之。

四七湯　治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間。咯不出。嚥不下。并治中脘痞滿。痰涎壅盛上氣喘急。婦人有孕惡阻。亦宜服之

半夏一錢半　白茯苓一錢三分　蘇梗一錢

厚朴一錢

右剉一劑。生薑七片大棗一枚。水二鍾煎八分。服

化痰丸　方見痰病

湧痰湯

甘草一兩　桔梗一兩　瓜蒂五錢　枳殼五錢

陳皮五錢

右用水十碗。煎至五碗。去查。連連飲盡。浸浮發一惡心。即大吐。得寬後可服參苓白朮散調理。不致復發矣。

火

上焦火盛。冲逆。食不得下而嘔者。和中桔梗湯加竹茹枇杷葉。渴者去半夏。加麥冬。大便燥結者。人參利膈丸微下。血少陰虛。火盛不得眠。食入反出者。朱砂安神丸。

和中桔梗湯　方見嘔

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

人參利膈丸　治胸中不利。痰咳喘滿。和脾開滯推陳致新。治噎膈之聖藥。

木香一兩　檳榔一兩　人參一兩　當歸一兩

藿香一兩　甘草一兩　枳實一兩　大黃酒浸一兩

厚朴薑製一兩

右為細末水丸。溫水送下五十丸。如桐子大。仍用猪膽導之。得通便佳。

朱砂安神丸方見驚悸

虛

血氣槁弱而成噎塞者。養血湯。或潤血飲子。脾虛中氣不足。八珍湯加橘皮竹茹枇杷葉。

養血湯

當歸二錢　生地黃二錢　玄參二錢　阿膠二錢

知母二錢　紅花五分酒洗　桃仁五分研泥

右剉一劑。水二盞煎八分。加生白蜜二匙服。

潤血飲子增　治血槁成噎

水一鍾。入阿膠一兩。化開。煎至七分。加竹瀝半盞。人乳一盞。蜜五匙。徐徐服之。

瘀血

瘀血則脉澀。桃仁承氣湯下之。



East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

桃仁承氣湯 方見本條下

痞滿症七

歌 胸中滿悶名爲痞。外面脉無脹急形。食積結痰兼溼熱。氣虛不運病根深。

論 痞者。否也。不通之意。由陰伏陽畜。氣血不運而成。處心下。位中央塡滿痞塞。皆土之爲病也。然痞與脹有輕重之分。痞則內覺痞悶。而外無脹急之形也。有中氣不足。不能運化者。有飲食痰結。不能施化者。有溼熱太甚而成者。當隨症分消。虛者補中益氣湯。不可峻利。致之實者略與疎導。昧者苟[illegible]暫時通快。喜行峻利。多致危殆也。

脉 痞滿滑大。痰火作孽。弦伏中虛。微澀衰劣。

中氣不足

中氣不足。不能運化精微。而爲痞悶。脉弱無力。不可用利藥攻之。補中益氣湯。久服中氣充滿。清道健運。痞自除也。

補中益氣湯 方見內傷

食積

飲食內傷。不能尅化。而痞者。枳朮丸。或保和丸。或枳桔二陳湯加神麴麥芽山查。心下虛痞。按之痛

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

者。枳實消痞丸。黃連瀉心湯

枳朮丸 方見脾胃

保和丸 方見傷食

枳桔二陳湯 方見脾胃

枳實消痞丸

枳實一錢炒　山查肉一錢　黃連炒一錢　神麴炒一錢

甘艸炙一錢　猪苓一錢　澤瀉八分去毛　厚朴薑汁拌炒八分

砂仁八分炒　陳皮一錢　人參一錢去芦　黃芩一錢炒

乾薑八分　蔓黃八分　白朮炒一錢

右末。蒸餅丸。如[illegible]大。每服五十丸。食後白湯送下。

黃連瀉心湯

黃連一錢二分　厚朴一錢製　乾薑八分　甘艸五分

人參八分　白芍藥八分

右剉一劑。薑三片。水二鍾。煎八分。空心熱服。

溼熱

溼熱太甚而痞者。黃連瀉心湯。有熱。三黃瀉心湯。火邪乘脾而痞者。二陳加黃連黃芩瓜蔞。

黃連瀉心湯 方見前

三黃瀉心湯

大黃三錢　黃連三錢　黃芩三錢



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右剉一劑。水二盞。煎一盞。熱服。

二陳湯 方見痰症

痰滯

痰氣阻滯中州而爲痞者。小陷胸湯。或枳桔二陳湯加黃連瓜蔞天花粉。痰氣壅滯。心胸痞滿不寬。導痰湯。

小陷胸湯

半夏六錢 黃連三錢 瓜蔞小者一箇 大者半箇

用水二鍾。加生薑汁。先煮瓜蔞。約鍾半許。入半夏黃連。煎至一鍾。溫服。

枳桔二陳湯 方見胸膈

導痰湯 方見痰症

惡心症八

歌 畏食分明是惡心。嘔而無物亦無聲。胃中寒氣兼痰火。隨症斟量細辨明。

論 戴云。惡心者。無聲無物。心下欲吐不吐。欲嘔不嘔。心中兀兀如畏舟車者是也。

胃寒

胃中有寒氣而作惡心者。嘔清水。不渴。脉遲。明知食寒物。受寒氣。大半夏湯。小半夏茯苓湯。理中湯。



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

加生薑半夏。

大半夏湯

半夏二錢五分　陳皮二錢五分　茯苓二錢五分　生薑二錢五分

右剉一劑。水二盞。煎一盞熱服。

小半夏茯苓湯　方見欬逆　理中湯　方見中寒

胃熱

胃中有熱而作惡心　酸。內有熱脉必浮大而滑

數。煩渴二陳加薑炒　連山梔。胃氣不足。內熱惡

心。六君子湯加辰砂　炒黃連

二陳湯　方見痰症　六君子湯　方見脾胃

吞酸症九

【歌】要識吞酸與吐酸。總因溼熱肺脾間。吐酸吐出酸

如醋。若是吞酸咯吐難。

【論】夫吞酸與吐酸不同。吐酸者。吐出酸水如醋。平時

津液隨上升之氣。鬱滯日久。溼中生熱。故從火化。

遂作酸味。如穀肉在器。溼熱則易酸。吞酸者。鬱滯

日久。不能自湧而出。伏於肺胃之間。咯不得上。嚥

不得下。肌表得風寒則內熱愈鬱。而酸味刺心。肌

膚得溫煖則腠理開發。或得香熱湯丸。則津液流

通。鬱熱得行。亦可暫解。蓋標寒而本熱也。故素問



DO NOT COPY
Gest Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

河間言熱者。言其本也。東垣言寒者。言其標也。學者當究其淺深之盛。本末之治而用藥。庶可取十全之效也。

〔脉〕吞酸脉形。多弦而滑。或沉而遲。胸有寒飲。或數而洪。胸有痰熱。

吞酸

吞酸是溼熱鬱滯于肺胃之間。必糲食自養。二陳湯加吳茱萸黃連。順其性而折之。佐以蒼朮茯苓。以行其溼熱。再加蜜炒黃連。吞酸有食不化者。平胃散加神麴麥芽白豆蔻炒黃連。

二陳湯 方見痰症

平胃散 方見中溼

吐酸

吐酸者。津液隨上升之氣。鬱之日久。溼中生熱。故從火化而作酸味。二陳湯加吳茱萸炒黃連山梔蒼朮厚朴生薑。中脘有宿食留飲。酸味折心痛。或吐酸水如醋之味。蜇牙痛。麴朮丸。茱連丸。

麴朮丸 治中脘停食留飲。酸蜇心痛。或口吐清水

神麴炒三兩 陳皮一兩 蒼朮米泔浸炒一兩五錢

右爲末。生薑汁煮神麴爲丸。每服七十丸。薑湯下。



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

茱連丸

黃連一兩酒炒　黃芩五錢酒炒　陳皮五錢　吳茱萸五錢煮晒乾

蒼朮七錢米泔浸炒

右爲末。煮神麴爲丸下七十丸。○按是方以芩連治熱。熱去則不吐酸。蒼朮燥溼。溼除則不生熱。陳皮理氣。氣行則溼不鬱。茱萸味辛熱。能引芩連入肝而瀉火。此從治之義也。

嘈雜症十

【歌】痰因火動令人嘈。溼痰氣鬱總同條。肥人自是溼痰故。伐火芩連梔子調。

【論】丹溪云。嘈雜者。俗謂之心嘈是也。有痰因火動者。必痰多。脉滑而數。宜治痰爲先。治火次之。有食鬱作熱者。脉數而大。當治其火。而開導次之。有因溼痰者。脉沉而滑。宜豁痰。有因氣鬱者。脉沉而澀。宜開鬱理氣。蓋沉則爲鬱。滑主痰。而澀主氣也。醫能審脉驗症。眞知是火是氣是鬱。斯爲活法矣。

痰

痰因火動者。治痰爲先。二陳湯加薑炒黃芩黃連。山梔子爲君。南星半夏爲佐。桔梗青黛爲使。

二陳湯　方見痰症

氣鬱



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

氣鬱者。越鞠丸。或二陳湯加枳殼桔梗。香附烏藥
薑炒黃連蒼朮。有痰加貝母

越鞠丸 方見鬱症

火

火嘈者。二陳湯加黃芩黃連山梔子或三補丸。有
火鬱二陳湯加山梔子香附撫芎蒼朮

二補丸

黃芩 四兩 黃連 四兩 黃蘗 四兩

右爲細末。水丸每服七十丸。白湯送下。

食鬱熱

食鬱有熱。先治火。芩連枳朮丸。加神麯麥芽山查
陳皮半夏。或食鬱不消。胸滿嘈雜。大安丸。

芩連枳朮丸 即枳朮丸加芩連 方見脾胃

大安丸 即保和丸加白朮 方見傷食

欬逆症十一

歌 陰火攻衝成欬逆。或因痰氣滯胸膈。胃中積熱與
停寒。病後胃虛多吃忒

論 欬逆者。古名噦。今名呃。又名吃忒。胃寒者。脉遲澀。
手足寒。嘔吐。無熱症。胃熱者。脉洪大。燥渴。便難。有
胃中有痰。陰虛火炎上衝而呃者。其氣從齊下逆

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

上。丹溪云。上升之氣。至肝而出。中挾相火。經云。諸逆衝上。皆屬于火。有痰氣逆滯者。其氣從胸中起中州元氣鬱也。有痰後發呃者。久病胃虛也。宜細辨之。

脉　呃逆甚危。浮緩乃宜。弦急必死。結代促微

胃火

胃火上逆而呃。小半夏茯苓湯。加山梔黃芩吐之。利後胃熱而呃。橘皮竹茹湯。

小半夏茯苓湯

半夏五錢湯泡　茯苓二錢

右生薑五錢。搗汁同煎。不拘時熱服。

橘皮竹茹湯　治吐利後。胃虛膈熱而咳逆者。

橘皮二錢　竹茹一錢　人參五分　甘艸炙五分

右生薑五片。大棗二枚。煎服。

陰火

陰火上逆。從臍下逆上。夜分轉甚者。四物湯。加知母黃蘗竹茹陳皮茯苓

四物湯　方見血症

病後呃

病後元氣不足。胃虛寒而呃。人參理中湯。痢後發



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

呃多不救。用六君子湯。猶或可生。

人參理中湯 方見中氣

六君子湯 方見脾胃

胃寒

胃寒氣逆呃者。丁香柿蒂湯。吐利後胃虛寒。手足厥冷。呃逆者。理中湯加丁香木香枳殼。

丁香柿蒂湯

丁香 一錢　柿蒂 一錢　陳皮 一錢　青皮 一錢

人參 五分

右剉一劑。水一鍾。煎八分。溫服。

理中湯 方見

痰氣

無別症。忽然發呃。痰氣逆滯。氣從胸中起。小半夏茯苓湯。加木香枳殼。或蘿蔔湯調木香調氣散。痰碍氣逆而呃。用薑湯探吐。

小半夏茯苓湯 方見前

木香調氣散

木香 三兩　檀香 三兩　白豆蔻 三兩　丁香 三兩

砂仁 四兩　甘草 炙一兩半　藿香 一兩五錢

右爲末。每服一錢。鹽湯下。



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

## 噯氣症十二

【歌】何故令人成噯氣。蓋緣痰火乘于胃。治痰星夏共陳皮。治火黃連石膏輩。

【論】噯氣者。胃中有火有痰。有食有氣。南星半夏軟石膏炒黑山梔子香附。或丸或煎服。又云痰條下。食積熱。噫氣吞酸症。火氣冲上多作噯氣黃芩爲君。南星半夏陳皮爲佐。熱多再加青黛山梔子瓜蔞仁。或潤下丸。

羯下丸 方見痰症

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection