PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

C83/2537
V.7

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

頭痛症一 附頭痛

歌曰 頭痛先須辨厥陰。濕痰風火挾邪侵。氣虛血少兼寒濕。識者尤當審六經。更有君臣頭作痛。風痰風熱客於經。

論曰 如太陽頭痛者。必風寒。脈浮緊。痛在巔頂兩額角。少陽頭痛者。往來寒熱。脈弦。痛連耳根。陽明頭痛者。發熱自汗。脈浮長大。痛連目眥顴齒。太陰頭痛者。必有痰。體重。或腹痛。脈沉頭重。少陰頭痛者。足寒氣逆。爲寒厥。脈沉細。厥陰頭痛者。吐痰沫。厥冷。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一脉浮緩痛引目系。此六經頭痛。多挾外邪也。血虛一頭痛者。白魚尾上攻頭痛也。氣虛頭痛者。耳鳴九竅不利。腸胃之所生。濕熱頭痛者。心煩重痛。病在腦中。過在手太陽少陰。寒濕頭痛者。氣上而不下。頭痛頭重疾。下虛上實。過在手少陰巨陽。甚則入腎。偏頭痛者。頭半寒痛。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明也。厥頭痛者。所犯大寒至骨髓。髓以腦爲主。腦逆。故頭痛齒亦痛。真頭痛者。痛甚入連于腦。手足寒至節。旦發夕死。夕發旦死也。丹溪云。頭痛多主於痰。甚者久痛。有吐者。有下者。又甚者。有風熱與痰。有所虛而痛者。纔見光明則痛甚。有眉稜骨痛者。眼不可開。晝靜夜劇。屬痰。見此之類。種種不同。視其所挾。究其所因。定其經絡。參以脉理而施以補瀉。宜通汗利之法。斯無一偏之弊也。

六經痛

太陽。川芎羌活藁本蔓荊黃。少陽。小柴胡湯。陽明。升麻葛根湯。加石膏白芷葱白。太陰。蒼朮半夏南星川芎蔓荊子。少陰。麻黃附子細辛湯。厥陰。吳茱萸湯加柴胡。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

小柴胡湯　方見寒症條下

升麻葛根湯　治陽明經頭痛。

升麻一錢五分　葛根一錢五分　白芍藥一錢　甘艸一錢　煎服。

麻黃附子細辛湯　治少陰頭痛。

麻黃去節二錢　細辛二錢　附子炮二錢　水二盞煎溫服。

吳茱萸湯　治厥陰頭痛。或痰涎厥冷。脉浮而緩。

麻黃五分去節　羌活五分去芦　吳茱萸四分　藁本三分　升麻三分　黃芩一錢　當歸酒洗一錢

黃蘗炒一錢　川芎一錢　蔓荊子三分　細辛三分　柴胡三分　黃連炒三分半　夏泡三分　紅花三分

碧玄飲　治頭痛。

晒乾炒一錢　羌活一錢　一劑。水二盞煎八分服。

虛痛

血虛痛。芎歸湯。或四物加細辛羌活。柴胡蔓荊子。

氣虛痛。四君子湯。氣血兩虛。調中益氣湯。加川芎蔓荊子細辛。巔頂痛。必用藁本柴胡防風。

芎歸湯　治血虛頭痛。一名芎第湯

川芎酒炒三錢　當歸酒浸三錢　水二盞煎八分。食遠熱服。

四物湯　方見血症條下

四君子湯　方見脾胃條下

調中益氣湯　方見內傷條下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

風溼寒熱痛

風熱與溼上壅清空者。風熱盛者。徹清膏。瘦人頭痛是火。酒芩爲主。加引上藥。風熱上攻頭痛者。防風通聖散。或芎芷散。大寒犯腦。令人頭痛。齒亦痛。羌活黑附湯。風熱寒溼。清芩天麻川芎防風薄荷。或茶調散。

清空膏　治偏正頭疼。及風溼熱上壅作痛。

細梃子黃芩（三兩　一半酒蒸一半炒）　羌活（一兩　去芦）　甘草（炙一兩　生一半炒）　防風（去芦一兩）　川芎（一兩半）　薄荷（三分）　細辛（一錢）　蔓荊子（一錢　生用五分　炒用五分）　藁本（一錢）　末之。茶調下三錢。

防風通聖散　方見中風條下。

芎芷散　治風邪入于面腦作疼痛。

白芷（一錢）　石菖蒲（一錢）　陳皮（八分）　茯苓（米泔浸晒乾炒八分）　細辛（八分）　厚朴（薑炒七分）　半夏（湯泡七分）　紫蘇葉（八分）　甘艸（炙六分）　木通（八分）　肉桂（六分）　川芎（一錢）　薄荷（三分）

右剉一劑。水二鍾。加薑三片。葱白二枚。煎八分。服。

羌活黑附湯　治冬月大寒犯腦。令人頭痛齒亦痛。

麻黃（帶節三分）　蟬蛻（炒三分）　羌活（三分）　藁本（炒三分）　黑附子（泡三分）

羌活 去芦 五分　防風 去芦 五分　白芷 五分　薏苡 炒 五分
升麻 二分　甘草 二分　蔓荊 一錢　水煎。食後溫服。

茶調散　治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞。及偏頭疼。

薄荷葉 二兩　川芎 一兩　羌活 去芦 五錢　甘州 炙 五錢
荊芥穗 一兩　白芷 五錢　細辛 一錢　防風 三錢 去芦

右爲細末。每服二錢。食後。茶湯調下。

痰痛

痰厥頭痛。四陳湯加薏苡。荊子。南星。防風。肥人頭痛是濕痰。半夏。薏苡爲主。加引經鄉導藥。痰厥頭痛。痰壅稠粘。頭旋眼黑。頭若痛如裂者。半夏白

朮。天麻湯。風痰上攻。頭痛。白芷。芎。茶。川芎。防風。南星半夏。陳皮。白朮。神麴。炒。各一錢。麥蘗。一錢。白茯苓。天麻。各五分。人參。去芦 五分。薏苡。各五分。澤瀉。五分 去毛 乾薑。二分 黃蘗。酒炒 二分。劑一劑。水二鍾。煎至八分。空心熱服。

青州白丸子　治風痰壅盛。癱瘓驚風。嘔痰水涎沫。

白附子 二兩半 夏 二兩 南星 二兩 川烏 去皮臍 半兩 俱生用

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Circulate

右搗爲末。以生絹袋盛之。于井花水中擺出藥末。更以手捏令出。以粗查再搗。仍入絹袋擺盡爲度。貯磁器中日曬夜露。每日一換新水。攪而復澄。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水曬乾再研。以糯米粉清。丸如菉豆大。常服二十丸。生薑泡湯送下。

三生散　治風上攻頭腦痰滯不行。以致偏正苦疼。

烏頭炮一錢　白附炮二錢　南星炮一錢　薑三片。水煎服。

着眠痛

肝虛羞明着眠痛者。熟地黃丸。

風熱盛着眠痛。選奇羌防散或參苓芎散。風痰攻上着枝痛者。羌活湯。

寒溼上攻着枝痛者。羊辛散。

痰風熱盛。二烏散。

熟地黃丸　治肝血虛少。着眠夜痛。羞明畏日之症。

生地黃一兩　熟地黃一兩　玄參一兩　金鈒石斛一兩

右末之。蜜丸梧桐子大。每服三錢。空心白湯送下。

選奇羌防散　治風熱上壅。着枝痛不可忍之症。

羌活二錢去芦　防風二錢去芦　甘艸二錢　黃芩酒炒一錢　煎服。

芎芷散　治風熱上盛。着眠痛痒羞。目不能視物者。

黃芩酒炒一兩　白芷一兩

末之。每服二錢。茶清調下。

羌痰湯　方見痰症條

羊辛散　治頭痰。因寒溼上攻。或着枝痛。並治之。

烏頭 生用 一兩　附子 生用 一兩　天南星 一兩　乾薑 一兩
甘蝎 五錢　川芎 一兩　細辛 一兩　每四錢。薑棗煎。

二烏散　治風治熱。二氣攻於太陽等經。頭腦作痛。

川烏 童便浸 炒 五錢　蝎 童便浸 炒 五錢
細辛 五錢　羌活 去苗 五錢　黃芩 酒炒 五錢　甘蝎 炙 三錢

右末之。每服二錢。食後茶清調下。

頭風症二

歌曰頭風素有熱和痰。忽冒風寒腦髓間。何故女人多病此。爲無巾幘禦風寒。

論夫頭風。即首風也。徐思邈云。新沐浴竟。取風爲首風經云。首風之病。頭面多汗。惡寒。當先風一日。則病甚。頭痛不可以出內。至其風日。則病稍愈。又云頭風者。本于風寒入于腦髓也。蓋頭者。爲諸陽之會。其人素有痰火。風寒客之。則熱鬱而腦痛。故婦人多患此者。無巾幘以禦風寒。故也。有偏有正。丹溪云。頭風屬痰者多。有熱有風。有血虛。在左屬風。真血虛。在右屬痰。真熱。善治者。究此病情。全在活法。出入加減。無不奏效也

風與血虛

頭風在左。屬風與血虛。風者。荊芥薄荷之類。風熱

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

者。消風散。茶調散。虛者。芎歸湯。或四物湯。加荊芥防風白芷酒芩薄荷蔓荊子之類。已上諸方俱見頭痛症下。

痰

頭風在右者屬痰。蒼朮半夏之芩三錢。蒼朮四錢。川芎細辛各一錢。末。薑痰頭風。用酒炒蒼朮。川芎細辛。或二陳湯。加酒芩蒼朮。已上一方。俱見痰症之藁。

頭風屬火者。酒芩羌活。或二陳湯。加酒芩薄荷。川芎等。細末。或防風通聖散。已見頭痛症下。

消風百解散　治半邊頭風不痛。日久。難上藥之症。

荊芥一錢　白芷一錢　陳皮一錢　麻黃一錢

蒼朮一錢米泔水浸冬七日。春秋五日。晒乾炒　甘卅八分

右剉一劑。水二盞。煎八分。食遠。

附方　治偏頭疼至妙之藥。

羌活去节一錢　獨活去节一錢　川芎二錢　白芷一錢

細辛一錢　藁本去苗一錢　防風一錢去芦　黃芩酒炒一錢

右剉一劑。水二盞。煎八分。食後熱服。

又方　治半邊頭痛極效。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

香白芷一錢　天南星一錢　川烏入分半裹煨

右爲末。每服一錢。水調服。婦人加甘艸一錢

頭眩症三

歌曰。痰火令人頭轉旋。氣虛血失每頭眩。風寒暑濕乘虛致。識得其機可坐痊。

論曰。眩者。目花黑暗旋倒也。其狀頭眩目閉。身轉耳聾如立舟車之上。起則欲倒。虛極。乘寒得之。故風則有汗。寒則拘痛。暑則燠悶。濕則重滯。此四氣乘虛而眩暈也。或七情鬱而生痰動。火隨氣上厥。此七情致虛而眩暈也。過度。腎虛不能納氣歸元。使氣逆奔而上。氣虛而眩暈也。吐崩漏或產後失血。脾虛不能收攝營氣。使諸血失道妄行。此血虛眩暈也。丹溪云。頭眩多挾痰。氣虛併火及挾痰火。痰蓋無痰不能作眩。痰因火動也。凡此之症。要參以脈症治之。隨機應變。不可以一途而取。執也。謹按經曰。諸風掉眩。皆屬肝木。肝木爲風所撼。必鼓動其肺。肺金不能制。不風搖痰而上升。故目無定視。上下反覆。甚則嘔吐。飲食罕御。才治平其風。降其痰。而已。婦人患崩淋。頭眩。以血虛治。爲少血不能養肝。肝木相虛。不能不動搖。故眩。治崩淋。則

East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

眩自生所以培其根也

脈　暴寒暑產氣蓄生涎下虛上實皆頭眩暈風浮寒緊澁細著虛痰即滑弦緊芤而澀數大火邪虛大久極先埋氣痰火鬱症脈

外感眩暈

風熱虛眩川芎茶調散方見頭風寒土厥眩暈芎芷除眩散暑火眩暈二陳湯方見加入參白朮山痰症

梔黃連川芎傷燥腎者湯方見腰痛

芎芷除眩散　治寒土厥眩暈

附子生半夏白朮生南星南川芎半兩桂二錢半

右剉每服二錢薑三片水二盞煎一盞食遠熱服

川芎錢半　每服二錢薑三片水二盞煎一盞服

虛眩

氣虛眩暈因相火盛治痰爲先半夏白朮天麻湯方見頭眩症或用香橘飲氣虛眩暈四君子湯方見脾胃加天麻防風血虛眩暈芎歸湯方見頭痛加生薑產後血虛眩暈溝蕙散方見女科

香橘飲　治氣虛眩暈　如治血虛者加芎歸肉桂

木香七分　白朮一錢炒　半夏麴一錢　橘皮一錢

茯苓一錢　砂仁七分　丁香十四粒　甘草炙八分

右剉一貼生薑三片水二盞煎一盞食遠熱服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT Copy

痰火眩暈

痰挾眩暈二陳湯加酒芩白朮南星天麻蒼朮。方見痰症或青州白丸子。方見頭痛或白朮半夏天麻湯。方見火動其痰者二陳湯加黃芪黃連蒼朮羌活。方見痰症火盛者酒炒大黃末茶調下

方用大黃酒浸九蒸九晒爲末水丸如綠豆大每服百丸食後臨臥清茶送下神效

方用半夏白茯苓川芎甘草羌活白芷枳實南星防風細辛酒黃芩氣虛加參朮血虛加芎歸熟加黃連各等分薑三片水煎服以此作丸每日下一

心痛症四

心痛當分久與新暴痛氣必須溫若還稍久多成鬱積因而作執蒸大實痛難以按捺之痛定作虛論乾薑痛止偏能食脈證須知死血因真痛在心無藥療厥疼胃脘正當心

論大心痛者有真有厥真者。邪干心君主神居主胃至節部死無藥可療厥者邪客于心無所居胃脘之間當心之分非真心受之症故曰心也又有氣厥熱厥之分大實大虛之辨古人又有虛法實之表曰食

曰風。曰冷。曰熱。曰食。曰氣。曰痰。曰血。曰寒。痛者此者。皆可究其因而施治。也其如陳生之云。有五藏及諸經諸府心痛雖言之詳而無治劑。厥後舉有惑于心故不具載蓋亦不過寒熱虛實之候也。丹溪云。心腹痛須分久新。若明知身受寒氣。口食生物於初病之時。當以温散温利之劑。若得稍久而成鬱。邪則蒸熱糞久必生火。若欲行温劑。寧無助火添病。故古方多以山梔爲熱鬱導則邪易伏。病易退。又嘗亦言食熱物以致死血留于胃脘。或因痰飲不入。是皆影響而言。胃作痛者如此。

心痛。或因寒邪客于胃脘。或因食積痰飲。或因死血。或因蟲攻。或因氣鬱。或因虛火。或因胃虛。種種不一。治法也。

○觸按其人。患真心痛。若極少。真心痛者。平素原有痰涎。突然大痛。如刺入手。無暫止。出不休。若無痰無食。手足厥冷。此疾一作。死在旦夕。鍼灸之所不施。藥力之所未及。患之者十無一生。蓋寒邪直中心經。君火不能抗敵故也。今之患心胞絡痛耳。若痛極如錐刺時。口噤不言。面白少光彩者。爲蟲蟲頭上攻痛時。如有物咬。痛甚不得下。爲胃脘停食痛時。嘈雜不喜飲食。痰飲吐。吐即稍寬。爲痰飲痛。痛甚痛引肩背。痛引脇下。爲死血痛。痛甚痛引腰膂。爲氣痛。痛甚痛引小腹。爲虛火痛。痛甚痛引胸膈。爲胃虛痛。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

噯噫覺見爲氣憂慮痛悲痛哀痛悉屬實痛卽緊爲寒客心胞絡痛時自止而止有時間有時有聲按抵無措眠坐不寧心下如刺甚則痛連胸痛乃積血不消爲火所載不可誤以爲虛而補之也

〔脈〕心痛微急痛甚伏入陽微陰弦而短之爲緊實痛

緊滑實痰積心痛引背脇微而大手流而遲遲爲緊

數劍

虛痛

虛弱人心痛錢氏云心虛痛者炒鹽補之以物

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

注曰痛虛者按虛也一脈湯加胞薑末和之左

若久病元氣虛弱肢體惰慢脈虛手飲食少者六

君子湯加砂仁香附方見胃

實痛

因氣怒而飲食卒痛便閉心胸高起手不可按者

大實痛也者發黃丸後以藁本湯去其餘邪胃脘塞

熱痛小胃丹方見痰症

者發黃丸治大實心痛雄黃一兩研巴豆五錢去皮細研入白麪二兩研勻水先搗子大每用水下數丸如得利不可再服宜服藁本湯以去餘邪

藁本湯治心痛藁本一兩米泔浸炒作一貼煎服

噯噫覺爲喜憂驚恐悲思皆能動氣氣動則痛然
爲寒客心胞絡痛將自止而一切實痛胸有聲痞
脹無措眠坐不寧心下如刺甚腹痛乃積血不
消爲火所載不可認以爲虛而遽以參朮也
脈心痛微急痛甚伏入陽微陰弦而短又急緊實便
艱痛實蔽着心痛引背脈微而大寸沉而遲遲緊
數銳

虛痛

虛弱人心痛錢氏云心虛痛者炒鹽補之以物
按痛而虛者按虛也一陳湯加炮薑未詳之。左

若久病元氣虛弱肢體拘攣脈虛手欲按者大虛
子湯加砂仁香附方見胃

實痛

因氣怒而飲食卒痛便閉心胸高起手不可按者。
大實痛也。者蠶黃丸。後以藁本湯去其餘邪。胃脘痞
塞痛。小胃丹。方見痰症

者蠶黃丸 治大實心痛 雄黃研 一兩 巴豆 五錢去皮細研入白麪二兩
研勻。水丸梧子大。每用水下數丸。如得利不可再
服。宜服藁本湯以去餘邪。

藁本湯 治心痛藁本 半兩 蒼朮 一兩米泔浸炒 一兩 一貼煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY
Online

熱厥心痛

熱厥心痛者。其人必縱酒嗜熱在胃。偶遇寒鬱而發。故身熱足冷。痛甚則煩躁而吐。額上有汗。脉洪大。當久太谿崑崙表裏俱瀉之。內服金鈴子散。痛止服枳朮丸以去餘邪。若胃脘痛以鹽湯探吐。得吐就發散。心脾痛日久。與悲哀憂思為熱。二陳湯加山梔炒黑。少香附。痛甚者。加炮薑反佐之。方見痰症或以山梔一味。入童尿煎服。大便不通。大黃氣大陷胸之類下之。方俱見傷食

金鈴子散　玄胡索一兩　末三錢溫酒

寒厥心痛

寒厥心痛者。手足厥逆。痛引身冷汗。甚則手足甲青黑。小便清白不渴。氣微力虛。脉沉細微。朮附湯。大寒厥暴痛。非久痛者。若久則非寒也。丹溪云。明知身受寒氣。口食寒物。初病當以溫散溫利之藥。艸豆蔻丸。大便閉結不通者。元戎厚朴丸

朮附湯　治寒厥心痛　白朮二錢炒　甘艸一錢炙　黑附子炮一錢半

右三味。劉作一貼。薑三片。棗二枚。二鍾煎溫服。

草豆蔻丸　寒厥心痛　草豆蔻一錢五分　去芦白麪裹煨　益智仁八分　陳皮八分　人參去芦八分　黃芪蜜炙八分　吳茱萸洗去苦八分

East Asian Library and the Gest Collection
Do Not Copy
Princeton University Library

殭蠶人分　當歸洗六分　青皮炒六分　神麯炒四分
薑黃四分　柴胡四分　半夏一錢薑製　澤瀉去毛一錢
桃仁七個泡去皮尖　麥芽炒一錢　甘艸生三分炙三分

右爲細末。湯浸蒸餅。丸如梧桐子大。每三十丸。

元戎厚朴丸　厚朴三兩薑炒　黃連二兩半炒　吳茱萸湯泡七次二兩
乾薑炮二兩　巴豆一兩另研　人參一兩去芦　川烏炮一兩

末之。入豆霜勻。蜜和丸桐子大。每三丸。以利爲度。

痰積食積心痛

痰飲積滯于胃脘。當心而痛。牆上陳螺螄殼煅存性。炒砻荒海石山梔香附各二兩。枳殼青皮

木香小茴砂仁各一兩和丸。方見傷食　丸薑湯送下。食積痛條

瘀血痛

平昔喜食熟物。致死血留于胃口作痛者。脈沉而扎澁。在上者。四物湯加桃仁紅花丹皮枳殼玄胡索。方見血症　輕者。韭汁桔梗開之。重者桃仁承氣湯下之。方見血症

蟲痛疰痛

蛔蟲攻入心脇作痛者。痛定便能食。面上有白斑唇紅。治以苦練錫灰。或烏梅丸。或集効丸。蛔蟲攻

East Asian Library DO NOT COPY and the Gest Collection Princeton University Library

嘔心痛。惡心而吐。川椒湯下烏梅丸。疰心痛者。十
年病皆心痛。化蟲丸。辣蓼草煎湯飲之。

烏梅丸　治蚘蟲上攻痛　烏梅七十箇　細辛一兩　附子炮一兩　五錢　人參一兩　五錢　黃柏一兩　五錢　桂枝一兩　五錢　乾薑二兩　五錢　黃連四兩　川椒五錢　當歸五錢

末之以苦酒漬烏梅一宿。去核蒸爛。搗成膏。少加蜜和。丸如梧桐子大。每十丸加至二十丸。食前服。

棗劾丸　治蚘厥心痛　木香二錢　五分　鶴虱炒二錢半　檳榔二錢　五分　訶子二錢　五分　蕪荑炒二錢　附子炮二錢　乾薑炮二錢　五分

黃一兩半　烏梅肉一兩

右為細末。糊丸梧子大。每服五十丸。溫漿水入芝蘇油一二點。打勻下之。米飲亦可。不拘時候。其蟲小者化為水。大者自下。

腹痛症五

歌寒痛綿綿無減增。時疼時止熱為根。血瘀痛處無移動。食積便通便見輕。實者不能將手近。痛時能

湯送下。

化蟲丸　服之蟲化為水　胡粉炒五錢　鶴虱三錢　白鑞五錢

檳榔五錢　苦練根五錢

右為細末。糊丸梧子大。每服五十丸。溫漿水入芝蘇油一二點。打勻下之。米飲亦可。不拘時候。其蟲小者化為水。大者自下。

腹痛症五

歌寒痛綿綿無減增。時疼時止熱為根。血瘀痛處無移動。食積便通便見輕。實者不能將手近。痛時能

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

按作虛論。痰痛者瀉便秘。體證兵形見病情。論夫寒痛者。常痛而無增減也。成無己云。陰寒爲邪。則腹痛而叶利。熱痛者。時作時止。原病式云。熱鬱于內。而腹滿堅結痛。勿以爲寒。外血痛者。每痛不移其處。成無己云。邪氣聚于下焦。津液不得通氣血不得行。或瘀或血。留滯于下。是生脹鞕。小便不利也。食積痛者。利後即痛減。溼痰痛者。凡痛大小便俱不利。丹溪云。清痰多作腹痛。脈滑。痰因氣滯而聚凝。其道路不得通。故也。腸癰痛者。身甲錯。小便如淋。腹皮急。按之濡。如腫狀。脈乳數也。積聚痛者。腹中原有積。左右上下當積而痛也。寒而入腹痛者。少腹痛引睾丸。陰毒痛者。四肢厥逆。痛甚咽喉不利。或心下脹滿。結燥。虛汗狂言。面色俱青。陰積于下。陽消于上。實痛者。腹堅不可按。虛痛者。雖痛不脹滿。手可按。若此胷壞不治。可一藥而盡之乎。

○謹按腹痛。爲病所家受病。蓋脾或受有形而痛者。或受無形而痛者。若暴傷飲食。則胃脘先痛而後入腹。暴觸怒氣。則兩脇先痛而後入腹。血積上焦。脾火薰蒸。則痛從腹而上于胸隱。血積下部。胃氣下

行則痛從腹而入于少腹傷于寒者寒於痛得熱則緩傷于氣者氣即痛得食即止吞酸腹痛爲痰鬱中焦復傷飲食下黃腹痛爲宿食不消蛔蟲攻咬氣虛腹痛脫血虛鬆呼吸短淺血虛腹痛者痛如芒刺牽引不寧喜者當審其因以處治大要以甘溫爲上惟傷酒作痛者方可涼劑而必佐之以甘溫也

脈沉弦細動皆是痛症心痛在寸臍痛在關下部在尺脈象顯然

熱痛

胸中有熱胃中有邪腹痛欲嘔黃連湯腹痛脈滿熱也黃芩芍藥湯寒邪變熱裏腹痛便秘而厥四逆散腹滿時痛桂枝加大黃湯腹痛便秘脈實大者大承氣湯方見傷食

黃連湯治熱邪腹痛　黃連三錢炒　甘草三錢炙　乾薑三錢　桂枝三錢　人參二錢　半夏半兩薑製　每七錢棗煎服

黃芩芍藥湯　黃芩炒二錢　芍藥炒一錢半　甘草一錢　煎服

四逆散陽邪傳裏腹痛　甘草炙一兩　枳殼炒一兩　芍藥炒一兩　柴胡一兩　未之每服二錢白湯調下

桂枝加大黃湯治太陰脈滿時痛　桂枝一錢　芍藥炒一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

甘草一錢　大棗二枚　薑三片煎入餳一合微炒服

寒痛

傷寒下利腹痛四逆湯方見中寒　嘔痛厥冷欲死者霹靂散腹痛下利四肢沉重眞武湯或理中湯方見中寒　霹靂散治中寒腹痛　附子一枚炮入眞臘茶一大盞同研勻更分二劑水二鍾煎八分入熟白蜜一匙涼服

眞武湯治少陰腹痛　茯苓一錢　芍藥炒一錢　生薑七片　附子炮一錢　水二大盞煎至一盞冷服

痰痛食積痛

壽於多作腹痛治法參看木香白豆蔻附未之薑湯調服肥人腹痛乃氣虛痰溼痰也二朮半夏陳皮芍藥之類飲食過傷腹痛保和丸木香檳榔丸方俱見傷食虛人飲食傷腹脾痛若子湯加麴糵方俱脾胃

虛痛

素弱人全不思食腹冷痛養胃湯加肉桂茱萸木香或小建中湯方俱寒腹痛或理中湯方俱寒腹痛欲以手按按之痛止者屬虛寒甚者宜大建中之類血虛腹痛須用白芍藥之醫補以和之或四物湯加焦炒乾薑炒芍藥各用方見血症

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

凡痛脹滿者不可補當用大黃氣湯。方見傷食初得腹痛元氣未虛宜此急之此通因通用。痛隨利減也。柱枝加大黃湯。方見寒門或未全檳榔丸。方見傷食

血痛

因跌撲瘀血腹痛桃仁承氣湯加蘇木紅花一方見婦人經閉血積蓄腹中痛玉燐散。即大承氣湯對四物湯。二方。見婦女科或失笑散方見婦人惡露條下或通經散。

通經散　活血定痛　陳皮一兩　甘遂一兩　當歸尾一兩　川芎一兩　紅花一兩　桃仁一百个　酒洗去皮尖

右剉每服七錢水二鍾酒一鍾煎至八分空

腹中上下左右有積聚當積而痛三聖膏或檳榔丸保和丸。二方俱見傷食香脾積丸。食積痞塊作痛。阿魏丸。

三聖膏　未化石灰半斤爲細末。再器中炒令淡紅色。提出火候。熟稍減。次下大黃末一兩復炒。又提出候溫。下桂心末半兩。略炒。入醋熬。攪成黑膏。厚紙攤作餅。隨患處貼之。漸消矣。

香脾積丸　丁香半兩　木香半兩　巴豆去心膜一分　海半兩　良薑　蓽茇　青皮　陳皮　三棱去皮　莪朮各二兩　麝香少許　硃砂三錢　爲末醋糊丸如梧子大每服三十丸食後生薑湯下

Do not copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

青皮一兩　吳茱萸二錢　巴豆七粒　大麻子大。每服十丸。空心時。白滾湯下。

阿魏丸　治肉積遠近腹痛　山查一兩　阿魏一兩

黃連六錢　末之　用阿魏醋黃化溺丸如梧桐子大。每服五六十丸。清晨白滾湯送下。

腸癰痛

腸癰痛者。腹大痛。身甲錯。小便如淋。脈芤或攢臍有癥。積冷。以附子溫之。積熱。以大黃下之。膿大出。以參芪補之。

陰毒痛

陰毒厥逆。腹痛。陰寒欲絕。脈沉。爪甲手指唇面俱黑者。回陽丹。或真武湯。方見前寒腹痛　急灸關元氣海。各五七十壯。

回陽丹　陰毒厥冷腹痛　牡礪燒一兩　良薑炒一錢　不灰木燒一錢　川烏泡一錢　白芍藥一錢　麝香少許　末之。每用一錢　男用女津調塗外腎。女用男津調塗兩乳。

疝症痛　附疝痛

忽然腹中大痛。嘔吐脈沉。疝症也。正氣散加香附　砂仁。方見霍亂　手足厥冷。舉體轉筋。理中湯。方見中寒　少腹引睾丸痛。疝氣入腎中痛。脈沉弦。補腎湯。餘詳疝

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

症本條

補腎湯　治痛氣入腹痛　人參一錢去蘆　白蕊苓一錢　薏苡一錢　蜜炙　附子炮一錢半　白朮炒一錢　沉香一錢　木瓜一錢二分　羌活去芦八分　川芎七分　紫蘇八分　甘草炙六分

右剉一劑。薑三片。棗二枚。水二盞。煎八分。空心服。

脇痛症六

歌　脇肋疼時統屬肝。或虛或實或因痰。脉沉氣鬱須開導。若濕痰原來死。血下食積一條常梗起。肝虛痛在脇梢間。若然痛甚肝經火。乾脇之疼最難論。足厥陰之絡。令人脇痛。皆肝膽經之所主也。并走

去水氣實肝火盛。死血痰飲。氣滯食積濕熱。皆令人脇痛。亦有肝虛血少而痛者。有因酒色勞損太過。脇下一點痛不止。名乾脇痛。急當大補氣血。尚難爲也。若此虛實之不同。必以脉症參之。斯得其受感之情。而用藥無差忒也。

○謹按左脇痛者。肝經受邪也。右脇痛者。肝邪入肺也。左右脇俱痛者。肝火盛。而木氣實也。兩脇走注痛而有聲者。痰也。左脇下有塊作痛。飲食不消。不移者。死血也。右脇下有塊作痛。飲食不積。亦成肺癰。勞傷身熱。發熱者。瘀熱痛也。或一症不到。成肺癰。勞傷身熱。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

脇痛者脉必盛也

脉兩脇疼痛脉必雙弦緊細弦者多怒氣偏沉澁而急痰瘀之病

肝火盛

脇痛甚者肝火太旺也當歸龍會丸輕者小柴胡湯加黃連龍膽柳白芍藥酯炒青皮方見瘧疾火盛者宜伐火左金丸

當歸龍會丸　膽炳一兩去芦　當歸一兩酒洗　山梔子仁一兩炒黑　黃連一兩炒　黃芩一兩炒　黃檗一兩炒　大黃半兩　蘆薈半兩　木香一錢　麝香半錢　爲丸。炎喜湯下。

左金丸　治肝火太盛　黃連一兩　吳茱萸一兩湯泡　爲丸。白湯下。

木氣實

脇痛脉弦數。木氣實也。醋炒青皮。蒼朮川芎當歸芍藥柴胡。或小柴胡湯。加醋炒青皮川芎柳膽炳。方見瘧疾或抑青丸

抑青丸　治肝火伐肝木　黃連一斤拘多少醋汁炒　爲丸。每百丸。白湯下。

死血痛

脇痛日輕夜重或午後發熱脉芤而澁。瘀血也。四物湯。加柴胡青皮桃仁紅花。行氣藥中加破血藥。

食積痛

脇下一條扛起作痛者。食積也。保和丸。方見傷食或吳茱萸炒黃連。神麯麥芽山查蓬朮青皮。或當歸龍薈丸。方見前肝火盛條下

濕熱

濕熱盛而兩脇痛者。先以琥珀膏貼痛處。後以淡薑湯吞當歸龍薈丸。方見前肝火脇痛條下或小柴胡湯。加蒼朮青皮黃連。方見痰痛

痰積

痰積脇下作痛控涎丹。或十棗湯。或二陳湯。加南星蒼朮川芎柴胡白芥子。炒山梔仁。酯炒青皮。方見

控涎丹治兩脇痰痛　乾遂麵裹煨熟　大戟劉八次　白芥子炒各等分

右末。丸如梧子大。每五七丸。薑湯下。漸加至十丸。

十棗湯治痰積脇痛　甘遂麵裹煨熟一錢　大戟製一錢　芫花一錢　棗子十枚。水二盞煎八分服

氣滯

氣滯脇下作痛。推氣散。或復元通氣散。控涎丹。方見前痰積脇痛條下

治一身氣痛。氣鬱者。詳鬱症條內。

推氣散治右脇　枳殼炒五錢　桂心五錢　片子薑黃五錢　甘州五錢　末之。每服二錢。薑棗湯調下。

復元通氣散　木香半兩　茴香半兩　青皮半兩
穿山甲炮七片　陳皮半兩　白芷半兩
甘艸半兩
每服五錢。水二鍾。煎八分。空心服。或作末。每服二錢。空心酒調下。

虛痛

肝血不足。悠悠痛不止者。四物湯加柴胡梢。方見血症

若脇下一點痛不止。此因酒色太過所致。名乾脇痛。難治。肥白人脇痛。參芪入小柴胡湯服。方見虛症

枳芎散　附方治左脇痛　枳實炒五錢　川芎五錢　粉甘草一錢半
右爲細末。每服二錢。薑棗湯。或酒調下。

木香調氣散　治氣虛脇痛
肝兩脇大痛難忍

丁香二兩　檀香二兩　木香二兩　白豆蔻仁二兩
藿香葉一兩　甘艸一兩　砂仁二兩
右末之。每服二錢。入鹽少許。沸湯點服。

腰痛症七

歌　腰痛多緣腎氣虛。衝風濕熱總因之。天陰痛作知歸溼。寒溼疼時見熱除。閃挫板疼難俛仰。甘輕夜重血多瘀。或因腎着并勞役。水積仍兼氣不舒。

論　夫腰者。腎之府。身之大關節也。血氣不行。風寒暑溼之氣相干。則沉痛不能轉側。然老人腎虛多腰

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痛。亦有寒溼者。挫閃者。氣滯者。瘀血者。腎着者。衝風姦熟者。水積者。勞傷者。之不同也。

脈 腰痛之脈。必沉而弦。沉微氣滯。弦損腎元。或浮而緊。風寒所纏。溼傷濡細。實挫閃然。澀必瘀血。滑痰火煎。或引背痛。沉滑易痊。

腎虛腰痛

腰痛悠悠不已。腎虛也。青娥丸。或摩腰膏。獨活寄生湯。丹溪補陰丸。安腎丸。立安丸。選而用之。

青娥丸 治腎虛腰痛 杜仲薑炒 破故紙炒 半斤 胡桃肉二十本去皮 大蒜四兩搗爲膏。和丸如梧桐子大。每三十丸。空心溫酒送下。或用酒糊爲丸。摩腰膏 治腰痛虛寒症 附尖一錢 烏頭一錢 五分 天南星二錢 五分 硃砂一錢 乾薑一錢 雄黃一錢 五分 樟腦一錢 五分 丁香一錢 五分 麝香半分 末之。薑汁調烘熱。摩腰上。

獨活寄生湯 獨活一錢 桑寄生一錢 杜仲鹽水炒去絲一錢半 細辛一錢 牛膝去苗一錢 秦艽去苗一錢 白茯苓去皮八分 桂心六分 川芎八分 防風去苗八分 白芍藥酒炒八分 甘草炙七分 人參一錢二分 當歸酒洗一錢半 熟地黃酒洗二錢 右剉一劑。水二鍾。煎至八分。空心熱服

丹溪補陰丸 黃蘗酒炒四兩 龜板酥炙四兩 知母酒炒四兩

熟地黃酒浸六兩　茱萸二兩　蜜丸梧子大空心淡鹽湯下

安腎丸治腎虛腰痛　茴香三兩炒　川練炒三兩　破故子炒三兩

續斷三兩　胡蘆巴三兩　杏仁炒二兩

乾山藥二兩　白茯苓二兩　茱萸之蜜丸桐子大鹽湯下

立安丸補腎止腰疼　牛膝去芦四兩　杜仲鹽炒四兩　破故子炒四兩

蘇葉二兩酒炒　大茴香炒二兩　茱萸之蜜丸淡鹽湯送下

腎着腰痛

着者腰冷重痛如帶五千錢者其飲食如故是且流溼熱則自已腎着湯不已服牛膝酒最妙

着湯　白茯苓四兩　白朮一兩　乾薑二兩　甘草炙二兩　每劑四錢水二盞空心煎服

牛膝酒治腎着腰痛　地骨皮一兩　五加皮一兩　薏苡仁一兩

川芎一兩　甘卅一兩　生地黃一兩　海桐皮一兩

川牛膝一兩　羌活一兩　劉寄奴一大劑浸酒日飲三次

寒溼腰痛

寒溼腰痛者遇陰寒即作或久雨陰溼所得晴煖即減五積散加吳茱萸杜仲方見中寒

溼熱腰痛

溼熱腰痛板疼不能俯仰小便赤大便泄或走注痛二妙丸或健步丸

二妙丸 治濕熱腰痛 川黃檗酒炒 四兩 蒼朮米泔浸炒 四兩

末之酒調下。或爲丸。白湯送下二三錢。

健步丸 治濕熱腰痛 羌活半兩去蘆 柴胡半兩 滑石炒半兩 甘草炙半兩 瓜蔞根半兩 防風去蘆三錢 澤瀉三錢去毛 防己酒洗一兩 川烏三錢酒洗去皮臍 苦參酒洗五錢 肉桂一錢

末之酒糊丸如桐子大。每七十丸。煎愈風湯吞下。

閃挫腰痛

閃挫腰痛者。按痰。復元通氣散。方見脇痛 或五積散。加幸牛頭末。桃仁。方見中寒 或濟生蠲痛丸。

濟生蠲痛丸 蒼朮米泔浸炒 四兩 川烏炮去皮臍 沒藥二錢五分 乳香二錢五分

末之酒糊丸如梧子大。每七十丸。空心淡鹽湯下。

勞役腰痛

腰痛因勞役而得者。獨活寄生湯。方見前 瘀血腰痛。

四物湯。加桃仁紅花薰木。方見血

風熱腰痛

因風腰痛。小續命湯。方見中風 或獨活寄生湯。方見前 風

溼腰痛。牛膝酒。方見

氣滯腰痛

氣滯腰痛。木香調氣散。見瘧痢 因憂思怒思。氣不

East Asian Library, Princeton University DO NOT COPY Digitized by Google

舒而痛。枳殼湯。或小七香丸。

枳殼湯順氣無鬱止痛枳殼五箇麩炒甘草二兩生用末之。葱白湯下。

小七香丸氣滯腰痛丁香一兩二錢香附炒一兩甘卅一兩末之。蓬莪朮二錢砂仁二錢炒甘松八錢益智仁六錢末之。蒸餅糊丸。如菉豆大。每二三十丸。米飲下。

疝症八

歌寒水癇血氣孤筋。先哲垂箴論七疝名。蓋是肝經原有熱。外邊郤感寒侵。或因死血并痰飲。鬱在囊中氣不行。控引睾丸生腫痛。或如瓜瓠或蛙聲。要將標本分寒熱。感受仍評重與輕。勿指膀胱心腎

論古有七疝之名。不按七疝而治。藥用局方辛熱辦一劑。是泥標而忘本也。或指為小腸氣。腎與膀胱氣。皆非也。殊不知厥陰之脈循陰器。然其地位。皆肝經所主。與小腸膀胱腎。了無相干。至戴人始辨之詳也。丹溪云。疝痛甚者。睾丸連少腹急痛也。或有形。或無形。或有聲。或無聲。自素問以下。皆以為寒。蓋經絡得寒。則收引不行。所以作痛。世有得寒而無疝者。內無熱也。亦有湯水徒涉。不曾病此。以手素無熱故也。若醉飽勞役。房室大怒。發動五志之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

火鬱久淫氣便盛濁液凝聚并入血隧流于厥陰肝經木性急速火性又暴爲寒所束宜其痛甚而暴也此淫熱被寒鬱而痛明矣若只作寒治恐爲未備又云痰飲食積死血鬱結爲病及因水氣爲腫腫多爲溼痺亦有挾虛者其脉沉緊而豁大當以參朮爲君佐以疏導若槩行決裂之法禍不旋踵此皆前人所未及學者引而伸之今將七疝之形狀開具于後

脉疝脉弦急積聚在裏牢急者生弱急者死沉遲浮滑疼痠寒痛偏墜甚則伏或細或動

寒疝

經云足厥陰肝經循中寒則筋攣卵縮此寒鬱于外也原病式云癇疝少腹連卵腫急絞痛實主拘縮寒極則木化制之或腫滿則知其症爲寒者是外受寒邪也而內實非寒也參所用標寒本熱明矣寒疝手足逆冷不仁疝腰痛及陰痛烏頭桂枝湯寒疝入腹痛少腹引睾丸痛泄利胸滿補腎湯或腎虛寒疝偏大者茱萸內消丸

烏頭桂枝湯　烏頭五分　白蜜一斤煎減半二十沸

每用桂枝湯五錢入蜜半兩水煎二合得吐

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT Copy

爲中病。佳。按湯方見惡寒症

補腎湯　治寒痢人參一兩　白茯苓一兩　薑炙一兩　白朮炒一兩　沉香三錢　赤石脂一兩　附子炮一兩　白朮炒一兩　木瓜一兩　五錢　羌活去蘆一兩　甘草炙二錢　川芎二錢　紫蘇三錢

右剉。每服五錢。薑三片。棗二枚。水二盞。煎八分。服。

葉黃肉消丸　山茱萸六兩　吳茱萸四兩　焉藭花四兩　木香四兩　陳皮四兩　肉桂四兩　乾山藥六兩　川練子四兩　青皮炒四兩　茴香四兩炒　酒丸。溫酒送下。

木腎

心火下降。則腎水不温。眞氣下行。則腎氣不應其不和。温而安者。所謂木強者。或蓋衰腎不可絕用燥藥。當行温和散利以逐其邪。則邪自消。榮衛流轉。則愈。枸杞子丸。方用楮樹葉雄者。曝乾爲細末。酒糊丸如梧桐子大。每服五十丸。空心鹽酒吞下。楮樹不結子者雄也

枸杞子丸　枸杞子四兩　南星二兩　半夏二兩　黃蘗酒炒三兩　蒼朮鹽炒三兩　山查二兩　去核　白芷二兩　神麯炒二兩　滑石炒三兩　昆布四兩　吳茱萸四兩　末之酒糊丸如梧桐子大。每七十丸。空心鹽湯下。

食積塞於兩

食積與痰氣成癇痛。龍子桃仁。山查枳實茶黃薑汁。順流水煎。或加香附。苗香。療飲流下。壅滯囊中作痛。蒼朮山楂海石南星山查。蓋俱核青皮薑煎服。溼盛小便澀。五苓散加楝實。方下。

溼痰熱痛。橘核

散

橘核散 溼熱寒作痛 橘核二兩 桃仁五十箇 龍子三錢 吳茱萸一兩 茴香一兩 每服七分。水二盞煎熟服

溼熱痛

素有溼熱人。或涉水受寒。坐臥溼地。外受寒氣所來。其痛甘苦而重者。古方以烏頭梅龍子等分。作湯。

痰溼熱痛小便不通者。葵子湯。消痛散。選用

濟生葵子湯 赤茯苓一兩 猪苓一兩 葵子一兩 枳實炒五錢 瞿麥五錢 木通五錢 黃芩五錢 車前子一兩 滑石一兩研 甘草五錢 薑五錢 薑煎服

消痛散 治溼熱蓄血痛 蓄血炒半兩 木通半兩 青葉半兩炒 青皮炒半兩 厚朴炒三錢 末之。每二錢。陳皮泡湯下

虛痛

青痛挾虛者。其脉沉弦滑大。參朮為君。佐以疎導。

如枳實青皮山查川楝子橘核。地之不定屬虛。桂枝炒山楂烏頭煮之。薤九服。或加橘核散加蓄朮。方見

Princeton University Library
East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY

前虛而挾熱痼梔子飲

梔子飲虛而挾熱痼 山梔炒半兩 黃芩炒半兩 枳殼炒半兩 山查半兩 薑汁同順流水煎服。一方加吳茱黃。

七痼之形狀

寒痼者囊冷結硬如石陰埜不舉。或控睾丸痛。得于坐臥溼地涉水以溼劑下之。○水痼者囊腫如水晶陰平癢搔出黃水。或小腹按之作水聲。得于醉酒行房。汗出遇風寒溼結于囊中以逐水之劑下之。○筋痼者陰埜腫脹。或潰或膿或痛。而裏急筋縮。或莖中痛痛極則癢。或挺然不收。白物如精液出得于房中邪痛所使而戕宜降心火之劑下之。○血痼者其狀如黃瓜。在小腹兩衝橫骨兩端。俗名便癰。得之重感春夏大熱勞于使內其氣流溢滲入脬囊結爲癰腫。以和血藥下之。○氣痼者上連腎區下及陰囊或號哭忿怒氣鬱而脹。以散氣藥下之。○孤痼者狀如黃瓜臥則入腹行則出上下無定。如孤孤之惑也故名之以逐氣流經之劑下之。○癮痼者陰囊腫大如升斗不癢不痛以受溼氣之所生。宜去溼之劑下之

○附治痼諸方

五葉湯

枇杷葉　橄葉　蒼耳葉　野紫蘇葉
水晶葡萄葉　木煎洗

痂氣神方

硫黃火中鎔化即投水中去毒研細荔枝核焦黃等分爲末飯丸每用十四五丸酒下其來立止自覺已來甚不能支持服用六丸再不可多用。

治痂用仙人對坐草青木末搗汁和酒少許服之即效。

脚氣多因清濕致風寒暑濕須分異浮弦之脈挾于風濡從濕今數從暑挾于寒暑脈心遲得病必從足上起頭痛身熱節疼人皆誤作傷寒治但看足膝多不仁或軟或腫或疼痺或便秘體轉筋胸脇痞滿心中悸此病根從濕上來治濕當分南北地

論夫脚氣始受于濕後挾風寒暑熱之邪而成故先起于腫足必脚屈筋而舉體轉筋骨疼而足腫小腹不仁心中悸動胸滿便濇但發熱頭痛身

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疼之候。絕似傷寒人多悞治故仲景以腳氣爲類傷寒症另立篇目以別之并溪云腳氣多從于溼而有溼熱溼寒風溼之殊。食積流注之因。羅謙甫云南北腳氣受病不同南方地土卑溼溼襲虛而病起于下。此南方腳氣從外受也其方施高陵居無溼其俗飲漉乳酒多飲多吠食爲能或奉養太過亦滋其溼。水性潤下。氣不能拘故下注于足而成腫痛此北方腳氣之從內受也學者當推究所因而治之。

○瀧崎前莊乃腎火於股見于皮肉紅腫如雲狀或

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

漫見紅色按之熱且痛者是也紅腫自足起漸行至股其勢必上升治之不治急宜治之勿令上升爲妙

脈脚氣之脈。其狀有四。浮弦爲風濡弱溼氣遲濇因寒洪數熱鬱風寒熱溫如下寒慶。

溼

溼勝者。足重痛或腫腫防己飲或除溼丹。溼勝心下痞滿開結導飲丸 二方俱前溼門

防己飲治溫痺神効 白朮一錢 木通一分 防己八分 檳榔八分 川芎八分 甘艸八分 桂枝七分 羌活一錢

蒼朮炒一錢　黃蘗酒炒一錢　生地黃酒炒一錢　木煎熱服。

挾寒

挾寒溼者六物附子湯。五積散加減方見寒門。德步先生方見腰痛六物附子湯　附子四錢　桂枝四錢　防己四錢　白朮炒三錢　茯苓三錢　甘草炙二錢　每半兩。薑煎服。

挾熱

挾溼熱者。走痛。當歸拈痛湯。溼熱甚大便不通。大黃左經湯。或先治導滯湯

當歸拈痛湯　當歸酒洗一錢　白朮炒一錢　蒼朮米泔浸炒一錢　羌活去蘆一錢　獨活去蘆一錢　防己一錢　甘草炙二錢　茵陳酒炒一錢　升麻一錢　葛根一錢　甘州六分　人參六分　知母炒一分　右剉作一貼。水二鍾。煎八分。食遠。心熱服。

大黃左經湯　細辛八分　茯苓去皮七分　黃芩炒七分　大黃煨二錢　甘草炙六分　前胡七分　枳殼炒七分　厚朴薑炒八分　黃芩炒一錢　杏仁十四粒去皮尖　薑桑水煎服

羌活導滯湯　羌活半兩去蘆　獨活半兩去蘆　防己二錢　當歸二錢　大黃酒蒸一兩　枳實炒二錢　每七錢。水煎服。

挾風

挾風者。麻黃左經湯。風溼痺痛足弱。獨活寄生湯。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

方見腰痛或半夏左經湯

麻黃左經湯　麻黃去節一錢　細辛一錢　乾葛一錢　白朮四分　茯苓八分　防己一錢　肉桂七分　羌活去芦一錢　防風去芦一錢　甘草六分　薑棗水煎服。

半夏左經湯　半夏一錢　乾葛一錢　細辛一錢　白朮炒四分　麥門冬八分　白茯苓八分　桂枝八分　防風去苗八分　乾薑五分　黃芩炒七分　小草六分　柴胡八分　甘草炙六分　薑三片。棗二枚水煎服。

食積

食積流注于下作腳氣。茶朮防己丸。食不消。胸膈

痛者。紫蘇湯送下。

茶朮防己丸　茶朮炒一兩　防己一兩　黃檗酒炒一兩　南星八錢薑製　川芎五錢　白芷一兩　犀角一兩　檳榔八錢　肥人加貝母一兩去心　橘皮一兩去白

末之酒糊丸如梧桐子大。每七十丸。空心白湯下。

開結導飲丸　白朮一兩炒　橘皮一兩　澤瀉一兩去毛　茯苓一兩去皮　神麴炒一兩　麥芽炒一兩　半夏一兩薑製　枳殼炒半兩　巴豆霜半兩　青皮半兩　乾薑半兩

末之蒸餅糊丸如梧子大。每七十丸。空心白湯下。

痛風左十

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO Not Copy

(歌)遍體煩疼曰痛風。濕痰風熱若相攻。或因血弱寒凝泣。流注運身骨節中。

(論)夫痛風者。通身骨節走痛是也。古人謂之白虎歷節風。大率因血受熱。已自沸騰。或涉冷受溼取凉熱血得寒則汚濁凝泣。不得運行。所以作痛。夜痛甚者。行于陰分也。亦有陰溼與痰流注為痛者。有因藥與熱者。素肥人多是溼痰流注經絡。瘦人多是血虛與熱。大法以行氣流溼疎風導滯血養新血。降陽升陰。治有先後。須臨腫與不腫。及上下部分別而導之

因痰者。二陳湯。加酒芩羌活南星蒼朮竹瀝薑汁。

方見痰症 濕痰痛風。酒蒸黃芩酒蒸黃柏蒼朮羌活甘草乾薑陳皮芍藥。痰挾死血一身走痛者。桂枝加防風湯。

溼

因溼者。二朮加羌活白芷黃蘗防風竹瀝薑汁。或二妙散。方見脚氣 肢節腫痛脈滑。蒼朮南星木香枳殼檳榔防己黃蘗。風溼相搏痛者。甜瓜子丸。

甜瓜子丸

乾木瓜 兩半 蔵靈仙 兩半 甜瓜子二兩炒黃

川烏炮五錢 末之。酒糊丸桐子大。每二十丸。酒下。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

血虛 附死血

血虛痛。芎歸湯。加桃仁紅花薄桂威靈仙取橫行手臂。方見頭痛肢節腫痛脉澁。死血也。四物湯加桃仁紅花。方見血虛寒澁相搏。血鬱經絡作痛者。麒麟竭散

麒麟竭散 血竭六錢 乳香六錢 沒藥六錢

白芍藥六錢 當歸六錢 水蛭二錢 炒 麝香二錢

虎脛骨酥炙五錢 末之。每服三錢。食前酒調下

風熱

風者。小續命湯。去附子加羌活防風酒炒黃芩。在歲靈仙桂枝在下。牛膝防己黃芩。方見中風澁熱。當歸拈痛湯。方見脚氣。瘦人服痛血虛火盛也。四物湯加

黃芩黃蘗羌活防風柴胡 方見血症

斑疹症十一

歌有色有痕明是疹。若無頭粒是爲斑。究其實火并虛火。更有陰斑與內傷。

論夫斑與疹不同。斑者。瘡發掀腫于外。有色點而無頭粒屬少陽相火。疹者。小紅靨。有頭粒。隨出隨收收而復出。或在皮膚中不出者。名曰隱疹屬少陰君火。然傷寒發斑。有陽毒。溫毒。胃爛之症。雜病有陰症發斑者。亦出胸背及手足。稀少而微紅。此無

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

根失守之火聚于胸中。上獨薰肺而為斑。如蚊跡之狀。終不似陽證之錦紋也。若裏作熱症用寒藥非也。亦有內傷發斑。乃胃氣極虛。一身之火。遊行于外。宜補宜降。亦不可用凉藥。二者雖十無二三。然亦當辨。陽斑皆屬風熱挾虛而作。蓋紅赤甚者。胃熱也。紫者。胃爛也。半死半生。黑者死。陰陽虛實。切脉驗症可知矣

醋疹

醋疹出不快者。升麻葛根湯。毒盛而內火熾者。消毒飲子。

升麻葛根湯

升麻一錢　葛根一錢半　芍藥七分　甘艸六分　水煎熱服

消毒飲子

防風二錢去芦　荊芥一錢半　甘艸一錢半　水煎熱服　黑豆三錢研

隱疹

隱疹者。隱在皮膚不透出者。屬肝風兼濕。紅者兼火化。黃瓜水調伏龍肝末服之。不已再服。

陽斑

陽斑者。傷寒中之一症也。治方自有本科。茲不多贅。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

陰斑

陰斑。隱如蚊跡是也。調中湯加茴香芍藥。附傷斑者。胃氣極虛。火上熏肺。宜補藥降之。大建中湯。見前

調中湯 治陰斑

蕃木一錢半 砂陳皮一錢 砂仁一錢 藿香一錢 芍藥一錢妙 甘艸炙一錢 桔梗一錢 半夏一錢 白芷一錢 羌活一錢 枳殼一錢 川芎五分 黃芩半錢 桂枝五分 薑水煎服

萬風症十一

〔歌〕瘡疾原來即萬風。遍身疙瘩痒生蟲。須臾鼻塌眉毛墮。暴酷應知惡氣鍾。

〔論〕夫萬風者。大風也。古名曰癩。受得天地殺物之風暴悍酷烈。可畏然。血隨氣化。氣既不施。血爲之聚血聚則肉爛生蟲。須臾鼻崩眉墮。不外乎陽明一經。蓋陽明無物不受故也。風之入人也。氣受之。則上身多。血受之。則下身多。氣血俱受。上下俱多。甚重。自非醫者神手。病者鐵心。罕有免于死者。按法治之。尤當絕厚味。忌酒色。不致再發。再發則無救矣。知命者。可以守此戒乎。

在上多

在上多者。醉仙散。取臭涎惡血于齒縫出。

East Asian Library Princeton University Library DO NOT COPY Gest Collection

醉仙散 治大風之神藥 胡麻仁半兩 牛蒡子半兩 蔓荊子半兩 防風半兩去芦 枸杞子半兩炒黑色 瓜蔞根半兩 苦參半兩 白蒺藜半兩炒 末之每一兩加輕粉一錢拌勻。大人用一錢。空心日午臨卧各一服。茶湯調下。五七日效。量大小虛實加減與之。

在下多

在下多。通天再造散。取陳蟲惡物穀道中出。

通天再造散 錦紋大黃一兩 角刺一兩半 獨生黑大者 礬金半兩 白牽牛取頭末六兩半生半熟

末之每服二錢。臨臥冷酒調。日未出時面東服。以浮萍煎湯候泄出蟲如黑色。年久根深。赤色日近者。二四日。又進一服。直候無蟲。則絕根矣

通治

厲風通用升麻散。取汗浮萍散

白芷二錢 當歸二錢 熟半夏二錢 白茯苓二錢 葛朮一兩 乾葛一兩 升麻一兩 桔梗一兩 枳殼五錢 乾薑五錢 大黃五錢蒸 白芍藥七錢 陳皮兩半 甘艸兩半 每服四錢。生薑煙薑煎服

浮萍散 治癩風 浮萍一兩 荊芥半兩 麻黃去根節半兩 川芎半兩 甘艸半兩 末之每一兩。水二鍾。入葱

白豆蔻煎服。汗出則愈

腸風臟毒症十三

歌曰腸風臟毒從何別腸胃停寒與蓄熱。血濁色黯臟毒因。蘊毒千中幾箕踞。腸風血色清且鮮。外邪隨感而隨泄。

論曰人之腸胃不虛。則邪氣無由而入。或坐臥風溼。醉飽房勞。生冷停寒。酒麵積熱。以致榮血失道。滲入于大腸之經。此腸風臟毒之所由作也。故出依熱下血暴發者。則血色清鮮。腹中有痛。若挾寒。則下血兼積久者。則血色凝濁而色黯。腹肉微痛。此名曰臟毒。與爲腸風蓋腸風者。邪從外入。隨感而隨泄也。積久始發濁者。爲臟毒。蓋臟毒者。久積其毒而始發是也。有先血後便者。其血來也遠。先便後血者。其血來也近。俗謂糞前糞後非。若臟毒症積熱日久。忽鬱于寒。實非寒也。不可以標寒而用熱劑也。

腸風

丹溪云腸風獨在胃大腸出。若兼風者。蒼朮秦艽香附之類。便血久遠傷血。致虛。并麻風癩癘見于面者。蒼皮丸。又方腸風下血香附一兩。枳殼七錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

謹按大肺與大腸相爲表裏故肺臟蘊熱則症門閉結熱極反挺出其症也肺氣不足不能收斂則症門脫出故婦人生產用力過者及小兒痢久不已者多致脫症即可見也亦有血熱血虛亦令脫肛也審而療之

氣虛

氣虛不能收斂脈虛或久病後脫症補中益氣湯（方見內傷）丹溪云氣虛者宜大補元氣兼升提人參黃芪用芎當歸芍藥升麻柴胡外肥皂水洗之

氣熱

氣熱及內有熱脈數者二補丸加此以升麻又方

氣熱盛而脫症者綠荅六兩升麻一兩神麴糊丸空心白湯下五錢

二補丸治熱盛脫症　黃芩炒一兩半　黃蘗炒一兩半　黃連炒二兩半

末之煉蜜丸如桐子大每七十九空心白湯送下

血虛

血虛者或因失血後脫乳婦四物湯加黃芪升麻柴胡（方見血症）外用五倍子爲細末塗之以手托而上之至五六次待收乃止

血熱

East Asian Library and the G. Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

內原有熱症。血虛麻數而虛者。四物湯加炒黃蘗
柴胡防風秦艽升麻。或涼血地黃湯。加升麻柴胡
防風秦艽 方見

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

7

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2537
V.7

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

頭痛症一

許叔微 編輯

歌 頭痛先須辨厥陰。氣虛血少兼寒濕。識者尤當審六經。更有猶歸頻作痛。風痰風熱客於經。

論 如太陽頭痛者。或風寒。脉浮緊。痛在巔頂兩額角。少陽頭痛者。往來寒熱。脉弦。痛連耳根。陽明頭痛者。發熱自汗。脉浮長大。痛連目眥頰齒。太陰頭痛者。必有痰。體重。或腹痛。脉沉緩。厥陰頭痛者。止痰沫。厥冷。寒氣逆為寒厥。脉沉細。厥陰頭痛者。足

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一脉浮緩痛引目系。此六經頭痛。多挾外邪也。血虛一頭痛者。白魚尾上攻頭痛也。氣虛頭痛者。耳鳴九竅不利。腸胃之所生。濕熱頭痛者。心煩重痛。病在膈中。過在手太陽少陰。寒濕頭痛者。氣上而不下。頭痛巔疾。下虛上實。過在手少陰巨陽。甚則入腎。偏頭痛者。頭半寒痛。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。厥頭痛者。所犯大寒。至骨髓。髓以腦爲主。腦逆。故頭痛齒亦痛。眞頭痛者。痛甚入連于腦。手足寒至節。旦發夕死。夕發旦死也。丹溪云。頭痛之主於痰。甚者次之。有吐者。有下者。又甚則汗之。法。斯無一偏之弊也。

六經痛

太陽。川芎羌活藁本蔓荊黃。少陽。小柴胡湯。陽明。升麻葛根湯。加石膏白芷葱白。太陰。蒼朮半夏南星川芎蔓荊子。少陰麻黃附子細辛湯。厥陰。吳茱萸湯加柴胡。

痛者屬風熱與痰。有虛而痛者。纔見光明。則暗痛甚。有君稜骨痛者。晝不可開。晝靜夜劇。屬痰。凡此之類。種種不同。視其所挾。及所因。定其經絡。參以脉理。而施以補瀉。宜通汗和之法。斯無一偏之弊也。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY