PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

8

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

083/2557
v.8

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

癇症一

〔歌〕牛馬猪羊雞五癇。治須尋火與尋痰。更將痰火分多少。識得樞機總不難。

〔論〕夫癇有五。馬癇則張口搖頭。鳴牛癇則目正直視。腹脹。猪癇則喜吐沫。羊癇則揚目吐舌。雞癇則搖頭反折。善驚。蓋以其形之類而名之也。古者既有五癇之名。治無分別。槩用香竄鎮墜之藥。殊爲未當。丹溪云。癇病蓋因痰涎壅盛。迷瞞孔竅。發則頭旋顛倒。手足搖搦。口眼相引。胸背强直。叫吼吐

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

涕。食頃乃甦。大率屬痰與火。法當尋火尋痰。分多分少治之。亦有因驚而得者。驚則神不守舍。舍空而痰聚也。宜以行痰爲主。佐以定悸寧心安神可也。彼香竄燥劑寧不助火耗氣乎。

痰

痰者。動則有聲。脉滑涎沫出。必得吐後用安神丸。大率以行痰爲主。二陳湯加南星瓜蔞黃連（方見痰症）安神丸（治痰癇）黃連（一兩五錢酒製）硃砂（水飛一兩）生地黃（一兩酒洗）甘艸（炙五錢）寫丸。每五十丸。

火

火者有熱面赤脉數。抵肥人痰多。瘦人火多。宜吐後用平胃散黃連川芎柴胡或寧神丹。

寧神丹（治火盛癇症）天麻（五錢）人參（去蘆五錢）陳皮（五錢）白朮（五錢炒）當歸身（五錢）白茯苓（五錢）荊芥（五錢）殭蠶（五錢）獨活（五錢）遠志（五錢去心）犀角（五錢）麥門冬（炒五錢）棗仁（炒五錢）辰砂（五錢另研）半夏（一兩）南星（一兩）石膏（一兩）甘草（炙三錢）白附子（三錢）川芎（三錢）牛黃（三錢）珍珠（三錢）生地黃（五錢）黃連（五錢）金箔（三十片）酒丸。空心白湯下五十丸。

驚

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

因驚而得者則神不守舍舍空痰聚必先行痰亦用吐痰吐後安神丸方見前痰癇下或三癇丸

三癇丸治一切驚癇　荊芥穗二兩　白礬一兩半生半枯　硃砂爲衣

顛狂症二

歌　譫言歌走忽踰墻妄自稱尊號曰狂顛者身殭心不樂須知二症有陰陽

論　夫狂者陽症其狀少卧而不飢妄言歌笑踰垣上屋棄衣奔走白高賢也自貴倨也自辨智也顛者陰症其狀殭仆直視意不樂是也丹溪云大率多因痰結于心胸間治當鎮心神開結痰有中邪而得者以治邪法治之蓋陽虛陰實則顛陰虛陽實則狂扁鵲云重陰者顛重陽者狂故顛狂二症陰陽之不同也

脉　顛癇之症陽浮陰沉數熱滑痰狂發于心驚風肝癇弦急可尋浮病腑淺沉病臟深顛脉搏大滑者生沉小緊急者不治狂脉實大者生沉小者死顛脉虛可治實則死

顛症

顛者神不守舍顛狂如有所見經年不愈心經有損是爲眞病若悲哭呻吟爲邪所憑者非狂也用

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

蠶故帋一味燒灰好酒調服二錢。顛風麻仁湯。顛疾失心者。宜助心氣。用靈苑方。

顛風麻仁湯　麻仁四升　水六升。猛火煑七合服。

靈苑方　助心氣　硃砂一兩研　棗仁半兩炒研　乳香半兩研

右作一服。溫酒下。以醉爲度。勿令吐。服後便令睡。待其自醒。則神魂安矣。若一驚觸。不可復始。

狂邪

狂邪者。發作無時。披頭大叫。踰垣上屋。不避水火。棄衣奔走。欲殺人。苦參丸。卒狂妄言者。針大拇指[illegible]

苦參丸　大叫狂邪　苦參不拘多少　蜜丸。薄荷湯下五十丸。

大黃一物湯　大黃四兩酒浸一宿　水三升。煎之。分三服。必數日後。方可與食。但得寧靜。方爲吉兆。不可見其瘦弱減食。便以溫藥補之。及以飲食飽之。病必再作。戒之戒之。緩與之食。方爲得體。故曰損其穀氣則病易愈。所以然者。食入于陰。長氣于陽故也。

○按前二症。必有所因。或因大怒。動其肝風。或因大驚。動其心火。或素有痰。卒爲火升。升而不降。壅塞心竅。神明不得出入。主宰六號令。心反爲痰所

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

役一時發越若踰垣上屋持刃殺人裸體罵詈不避親疎飛奔疾走涉水如陸者此肝氣太旺木來乘心名之曰狂又謂之大顛法當抑肝鎮心降龍丹主之若撫掌大笑語言不倫左顧右盼如見鬼神片時正性復明深爲赧悔少頃而狀態如故者此爲上膈頑痰沉濫洋溢塞其道路心爲之碍痰少降則正性復明痰復升則又發名之曰顛法當利肺安心安神滾痰丸主之

降龍丹 抑肝鎮心 黑鉛一兩鎔開投水銀一兩不住手炒至成粉爲度名曰銀砂

硃砂 五錢 蛇含石 五錢火煅過 金箔 五百片

銀箔 五百片 研細丸如芡實大每服三丸茯神湯磨化下

安神滾痰丸 礞石 一兩煅 風化硝 一兩 硃砂 一兩

沉香 五錢 珍珠 五錢 共末煎大麻膏丸如芡實大每服三丸薑汁竹瀝調下

痓症三

【歌】痓本非風溼上求有無汗症見剛柔角弓口噤如風狀燥劑教君勿妄投

【論】仲景云太陽病發熱脉沉而遲曰痓傷寒發汗過多因致痓太發溼家汗亦成痓瘡家發汗亦成痓

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

產後去血過多亦成痙其症身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭搖卒口噤背反張者是也有汗曰柔痙無汗曰剛痙剛痙屬陽柔痙屬陰丹溪云痙屬太陰溼土故經云諸痙強直皆屬于溼蓋溼土過極反兼風化制之然兼化者虛象而實非風也切不可槩作風治而用燥藥大率屬氣虛亦有火兼痰者宜辨之若身涼手足冷脉沉細者爲陰痙若口眼牽扯手足戰搖伸縮者爲風痰若發熱喘嗽生痰爲痰火宜隨症治之若目瞪口開昏冒不知人者不治並用如聖飲加減之

如聖飲　治剛柔二治與痺痙同治法

羌活上　防風中　川芎中　白芷中

柴胡中　芍藥中　人參中　當歸中

甘艸中　半夏下　黃芩中　烏藥中

右用水二盞薑三片煎一盞入薑汁竹瀝溫服○有汗曰柔痙加白朮桂枝○無汗曰剛痙加蒼朮麻黃或加葛根亦可○痰多加貝母瓜蔞枳實紫蘇子○火盛加山梔仁麥門冬花粉去川芎柴胡烏藥半夏羌活防風白芷○如口噤咬牙大便實

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

者。加大黃利之。○產後去血過多成痓者。加黃芪熟地黃。

厥症四

【歌】厥形有六要消詳。痰氣尸蚘陰共陽。故使四肢成厥逆。陰陽虛實各分張。

【論】夫陰厥者。始因泄利。身寒厥冷。足踡臥。脣口青。自利溲白。不渴脉遲。陽厥者。身熱四肢厥逆。大小便閉澀。脉數熱極反厥也。痰厥者。寒痰迷悶心胸。隧道不行。四肢厥冷。僵仆卒倒。不知人事。厥者。氣異逆也。故卒然厥逆。不知人。僵仆身冷。蚘厥者。胃寒蚘蟲攻胃。手足厥冷。此蚘尸厥者。冒犯不正之氣。忽然手足厥冷。肌膚起粟。頭面青黑。或妄言。或口噤。昏瞶不知人。或因弔喪問病。入廟登塚而得。丹溪云。有因氣而厥者。身冷脉伏。有血虛而厥者。因血大損故也。脉必芤澀。有因痰滯而厥者。口中流涎。昏不知人。脉沉滑。有氣虛而厥者。有所勞傷。氣弱不能運行故也。凡此之類。在乎細辨之。

陰陽厥

陰厥。理中湯。重者四逆湯。二方俱見中寒外灸關元穴五十壯。陽厥四逆散。大便閉。熱極反厥。大承氣湯下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之。方見傷食

四逆散 治陽厥輕者 甘艸炙一錢 枳殼炒一錢 柴胡一錢

白芍藥炒一錢 剉一貼。水二鍾。煎八分。不拘時服。

氣血厥

氣厥。四七湯。調氣散。八味順氣散。方見氣症 蘇合香丸。方見類中風 婦人血厥。倉公散。白薇湯。

倉公散 治血厥 瓜蔕一錢 藜蘆一錢 礬石飛一錢

雄黃一錢 末之。每用少許。吹鼻中取嚏

白薇湯 治血厥 白薇三錢 當歸三錢 人參一錢半

甘艸炙七分 剉一貼。水一盞。煎一盞。溫服

蚘厥

蚘厥。理中湯加檳榔川椒。煎吞烏梅丸 一方一見中寒一見心痛 不止用烏梅川椒黃蘗煎服。蓋蚘聞酸苦則安。

尸厥

尸厥。蘇合香丸。方見類中風症 調氣散 方見氣症 或追魂湯

追魂湯 治卒厥不知人 麻黃去節三錢 杏仁二十五粒 生甘艸一錢 煎服。

痰厥

痰厥昏悶不醒。稀涎散。方見中風 導痰湯 方見痰症

痿症五

歌 諸痿多因肺熱生。故云痿獨取陽明。分明月是膏

Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

梁疾勿認爲風浪立名。

【論】夫痿有五脉筋骨肉痿歷是也。古方多以治風之藥通治痿。何其謬也。至丹溪始辨之。以風痿二症另立篇目源流不同治法迥別。此開千古之弊也。丹溪云。內經謂諸痿起于肺熱。又謂治痿獨取陽明。蓋肺金體燥。居上而主氣。畏火者也。脾土主溼。居中央。主四肢。畏木者也。火性炎上。若嗜欲無節。則水失所養。火寡于畏而侮所勝。肺得火邪而熱矣。木性則急。肺受熱邪。則金失所養。木寡于畏而侮所勝。脾得木邪而傷矣。肺熱則不能管攝一身。脾傷則四肢不能爲用。而諸痿作矣。故瀉火則肺金清而木不實。何傷脾之有。補腎水則心火降而肺金不虛。何肺熱之有。故陽明實。則宗筋潤而能束骨關節利矣。治痿之法。莫出于此。然或有溼熱或痰。或血虛。或氣虛。或死血。或食積妨礙。不得降者。比比皆然。當審而療之。尤當淡薄滋味焉。

【脉】痿因肺燥。脉多浮弱。寸口若沉。發汗則錯。足痛或軟。專審于尺。滑疾而緩。或沉而弱。

虛痿

大率虛與熱氣血兩虛者。四物湯加參芪知母黃

Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蘖熟多加黃芩只血虛。四物湯。加黃蘗蒼朮。方見血症

或丹溪補陰丸。方見火症氣虛者。四君子湯加黃蘗知母。方見脾胃

食積

食積瘀血。妨礙不得降者四物湯。對二陳湯加桃仁紅花黃蘗神麯。痰者。二陳湯。加蒼白朮芩蘗竹瀝薑汁。食積者。二陳湯。加蒼蘗實麯。方見血症及痰症

溼熱

溼熱成痿二妙散。或健步丸。二方俱見腰痛六七月間。溼熱成痿清燥湯。

東垣清燥湯　黃芪一錢半　蒼朮一錢　白朮五分　陳皮五分　澤瀉五分　人參三分　白茯苓五分　升麻三分　麥門冬一分　當歸身一分　生地黃二分　酒蘗一分　柴胡一分　黃連一分　甘艸三分　煎服

痺症六

歌風溼寒邪相雜至。襲人經絡因成痺。寒者痛而風者行溼爲重着不移處。或中皮脉肌骨筋。內舍心肝脾腎肺筋攣不仁。類乎風。局方風痺同論治。因襲既久未能明。近代明師始分異。內經風痺合有條。諸痺所因出陳氏。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

論 內經云風溼寒三氣雜至而爲痺。其風氣勝者爲行痺。寒氣勝者爲痛痺。溼氣勝者爲着痺。又云以冬遇此爲骨痺。以春遇此爲筋痺。以夏遇此爲脉痺。以至陰遇此爲肌痺。以秋遇此爲皮痺。久而不已。內舍于合。故骨痺不已。復感于邪。內舍于腎。筋痺不已。復感于邪。內舍于肝。脉痺不已。復感于邪。內舍于心。肌痺不已。復感于邪。內舍于脾。皮痺不已。復感于邪。內舍于肺。所謂痺者各以其時重感于風寒溼之邪氣也。又云。淫氣喘息。痺聚在肺。淫氣憂思。痺聚在心。淫氣遺溺。痺聚在腎。淫氣乏竭。痺聚在肝。淫氣肌絕。痺聚在脾。故風氣勝者易已。留連于筋骨間者病久。其留皮膚間易已。入臟者死。若此者可以見其淺深之受症也。然五臟痺各有形狀之不同。淺深之各異。善治者。審其所因。辨其所形。真知其在皮膚血脉筋骨臟腑淺深之分而調之。斯無危痼之患矣。若一槩混作風治而用風燥熱藥謬矣。

脉 風溼寒氣。合而爲痺。浮濇而緊。三脉乃備。

五痺名狀

肺痺者。煩滿喘嘔。心痺者。脉不通。煩則心下鼓暴。

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

上氣嗌乾而嘔。善噫厥氣上則恐。肝痺。夜臥則驚。多飲數小便。上爲引如懷。腎痺。善脹尻以代踵脊以當頭脾痺。四肢怠惰。發欬嘔汁。上爲大塞五痺湯主之。方見後風痺

風痺

脉尺寸俱浮微身體不仁。血氣凝聚。手足拘攣者。風痺也。防風湯。風寒溼氣。客留于脾。手足緩弱。頑痺不仁。三痺湯。五痺湯

防風湯 治風痺血痺　防風一錢　當歸一錢　赤茯苓八分

秦艽八分　木芍藥八分　黃芩一分　獨活八分

桂心五分　杏仁七四粒　甘艸一錢　薑水煎服

三痺湯 治風寒溼痺　川續斷錢半　杜仲薑炒錢半　防風錢半去芦

桂心錢半　細辛錢半　人參錢半去芦　白茯苓錢半

當歸酒浸錢半　甘草錢半　白芍藥錢半　生地黃一錢

秦艽一錢去芦　川芎一錢　獨活一錢去芦　牛膝酒浸去芦一錢

黃芪一錢　每服七錢。薑三片。棗二枚。水煎服。

五痺湯 治五藏痺　羌活一兩去芦　白朮一兩　片子薑黃去土一兩

防已一兩　甘草炙半兩　每服四錢。薑三片。水煎服。

溼痺

溼勝。脉沉緩。留住不去。四肢麻木拘急。浮腫。茯苓

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

川芎湯。風溼痺。脚膝腫痛。行步艱難。腰膝臂髀大骨痛。蒼朮散。手足流注疼痛。麻痺不仁。難以屈伸。

當歸拈痛湯。方見脚氣

茯苓川芎湯　赤茯苓一兩　桑白皮一兩　防風半兩

肉桂半兩　麻黃去節半兩　川芎半兩　芍藥半兩

當歸半兩　甘艸半兩　每用五錢。薑棗煎服。

蒼朮散治溼熱成痺　蒼朮四兩泔浸　黃蘗四兩酒炒　虎脛骨酥炙二兩

防風一兩　末之。每服二錢白湯調下。

寒痺

身體煩疼。項背拘急。或重或痛。舉體艱難。手足冷痛着故寒气

節疼痛。皮膚不仁。肌肉重着。及四肢緩縱不仁者

附子湯寒溼痺痛。薏苡仁湯

蠲痺湯治寒痺　當歸一錢半　芍藥一錢半　黃芪一錢半

羌活一錢半　甘艸一錢　片子薑黃一錢半　薑棗煎服

附子湯治寒痺　生附子四錢　白芍藥二錢　肉桂二錢

白茯苓二錢　人參二錢　白朮一錢二分　甘草一錢

右剉作二貼。薑三片。棗二枚。水煎服。

薏苡仁湯　當歸一兩　芍藥炒一兩　薏苡仁一兩

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

麻黃一兩　肉桂一兩　甘草炙一兩　蒼朮米泔浸炒四兩

右剉。每服七錢生薑三片煎服。自汗減麻黃。熱減桂。

虛損勞瘵症七

【歌】眞元斷喪漸成勞。骨熱煩蒸氣血銷。清骨保眞除內熱。黃芪鼈甲治晡潮。補虛八物滋榮血。虛甚參芪白鳳膏。花蕊十灰能止血。劫勞須用煉青蒿。大平治痿能清肺。消化能令痰自消。男子必須先補腎。女人惟要把經調。傳屍急製天靈散。勿使延纏種禍由。

【論】夫男子之勞。起于傷精。女子之勞。起于經閉。小兒之勞。得于母胎。蓋男子十六而精通。女子十四而天癸至。然未充也。後生少年。輩淫慾太盛。斷喪眞元。眞陰內虧。虛火熾焰。肺金受傷。無以生腎水。腎水枯竭。無以濟心火。心火一旺。腎火從之。而夢遺鬼交之病作。肺氣一虛。則腠理疎豁。而盜汗自汗之病作。火動其血。血隨火升。而咳嗽吐紅之病作。攷之內經。及上古諸家之說。一曰勞瘵。一曰勞極。一曰陰虛。一曰不足。一曰虛損。然因名以責實。不過氣虛。血虛陰虛之異耳。凡脾肺不足。皆氣虛也。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

心肝不足。皆血虛也。腎水有虧。即陰虛也。氣屬陽。血屬陰。血虛亦屬陰虛。世有患此者。急絕房慾以養精。內觀以養神。毋怒勞。以耗氣則其眞陰之水自充。而五內之火自息。又何不治之有。惟其嗜慾無節。起居不時。食飲自倍。使神散而精竭。血涸而氣亡。直至發熱不休。形骸骨立而死。良可歎哉。然而一火未足憐也。猶有侍奉親密之人。或同氣兄弟子女之屬。受其惡氣。多遭傳染。名曰傳屍。甚至

門者有

其物惡蟲。

以勞傷于肝者。則爲毛蟲。如刺蝟瓦蛆之屬。食人筋膜。勞傷于心者。則爲羽蟲。如燈蛾蚊蝱禽鳥之形。食人血脉。勞傷于脾者。則爲裸蟲。如嬰孩蚯蚓之類。食人肌肉。勞傷于肺者。則爲介蟲。如龜鼈鰕蟹之狀。食人膚膏。勞傷于腎者。則爲鱗蟲。如魚龍蛟蟶之形。食人骨髓。或挾相火之勢。亦如羽蟲之酷者。鴟梟之類。爲狀不一。不可勝紀。凡有此症。便宜蚤治。一則殺蟲以絕其根。一則補虛以復其元緩則不及事矣。

骨蒸兩顴赤者不治。蓋骨蒸內熱本于腎虛腎屬水。水性寒腎實則寒。腎虛則

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

熱。腎熱。則火蒸于骨。而髓亦熱矣。腎主骨髓。兩顴爲骨之本故也。勞瘵喉啞者。爲肺絕。不治。蓋肺主氣。聲之所從出也。肺爲火爍。金不能鳴。故也。勞瘵忽患下部癰腫者死。先痔漏而後瘵者死。先得瘵而後痔漏者亦死。蓋痔漏通于大腸。大腸爲肺之府。肺爲火爍。遺熱于大腸。故也。勞瘵犯一側眠者。不治。蓋無血養筋。不能轉動。故也。勞瘵泄瀉不食者死。蓋胃爲五藏六府之海。主生化之源。源絕則無以生精血。故也。

脉

氣虛脉細。或緩而無力。右脉常弱。血虛脉大。或數而無力。左脉常弱。陽虛脉遲。陰虛脉弦。真氣虛脉緊。男子久病。氣口脉弱則死。强則生。女人久病。人迎脉强則生。弱則死。經云。[illegible]者。氣血[illegible]

虛脉小者。氣血俱小。又曰。虛勞之脉。以浮大。或弦數。大者勞也。弦者亦勞也。大者易治。血氣未衰。可斂而正也。弦者難治。血氣已耗。而難補也。若雙弦則賊邪侵脾。加數則危殆矣。

葛可久治勞瘵十神方

葛先師有言曰。萬病莫若勞瘵最爲難治。庸醫不究其源。不窮其本。或投之以大寒之劑。或療之以大熱之藥。妄爲施治。絕不取效。殊不知大寒則愈虛其中。大熱則愈竭其內。所以世之醫瘵疾者。萬無一人焉。今開用藥次第于後。如嘔吐咯嗽血者。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

先以十灰散揭住如極甚者須以花蕊石散主之
大抵血熱則行。血冷則凝。見黑則止。此其理也。止
血之後。患人之體。必稍疎解。用蠲參湯一補。容其
熟睡一覺。不令驚醒。睡起病勢去其五六。却分病
用後諸藥。保和湯止嗽寧肺。保真湯補虛除熱。太
平丸潤肺扶痿。消化丸下痰疎氣。隨症加減。服藥
之法。每日三食前。服保真湯。三食後。服保和湯。二
藥間而服之。每日又濃煎薄苦湯灌漱咽口。用太
平丸先嚼一丸。徐徐咽下。次再嚼一丸。緩緩溶化。
至上牀時。亦如此用之。蓋夜則肺竅開。藥味必能
入竅中。此決要緊。如痰壅盛。先用錫糖拌消化丸
一百丸吞下。次却依前嚼噙太平丸。令其仰臥而
睡。服前七藥後。若肺燥餘嗽未除。可煮潤肺膏。如
常服之。續煮白鳳膏食之。復其真元。完其根本。全
愈後。合十珍丸服之。乃收功起身之藥也。

甲字號十灰散　治勞嗽嘔吐咯血。先用此揭之。

大薊一兩　小薊一兩　栢葉一兩　薄苛葉一兩
茅根一兩　茜根一兩　牡丹皮一兩　櫻櫚皮一兩
大黃一兩　山梔一兩

右燒存性。爲細末。用紙包椀蓋地上一夕。出火毒。

用時先將藕汁或蘿蔔汁磨京墨半盞調灰五錢食後服下如勢輕用此立止如勢盛血成升斗者用花蕊石散

乙字號花蕊石散　治勞瘵溺血出成升斗者

花蕊石不拘多少煅存性研如粉

右用童便一盞頓溫調末三錢食後下如男子則和酒女子和醋與童便調藥服後用獨參湯補之

丙字號獨參湯　治勞瘵止血後服此補之

人參二兩去芦

右㕮咀棗五枚水二盞煎一盞不拘時候服後宜熟睡一覺後服諸藥

丁字號保和湯　治勞症久嗽肺痿者服之

知母酒炒三分　貝母去心三分　天花粉二分　天門冬去心三分

款冬花二分　薏苡仁二分　杏仁泡二分　麥門冬去心三分

五味子二分　粉草一分　馬兜苓一分　紫菀一分

百部一分　百合一分　桔梗一分　阿膠蛤粉炒一分半

當歸一分半　地黃一分半　紫蘇半分　薄苦半分

右用水二盞薑三片煎一盞入飴糖一匙每日三食後各進一服○血盛加大小蓟茅花蒲黃茜根藕節○虛極加鹿茸鬱金青蒿○痰盛加南星半

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

夏陳皮大腹皮茯苓枳殼枳實○喘盛加桑皮陳皮大腹皮紫蘇子蘿蔔子葶藶子○熱盛加山梔黃芩黃連黃蘗連翹

戊字號保眞湯　治勞症骨蒸體熱而虛

當歸三分酒洗　人參三分去芦　生地黃三分　熟地黃三分

白朮三分炒　黃芪三分蜜炙　赤茯苓三分　白茯苓三分

天冬二分去心　麥冬二分去心　赤芍藥分半　白芍藥分半

知母二分鹽炒　黃蘗二分鹽炒　五味子二分　甘艸一分半

陳皮一分半　柴胡二分　地骨皮二分

右用水二盞薑三片棗五枚蓮心五箇每日三食前各進一服○驚悸加茯苓茯神遠志棗仁○淋濁加萆薢猪苓澤瀉○便澁加木通扁畜○遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮心○燥熱加鼈甲石膏黃蒿○盜汗加浮小麥麻黃根黃芪牡蠣

己字號太平丸　治勞症久嗽肺痿肺癰噙服除根

天冬二兩去心　麥冬二兩去心　知母二兩去毛　貝母去心二兩

款冬花一兩　杏仁二兩泡　當歸一兩半　生地黃一兩半

黃連一兩半　蒲黃一兩炒　膠珠一兩半　京墨一兩

桔梗一兩　薄荷一兩　麝香少許

右爲細末用白蜜半斤銀鍋內煉熟取起下諸藥

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

末攪勻。再上火熬二三沸。丸如彈子大。每日三食後。濃煎薄荷湯灌漱喉口細嚼一丸。津唾咽下。再噙一丸。緩緩溶化。臨卧時如有痰盛。先用餳糖拌消化丸一百丸吞下。次噙嚼此丸。仰卧而睡。從其溜入肺竅中。則肺清嗽止。

庚字號消化丸　治勞症熱嗽壅盛。

礞石二兩硝煅　明礬飛二兩　猪牙皂角二兩炙去皮弦

南星二兩生用　半夏二兩生用　白茯苓二兩　陳皮二兩

枳實一兩半　枳殼一兩半

右爲細末。以神麯和丸如梧子大。每服百丸。臨嗽將餳糖拌勻吞下。次噙嚼太平丸。二藥交攻。

辛字號潤肺膏　治勞症久嗽肺痿。時常服之。

羯羊肺一具　杏仁一兩洗研　柿霜二兩　真粉一兩

白蜜二兩

右先將羊肺洗淨。次將餘藥水解薄打擾五味稠粘灌入肺中。白水煮熟食之。此藥服前七藥後可用。或與七藥相間而服亦佳。

壬字號白鳳膏　治一切大勞大怯。極虛甚憊。咳嗽吐痰咯血。發熱。火乘金位。此藥固真元。全根本。

黑嘴白鴨一隻　大京棗二升

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

參苓平胃散 一升　陳煮酒 一大瓶

右先將鴨縛其脚掛起。隨患人之酒量多少。傾鴨血于酒中攪勻。一時飲盡。直入肺中。潤補其肺。仍止其嗽。却將鴨擣去毛。就脇邊開一孔。出其肚雜。拭乾將棗子去核。每箇入平胃散令滿。以麻皮扎定。填滿鴨腹中。入鴨于小鐔內。四圍炭火慢煨。以一鉼酒盡爲度。此酒須二次添入。待酒乾取起食之。其棗陰乾。隨意食之。後合十珍丸服之。

癸字號十珍丸　治一切大勞大怯。極虛甚憊。髓乾精涸。血枯氣竭。火乘金位。服前藥愈後。却服此丸。以爲收功起身之用也。

猪脊膂 一條　羊脊膂 一箇　烏骨雞 一隻

右四味去骨留肉。用煮酒一大鉼于鐔內煮乾搗爛用。

大山藥 五條　蓮肉 半斤　京棗 一百箇　霜柿 十箇

右四味。用井水一大瓶于鐔內煮熟搗爛。與前肉一處再慢火熬。却下後藥。

真阿膠 四兩　黃蠟 三兩

右二味逐漸下。與前八味和一處。研成膏子。和平胃散末四君子末并知母貝母蘗末各一兩。搜和

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

成劑如十分堅硬。再入白蜜同熬取起。放青石上搗爲丸如桐子大。每百丸。棗湯送下。不拘時服。

青蒿膏 治骨蒸勞熱　青蒿 一斗五升　童便 三斗

右慢火熬童便減至二斗。去蒿。再熬至一斗。入猪胆汁七枚。再熬數沸。甘艸末收之。每用一匙。湯下。

天靈蓋散 取勞蟲　天靈蓋 兩指大。以檀香煎湯洗過酥炙。呪七遍。呪曰。靈公神。靈母聖。逢傳。屍便須定魚。急如律令。　雞心檳榔 五箇爲末

麝香 二錢另研　阿魏 三錢研　甘遂 三錢爲末　辰砂 一錢另研

安息香 三錢另研

右六味。研極細。和勻。每服三錢。同後湯送下。

薤白 二七莖　青蒿 二握　甘草 五寸二根　葱白 二七莖

桃枝 一寸　柳枝 一寸　桑白皮 一寸　榴根 一寸俱用向東者

右八味。須選潔淨處。採童便四升。瓦器內慢火煎至一升。去查。分作三盞。調前藥。五更初服。男患女煎。女患男煎。服藥後。如覺欲吐。即用白梅含之。五更盡。須下蟲及惡物黃水黑糞。如服後不見動靜。約人行五七里。又進一服。至天明更進一服。如瀉不止。用龍骨黃連等分末之。白水調。及白梅粥補之。

虛損用四物湯。方見血症　四君子湯。八珍湯。十全大補

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

湯。方俱見脾胃　大補陰丸方見火症　六味地黃丸。集靈膏。瓊玉膏。泄瀉者。白朮膏。

六味地黃丸　白茯苓三兩　牡丹皮三兩　澤瀉三兩

乾山藥四兩　山茱萸肉四兩　熟地黃八兩酒蒸

末之。煉蜜丸如桐子大。每服六十丸。溫酒下。

集靈膏生精補血消痰　人參四兩去芦　生地黃　熟地黃

天門冬　麥門冬　牛膝　枸杞半斤

用文武火水煎三日。蜜收成膏子。每三匙。白湯下。

瓊玉膏大補元氣　生地汁十斤　白蜜十六斤煉　人參一斤半

白茯苓四十九兩　拌勻。入罈內封固。桑柴火煮三晝夜。浸井內一日去火毒。復煮一日去水氣。每服一大匙。白湯或酒任下。

白朮膏止瀉大補元氣　白朮一斤　用水一斗。煎至五升。濾去汁聽用。復用水五升。再煎。約耗一半去查。合前汁一處。慢火煎成膏子。每服三匙。白湯調下。

驚悸怔忡健忘症八

【歌】驚悸心中常惕惕。如人將捕時驚惑。延纏不已漸怔忡。寤寐神魂多恍惚。精神短少或多痰。健忘之病因而得。皆緣大恐與大驚。觸事喪志心神失。

【論】夫人之所主者心。心之所養者血。心血虛。神氣

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

失守。神去則舍空。舍空則鬱而停痰。痰居心位。此驚悸之所以肇端也。或耳聞大聲。目擊異物。遇險臨危。觸事喪志。則心爲之忤。使人有惕惕之狀。始則爲驚悸。久而心虛停飲。水氣乘心。胸中滲漉。虛氣流動。水既上乘。心火畏之。心不自安。故怏怏然而怔忡也。日久不已。精神短少。心氣空虛。神不清而生煩惱。迷心竅。則遇事多忘。亦因思慮過度。病在心脾。故令轉盼遺忘。名曰健忘。三者雖有淺深之殊。皆心脾之病。其所由來者一也。而治之之法。必審其脉之虛實。病之淺深。元氣之盛衰。則虛實邪正之情。自了然矣。

脉　驚悸怔忡。寸動而弱。寸緊關浮。悸病乃作。飲食痰火。伏動滑搏。浮微弦濡。憂驚過却。健忘神虧。心虛浮薄。

驚悸

血虛驚悸者。四物湯。加貝母橘紅黃連山梔。方見血症

安神丸。氣血兩虛者。益榮湯。方俱見女科　天王補心丹

天王補心丹　人參四兩　玄參二兩　杜仲炒去絲四兩

天門冬三兩　麥門冬三兩　遠志四兩　熟地黃六兩

百部三兩　桔梗三兩　牡丹皮四兩　栢子仁四兩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

五味子四兩　甘艸二兩　茯神四兩　茯苓四兩

石菖蒲四兩　酸棗仁四兩　末之蜜丸每下三錢。

怔忡

心血虛少。惕惕然恍惚怔忡。益榮湯。方見女科　痰火盛心下怔忡者。溫膽湯。加炒黃連山梔當歸貝母。溫膽湯即二陳湯加炒枳殼一錢竹瀝一錢二陳方見痰症　水氣承心而作怔忡。朱雀丸。心氣鬱滯。痰氣結于心下。而作怔忡。四七湯。加竹瀝薑汁。方見氣症

朱雀丸治水氣怔忡　白茯苓一兩　沉香半兩

末之。蜜丸桐子大。每服三十丸。人參湯送下。

防己黃芪湯　防己一兩　甘艸炙半兩　黃芪炙兩半　白朮炒七錢　每服一兩。加薑三片。棗二枚。水煎服

表虛自汗

表虛自汗惡寒者。桂枝湯以實其表。方見惡寒外以溫粉撲之。方見前

虛火自汗

虛火自汗不止。玉屏風散。火盛者。涼膈散。方見火症

玉屏風散虛火自汗　防風一兩　黃芪一兩炙　白朮二兩炒

每用五錢。薑三片。水二鍾。煎八分。溫服。

痰症自汗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

痰症自汗。二陳湯。加貝母膽星白朮黃芪方見痰症

盜汗

盜汗屬陰虛血虛。四物湯。加黃蘗知母。方見血症當歸六黃湯。治盜汗之聖藥也。或黃芪六一湯。麥煎散。

當歸六黃湯　當歸一錢　生地黃二錢　熟地黃二錢

黃連一錢　黃芩一錢　黃蘗一錢　黃芪一錢

右剉一劑。水二盞。煎八分。空心服。

黃芪六一湯　黃芪六兩蜜炙　甘艸一兩　每一兩。水煎服

麥煎散治盜汗神藥　知母二錢　石膏二錢　甘艸炙二錢

滑石二錢　地骨皮二錢　赤芍藥一錢　葶藶二錢

杏仁二錢去皮　人參二錢　白茯苓二錢　麻黃根二錢

末之。每服一錢。浮小麥煎湯送下。

心汗

心汗者。獨心孔有汗。思慮過多所致也。以艾煎湯調茯苓末一錢服。又用青桑焙乾末之。米湯送下。

赤白濁精滑夢遺症十一

【歌】溼痰溼火干氣血赤白二濁從茲別。更有精滑及夢遺。却緣相火與溼熱。

【論】夫赤白二濁。其色雖殊。總歸于火。火鬱下焦。精化不清。故有赤白。白者屬氣。赤者屬血。而精者實血

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

之所化也好色之徒勤于御女精出有限而慾無窮血爲火迫不及化精故其色赤從乎血也大法白濁以降火爲主而補次之赤濁以補爲主而降火次之寡慾之人亦患此者以溼熱治又有腎虛人小便白如油光彩不定尿脚澄下凝如膏糊爲寒蓋因腎虛過慾眩朕弱而陰寒生若此者十無一二非尋常白濁之比當審而辨之夢遺者夢與人交而遺其精也精滑者不因夢交而精自泄出也皆因真元氣虛虛火流行以致精海脫滑遺于夜而不遺于晝者蓋晝爲陽夜爲陰惟陰虛故遺

于陰分也甚則遺于晝者并陽皆虛也陰陽皆虛死期將至矣不亦殆哉然求其所屬則心肝與腎之火相挾而成之耳蓋心藏神肝藏魂腎藏精夢中所主之心即心之神也夢中所見之形即肝之魂也夢中所洩之精即腎之精也要之心爲君肝腎爲相未有君火動而相火不隨之者故于寐時神游于外欲爲雲雨則魂化爲形從而行焉而吾之精亦不容以不洩矣故治此病者先治其心火而後及其餘也寡慾之人亦患此者以脾溼治蓋脾溼則化氣不清而分注于膀胱者亦混濁而稠

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

厚。陰火一動精隨而出。固有不待夢而自遺者也。

脉兩尺洪數。或心脉短小。必便濁遺精。

赤白濁

赤濁。溼熱乘于血分。四物湯對二陳湯。加貝母樗根白皮。青黛滑石。二方一見血症一見痰症 弱者補陰丸 方見火症

白濁。溼痰流下。宜燥溼二陳湯加二朮相火盛者。珍珠粉丸。氣虛者。清心蓮子飲。方見消 腎水虛寒。尿白如油。光彩不定。凝如糊。分清飲。

珍珠粉丸 治白濁陰虛火旺之症 眞蛤粉一斤 黃蘗一斤赤色 末之。滴水丸如桐子大。空心酒下百丸。

分清飲 治腎水虛寒濁 益智五錢 萆薢五錢 石菖蒲三錢

夢遺

夢遺者。夜夢交感而泄也。火盛者珍珠粉丸。方見前 心不寧溫膽湯。去竹茹。加人參遠志茯神。蓮肉棗仁。腎虛者。六味地黃丸。方見勞瘵 或丹溪補陰丸。方見火症 精不固。金櫻子膏。因思想而得。其病在心。定志丸。或妙香散。方見女科

溫膽湯 即二陳加枳殼 方見痰症

金櫻子膏 金櫻子十斤剖開去子毛 于木相內杵碎。水二斗。煎成膏子服。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

精滑

精滑者。不因交感而自泄也。先服妙香散。方見女科或威喜丸。精滑因相火動者。珍珠粉丸。方見前虛者。大補陰丸。方見火症久不止。必用龍骨牡蠣澀之。

威喜丸 治泄精　黃蠟 四兩　茯苓 四兩用猪苓一分磁器內同煮二十沸晒末之。溶蠟搜和如彈子大。每一丸。空心細咽下。

淋症十二

【歌】血石膏勞肉五淋。便時滴瀝痛難禁。細微實滑求虛實。死血陰寒氣滯并。

【論】夫淋瀝者。滴瀝澀痛也。閉者急脹不通也。蓋心腎氣鬱。使陰陽乖舛。清濁相干。膀胱畜熱而水道焉。所以滴瀝澀痛。欲通不通。甚則窒塞其間。令人悶絕。故小便血熱。則爲血淋。火氣煎爍而爲砂石淋。如湯罐中煎之日久而生醎也。氣血結聚而爲內淋。氣血凝如膏糊爲膏淋。因勞而作爲勞淋。丹溪云。淋有五皆屬于熱。斯得其旨矣。然有氣滯而淋者。有氣虛而淋者。有死血而淋者。亦有冷氣滯于膀胱而作淋者。蓋十無一二也。然此之類有冷熱虛實之不同。尤當參之以脉症。則有餘不足之候。無所逃也。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

脉淋病之脉細數何妨。少陰微者。氣閉膀胱女人見之。陰中生瘡。大實易愈。虛濇者亡。

血淋

不痛者。爲溺血。痛者血淋也。通閉散。死血作淋地髓湯。

通閉散 治血熱成淋 香附五錢 陳皮五錢 赤茯苓一兩

右末之。每服二錢。水煎。空心服。

地髓湯 治瘀血成淋 杜牛膝一合 水五鍾。煎耗其半。去滓。麝香少許。空心服。

熱淋

熱淋而痛者。五淋散或四苓散。[illegible]五苓散去桂方見脾胃加通車前子滑石燈心瞿麥蟲蠶。末之。蜜水調下。

五淋散 治諸淋 赤茯苓八分 赤芍藥八分 山梔仁八分 生甘艸七分 當歸五分 黃芩五分 水煎空心服。

砂石淋

砂石淋。艸豆飲。或用寒水石煅研。水飛溫水調下。

艸豆飲 治砂石淋 黑豆一百甘粒 生粉艸一寸 水煎。乘熱入滑石末一錢。空心服

虛淋

腎虛成淋者。八味丸。或六味地黃丸。方見勞瘵

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

八味丸 即六味地黃丸加肉桂五錢黑附子炮去皮臍五錢方見勞瘵

勞淋 附氣淋

勞淋。四物湯。加黃蘗知母石葦滑石琥珀。方見血症 氣淋。沉香散。

沉香散 治氣淋 沉香半兩 石葦去毛半兩 王不留行半兩 當歸半兩 滑石半兩 葵子七錢半 白芍藥七錢半 甘艸三錢半 陳皮一兩 末之。每服二錢。大麥湯下。

陰寒

冷氣凝滯。小便淋瀝。木香散。內積寒冷。淋凝如膏糊者。生附湯。凝白如油。萆薢分清飲。

木香散 治冷淋 木香五分 木通五分 檳榔五分 大茴香四分 當歸五分 赤芍藥五分 青皮七分 澤瀉七分 橘皮五分 甘艸四分 水煎服。

生附湯 治寒淋 附子半兩 滑石半兩 瞿麥七錢半 木通七錢半 半夏四錢 每三錢。燈心薑蜜水煎服。

萆薢分清飲 益智一錢 萆薢一錢 石菖蒲一錢 烏藥一錢 茯苓八分 甘艸七分

右剉。水煎。入鹽一捻。空心服。

癃閉遺溺症十三

歌 實熱溲便故不通。下焦氣結號爲癃。氣虛血弱兼

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

痰閉一吐提時便有功。虛熱故令便不禁。虛寒遺溺在溫中。

〔論〕夫腎水瀦于膀胱而泄于小腸。此上下相通。故水火既濟。則榮衛流行。水竇開闔。便溺通暢。豈有不禁不利者歟。夫惟心腎不交。水火未濟。陰陽不調。則內外關。水道窒塞。而有小便癃閉遺溺之病生焉。蓋膀胱與腎為表裏。虛則客熱乘之。故不能制水。水挾熱而行。故數而不通。溺有餘瀝。腎與膀胱皆冷。內氣不充。胞中自滑。故出多而色白。所以熱則不通。冷則不禁。理之自然。亦有虛熱而遺瀝。氣虛而不通者。不可不知。

〔脉〕鼻頭色黃。小便必難。脉弦滑。為不小便。

虛閉

氣虛不能施化。小水不通者。四君子湯加升麻。先服後吐之。方見脾胃 血虛而小水不通者。四物湯加升麻。先服後吐之。方見血虛 氣血兩虛。二方合用。加升麻。

痰閉

痰氣閉澀于下焦。小水不通者。二陳湯加木通香附。先服後吐。或蒲黃湯。痰盛肥胖之人。導痰湯。取吐即通。二陳湯導痰湯 二方俱見痰症內

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

蒲黃湯 治小便不通　赤茯苓 三分　木通 五分　車前子 五分
桑白皮 八分　荊芥 四分　燈心 三分　赤芍藥 五分
蒲黃 生用 八分　滑石 一錢 研　甘草梢 七分　紫蘇 五分

右剉。加葱白三个。水煎服。

熱閉

下焦實熱。小便不通者。八正散。再用通小便法。莖中痛。熱盛閉澀者。導赤散。加山梔大黃。

八正散 治熱閉車前子 一錢　瞿麥 一錢　萹蓄 一錢
滑石 一錢　甘草 一錢　山梔仁 一錢　木通 一錢
大黃 一錢 煨　燈心二十莖。水煎。空心服。

導赤散 治小便不通　木通 二兩　生地黃 二兩
甘草 一兩　水煎服。

通小便法　用活田螺一个。連殼搗如泥。入麝少許。置臍內。以蛤蜊殼合之。絹帛扎定。少時即通。治禁口痢亦用此法。

小便不禁

小水不禁。出而不覺。赤者爲熱。白者氣虛。又有虛熱虛寒之不同。內虛溲熱。小便不禁。遺瀝者。六味地黃丸。加牛膝杜仲破故紙 方見前 勞瘵症 三因。韮子丸。乃治虛寒遺溺之要藥。自汗脉弱者。秘元丹。若虛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

熟不禁補陰丸加益智人參乾山藥。方見之症

三因韮子丸　韮子六兩炒　鹿茸四兩酥炙　肉蓯蓉酒浸二兩

牛膝二兩　熟地黃二兩　當歸二兩　巴戟兩半去心

兎絲子兩半　杜仲一兩　石斛一兩　乾薑一兩

桂心一兩　末之丸梧子大每服百丸空心酒下。

秘元丹固精止溺　龍骨三兩服　砂仁兩　訶子十个泡去核

靈砂一兩　末之煮糯米粥丸如麻子大空心臨

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library