PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

9

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2557
v.9

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

訂補明醫指掌卷之八

雜科

喉痺症一 咽喉十八症附

歌 喉痺皆因二火攻風痰壅熱在喉嚨因生血泡咽關閉性命危于旦夕中砭血攪痰爲上策寒凉直治定收功咽喉亦有陰經症喉服寒凉立見凶

論 內經云一陰一陽結謂之喉痺王太僕云一陰者手少陰君火心主之脉氣也一陽者手少陽相火三焦之脉氣也二脉正絡于喉然氣熱則內結甚則腫脹腫甚則痺痺甚則不通而死原病式云痺

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

者不仁也。俗作閉。由閉塞也。火主腫脹。故熱客上焦。而咽嗌腫脹也。咽喉之疾。死生反掌。腫脹甚者。急宜砭出血爲尚。然後用寒涼藥隨症調之。子和云。喉痺不歸之火。相去遠矣。已上之說屬火熱明矣。亦有伏氣病。名腎傷寒。謂非時暴寒。伏毒于少陰。始衰不病。旬日乃發。脉微弱。法當咽痛。次必下痢。當以辛熱藥攻其本病。順其陰陽。則水升火降。而咽痛自已。又有少陰傷寒。不傳太陽。寒邪節鬱。內格陽氣。爲熱上行于咽門經會之處。寒熱相搏而成咽痺。當以辛溫甘苦制其標病。以通咽嗌二者。若誤用寒涼。卒致不救。嗚呼冤哉。學者可不深究之。其咽喉十八症人多未明。開于後。括成歌。以便後學之記誦也。

咽喉十八症附

歌 十八咽喉君要通。雙單乳蛾生喉中。牙蜞風毒牙齦腫。蟬舌之風舌必重。魚口風如魚吸水。舌黃舌腫色黃濃。牙根作釁咬牙噤。木舌腫如猪舌同。聚毒塞喉風熱壅。纏喉風症繞喉攻。連珠五七相連起。更有懸蜞蠱毒風。搶食口中多發泡。崩砂甘口齒斷崩。毒名蜂子腮洋爛。松子風令灌口紅。走注

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

瘰癧風連頸。腮腫連牙獵頰風

論　古有咽喉十八症。後學多不能記故括成歌夫單蛾風者。其形圓如小筯頭。生于咽喉關上或左或右。可治。生于關下不見者。難治。雙蛾風兩箇生于喉間關下是也。難治。蟬舌風者。一名子舌舌下再生一舌是也。牙蜞風者。牙齦上腫甚聚毒成瘡是也。木舌風者。其舌腫大如煮猪舌。不能轉動是也。舌黃風者。自舌上腫痛。黃色是也。魚口風者如魚吸水是也。不治。聚毒塞喉風喉痺聚毒涎垂稠實而發寒熱是也。關上可治。關下難治。懸蜞蠱毒風者上脛腫。水食不下。形腫如雞卵是也。搶食風者。亦名飛絲毒。生口中。或食鯉鱠惡物。發泡是也。獵頰風者。腮頰結腫。牙盡處腫破是也。纏喉風者。風自頤纏繞。赤色寒熱者是也。松子風者。口內滿喉赤如猪肝。張口吐物則氣逆關閉。飲食不能是也。崩砂甘口風。自舌下牙齗上腫赤。口內咋臂如湯熱。牙齦漸爛者亦能脫齒是也。連珠風者。自舌下起。初起一箇。又起一箇。而甚者。三五七九箇。連珠生起是也。蜂子毒者。或在臉腮洋爛。或在喉關舌下作臀。其色黃如蜂是也。走疰瘰癧風者。頸項結

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

核五七箇。皮膚赤腫作寒熱是也

脉 咽喉之脉。兩寸洪溢。上盛下虛。脉忌微伏。

咽喉熱症

咽喉熱腫。吞水妨碍。語塞桔梗湯。喉痺及時疫毒。牛蒡子散。風熱腫痛。射干湯。纏喉風卒然失音。不省人事。痰壅口噤。解毒雄黃丸。腮腫。雙單乳蛾。木舌重舌。如聖金錠。咽喉腫閉。舌根腫痛。麝香硃砂丸。喉閉不通。二聖散吹之。或吹喉散。金鑰匙。喉痺痛。水穀不下者。通關散。或用射干逆流水吐之。或服千兩金丸。喉閉乳蛾諸症。在關上者。必有血泡用喉鍼點破。即寬。在關下不見者難治。用蘆管削尖快。令病人含水一口。從鼻孔中放蘆管進擊一下。出血妙。

桔梗湯 治熱腫喉痺。飲水妨碍。言語不出。

桔梗一錢去芦 甘艸一錢生用 連翹仁一錢 山梔子仁炒黑一錢 薄荷葉一錢 生黃芩一錢 水二鍾。竹葉十片。煎服。

牛蒡子散 治風熱上壅。咽喉腫痛。時疫毒氣所致

玄參一錢 升麻一錢 桔梗去芦一錢 牛蒡子研一錢 犀角鎊碎一錢 黃芩生用一錢 木通一錢 生甘草一錢

右剉一劑。水二盞。生薑三片。煎八分。徐徐細嚥下。

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

射干湯　治咽喉因風熱壅盛疼痛難進水飲。

射干 五錢　升麻 五錢　牙硝 三錢五分　馬勃 三錢五分　煎服

解毒雄黃丸　治纏喉風急症。雙蛾腫痛湯藥不下

雄黃 一兩　巴豆 十四粒去殼去油　玉金 一錢

末之醋糊丸菉豆大。熱茶湯送下七丸吐出頑涎即甦大効如牙關緊閉以物幹開灌之。起死回生

如聖金錠　咽喉急閉腮頷腫痛。雙單乳蛾。重舌 木舌

硫黃 研二錢　川芎 三錢　臈茶 三錢　薄荷葉 三錢

川烏 泡二錢　硝石 五錢　生地黃 五錢

末之用生葱汁拌勻為錠如指大每用一錠。先以

蔡水灌漱。次嚼薄荷葉五七片。却用藥同嚼極爛

以井花水下。甚者。連進二錠并口內噙化之。

麝香硃砂丸　治咽喉腫閉舌根腫痛。勺飲難進。

馬蹄硝 七錢　鉛白霜 三錢　龍腦 三錢　寒水石 燒一斤

硼砂 三兩　麝香 二錢　硃砂 一兩五錢　甘艸 十兩另自熬膏

研細。甘艸膏丸梧子大。硃砂為衣。每噙化一二丸

二聖散　治纏喉風。急喉痺。牙關緊急。痰涎壅盛。

膽礬 二錢五分　白殭蠶 炒去絲五錢　末之。少許吹入喉中

吹喉散　治三焦火熱。口舌生瘡。咽喉腫痛湯水不入

蒲黃 一兩　青黛 一兩　盆硝 二兩　薄荷汁 一鍾和勻前藥

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

用磁罐盛。慢火熬乾。研細每半錢。吹喉內涎出妙

金鑰匙　治一切風熱咽喉閉塞。口禁不開牙關緊急

朴硝一兩　大黃一錢　雄黃五錢　末之吹入喉內

通關散　方見中風條下

千兩金丸　大治喉風。不問陰陽內外危急惡症

蚵蛾艸半兩　銅青半兩　大黃半兩　牙硝半兩

末之以白梅肉搗爛和勻作二十丸。絲綿裹噙化

咽喉陰症

疫厲病。夏寒變。及非時暴寒少陰症。脉微細而沉。

自汗咽痛不利。名腎傷寒。半夏桂甘湯或苦酒湯

藏寒咽閉吞吐不利。蜜附子

半夏桂甘湯　治疫厲。夏爲寒變。及感非時暴寒之症

半夏二錢　桂枝二錢　甘艸二錢　薑三片　水煎服

黃芪芍藥桂枝苦酒湯　治腎傷寒脉沉咽痛自汗

黃芪五錢　芍藥三錢　桂枝三錢　水煎苦酒和服

三因蜜附子　治臟寒喉閉吞吐不利

大附子一箇去皮臍切作大片蜜炙令黃　每含一片。味盡再易。

咽喉痰症

一切纏喉風症。牙關緊急。痰涎壅盛者。必用吐法

攪去痰即寬。用珠子一草。俗名五瓜龍草。取根搗入

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

陳米醋調灌下。用牙皂桐油鵞翎探吐。或千兩金丸。二聖散。白礬散。一字散選而用之。吐痰後。服甘桔湯甚妙。

千兩金丸　二聖散　俱見前咽喉熱症條內

白礬散　吹急喉痺纏喉風人事不省牙關緊閉。

白礬三錢　巴豆二粒去殼研

將礬于銚內慢火熬化爲水。置巴豆于內。候乾去巴豆。取礬研末。每用少許吹入喉中。頑痰出立愈

一字散　治時氣纏喉風。牙關緊急。水穀不下。人事不省

白礬飛過一錢　藜蘆一錢　雄黃一錢五分　全蝎稍一錢五

猪牙皂莢去皮弦一錢半　末之每用一豆大。鼻內搐之

甘桔湯方見咳嗽條下

口齒症二

歌　齒牙由是骨之餘。齒豁須知腎氣虛。斷齒動搖生腫痛。陽明風盛熱寒殊。口爲脾竅能知味。臭惡應知熱在脾。口舌生瘡心壅熱。究其虛實根除。

論　夫齒者。腎之標。骨之餘也。口者。脾之竅。古者心之苗。諸經多會于口齒。齒爲手足陽明之所過。上齒隸于坤土。足陽明胃脉貫絡也。止而不動。喜寒飲而惡熱飲。下齒屬手陽明大腸脉貫絡也。嚼物動

East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

而不休。喜熱飲而惡寒飲故爲病不一熱甚則動搖。齦斷袒脫作痛不已也虛則齒豁焦禍而搖落。所療不同。故有惡寒作痛者。有惡熱作痛者有惡寒又惡熱作痛者。有惡寒飲少熱飲多而作痛者有牙齒動搖作痛者。有齒袒作痛者。有齒爲疳所蝕缺少血出爲痛者。有齒腫齦宣爲痛者。有脾胃中有風邪但覺風而作痛者。有牙齒爲蟲所蝕缺少而色變作痛者。有胃中氣少。不能禦於寒。袒露其齒而作痛者。有齒痛而臭穢不可近者。其痛非一治療各異。當究其經絡虛實。寒熱之候調之。口舌生瘡臭惡者。心脾之熱也。唇口腫脹。瞤動者風熱爲患也。各審其症而治之。無不驗也

脉　齒痛腎虛。尺虛而大。火盛尺洪。或搖豁壞。右寸關數。或洪而弦。此屬腸胃。風熱多涎。

齒病

因服熱藥。上下齒疼不可忍。引頭腦痛滿面發熱。善寒惡熱。清胃湯。陽明受風。引煙熏之熱煩頰車連口唇腫痛。犀角升麻散。大寒犯腦連齒痛。白芷散。梧桐淚散。牙痛不可忍。薑黃散。羊脛灰散。腎虛齒黑爛腫痛。安腎丸。牢牙散。蟲牙。天仙子燒煙。竹

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

筒抵牙引煙熏之或砂糖丸塞。風蛀牙痛。腮頷浮腫。細辛散。立效散玉池散選用。

清胃湯 方見火症條下

犀角升麻湯 治陽明受風熱。口唇頰車連牙腫痛。

犀角 鎊碎七錢 升麻 五錢 防風 去芦五錢 羌活 去芦五錢

川芎 五錢 白芷 五錢 黃芩 三錢 白附子 一錢五分

甘草 一錢五分 每服七錢。水二鍾。煎一鍾。食後漱服

白芷散 大寒犯腦。牙齒疼痛

羌活 八分去芦 麻黃 一錢去節 黃芪 一錢 艸豆 [illegible]錢

升麻 [illegible] 大菊黃 一錢 白芷 一錢 當歸 一錢

熟地黃 五分 藁本 三分 桂枝 二分半 末之。漱淨擦齒。

梧桐淚散 治陽明風熱。齒齦攻注。腫痛煩悶。

梧桐淚 五錢 石膽礬 五錢 黃礬 五錢 蘆薈 五錢

升麻 五錢 血餘 煅三錢 麝香 三錢 硃砂 二錢五分

細辛 二錢五分 當歸 二錢五分 川芎 二錢五分 牛膝 二錢五分

末之。先以甘草湯漱口。後用藥傅之。常用擦牙効。

薑黃散 治一切風熱蟲蛀牙齒疼痛。不可忍。

薑黃 一錢 細辛 一錢 白芷 一錢

末之。擦患處。須臾吐涎。鹽湯漱口。極效。

羊脛灰散 治牙齒疼痛難忍。用之擦齒。立止神效

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

地骨皮五錢 羊脛灰五錢 石膏五錢煅 升麻五錢共爲末擦齒止

安腎丸 腎虛牙齒疼痛

蓯蓉酒浸一兩 白朮一兩 乾山藥一兩 桃仁去皮尖炒一兩

石斛一兩 萆薢一兩 川烏去皮一兩 補骨脂炒一兩

白蒺藜炒去刺一兩 巴戟去皮心一兩 蜜丸鹽湯下。

牢牙散 注顏補腎。牢牙固齒。

青鹽七錢 細辛七錢 當歸酒洗一兩 川芎一兩

末之每用少許。侵晨擦牙漱滿口。連藥嚥之即愈。

砂糖丸 治蟲蛀牙齒疼痛不休。此藥神効。

礦灰不拘多少 末之。砂糖和丸如米粒大。塞蛀孔中。

細辛散 治風蛀牙疼。腮頷腫脹

荊芥穗一兩 細辛一兩 砂仁五錢 白芷二兩

川椒二兩去目 草烏二兩 鶴虱五錢 猪牙皂角五錢

蓽撥五錢 末之。每用少許。頻擦患處。

立效散 治一切牙齒疼痛。

川椒一兩去目 露蜂房一兩 青鹽一兩 水煎漱口即愈。

玉池散 治風蛀牙疼。腫癢動搖。潰爛宣露出血。口氣

地骨皮八分 白芷八分 升麻七分 防風去芦七分

細辛七分 川芎七分 槐花一錢 當歸一錢

藁本七分 甘草六分 爲末。每用一字擦之。即止。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

或痛甚。取二錢。水一鍾半。黑豆半合。薑三片。煎服

口病

口瘡。陰陽散付之。口舌生瘡。桃花散。內服甘桔湯。內熱口瘡。及咽喉腫痛。升麻湯。口瘡爛臭。赴筵散。黃丹散。口熱臭氣。芎芷散。唇口瞤動。或生核。薏苡仁湯。口舌生瘡。水蘗丸。

陰陽散　口舌生瘡。疼痛臭爛。用之即效。如神藥也

乾薑五錢　黃連五錢　末之乾搽舌上。

桃花散　治痢同前

玄胡索一兩　黃蘗五錢　黃連五錢　青黛二錢

蜜陀僧二錢　末之。用竹管吹入口內。

甘桔湯　方見咳嗽條下

升麻湯　治上膈熱毒。口舌生瘡。咽喉腫痛。

升麻八分　白芍藥一錢　人參一錢去芦　桔梗一錢去芦

乾葛一錢　甘草一錢　薑三片。水二盞。食後頻服

赴筵散　治口瘡。舌爛。臭穢不可近。

銅綠一兩　白芷一兩　末之。摻于舌上。溫醋漱之。

黃丹散　治滿口瘡爛。

黃丹一兩　蜜一兩　盞盛甑內蒸一伏時。鵞翎刷上

芎芷散　方見頭痛條下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

薏苡仁湯　治風熱在脾。唇口瞤動。或結核浮腫。

赤小豆三錢　防己三錢　甘艸三錢　薏苡仁三錢

右剉。每服七錢。生薑三片。水二盞。煎八分。食遠服

氷蘗丸　治口瘡　片腦一錢　薄荷二錢　黃蘗二錢

硼砂二錢　末之。生蜜丸彈子大。每用一丸噙化。

唇舌病

舌忽然腫硬如石。血出如湧泉。蒲黃散。舌衄齒衄。必勝散。舌瘡。綠雲散。舌連喉痛。薄荷煎。壅唇。黃蘗散。脾經風熱燥烈。金色瀉黃飲。

蒲黃散　治舌上出血　海螵蛸一錢　蒲黃炒一錢　末之。乾摻舌上

必勝散　治舌衄齒衄　蒲黃炒一錢　螺青一錢　摻舌上。鹽湯漱

綠雲散　治口舌瘡爛　黃蘗蜜炙五錢　青黛一錢　末之。摻于患處

薄荷煎　治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅盛　薄荷二錢　甘草二錢

川芎二錢　片腦五分　末之。蜜和成劑。隨意嚼服。

黃蘗散　治壅唇　黃蘗皮二兩　五倍二錢爲末　蜜陀僧二錢爲末

甘艸二錢爲末　三味爲末。塗蘗上炙乾。刮片貼唇上

金色瀉黃飲　白芷二錢　升麻二錢　枳殼炒二錢

黃芩炒二錢　防風去芦二錢　半夏二錢　石斛二錢

甘艸一錢　分作二貼。每貼加生薑三片。食後服。

鼻症三

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

歌 鼻竅應知與肺通。鼻齄血熱準頭紅。鼻瘡鼻痔皆因熱。熱結從教發鼻癰。齆衄依經從火治。鼻淵濁涕腦流空。鼻中瘜肉能塡竅。鼻塞風寒與熱攻。

論 夫鼻爲肺之竅。所以司嗅也。鼻齄赤鼻也。由飲酒血熱薰肺。外遇風寒。血凝不散而赤色。亦有不飲自赤者。肺風血熱故也。鼻瘡鼻痔鼻癰者。皆肺熱所致。但有淺深之不同。日久不已。結成瘜肉如棗塞滯鼻中。氣息不通。不知香臭。丹溪云。胃中有食積熱痰流注。挾濁氣凝結而生瘜肉也。齆者。鼻[illegible]清水也。衄者。鼻流血也。原病式云。皆以爲屬[illegible]君火之病。鼻淵者。濁涕流下不止。如彼水泉。內經云。膽移熱于腦。則辛頞鼻淵。傳爲衄衊瞑目。故得之氣厥也。鼻塞者。有外傷風寒。鼻塞流涕者。有風熱壅盛鬱于肺。而鼻塞聲重者。凡此之類。皆鼻病也。故併及之。

脉 右寸洪數。鼻衄鼻齄。左寸浮緩。鼻涕風邪。

鼻塞

鼻塞外感症。及內火熾盛症。俱詳傷風條下 鼻塞不聞香臭。通艸膏主之。

通草膏 治鼻塞 通艸一錢 附子炮一錢 細辛一錢 蜜丸綿裹塞鼻

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

鼻瘡癰

鼻中生瘡。辛夷爲末。入麝香氷片少許。綿裹塞鼻中。或枇杷葉拭去毛煎湯。調消風散方見咳嗽服。鼻癰有瘜肉。不聞香臭通草膏。見前鼻痔。以瓜蔕甘遂丸塞之。

瓜蔕甘遂丸　瓜蔕二錢　甘遂二錢　枯白礬二錢五分　螺青二錢五分　艸烏二錢五分　末之。芝蔴油搜合。硬不可爛。旋丸。內鼻孔中。到痔上。其痔化爲臭水。皆爛下。

鼻齆衄

鼻齆者。鼻中流水不止。千金細辛膏。肺熱鼻塞流清水。抑金散鼻衄症。[illegible]血症衄血條下

千金細辛膏　黑附子炮去皮臍一錢五分　川椒去目炒錢五分　川芎一錢五分　細辛一錢五分　乾薑一錢五分　吳茱萸一錢五分　桂心三錢五分　皂角一錢二分　用猪脂二兩煎油。先一宿用米醋浸藥。取入猪油內同煎。以附子色黃爲度用綿蘸藥塞鼻中。

抑金散治肺熱鼻塞　細辛八分　白芷八分　防風去芦八分　羌活去芦八分　當歸一錢　半夏八分薑製　川芎藭八分　桔梗去芦八分　陳皮七分　茯苓去皮八分　加薄荷薑煎服。

鼻淵瘜肉

鼻淵不止。辛夷荊芥散。鼻流濁涕不止者。蒼耳散

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

防風散或防風通聖散（方見中風）鼻中瘜肉。由胃中食積熱痰流注者。蝴蝶散納鼻中。或用輕黃散紝（鼻中）

辛荑荊芥散　辛荑（一錢）　荊芥（八分）　黃芩（酒炒八分）

神麴（炒七分）　南星（八分薑製）　半夏（八分薑製）　蒼朮（米泔浸炒八分）

白芷（八分）　剉一劑。水二盞。煎至八分。食後溫服

蒼耳散　蒼耳根莖苗子。燒灰醋泥調塗極效

防風散（治鼻淵）　防風（去芦三兩）　黃芩（二兩）　麥門冬（去心二兩）

人參（去芦二兩）　甘草（炙二兩）　川芎（二兩）　末之。每服二錢

蝴蝶散（去鼻中瘜肉）　蝴蝶（一味不拘多寡煅）　綿裹一字納入鼻中

輕黃散（治鼻臭瘜肉）　杏仁（去皮）　輕粉（一錢）　雄黃（五分）

麝香（少許）　硼[illegible]末。臨臥時。以筯點一米許于[illegible]

鼻齄

鼻齄。四物加酒芩酒蘗煎。調炒五靈脂末服。（方見血症）

目症四

歌　目爲五臟之精華。五輪八廓總虛靈。白睛屬肺目綱土。黑水神光肝腎家。赤脉屬心須體認五行生尅勿令差。大凡赤腫羞明痛。隱澀難開淚若麻。冒昧本當從火療。隨經用藥免咨嗟。昏蒙黑暗迎風淚。內障多生五色花。視遠不能兼雀目。滋陰壯水却爲佳。時人不究陰陽理。設把辛香浪點搽。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

論經云。諸脉者。皆屬于目。又云目得血而能視。鍼經云。五藏六府之精華。上注于目。故目爲宗脉之主。目之內眥及上綱。太陽之所過也。目銳眥。少陽也。目下綱。及兩傍交頞之中。陽明也。足厥陰連于目系。故目總統于肝。白睛屬肺。若白睛變赤。火乘于肺也。肉輪屬脾。上下綱赤腫者。火乘于脾也。黑水屬腎。五色花翳遮黑睛。腎不足也。神光屬肝。青睛被翳。肝虛火旺也。赤脉屬心。目中血貫痛澀。火自甚也。凡暴赤翳羞明。淚出不止。隱澀難開。冒昧不明。[illegible]病。經云。熱盛則腫是也。能審其經絡部位寫之可使立已。若久病昏暗。雀目不能遠視。及內障目矇。五色花翳。迎風出淚。頭昏目眩。皆血虛之候。宜壯水滋陰可也。亦有服寒涼太過以致陽虛。其火轉甚則當溫劑從治。其火自降。目自明。經云。益水之源。以制陽光。壯火之主。以消陰翳。此之謂也。今人治目。但知以寒藥伐火。而不知有益水壯火之法。專以龍腦辛香石藥搽點。而不知有辛散損明之戒也。悲夫。

脉眼赤火病。心肝數洪。右寸關見相火上衝。

實熱

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

暴發赤腫疼痛。瀉熱黃連湯。上焦壅熱鼻塞。頭目不清利。上清散。肝火盛目赤澀痛。龍薈丸。或四物龍膽湯。肺經壅熱。目睛赤腫。桑白皮散。赤翳努力攀睛者。決明子散。

瀉熱黃連湯　黃連酒炒一錢　黃芩酒炒八分　草龍胆一錢二分　升麻八分　柴胡八分　生地黃酒蒸一錢　水二盞。煎服

上清散清上熱　川芎五錢　荊芥五錢　薄荷五錢　盆硝一兩　石膏一兩　片腦三分

右末之。每用一字口噙水。以藥鼻內搐之。即愈。

龍薈丸治肝火攻目痛　草龍胆一兩　當歸一兩酒洗　山梔子炒一兩　黃連炒一兩　黃芩炒一兩　大黃五錢　蘆薈五錢　木香一錢五分　麝香五分　末之。蜜丸。生薑泡湯送下。

四物龍膽湯　四物湯方見血症條下　加羌活三錢去芦　防風三錢去芦　龍膽艸二錢　防己二錢　作數貼。水煎服

桑白皮散　玄參一兩　桑白皮一兩　枳殼炒一兩　杏仁一兩去皮　旋復花一兩　升麻一兩　防風一兩去芦　赤芍藥一兩　葶藶炒一兩　甘菊花一兩　炙甘草一兩　黃芩炒一兩　每服半兩。薑三片。水二盞。煎八分服。

決明子散　黃芩一兩　甘菊花一兩　木賊艸一兩　決明子一兩　石膏一兩　赤芍藥一兩　川芎一兩

Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

羌活一兩去芦　甘艸一兩　蔓荊子一兩　石決明一兩

右剉。每服七錢。水二盞。薑三片。煎至八分。食後服。

虛眼

肝血不足。眼昏生花。久視無力生眵者。養肝丸。羊肝丸。腎水不足。視不分明。漸成內障。熟地黃丸。滋陰丸。血虛目昏。明目地黃丸。能近視。不能遠視。地芝丸。能遠視。不能近視。定志丸。

養肝丸 治肝虛不收　當歸酒浸二兩　防風去芦一兩　車前子酒蒸二兩　川芎二兩　楮實子二兩　熟芋酒蒸二兩　蕤仁湯泡去皮一兩　白芍藥二兩

末之。蜜丸梧子大。每服七十丸。湯下。

羊肝丸 補肝明目　羊肝一具生用　黃連去鬚二兩

將羊肝去筋膜。于石臼內搗爛。入連末。杵爲丸。桐子大。白湯送下。

熟地黃丸 補腎明目　熟地黃一兩　當歸酒洗五錢　地骨皮五錢　黃芩五錢　枳殼麩炒三錢　生地黃一兩　天門冬八錢去心　五味子七錢　炙甘三錢　黃連酒炒六錢　人參去芦二錢　柴胡三錢

末之。蜜丸梧子大。每百丸。白湯送下。

滋陰丸 即六味地黃丸方。見虛損症條下。

明目地黃丸　牛膝酒浸五兩　石斛五兩　枳殼炒三兩　防風去芦二兩　杏仁去皮二兩　生地黃一斤　熟地黃一斤

右末之。蜜丸如梧桐子大。每七十丸。空心鹽湯下。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

地芝丸 治能近視陰有餘不能遠視陽不足 生地黃四兩 天門冬去心四兩

甘菊花二兩 枳殼炒二兩 蜜丸桐子大茶清下百丸

定志丸 方見驚悸怔忡條下

養陽

渾身及手足麻木不仁兩目緊急羞明或視物無力黃芪湯內傷脾胃不足內障耳鳴多年目昏不能視物益氣聰明湯陰盛陽虛丸竅不利青白翳見於大眥補陽湯主之久服涼藥過多目轉昏者補胃湯主之

黃芪湯 治視物無力 黃芪二兩蜜炙 人參八錢去芦 甘艸炙一兩

風邪乘之風入于耳脉使經氣痞而不宣是謂耳聾必有頭痛之症也有勞碌傷其血氣浮慾耗其精元瘦瘁力疲昏昏憒憒是謂勞聾能將息得宜血氣平和則其聾漸輕又有耳鳴風邪與氣相搏其聲嘈嘈而鳴眼中流火謂之虛聾熱氣乘虛隨脉入耳熱聚不散膿汁出謂之膿耳人或耳間有津液輕則不能爲害若風熱搏之津液結成核塞于耳竅亦令暴聾謂之耵耳蓋風則腎脉必浮熱則腎脉必數虛則腎脉澀弱氣鬱腎脉沉滯風者者疎散之熱者清利之虛者補之氣鬱開導之治

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

之活法不過此也。

〔脉〕耳病腎虛。遲濡其脉。浮大爲風。洪動火賊。沉濇氣凝。數實熱塞。此久聾者。專于腎責。暴病浮洪。兩尺相同。或兩尺數陰火上衝。

風耳

風觸耳鳴及聾。防風通聖散。方見中風 風虛耳聾。桂香散。風入耳中虛鳴。芎芷散。方見頭痛 風熱搏成耵耳。生猪脂地龍釜底墨等分。細研。葱汁和捏如棗大綿裹塞。耳中數日。待軟即挑出。

桂香散 治風虛耳聾 辣桂 二分 川芎 五分 當歸 六分 酒洗

細辛 三分 石菖蒲 八分 木香 二分 木通 五分

麻黃 去節三分 甘艸 二分生用 南星 炮三分 白蒺藜 炒三分

白芷 四分 紫蘇 五分 剉一劑。水二盞。葱煎服。

熱耳

耳聾者。少陽厥陰熱多。通聖散。方見中風 耳鳴酒遏者。加枳桔柴胡乾葛。南星。陰虛火動耳鳴者。四物湯 方見血症 加黃蘗知母。痰氣耳鳴者。滾痰丸 方見痰症 內熱耳聾。桃花散塞之。蔓荊子散內服。

桃花散 治耳中出膿 枯礬 一錢 乾胭脂 一錢 麝香 少許共爲末吹耳內

蔓荊子散 甘草 炙五分 升麻 三分 木通 三分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

赤芍藥五分 桑白皮五分 生地黃一錢 麥門冬去心四分
前胡三分去芦 蔓荊子七分 赤茯苓六分 甘菊花四分
右剉一劑。水二盞。薑三片。棗一枚。煎八分。食後服

虛耳

腎虛耳聾者。益腎散。或六味地黃丸。補陰丸。方見虛損
勞損耳聾者。地黃丸。人參養榮湯。方見虛損 大病後元
氣損傷。精血虛耗。耳聾及鳴。調中益氣湯。方見內傷
益腎散 治腎虛耳聾 磁石製一兩 巴戟去心一兩 沉香一兩
石菖蒲一兩 川椒一兩去目 末之。每二錢。用猪腎一枚
細切。和以葱白食鹽。并藥用濕紙裹煨。空心酒下。

氣耳

氣怒厥逆耳聾。和劑流氣飲。氣壅于上而聾者。清
神散。氣實人耳聾或鳴者。檳榔丸。神芎丸。氣閉耳
聾。用甘遂爲丸。如棗子大塞耳內。服甘草湯。
和劑流氣飲 陳皮四兩 青皮四兩炒 甘艸炙四兩
厚朴薑炒四兩 香附醋炒四兩 紫蘇四兩 木通一兩
大腹皮二兩 丁香一兩五錢 檳榔一兩五錢 木香一兩五錢
草果一兩五錢 莪朮炮一兩半 藿香一兩五錢 肉桂一兩五錢
人參去芦一兩 白朮炒一兩 木瓜一兩 麥門冬去一
赤茯苓一兩 石菖蒲一兩 白芷一兩 半夏一兩

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

枳殼炒一兩每服三錢。生薑三片。棗二枚。葱煎服

清神散 氣壅耳聾 甘菊花五錢 羌活去芦五錢 殭蠶炒去嘴五

木通四錢 荊芥四錢 川芎四錢 防風去芦四錢

木香四錢 甘草炙四錢 石菖蒲四錢 末之。每服三錢

木香檳榔丸 郁李仁一兩半。夏麴一兩 皂莢去皮炙一

檳榔五錢 枳殼炒五錢 木香五錢 杏仁去皮炒五

青皮五錢 末之 [illegible]三兩。去皮弦子漿水

半椀。搓揉熬膏。[illegible]如桐子大。每五十丸

食後薑湯送下。

神芎丸 氣實大宜

大黃一兩 黃芩一兩 滑石一兩

末之。滴水丸梧子[illegible]七十丸。白湯送下

外科

癰疽症六

【歌】疽發惡深其狀小。淺而大者是爲癰。要看部位分虛實。薄處尤當大補榮。

【論】原病式云。癰者。淺而大者也。疽者。深而惡者也。熱盛血則爲癰疽。丹溪云。癰疽須看六陽經。六陰經有多氣少血者。有多血少氣者。有血氣俱多者。不可以一槩論。若夫要害處。近虛怯處。如少陰厥陰

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

經生癰。以其氣多血少。恐肌肉難長。瘡口未合必成大害。所以戒用驅毒利藥以伐其陰分之血。當大補氣血。方可收功。又如中年人生癰疽。纔有痛處。參之脉症。但見虛弱。便與滋補血氣。可保終吉。河間云。腫掀于外。根盤不深。形症在表。其脉多浮病在皮肉。非氣盛必侵于內。急須內托以救裏宜復煎散。除溼散鬱。使胃氣和平。或未已。再前半料與之。如大便秘煩者。少少與黃連湯。如微利而煩熱少退。却復與復煎散半料。如此使榮衛俱行。邪氣不能內傷。世俗多用排膿內補十宣散。若用于此。少瘡。及冬月則可。若潰瘍于夏月用之。其桂附辛熱溫散。佐以防風白芷。吾恐雖有參芪。難爲倚仗。不若復煎散之愈也。學者臨用斟酌斯無弊也。

托裏復煎散

防風三兩去芦　地骨皮二兩　白茯苓二兩

黃芩二兩　白芍藥二兩　人參二兩去芦　白朮二兩炒

黃芪二兩蜜炙　肉桂二兩　甘艸二兩　防已二兩

當歸二兩　先以蒼朮一斤。水五升。煎至三升。去朮。入前藥煎至四盞。分四次飲之。朮查還可再煎。

○背發發脾肚。在肩下脊上。因飲食而感其毒。廣一尺。深一寸。雖潰在骨。不穿膜不死。急治脾肚之毒。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

內當托裏護心外當拔毒散腫內外夾攻之若發于右脾中恐其毒奔心大要服藥截住不令攻心如通脊背腫者不可救也

○蜂窠發者正當脊心頭在上最不宜乃爲反症全要托裏生肌定痛恐毒攻心難治心火亦發故也

○散走流注發此毒氣乘風熱而走急用疎風定熱則氣自息治之若流注于[illegible]足腿膝者必死無疑

○背發兩頭小四邊散攻乃因飲食所致而氣食相關合陰虛而成之氣虛而[illegible]者所以開口而闊急服內消藥亦宜補陽也

○肺癰發于左膊間初可用燈火點破追疔湯汗之而散

○右搭肩發骨上生者以動之處可治若串于左肩難治左搭肩發骨上以動處可治串于右肩難治

二症金用雄黃散及絮焙乾爲末香油調搽患處

○對心發因心火盛而熱氣會生于此其毒甚盛走之急用疎導心火藥解之

○腎俞發因受溼并怒氣飲熱酒而得之傷于內腎之間流毒在腎俞宜解內腎之毒若陰發傷腎膜者不治腎俞雙發陽發于外可治陰發傷腎膜及

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

膿稀者死。

○臁瘡久不痊。腎水虛憊。下流故也。可服苦參丸。外用隔紙膏貼之。紅玉散付之。

○紅絲瘡。人多不識。無治法。害人甚速。其瘡生于手足間。有黃泡。其中忽紫黑色。即有一條紅絲迤邐血上而生。若至心腹則使人昏亂不救。或有生兩三條紅者。以針橫截紅絲。所到之處刺之。使血出以膏藥貼之愈。此症得之喜怒不節。血氣逆而生也。

○內疳瘡。生上腭。初發如蓮花痔。根蔕小而下垂。及大。治法以勾刀決其根燒鐵烙之以止其血。次以雄黃輕粉粉霜白芷白蘞末之。敷其上。以槐杖作枕支其牙頰間。毋使口合一兩時瘡瘢定合口自便。次日出膿以生肌散付之。仍以乳香膏護之。不支其牙則津液冲動。不能付藥。此勞氣虛憊故也。

○便癰。血疝也。俗呼為便毒。以其不便處生故也。乃足厥陰肝之經絡及衝任督脉。亦屬肝之傍絡。是血氣流行之道路也。今壅而為癰。當以玉燭散或桃仁承氣湯下之。

○乳癰由忿怒所逆。鬱悶所遏。厚味所釀。蓋乳房陽明所經。乳頭厥陰所屬。厥陰之氣不通。而汁不出。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

陽明之熱沸騰。故熱甚而化膿。亦因乳子膈有痰滯。口氣掀熱。含乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。初起須忍痛。揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此必成癰。故用青皮疎厥陰之滯。石膏清陽明之熱。當歸川芎甘草節行汚濁之血。瓜蔞沒藥橘葉皂角刺金銀花消腫導毒。少佐以酒。行藥力也。更以艾灸兩三壯尤捷。若有不得于夫。不得于舅姑者。憂怒鬱悶。朝夕積累。遂成隱核。如棋子。不痛不癢。數十年後爲陷空。名曰乳癰。其瘡形凹嵌如嵌穴。難治。

○蜂窠發于胸乳間。乃心熱盛。急用疎導心火藥。遲則不救。

○頸後蜂窠發。宜急救。若初起掀赤腫痛。可療。痰發及流兩肩者難治。

○兩脇下癰疽。切不可用補陽藥。蓋虛中得。決不可受熱劑。虛甚易于傷骨膜。

○兩邊髮際發。在頸後兩邊髮際。如核發起。急宜取去病根。如腦心發。看熱氣上攻于腦四畔邊。掀赤腫硬。連于耳項。寒熱疼痛。不急治。毒入于血肉。多腐爲膿水。不治。

○腦後發。名天疽。其狀大而紫黑色。若不急治。則毒

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

入淵腋。前傷任脉。內薰肝肺。十餘日死。急用化痰消腫托裏散。及內托千金散。

○耳後發。耳後一寸三分發之必死。名銳毒。不治。

○胸發。名井疽。狀如豆。三四日起。不早治。入于腹。十日死。急服內固清心散。外發可治。內發必死無疑。

○九發肺疽在募中。肝疽在期門。腎疽在中脘。脾疽在章門。胃疽在賁門。大腸疽在天樞。三焦疽在丹田。小腸疽在關元。其氣穿潰在外可治。若發于內傷膜者。流膿大腸出。不治。

○外腎陰發。名腎癰。又名懸癰。陰囊上腫痛。乃[illegible]

血腎經。及足厥陰肝經。感寒濕邪。偏腎于陰之經絡。致血氣凝滯。寒濕氣不散。而爲此病。即服托裏散。加車前子木通淡竹葉牽牛何首烏。復用內消散。及生肌定痛散敷之。此症外潰去子亦無害也。

○下疳瘡。秘傳一味千金散立効。外以葱白炒熱熨之。如冷再熱熨三五次。後敷消毒消腫藥。加大黃木鼈子南星草烏敷之。破用生肌散付之。

○人面瘡。此症是冤業所致。可以善事解之。然後服流氣飲。久不已。苦參丸。或用貝母研末付之。

托裏護心散　大黃三錢　牡蠣三錢煅　天花粉三錢

Tokyo Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

皂角刺三錢 杵硝三錢 連翹三錢 當歸一兩五錢

金銀花一兩 芍藥二錢炒 黃芩二錢炒 每半兩水酒煎

托裏十補散 黃芪二錢蜜炙 人參二錢去芦 當歸二錢五分

厚朴一錢炒 桔梗一錢去芦 川芎一錢二分 防風一錢去芦

桂心一錢 甘艸一錢炙 白芷一錢五分 剉一劑水煎服

內托千金散 白芷一錢二分 人參二錢去芦 當歸二錢

黃芪二錢炙 川芎一錢二分 防風一錢二分 甘艸一錢炙五分

芍藥一錢炒 花粉一錢五分 官桂一錢二分 桔梗一錢去芦二分

金銀花三錢 水煎入酒半盞再煎沸溫服

內固清心散 朱砂一錢 白茯苓一錢 人參一錢去芦

白豆蔻一錢 雄黃一錢 綠豆一撮 杵硝一錢

甘艸一錢炙 片腦一錢 麝香一錢 皂角刺八分

末之每服一錢蜜湯調下

一味千金散 用黑蜘蛛一箇過街者爲妙入杵鉢中研爛熟酒攪勻通口服

雄黃散 雄黃一錢 巴豆一粒同研如泥入乳香沒藥各少許再研勻細少上惡肉自去

拔毒散 陳皮一兩 甘遂一兩 當歸尾一兩五錢 川芎一兩 紅花酒洗一兩 桃仁去皮尖一百个 水酒煎服

玉燭散 即大承氣對四物湯二方一見傷食一見血症

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

生肌散　枯白礬一兩　檳榔一兩　蜜陀僧錢半

黃丹一錢　血竭一錢　輕粉五分　末之。敷瘡上。

乳香散　赤石脂五錢　白膠香五錢　枯白礬五錢

黃丹二錢　乳香二錢　沒藥二錢　輕粉二錢俱末之敷瘡上

流氣飲方見耳症條下

苦參丸　苦參不拘多少。煉蜜丸如梧桐子大。每服五六十丸。薄荷煎湯送下。

紅玉錠子　乾胭脂三錢　枯白礬三錢　輕粉三錢

砒霜一錢　黃丹三錢　片腦五分　麝香五分

末之。糊為錠子。臨用芥花水磨。塗患處。

[illegible]紙膏　龍骨煅一兩　鉛粉一兩　鉛丹一兩

末之。香油或桐油調。油紙夾膏貼之。次日又番過貼。須先以葱椒煎湯洗淨。然後貼上。

烏龍膏　小粉四兩　半夏一兩　木鼈子去殼一兩

艸烏半兩　鐵鍋內炒焦研細出火毒。水調傅。一日一換。

疔毒症七

歌　十三疔毒要精通。麻子鹽膚牛狗同。水洗刀鎌三十六。浮漚蛇眼及雌雄。更兼石爛皆其數。體弱因令暴沴鍾。手足初生黃泡起。或時紫黑熱寒攻。眼

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

中流火心驚惕。痒痛無時嘔逆兒。初見病時當速療。勿教稍慢致疲癃。

論　古方所載疔毒十三種。曰麻子疔。曰石疔。曰雄疔。曰雌疔。曰火疔。曰爛疔。曰三十六疔。曰蛇眼疔。曰鹽膚疔。曰水洗疔。曰刀鎌疔。曰浮漚疔。曰牛狗疔者是也。皆緣感天地暴沴而生。然陰陽二氣互相繫怒。必成鼎氣。如卒然大風大霧。大暑大寒。遇之襲于皮膚。入于四體。傳注經脉。腠理壅隔。榮衛不得通行。發爲癰疽疔毒之患。或開死獸。鍾其毒氣尤甚。經云。膏粱之變。足生大疔。恣食辛辣厚味。炙煿葷腥蘊毒于中故也。然瘡之始發也。必先痒而後痛。先寒而後熱。熱定則多寒。四肢沉重。頭痛心驚。眼花見火。甚則嘔逆者多。危其麻子疔者。始末皆痒。不得觸犯。觸犯即難治。衆疔之中。惟三十六疔可畏。其狀頭黑浮起。形如黑豆四畔赤色。初生一箇。日增一箇。若滿至三十六箇。則藥所不治。急療之得生。若石疔。火疔。爛疔。蛇眼疔。水洗疔。刀鎌疔。雄雌疔。鹽膚疔之類。皆因形象而名者。不急治亦危殆也。獨浮漚牛狗二疔。雖不療。亦不殺人。凡疔不可觸犯。若瘠强痛極。不可忍者。是觸之候也。

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疔瘡外治法

凡疔瘡先以鍼刺四圍及中。然後用雄雌二黃末。醋調塗之。或紫金散敷。不過二次愈。

疔毒內治法

疔瘡初見憎寒壯熱。赤芍藥湯。毒氣入裏。煩悶不已。食不下。或紫黑內陷。飛龍奪命丹。疔始發脉洪弦洪實。腫甚欲作膿。托裏湯。重者飛龍奪命丹。返魂丹。取疔用紫金丹。

紫金散 外敷之藥 信一錢 雄黃一錢五分 硼砂炒一錢五分

末之。撥開瘡口敷之。不過二次瘥。

赤芍藥湯 內服之劑 金銀花三錢 赤芍藥三錢 大黃 瓜蔞一箇 當歸五分 甘草一錢五分 枳殼一錢五分

分作二貼。每一貼。水酒各一盞。煎不拘時服。

飛龍奪命丹 大南星一錢 雄黃一錢 巴豆一錢 硇砂一錢 黃丹半錢 信半錢 乳香半錢 斑毛十六个去翅足 麝香少許

末之。取蟾酥和丸如黍米大。每服十一二丸。或十四五丸。看瘡大小上下。食後好酒送下。

聖濟托裏湯 乳香明者一兩 眞菉豆粉四兩

末之和勻。每服一兩。甘艸湯調下。

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

返魂丹 治十三種疔瘡 硃砂五錢 胆礬五錢 血竭一兩 銅綠一兩 蝸牛一兩 雄黃二兩 枯白礬二兩 輕粉五錢 沒藥五錢 蟾酥五錢 麝香少許

末之和搗蝸牛蟾酥極爛如芡實大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥丸裹在葱白中用熱酒吞下如重車行五里許有汗出即瘥

紫金丹 治疔瘡毒氣入裏煩悶不已兼治癰疽發背惡瘡神効即返魂丹無蝸牛麝香沒藥和丸如前服法

瘻瘤症八

歌 五瘻多緣氣與痰結於頸項兩頭間若生身體上膚內氣聚成瘤不等閑

論 夫瘻有五氣血石筋肉是也瘤有六骨肉膿血脂石是也瘻但生於頸項之間瘤則遍身體頭面手足上下不拘其處隨氣凝結于皮膚之間日久結聚不散積累而成若人之元氣循環周流脉絡清順流通焉有瘻瘤之患也必因氣滯痰凝隧道中有所留止故也瘻氣決不可破破則膿血崩潰多致夭枉但當破氣豁痰鹹劑以軟其堅結自然消散丹溪云瘻氣先須斷厚味只此一言深達病機

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

之旨也。蓋癭初起如梅李。久則滋長如升斗。大小不一。蓋非一朝一夕之故也。然六瘤中惟脂瘤可破。去脂粉則愈。餘皆不可輕易決破也。愼之愼之。

癭

五癭。破結散。男女項下癭。不分久近。神効開結散。項下結核如梅李不消。以大蜘蛛不拘多少。酒浸研爛。酒調。臨臥服。五癭。用昆布一兩。切碎醋浸。徐徐嚥下自消。

破結散 治五癭 海蛤三分 通草三分 昆布三分 海藻三分洗 胆草三分 枯礬三分 松蘿三分 麥麪四分 半夏二分 貝母二分

末之。酒調服。日三次。忌鯽魚。猪肉。

神效開結散 沉香二錢 木香三錢 陳皮四兩 珍珠四十九顆炒內泥封口 海藻二錢 猪厭肉子生雄猪項紅色四十九个瓦上焙乾 末之。服二錢。

瘤

治瘤大如拳。小如粟。或軟或硬。無藥可療。不可驟用針破。用南星膏。一切癭瘤。不問新久。昆布丸

南星膏 治頭面生瘤。大如拳。小如棗。不知痛痒。

大南星一个 爲末醋調如膏。以鍼輕刺患處。令

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

氣透。然後付之。南星若得新鮮者尤佳。

昆布丸　治一切瘿瘤。不拘久近

昆布 洗一兩小麥醋煮乾　海藻 一兩小麥醋煮乾

末之蜜丸彈子大。每一丸噙化下。

瘰癧症丸

【歌】項頤結核名爲癧胸脇間生是馬刀。手足少陽經絡部。久成遺漏速當消。

【論】夫瘰癧之病者。即古謂丸漏也。形狀不一。生頸項者曰瘰癧生乳腋者曰馬刀。累累然結核大小無定發作寒熱腋水潰漏。其根在臟腑。蓋肝主狼角胃主鼠漏。大腸主螻蟈漏。脾主蜂漏。肺主蚍蜉漏。心主蠐螬漏。膽主蜉蚷漏。腎主瘰癧漏。小腸主轉脉漏。一本漏作瘻。原其所自。多因寒暑不調。或飲食乖節。遂至氣血壅結而成也。後氏所載決其死生者。但反其目而視其中。有赤脉從上。下貫瞳子者死。不下貫者可治。治之大法。以祛風熱潰堅結消痰降火。則瘰消而核散。決不致潰漏之地也。

瘰癧

瘰癧或破或不破。升麻調經湯。不破堅硬如石。散瘰潰堅湯。結核瘰痛。皂子仁丸連翹散

升麻調經湯　升麻八錢　生黃芩四錢　葛根三錢
胆艸三錢　三稜三錢酒炒　桔梗三錢　酒黃芩三錢
連翹三錢　甘艸三錢炙　黃連三錢　廣朮三錢
當歸三錢　白芍藥三錢　知母一兩　黃蘗一兩
每服半兩。水煎服。臥須畧使足高于首。藥可入膈。

散腫潰堅湯　柴胡四錢　升麻二錢　胆艸酒炒三錢
瓜蔞根三錢　黃蘗酒炒三錢　知母酒炒三錢　昆布五錢
廣朮酒炒二錢　三稜酒炒二錢　連翹三錢　白芍藥二錢酒炒
歸尾酒洗五錢　葛根二錢　每服六錢煎服如前。

皂子仁丸治瘰癧結核　皂子仁一斤　玄參一兩　連翹一兩
水五升慢火熬。水盡爲度。搗爛蜜丸彈子大。噙化。

連翹散治瘰癧馬刀　連翹一斤　瞿麥一斤　大黃三兩
甘艸二兩　每服五錢。水煎。服十日後。于臨泣穴
灸二七壯。穴在目上直入髮際五分陷中　再服藥至六十日愈。

馬刀

耳下至缺盆。肩上爲馬刀。潰堅湯。見前　連翹散堅湯。

連翹散堅湯　柴胡一兩二錢　木瓜根一兩　胆艸酒炒一兩
連翹一兩　芍藥酒炒一兩　當歸酒洗一兩　生黃芩七錢
酒黃芩七錢　廣朮酒炒五錢　三稜五錢　炙甘艸三錢
黃連酒炒一錢　蒼朮一錢　服法如前升麻調經湯。

瘡瘍疥癬症十

【歌】瘡瘍痛癢皆心火。疥癬多緣血熱生。乾溼兩端分溼熱。輕揚發散鬱須伸。

【論】經云。諸痛癢瘡瘍。皆屬心火。蓋瘡者。疥癬之總名。瘍者。有頭小瘡也。原病式云。熱甚則灼而爲瘡。潰而爲膿水。猶穀肉果菜。熱極則腐而爲汚水也。又云。熱勝于陰。則爲瘡瘍。然疥有五。乾疥。溼疥。蟲疥。沙瘡。膿窠瘡之別。乾者。以開鬱爲主。溼者。以燥溼爲主。蟲疥以退熱殺蟲爲主。沙瘡以活血清心爲主。膿窠以治熱燥溼爲主。癬亦有五。風癬。頑癬。溼癬。馬癬。牛皮癬之別。皆由肺受邪毒。運于四肢。內生肉蠹。治之之法。不過清熱驅溼。疎風散鬱。涼血殺蟲之劑。治之無不効。雖然疥癬皮膚之恙。非心腹之疾。不足爲患。久而不已。元氣因而虧損。以致尫羸者多矣。

疥瘡

乾疥開鬱爲主。吳茱萸散敷。或黃連大黃末猪胆調敷。溼疥一上散。沙瘡剪草散。膿窠三黃散。

吳茱萸散（乾疥用之）吳茱萸二錢 白礬二錢（枯） 寒水石二錢（五分）

蛇床子三錢 黃蘗一錢 大黃一錢 硫黃一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Do NOT COPY
Princeton University Library

樟腦五分　輕粉五分　檳榔一箇　末之油調敷。

一上散治溼疥　雄黃三錢五分　寒水石一兩　白膠香一兩

黑狗脊一兩　蛇床子一兩　枯白礬五錢　黃連五錢

吳茱萸三錢　硫黃三錢　斑毛十四箇去翅足

末之。和勻。洗瘡。令湯透。去痂。用臘脂油調。手中心擦熱。鼻中嗅二三次。却擦上。一上即愈。

剪草散治沙瘡　寒水石二錢　蕪荑二錢　剪草一錢

枯白礬一錢　吳茱萸一錢　黃蘗一錢　蒼朮五分

厚朴五分　雄黃五分　蛇床子三錢　輕粉二錢

末之。香油調付患處。

三黃散治臁窠　蕪荑半兩　枯白礬半兩　軟石膏半兩

大黃半兩　樟腦半兩　貫衆一兩　蛇床子一兩

硫黃二錢五分　雄黃二錢五分　末之。油調付。

諸瘡癬

乾癬。羊蹄根汁調膩粉塗之。又狼巴草川槿皮。海桐皮。末之。河水調付。或白膠香末入輕粉少許。油調擦之。鐵繡油調塗之。頭瘡。黃丹輕粉枯白礬等分油調付。甲疽瘡。綠礬散。月蝕瘡。胡粉散。上疳瘡。輕粉散。下疳瘡。蘆甘石散。或燈心灰入輕粉少許。乾貼。或熊膽片腦輕粉等分末之貼。大帶瘡。百合

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

根研爛頻付。火丹瘡。遍身赤腫痛。寒水石石膏各三兩。黃蘗甘草各一兩。末之。芭蕉汁調敷。征膚瘡。遍身如魚目無膿。升麻煎百沸。入蜜二匙。鵞羽蘸敷。臁瘡及杖瘡。翠玉膏湯火瘡。白蛤殼煅存性。研末油調搽。極效。或保生救苦散。黑白散。

綠礬散 治甲疽瘡　綠礬炒五錢　蘆薈生一錢　麝香一字

研極細。以小絹袋盛藥。納指于代衣中。扎定。瘡去之。

胡粉散 治凡蝕瘡　胡粉炒一錢　枯白礬一錢　黃丹炒一錢　黃連一錢　輕粉一錢　胭脂五分　麝香少許

末之。洗瘡淨。代藥付之。乾者油調付。

輕粉散 治上疳　黃蘗蜜炙二錢　蜜陀僧三錢　黃丹三錢　高末茶三錢　輕粉二錢　乳香二錢　麝香少許

末之。葱湯洗瘡淨。此藥付之。

蘆甘石散 治下疳　蘆甘石一兩六錢　黃連八錢

用砂鑵內煮。去黃連。曬乾細研。入片腦半錢同研付患處。

翠玉膏 治臁瘡　瀝青一兩　黃臘二錢　銅綠二錢

沒藥一錢

石將銅綠末。入油調勻。將黃臘火上溶開。下銅綠覺勻。入沒藥勻。傾河水盆內。扯勻。油紙裹用時。口

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

噙水洗了。旋捻作餅子。貼瘡紙封。三日一易。

隔紙膏　治臁瘡不問久近。雖腐爛至骨。此藥神效。

龍骨煅三錢　鉛粉三錢　鉛丹三錢

末之。香油或桐油調用油紙夾隔貼之。次日又番過貼。洗淨後。方可貼。

保生救苦散　治火燒湯盪。或熱油烙及脫肌肉者

寒水石三錢　大黃三錢　黃蘗三錢

右爲末。香油調塗患處。如濕爛乾摻之。

黑白散　治湯盪火燒爛去肌肉見骨者

百草霜三錢　[illegible]粉一錢　[illegible]分

[illegible]爲末。狗油調搽患處

痔漏症十一

[illegible]氣血脉腸牝牡蟲。七般痔狀要精通。或因風濕侵于外。醉飽過傷熱蘊中。

[illegible]經云。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。善人之藏府本虛。外傷風溼。內蘊熱毒。醉飽交接。多欲自戕。以故氣血墜下。結聚肛門。宿滯不散。衝突爲痔。故古人有七痔之目。牡痔者。肛邊發露肉珠。狀如鼠乳。時時滴潰膿血。牝痔者。肛邊生瘡。腫痛出血。其頭反陷入。脉痔者。腸口頻頻發癰。且疼且痒。出血淋

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

濟腸痔者腸內結核有血寒熱往來登圊肛血痔者每遇大便清血隨下不止蟲痔者肛門浸淫溼爛內有蟯蟲蝕其腸爲瘡氣痔者大便難强力努之則肛出不收此七痔之狀雖殊大抵以解熱涼血順氣爲主蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不運氣與血俱滯乘虛而墜入大腸所以爲痔凡諸痔久不愈必至穿腸而爲漏此因痔而成漏也當涼血寬大腸自愈亦有外傷四氣內窘七情與夫飲食乖常染鍼蠱動含鍼之毒未有不變爲瘻瘡穿孔膿汁不盡得冷而風邪併之涓涓而成漏矣蓋漏者諸瘻之濃也諸瘻者如狼瘻暴瘻蟻瘻螻蟈瘻蚍蜉瘻蜂瘻蟻蛆瘻蜉蛆瘻轉筋瘻瘰癧瘻之類內經云瘻即漏也所謂漏者以其穿孔而流膿水與血水像缸甕之漏孔故也瘻者如蟲豸之穿蠹蛀孔也如巢氏病源所謂十瘻三十六瘻之說名雖不同其理一也不必悉舉大抵漏有新久新者帶鮮紅或微腫或小核久者上槁白肉黑爛蟲惡臭生焉丹溪云漏瘡先須服補養血氣藥外用附子餅按瘡上以艾炷灸之直至肉平爲效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

諸痔瘡

痔瘡專以凉血爲主。參芪槐角湯。痔及腸風下血。脫肛槐角丸。翻花痔。荊芥朴硝煎湯洗。次用木鼈子鬱金末入龍腦付。或以熊膽片腦和勻貼之。或以米醋沃燒紅新磚熏之。日三五次。

參芪槐角湯　人參一錢五分　黃耆一錢五分　生地黃一錢　川芎一錢　當歸一錢二分　升麻一錢　條芩一錢炒　枳殼一錢炒　黃連一錢炒　槐角一錢　刺一劑。水煎服

槐角丸　治諸痔及腸風　槐角兩　防風五錢去芦　地榆五錢　當歸五錢　枳殼五錢　黃芩五錢　末之丸。米湯下

諸漏瘡

漏有三十六種。名狀雖多。而治法則一。丹溪云漏須大補氣血。人參白朮黃芪川芎當歸爲主佐以刺蝟蛇蛻牛角觸蜂房之類。大劑服之。外用附子末。以人津唾和作餅。如錢厚。放瘡上。以艾灸之。令微熱。但畧覺有微痛即止。每日三四次。逐次換藥餅。直灸至肉平爲效。一人原有痔。又于肛邊生一塊。皮厚腫痛。作膿。就在痔孔中出者。當作食積注下治之。黃連散。

黃連散　痔漏仙方　黃連三錢　阿魏三錢　神麯三錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library