PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

10

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/255T
V.10

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

婦人科 一切衆病男子同治經門水帶等血證不論婚否人皆有之

經候一

歌婦人天癸有常經血滿衝任應月行不及期來即是熱過期血少自分明若然色淡因寒多來紫黑形氣滿臨行先作痛虛時行腹中疼多不住加涼血來少無疼人補榮經閉要推虛寒候血枯氣瞞熱瘀因

論夫經者常也然衝任二脈爲經脈之海血氣之行外循經絡內榮臟腑氣血調適運行不息一月之

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University the Gest Collection Library

間。衝在血溢而行經云。月事以時下。此常經也。其或太過不及。或多或寡。或紫或淡。則失其常候而爲之病也。故有虛實冷熱之殊。善治者。必審其因而調之。復令充其元氣。以復其初。斯無病患也。

按諸氏云。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。不踰十年。思男子合亦不調。不調則舊血不出新血不行。或潰而入骨。或變而爲癰。寇氏亦云。室女經閉成勞者多。由積想在心。故也。王節齋曰。婦室經脉不行。多因脾胃傷損。不可便作經閉血凝。

整用通經之藥。過有此症。便須審其脾胃如何。若飲食減少。或因誤服汗下攻劫之藥。以致血少而不行者。只宜補養脾胃。用加減芎歸湯。若飲食減少。臣佐以黃耆甘草。陳皮麥芽山楂。當歸柴胡等藥。脾旺則能生血。而經自行矣。又有飲食停滯。致損脾胃者。亦宜消食補脾。若脾胃無病。果有血塊。宜結者。方宜行血通經。

脈經曰。寸關調和。故而尺脈絕不至者。月水不利。當患少腹引腰痛。氣滯止攻胸膈也。○寸口脈浮而弱。浮則爲虛。弱則無血。○關脈沉。主月水不利。腹

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

脹滿。○尺脉滑。血氣實。痛。經脉不利。○少陰脉弱而微微則血少。弱則發熱。

虛

經候行過而作痛者。血氣俱虛也。八珍湯。經水過期而行。血不足也。四物湯加黃芩。陳皮。經水不調而血色淡黃者。血少也。四物湯加人參。黃耆。香附。腹中痛。加炒艾。阿膠。血氣受虛。或生育多而瘦弱。經閉不行。四物加桃仁。紅花。

四物湯　此湯名為婦人室女補血要藥也

當歸身二錢　熟地黃二錢　川芎一錢　白芍藥炒二錢

右劑一劑。水二盞。煎八分。服加減法見血海。

八珍湯　此湯大補氣血兩虛。名八物湯。

白朮炒二錢　白茯苓一錢　人參一錢　甘草炙五分

當歸二錢　熟地黃二錢　川芎一錢　白芍藥炒二錢

右劑一劑。水二大鍾。煎至八分。空心服。

熱盛

經水不及期來者。血熱也。四物湯加黃芩黃連柴胡香附。經水來而血色紫黑者。并溪云。血紫黑。熱極從火化故也。經水去必多。或作痛。四物湯加黃芩黃連黃檗。若為藥。經水去多。十數日行不止。此

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

血熱也。三補丸加莎草根敗龜板荊芥生也柴胡。

三補丸　治三焦熱火之要藥。便火邪退而血自清。

黃連三錢去毛炒　黃芩二錢炒　黃蘗三錢去皮炒褐色

右為極細末。蜜丸白湯下。加山梔名梔子金花丸。

四物湯方見前

痰多

痰多佔住血海地位。因而下多。日必漸省。星苓丸。

肥人經閉是痰。瘦人經閉是氣滯。四物湯加木香檳榔枳殼香附桃仁紅花。

經水過期名痰也。裸湯加川芎當歸貝母。

花粉瞿行腹先痛。氣滯血實也。四物湯加玄胡索。

蓬朮枳殼木香桃仁香附。

星苓丸　治女人脂肥痰多。佔住血海。因而下多者。

南星製四兩　奢朮泔浸四兩　川芎四兩　香附童便浸三日炒四兩

右為細末。蒸餅糊丸。菜豆大。每服百丸。白湯送下。

二陳湯　此湯治痰之都管。但引用不同。隨宜斟酌。

陳皮一錢半　半夏薑製一錢　茯苓一錢去皮　甘草炙六分

右剉一劑。水二鍾。生薑三片。煎至八分。空心溫服。

薑痰湯　即二陳湯加南星炮一錢。枳殼炒一錢。

帶下二

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

歌婦人帶下爲何因。風寒氣熱乘胞門。痞氣累帶子帶脉。因而帶下得其名。濕痰下注或濕熱。赤白須將氣血分。

論大帶下者。由濕痰流注于帶脉而下。濁液故曰帶下。良方以爲起于風氣寒熱之所傷。或不避風邪。入於胞門。或中經脉。留停臟腑而發。或傷于五臟。而見五色之帶。但專用燥熱治之。亦誤其矣。機要以赤者爲入小腸。白者爲入大腸。其本實熱鬱結不散。則爲赤白濁下。多用寒涼攻下之劑。東垣以血少復亡其陽。故白濁之物下。無赤有濕痰流注

于陰。或腎肝陰淫之證。勝。或緣驚恐而木乘土位。濁液下流。或思慕爲筋痿。所謂二陽病也。多用補劑而兼升提。丹溪專主濕熱。予注。故以化痰而兼止濕之劑。古人立論。殆盡病情。而治法無定。後學弗知所措。不能無疑。大抵屬痰與熱者居多。陰寒者十無一二。學者仍須精察虛實遲數之脉。細審寒熱濕痰之症。治之斯無執一之患也。

脉帶下鼎中。脉多浮動。虛遲者輕實數者重

寒

白帶腥臭。多悲不樂者。寒也。陽氣極虛。桂附湯。婦

人亦白帶下。脉息沉微。腹痛。陰中亦痛。經水行愆期。子宮虛冷。不能成孕者。元戎六合湯。

桂附湯　治婦人白帶腥臭多悲不樂。大寒之症。

肉桂一錢　附子炮三錢　知母酒炒五分　黃蘗鹽酒炒五分　甘草炙五分　升麻五分　人參七分　黃耆蜜炙一錢五分

右劑。水二盞。煎八分。食前溫服。

元戎六合湯　治婦人帶下。腹中疼痛。陰中亦痛。

即四物湯四錢　見前經候條　加肉桂附子名五分　食前煎服

虛

白帶久不止。腰腹冷痛。陰中亦痛。經水不止或間崩後脉弱無力。瘀痛。東垣固真丸。產後去血過多。經水不調。白帶如傾。淋瀝腥穢。衛生湯。

東垣固真丸　治白帶久不止。腰腹冷。疼。陰中亦然。

白石脂燒赤一錢另研　柴胡酒製去皮一錢　黃蘗去皮酒炒一錢　當歸身二錢　白芍藥一錢　乾薑炮四錢　白龍骨煅二錢另研

右爲細末。水煮糊丸如梧桐子大。每十九空心下。

衛生湯　治帶下不止。脉微而弱。臍腹疼痛。

白芍藥三兩　當歸身三兩　黃耆蜜炙三兩　甘草一兩

右劑。水二盞。煎至八分。空心服。熱

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

內熱脈數。赤白帶下不止。枸杞根一兩。生地黃五兩。酒一斗。煮至三升服。赤白帶。內火盛。陰虛煩熱。二黃三白丸益母草末酒調服。或白芷散。

二黃三白丸　治白帶。因七情所傷。而脈數者。

扁柏酒蒸　黃蘗炒　五錢　香附醋炒　白芍藥炒　一兩　白朮炒　一兩　黃連炒　五錢　椿皮炒　二兩　白芷煅存性　二兩

右爲末。粥丸如梧桐子大。每服七十丸。米湯送下。

白芷散　治赤白帶下。火熱內盛。

白芷　一兩　鬍髮　一團　海螵蛸　二枚　煅　爲末。酒送下。

濕瘀結注于下。白帶淫濁。先以小胃丹開導。閉塞後用白朮丸。濕瘀下注。宜夏南星海石炒黃蘗等。

朱樸根皮青黛香附滑石蛤粉陳皮蒼朮。

小胃丹　取腸上溼痰熱結。須以意消息之。欲利。空心服。

芫花　半兩　好醋拌一宿　瓦器內炒不住手攪令黑不要焦

甘遂　半兩　溼麪裹長流水浸半月再用水煮曬乾

大戟　半兩　長流水煮一時再用水洗曬乾

大黃　一兩半　溼紙裹煨勿令焦切片焙乾再用酒潤炒熟

黃蘗　三兩　炒褐色　爲細末。粥丸如麻子大。白湯送下。

白朮丸　治赤白帶先以小胃丹開導。後用此補之

白朮二兩炒　黃芩五錢　白芍藥七錢炒　紅白蓁花二錢半

右爲極細末。蒸餅糊丸。空心煎四物湯下五十丸。

澼熱

肥人白帶。陰戶痛身黃皮緩身重。陰中如水濕也

升陽燥濕湯　澼而挾熱者大便或泄或閉小便澀脉實而氣盛澼熱者十棗湯下之。

升陽燥濕湯　治白帶陰中痛身重如山身黃皮緩。

黃芪一錢炒　柴胡八分　防風七分　蠶一錢　甘艸六分

陳皮八分　良薑一錢　乾薑一錢　神麥仁一錢

白蓁花七朵　劍水二鍾。煎至八分。空心服。

十棗湯　治濕痰猛烈之邪用之者當以意消息

甘遂五分大戟五分芫花五分棗十枚

右用水二鍾。煎八分。溫服。以利爲度。

崩漏三

歌　婦人何故有崩中。只爲勞傷任與衝。經爲氣虛無約制。故令暴下若山崩。因寒因熱因然鬱。損帶補兼升自有功。

論　夫婦人氣血調和。則經水依期而來。何崩漏之有。若勞動過極。臟腑俱傷。衝任之脉氣虛。不能約制其經血。故忽然暴下。若山崩然。故曰崩中。丹溪云

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

血崩症。有因勞損而致者。有挾熱者。有挾寒者。有因氣血不足者之不同。當辨明而治之。

脈經曰。婦人漏血下赤白。日下血數升。脈急數者死。遲者生。婦人漏下赤白不休。脈小虛滑者生。大緊實數者死。

勞損

因勞損衝任脈虛。血非時下。臍腹冷痛。崩中脈遲。

伏龍肝散　治勞傷氣血衝任脈虛

伏龍肝一兩　赤石脂一兩　參門冬一兩半　卵炙　川芎三兩　當歸七錢　乾薑七錢　甘草半兩　艾葉三兩　熟地黃四兩

右每服四錢。水煎服。

當歸芍藥湯　治崩漏不止。氣短氣逆。自汗之力。

黃耆一錢　蜜炙　白朮一錢　炒　甘草一錢　炙　蒼朮一錢　浸晒乾炒　白芍藥一錢　熟地黃五分　陳皮五分　當歸身三分　酒洗　生地黃三分　柴胡二分

右用水煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

虛而挾熱

氣血兩虛。四物湯加參耆。崩不止。小薊湯。荊芥散。如聖散之類。選而用之。血虛甚者。四物湯加焦薑。崩不止。香白芷。白艸霜。櫻櫚灰之屬。腎虛不能鎮相火而崩。涼血地黃湯。陽盛陰虛。血熱沸溢。黃芩湯。經漏下血。脈虛洪。其血紫黑。此熱極反兼水化制之故。紫色成塊。熱之極也。生地黃散。或四物湯。加黃芩黃連。其藥知母。

四物湯　方見前條下

小薊湯　治衄血。血虛而熱。太甚。服之不止。

小薊葉汁一盞　生地黃汁一盞

白朮半兩

入水一盞。煎至半盞。溫服。

荊芥散　治女人崩中不止

荊芥一味。不拘多寡。于瓦油燈上燒灰存性　末之。每三錢。童便下。

如聖散　治血山崩

櫻櫚一兩燬存性　烏梅一兩燬　乾薑一兩五錢燬

右爲末。每服二錢。烏梅酒調下。空心時服

生地黃散　治女人經漏下血。脈洪。血色紫黑。成塊

生地黃一錢　熟地黃一錢　枸杞子一錢　天門冬去心一錢

柴胡八分　黃連去毛一錢　白芍藥八分　地骨皮去骨一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

甘草七分　黃芩一錢　黃蓍一錢半　淡豉一錢

右劑作一劑。水二大鍾。煎至一鍾。空心溫服。

涼血地黃湯　治因陰虛不能鎮守相火。以致崩漏。

黃芩三分炒　荊芥三分　蔓荊子三分　黃檗二分鹽水炒褐色　知母二分酒炒　蔡本二分　細辛二分　川芎二分　黃連一錢炒　羌活五分　柴胡三分　升麻三分　防風三分　生地黃一錢　當歸五分　甘草五分　紅花少許

劉云一劑。水二盞。煎八分。空心溫服。

黃芩湯　治內熱。漏下血分。

黃芩炒二錢　芍藥炒一錢半　甘艸一錢　劉云一劑。水煎服。

挾寒濕

崩挾寒濕。升麻除濕湯。崩中。腰腹冷痛。脈遲。身寒。伏龍肝散

升麻除濕湯　治漏下惡血。宜飲食失節。水溼所致

羌活一錢　柴胡一錢去苗　蒼朮一錢泔浸　黃芪一錢蜜炙　防風一錢去芦　甘草炙一錢　升麻一錢　葉本一錢　蔓荊子七分　獨活五分　當歸五分　劉一劑。水煎服

伏龍肝散　方見前

胎前四

[歌]崩前衆疾要知。惡阻當從痰火推。胎上奏心胸

脹悶。子懸苓元。朮。炒。山梔。妊娠漏下名胎漏。血熱而成或氣虛。胎不安。芎歸及膠艾安胎順氣勿敎遲子淋須覓安娶。胎不漏當用鯽魚。腫滿遍身如水氣但煎防己。白朮寬令。足趺浮腫身無恙。皺脚安胎大腹皮。五加皮以來頗驗甚。子煩知母麥冬。醫妊娠腹痛分虛實寒熱溫涼可辨之子癎急用羚羊角。兒童喜歸芎奇。泄瀉砂蒼入二白。熱須芩朮倍之宜。風寒感冒參蘇飲。不解黃龍湯勿疑。胸滿本方加枳朴。熱而無汗荊根。驅裏熱甚時草胎散。熱極痙厥。解毒急。脈沉遲理中治。熱泄柴芩半夏

瘀汗吐下溫須仔細安胎為主勿差池清脾瘧瘧須除半。四獸祛邪更補肥。痢。疾香連湯有驗。胃風止痢補其虛。傷風咳嗽參蘇飲去半加苓杏白皮。便秘不通大腹散。小溲不利用冬葵。怔忡恍忽心驚悸。氣悶喧呼大聖祛。心痛小龍湯可定。腰疼遍氣更誰如達生散可將胎東。煩服須當見月時。

論夫婦人妊娠貴乎衝任之脈興盛。元氣充足則飲食如常。身體壯健。色澤不衰。而無病患相侵。故月水以時下。始能受孕。血氣充實。則可保十月滿足。分娩無虞。母子堅牢。何疾之有。若血氣不充。衝任

之脉虛弱。則經水愈期。豈能受孕。縱然得孕。則胞門子户虛寒。血受胎不實。或衝任之脉虛而協熱。輕則胎動。而不安。重則三五七月而即墮。過陽月分而墮者。尤能傷物也。更兼汗出狹六淫之邪。內因七情之氣。或飲食太過。致傷中血。或淫慾無度。內損元氣。如斯之類。鮮有不致疾者也。按凡胎孃有衆疾。必先以安胎爲主。驅疾次之。蓋病去則胎自安。胎固則病自愈矣。

脉訣規正曰。血氣和調。有子之象。手之少陰。其脉動甚。按不絕。此爲有孕。少陰屬心。心生血。腎爲胞門。脉應寸尺。或寸微關滑尺數。

來流利。如雀之啄。或參三部。浮沉一止。或平而虛。當問月水。婦人有病。而無邪。脉此孕非病。所以不月。○男女之別。以左右取左疾爲男。右疾爲女。沉實在左。浮大在右。右又左男。可以意測。離經六至。沉細而滑。陣痛連屬。胎即露脫。血液慈愛而大者。生虛小緊者。即是死形。半產漏下。革脉主之。豹即血耗。立見傾危。○懷妊六七月。脉實大牢強弦急者。生。若沉而細者。死。

惡阻

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

妊娠二三月以來。吐逆不食。心虛煩悶者。名曰惡阻。人參橘皮湯主之。丹溪云。肥人惡阻。因痰。二陳湯加黃芩白朮竹茹貝母去半夏。瘦人是火。前方再加黃連山梔仁。

人參橘皮湯　治妊娠三月。惡阻吐逆。不食煩悶。

赤茯苓（錢半）　橘皮（錢半）　白朮（炒一錢）　麥門冬（湯泡去心一錢）

厚朴（薑炒一錢）　人參（一錢）　甘草（炙八分）　竹茹（一錢二分）

右劑一劑。水二鍾。生薑五片。煎至八分。空心溫服

二陳湯　方見前。餘俱下

子腫

妊娠五六月以來。浮腫如水氣者。名曰子腫。俗呼爲疏璃胎是也。防己湯主之。妊娠面目俱浮。身腫如水。氣急而虛者。白朮散。

防己湯　治妊娠通身腫滿。如水氣喘促。小便不利

防己（一錢五分）　桑白皮（一錢五分）　赤茯苓（去皮一錢五分）

紫蘇（一錢五分）　木香（九分）　薑三片。水二鍾。煎服。

白朮散　治妊娠面目俱浮。身腫如水。氣急而虛者。

白朮（一兩）　生薑皮（五錢）　大腹皮（五錢）　陳皮（五錢）

右爲細末。每服二錢。米飲調下。

子煩

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

妊娠五六月。乃少陰君火以養精。六七月。乃少陽相火以養氣。平素有火人。內外之火相感。而作煩燥悶亂不安者。名曰子煩。麥門冬湯或安神丸。

麥門冬湯　治妊娠五六月煩悶不安。名曰子煩。

麥門冬（湯泡去心）一錢　防風一錢　茯苓一錢　竹葉一十片　黃芩一錢（炒）

劑一劑。水二盞。煎服。

安神丸　安胎孕。除煩熱。

黃連（兩半去鬚酒炒）　硃砂（水飛一兩）　生地黃（五錢酒洗）　當歸身（酒洗五錢）

甘草（炙五錢）

右為末。蒸餅和丸。如黍米大。硃砂為衣。每服五

十丸。

蒲胎

妊娠經血不時而來者。名曰蒲胎。氣虛者。四君子湯加黃芩阿膠。血虛者。四物湯加白朮黃芩黃連。

益母草主之。

四君子湯　大補氣虛胎蒲

白朮（炒）一錢半　人參（二錢）　白茯苓（一錢）　甘草（炙）一錢

右劑一劑。水二盞。煎八分。溫服。加減見脾胃症內。

四物湯　方見前經候篇下

墮胎

婦人妊娠。七八月以來。胎氣漸粗。兩足浮腫。頭目

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

不浮者。名曰皺瘺。平胃散。寬孕五六月兩足腫止
腿膝。或足指間出黃水。名曰水氣。天仙藤散。
平胃散　除濕行氣。消腫安胎。
蒼朮　一斤　陳皮　十二兩　厚朴　十二兩　甘艸　六兩
末之。每服二錢。入鹽一捻。白湯調下。或用水煎服。
天仙藤散　治妊娠三月以後。兩足浮腫。步履艱難
天仙藤　洗晾炒　六兩　香附　醋炒　六兩　陳皮　六兩
烏藥　五兩　甘艸　四兩
末之。每服三錢。薑二片。木瓜三箇。紫蘇三葉。煎服
子懸
重墜至四五箇月以來。若二火養胎。平養不安。
故胎熱氣逆。胎上奏心。不安胸膈。脹滿。名曰子懸。
嚴氏紫蘇飲　治胎氣不和。上奏胸膈。脹滿疾痛。
大腹皮　一兩　川芎　一兩　白芍藥　一兩　陳皮　一兩
紫蘇　一兩　當歸　一兩　人參　半兩　甘艸　半兩
每服四錢。生薑三片。葱白一莖。木瓜二片。煎八分服。
子淋
婦人因酒色過度。內傷膀胱。或飲食不節。熱不道。
瀝。小便淋瀝漏者。名曰子淋。安榮散。加減者六味

丸。或參苓飲。內熱而淋者。五淋散。

安榮散　治妊娠小便澀少。名曰子淋。

麥門冬 三錢 通草 三錢 滑石 三錢 當歸 五錢
燈心 五錢 甘草 五錢 人參 二錢 細辛 二錢

右爲細末。每服二錢。白湯調下。

六味丸　治妊娠因虛以致水道不通。淋瀝澁痛。

山藥二兩 熟地黃三兩 酒蒸 山茱萸去核 二兩
白茯苓二兩 皮一兩 肉桂 五錢 附子炮去皮臍 五錢

末之。煉蜜丸如梧子大。每服六十丸。空心鹽湯下。

參苓飲　治妊娠轉胞。

人參一錢 去芦 白朮一錢 炒 半夏製入 分 陳皮 分 甘草七分 薑水煎服。

五淋散　治妊娠小便不通。淋瀝澁痛。

赤茯苓 兩半 赤芍藥 兩半 山梔仁 兩 生甘草 兩半
當歸 五錢 加黃芩 五錢 每服五錢。空心水煎服。

子癎

妊娠發癎。名曰子癎。熱多寒少者。清瘛湯飲去半夏。寒多熱少者。人參養胃湯去半夏。虛者四獸飲。或勝金丹servicing之。

清瘛飲　治妊娠癎病。去半夏。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

柴胡一錢二分半 夏一錢去之 黃芩一錢 白朮一錢炒 陳皮一錢 茯苓八分 厚朴八分 青皮七分 神麯六分 甘艸四分 薑三片 棗二枚 水煎熱服

人參養胃湯 治妊娠瘧寒多熱少

人參一錢去芦 藿香葉一錢 厚朴薑炒一錢 蒼朮一錢浸晒乾炒 茯苓一錢二分 陳皮一錢五分 神麯六分半夏八分去之 甘艸五分 加烏梅一箇 生薑三片 水二盞 煎服

四獸飲 治孕婦虛瘧久不得愈必用此藥主之

人參一錢去芦 白朮一錢炒 陳皮一錢二分 白茯苓一錢二分去皮 甘艸五分 半夏八分去之 棗子三枚

烏梅三箇 生薑三片 水二大盞煎八分溫服

勝金丹 治婦人懷孕瘧疾久不已以此截之

川常山酒蒸四兩 雞心檳榔一兩

右爲細末醋糊丸如菀豆大未發前三更時先吞三十丸至五更時再吞十五丸俱用新酒冷送下

胎動

婦人胎動不安已有所見者芩歸湯加阿膠艾無所見者安胎飲元氣虛者加人參白朮如若氣不順者本方加砂仁大腹皮薤艾香附杜藿

芩歸湯 一名芩歸飲 一名佛手散

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

川芎 二錢 當歸 一錢 水二盞煎八分。空心服

安胎飲 治婦人胎不安。氣不利。

紫蘇 一錢 當歸身 一錢 白朮炒 一錢 條黃芩 署炒一錢

川芎 八分 陳皮 五分 香附 六分 白芍藥 七分 緩炒

甘艸 五分 大腹皮 六分 砂仁炒 六分 一水煎溫服。

胎水

婦人胎孕五六箇月。腹大異常。不分男女。胸腹脹滿。氣逆不安者。此一胞中蓄水也。名曰胎水。若不急治之。決然足腫。短形體發疾。或生下。即要此症人多不活。鯉魚湯治之。以泄其水。

鯉魚湯 治妊娠腹大異常。若不早治。必致母子俱斃

當歸 酒浸 二錢 白芍藥 二錢 白朮 四錢 白茯苓 五錢

右剉二劑。用鯉魚一箇。不拘大小。破去鱗腸。白水煮熟。去魚。每服用魚汁一盞半。生薑七片。陳皮少許。同煎至一盞。空心煎服。如未盡。再服之。

子癎

婦人妊娠。三五箇月以來。忽然失音。不能言語者。名曰子癎。或伯日。無治也。當十日復。更胎氣便然。非藥可療。直待分娩後。即能自言也。

見暈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

婦人妊娠七八月以來。忽然卒倒殭仆不知人。頃刻即甦者。名曰兒晕。當根湯若氣血兩虛。因而卒倒者。八珍湯加黃耆。

葛根湯　治婦人妊娠二三月以來。忽然卒倒殭仆。

葛根三錢　麻黃連節三錢　桂枝二錢　芍藥二錢酒炒　甘草炙二錢　薑三片棗二枚水煎服覆取微汗。

八珍湯　見前經候條下

泄瀉

妊娠泄瀉不止。小便清白者。三白散加砂仁厚朴蒼朮甘草。若泄瀉頻頻。腹痛裏急後重。熱者黃連炒

加白朮不過夜。冷痛加芍藥砂仁黃連炒

散　治孕婦泄瀉。令無氣健脾。和中養胃。

白朮炒三錢　芍藥酒炒二錢　白茯苓去皮三錢　甘草五分

右剉作一劑。水二鍾。煎至一鍾。空心溫服。

六君子湯　見前痛條下

痢

治婦女平痛。後重裏急者。香連化滯湯。

治婦女積滯不行。裏急後重。頻欲止圓

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT copy

薑皮一錢　厚朴一錢　薑炒　枳實炒一錢
黃芩一錢　炒　黃連一錢　炒　當歸酒洗一錢　白芍藥炒一錢
陳皮一錢二分　檳榔八分　木香五分　甘艸四分　灸

右剉作一劑。用水二大盞。煎至八分。空心時溫服。

黃芩芍藥湯　治妊娠痢疾腹痛口渴。後重裏急之症。

白芍藥一錢　當歸一錢　黃芩一錢三分　黃連去鬚酒炒一錢二分
肉桂四分　檳榔八分　木香六分　甘艸四分　灸

大黃生用量人虛實臨時酌用

用水二盞。煎至一盞。溫服。

實腸湯　治孕婦久痢。元氣虛耗。日夜頻併。無度之症。

人參一錢　白朮土炒　當歸一錢　白芍藥去皮
川芎一錢二分　肉桂四分　白芍藥酒炒一錢二分　水煎溫服

香連丸　治妊娠痢久而不已。此方主之甚驗。

黃連一斤四兩。研細。用夫茱萸十兩。同拌炒。去萸不用。湯少許。傾入臼內。泡一時。取出同炒法。

黃連　木香　四兩半　不見火

右俱爲末。用雞子清少許。入酷糊丸。每用二錢。

二便不通

妊娠大小便不通者。乃臟腑混濁所致也。四物湯加枳實厚朴黃芩。若小水不通者。胞中有熱故也。

冬葵子湯。

四物湯　方見經候條下

冬葵子湯　治妊娠小便不利。身重惡寒。起則頭眩。

冬葵子 兩半　茯苓 二兩　未之 每服二錢。米湯調下。

腰痛

妊娠腰痛。最爲緊要。蓋女人胞胎繫于腰。故腰痛酸急者。胞欲脫腎。必欲產也。若挫閃氣不行腰痛者。通氣散。腎虛腰痛者。青娥不老丸。大抵要固胎爲主。

通氣散　治孕婦困挫閃。或氣滯腰肉疼痛。

補骨脂 不拘多少　五味子 炒　杜仲 一斤 薑炒　破故紙 半斤 炒　胡桃肉 二十個

右末之。先臍前桃肉一個。空心溫酒調下二錢。

青娥不老丸　治妊娠腎虛腰痛。或風寒乘之。

杜仲 一斤 薑炒　破故紙 半斤 炒　胡桃肉 二十個

右末之。蒜四兩搗爛。丸如桐子大。每三十丸。酒下。

腹痛

妊娠腹痛。須辨其寒熱虛實。寒者脈遲。理中湯。加砂仁香附。熱者脈數。黃芩芍藥湯。加白朮桂枝。虛者。乃血滯不能養胎。脈無力。四君子湯。加炒芍藥當歸。實者脈有力。香蘇湯。大便不通。加厚朴芍藥黃芩。

理中湯　治孕婦觸冒寒氣。腹中疼痛。必用此湯去之

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

人參一錢二分　白朮炒一錢半　乾薑炮一錢　甘艸炙一錢

右劑一劑。生薑三片。水二大盞。煎至八分。空心服。

香設湯　治妊娠氣不滿爽。心腹脹滿或痛。爲實也

香附五錢炒　枳殼四錢炒　茶之每服二錢。白湯送下。

黃芩芍藥湯　方見前痢疾條

四君子湯　方見前胎漏條內

心痛

妊娠心痛。非心痛也。乃胎氣上升所致。名曰子懸。用順氣養血安胎飲。又有客熱客寒。若客熱犯胃。而嘔者。二陳湯加山梔香附。白朮黃芩。若客寒犯胃。而痛者。二陳湯加良薑。吳萸。

半夏客寒犯胃而痛者。火龍湯。半夏豆蔻丸

二陳湯　方見前惡阻條內

火龍湯　治婦人妊娠心痛。因客寒犯胃氣。

艾葉五錢鹽炒熟　高香五錢炒　川椒肉五錢炒

右劑作二劑。水二大盞。煎至八分。空心晨熱服。

半夏豆蔻丸　治孕婦寒邪犯胃。心腹疼痛。用此丸。

半夏一錢四分製　白豆蔻八分裹煨熟去心　益智八分炒　白僵蠶八分

陳皮一錢四分去白　人參八分　黃芪一錢炙　吳萸八分洗去汙　黃芩八分

甘艸生炙各三分　當歸身六分去蘆酒炒　青皮六分去瓤炒

神麴炒四分　薑黃四分　半夏四分　吳萸五分泡去之

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
Property of the Gest Collection
Princeton University Library

澤瀉六分　去毛　麥門冬炒六分　枳仁七箇　去皮尖

右為末蒸餅丸如梧子大每服三十丸白湯送下

怔忡

妊娠怔忡。脈亂驚悸不安。夜臥不寧。恍惚氣急促者。大聖散。血少神虛。心不寧者。益榮湯。火盛者。安神丸。虛而心不寧怔忡者。定志丸。

大聖散　治孕婦。因驚而發。使心神不定。惱恍怔忡。

川芎　兩　黃芪　蜜炙兩　當歸　酒浸兩　木香　兩

人參　去芦一兩　甘草　炙一錢　白茯苓　兩　麥門冬　一兩

右剉。每用七錢。生薑三片。水二盞。煎八分。空心服

益榮湯　治婦人心神不寧。怔忡驚悸。恍惚悲泣。

當歸　一錢二分　黃著　蜜炙一錢　遠志　去心一錢　酸棗仁　炒熟一錢

茯神　去木一錢　紫石英　八分　木香　一錢　柏子仁　炒一錢

人參　去芦一錢　白芍藥　炒八分　甘草　炙三分

右剉一劑。水二大盞。生薑三片。煎八分。空心温服

安神丸　抑火寧心。安神定志。婦人患此。必用此丸。

黃連　兩半　酒炒　硃砂　一兩　生地黃　一兩　當歸身　一兩　俱用酒洗

甘草　炙五錢　末之蒸餅丸如黍米大。硃砂為衣。

定志丸　治婦人妊娠。心虛不足。恍惚多惡之症。

遠志　一兩　去心　人參　一兩　去芦　蒲黃　一兩　白茯苓　二兩　去皮

PO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右末之。蜜丸。梧子大。辰砂爲衣。每三十丸。米湯下

咳嗽

妊娠咳嗽。因外感風寒者。參蘇飲去半夏。加桑皮杏仁。火乘肺金。而咳嗽者。二陳湯去半夏。加黃芩黃連枳殼桔梗貝母。有痰。加瓜蔞仁前胡桑白皮。

參蘇飲

治娠婦外感風邪。咳嗽。鼻塞聲重。紫蘇葉一錢 陳皮去白一錢 前胡七分 白茯苓去皮十分 枳殼微炒七分 桔梗七分半夏七分半 葛根七分 人參六分 甘草三分 薑三片 棗二枚 水煎服

二陳湯方見痰飲

羚羊角散

治妊娠中風。頭項强直。筋攣語澀。痰涎壅盛。人事不省。名曰子癎。羚羊角 鎖陽 川獨活 酸棗仁炒熟 五分 五加皮 薏苡仁 防風去芦 當歸 五分 川芎 五分 京芎 五分 杏仁五分 木香二分 甘草二分 劑一劑。水二盞。煎八分。不拘時服

舉輕古拜散

治婦人臨產前後中風。俱宜此湯。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

荊芥穗 末之每用二錢。豆淋湯調服。

傷風

妊娠傷風頭痛鼻塞聲重咳嗽甚至發熱者。參蘇飲去半夏取微汗。如肺火旺盛。風熱不清。壅熱于頭亦有頭痛身熱鼻塞聲重咳嗽音啞流涕之候

雙解散去大黃朴硝石膏

雙解散治婦人一切風熱之症。又名防風通聖散

防風一錢 當歸一錢 川芎八分 白芍藥炒八分 滑石炒八分 黃芩炒八分 大黃臨時酌用 梔子炒八分 甘草炒八分 荊芥八分 白朮一錢 連翹仁去心八分

右剉一劑。水二盞。煎一盞。去滓。臨臥服。

滑石 甘草 黃芩 梔子 連翹 白朮 荊芥 防風 當歸 川芎 芍藥 大黃

無汗七分 滑石 甘草 黃芩 梔子 連翹 白朮 荊芥 防風 當歸 川芎 芍藥 大黃

右剉一劑。水二盞。煎一盞。去滓。臨臥服。

參蘇飲 治感冒風邪咳嗽

參蘇飲

傷暑

妊娠正當炎暑。忽冒暑氣。煩渴悶亂不安。香薷飲加黃連白扁豆人參。或干姜香薷飲渴甚熱極者加麥門冬五味子石膏黃芩知母天花粉。

香薷飲 治孕婦傷暑渴悶不安身熱煩燥之症。

香薷二錢 白扁豆一錢半 炒 甘草炙五分

右剉一劑。水二盞。煎至八分。冷服。或加黃連一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

十味香蘇飲　治妊娠中暑。益氣和中。安胎保孕。

香薷二錢　扁豆八分　白朮八分　茯苓八分
陳皮八分　厚朴一錢　甘艸五分　木瓜五分
人參六分　黃芪七分　水二鍾煎八分。冷服。

傷食

妊娠傷飲食。胸滿脇痛。脉右手寸口緊盛。枳朮湯加山查麥蘗神麴黃連厚朴。如傷冷物而胸脇脹悶。欲吐脉緊。本方加砂仁木香丁香。嘔甘加生薑。

枳朮湯　治孕婦飲食過度致傷胃氣。胸脇脹脹。

白朮炒　枳實炒　黃連炒　厚朴薑炒　各一錢

木香八分　陳皮八分　枳殼七分
肉桂五分　半夏薑製　白芍炒　各六分　甘艸五分

右㕮一劑。水二鍾。薑三片。煎八分。空心服。

安胎

婦人內原有熱。繼而受孕。以致內火旺甚。胎氣不安。丹溪安胎丸。氣血虛而不能營養。胎氣不安者。紫蘇飲加砂仁枳殼木香行其氣。

安胎丸　妊娠四五月常墮不安。內熱甚故也。

白朮二兩炒　沉水黃芩二兩　末之。煉丸下五十丸。

紫蘇飲　方見前子懸條內

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

束胎

妊娠七八月以束胎肥大者。宜束其胎。蓬生散。若奉養太過。妄意之人。膏粱身肥胎又不運。必然難產。宜服瘦胎散。氣不運動。枳殼散。

蓬生散　又名束胎散。至八箇月服十數貼甚效。

大腹皮三錢　白朮一錢炒　白芍藥一錢　紫蘇葉八分　人參一錢　陳皮半錢　甘艸半錢炙　當歸身酒洗一錢二分

右剉一劑加葱五葉。黃楊腦七箇。水二鍾煎服。

加川芎。夏加黃芩。秋冬加砂仁。枳殼。

瘦胎散　奉養過度。致胎肥。預服此藥。可使易生。

血餘炒用　當歸酒洗一錢半　川芎一錢　白芍藥一錢　枳殼炒一錢　甘艸一錢　乳香另研五分　水二鍾煎八分食前温服。

枳殼散　瘦胎抑氣易產。凡孕肥胖者。宜預服之

枳殼四兩麥炒　甘艸二兩炙　末之。湯調食前服。

胎寒

婦人懷孕。不守禁忌。縱恣口腹。過食生冷瓜桃梨果。及當風取涼。以致胎冷不安。胸腹脹滿。或痛。腸中虛鳴。胎孕冷伏。四肢拘急。便泄欲死。安胎和氣飲主之。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

安胎和氣散　治娠婦過食生冷。當風取涼。胎寒之證。

訶子（麪裹煨去核）　白朮（炒）各一錢　陳皮（炒）一錢　良薑（炒）五分　木香一錢　白芍藥一錢　陳粟米（炒）半錢　甘艸（炙）五分

右一劑。水一大盞。煎至八分。加薑汁三匙。熱服。

胎熱

妊娠將及臨月。兩眼失明。不見燈火。頭痛暈悶。頷腫不能轉頭。此肝經熱毒上攻。蓋是薑椒熱酒葷腥炙煿熱積於中也。消風散。天門冬飲四物湯加荊芥防風黃芩薄荷

消風散　治婦人胎熱

辣厚味之物。此湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY