PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

11

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2557
V.11

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

荊芥穗一兩 甘草炙一兩 川芎一兩 羌活一分

人參一兩去芦 茯苓一兩去皮 殭蠶炒一兩 防風去芦一兩

藿香葉一兩 蟬蛻炒一兩 陳皮一兩 厚朴薑汁拌勻炒一兩

右爲末。每服二錢。荊芥湯。或茶湯調下。

天門冬飲 治妊娠蘊熱。忽然兩目失明。內熱煩燥。

天門冬一錢二分 知母一錢二分 益母柳子一錢二分

五味子一錢 白茯苓一錢 羌活一錢 人參去芦一錢

防風一錢去芦 水二盞。煎一盞。溫服。

四物湯 方見前經候條下

傷胎

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

婦人因頓仆。腹腹疼。或胎上搶心。去血腹痛。阿膠
蘄艾丸。妊娠從高墜下。或爲重物所壓。觸動胎氣。
腹痛下血。胃虛[illegible]逆。縮砂仁二錢炒爲末。酒調下。
或佛手散。

佛手散 即芳[illegible]丸[illegible]胎動條內

阿膠蘄艾丸

四物湯加阿膠炒一錢。艾葉炒一錢。甘艸炙一
錢。作一劑水二盞。[illegible]半盞。煎一盞。空心熱服。

死胎

婦人舌青黑。及胎上冷者。子已死。或指甲青。脹[illegible]
甚者。口中作屎臭。先以平胃散。投朴硝半兩。酒[illegible]
水各半鍾。煎服。胎化血水下。鹿角散下死胎。

平胃散 方見前皺脚條內

鹿角散 治孕婦因傷寒熱病。以致胎死腹中。
鹿角屑一兩。入葱豉煎服。

傷寒

妊娠外感寒邪。[illegible]痛身熱無汗。輕則參蘇飲去半
夏重則十神湯治之。汗後熱不解者黃龍湯。若胸
滿嘔逆口苦或寒熱往來。本方加枳殼桔梗。發熱
無汗。不得汗。本方加乾葛。煩渴。再加天花粉。胸滿

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

加枳實黃連如自汗身熱煩渴唇焦舌燥譫語人參白虎湯。大熱煩渴錯語呻吟。乾嘔。黃連解毒湯。熱甚不退。胎動不安者。單胎散。如五六日不解。大便不通不惡寒。反惡熱。或日晡潮熱。微惡寒者。大柴胡湯去半夏。服後不通。煩熱盛甚。小承氣湯。如六七日汗下後不解。病傳陰分手足冷脉細小者理中湯加人參

參蘇飲 方見前吹嗽條內

十神湯 發散瘟疫。及時感風寒。

川芎一錢 甘草七分 麻黃去節一錢 乾葛一錢

紫蘇一錢 升麻八分 赤芍藥八分 白芷一錢

陳皮八分 香附一錢

右剉一劑。生薑三片。葱白三箇。水煎熱服。取微汗

黃龍湯 治妊娠及新產後傷寒。和解退熱之藥。

柴胡二錢 黃芩一錢五分 人參一錢 甘草五分

右剉作一劑。生薑三片。水二盞。煎一盞。空心熱服

人參白虎湯 治娠婦傷寒身熱自汗煩渴唇焦。

石膏五錢 知母二錢 人參一錢 甘草一錢

右剉一劑。加粳米一撮。水二盞。煎八分。不拘時服。

黃連解毒湯 治傷寒大熱煩渴錯語呻吟乾嘔

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

黃連炒二錢　黃芩炒一錢半　黃蘗炒二錢半　山梔子炒一錢半

右剉一劑。水二盞。煎八分溫服。

大柴胡湯　治孕婦傷寒陽明六七日大便難帶表。

柴胡二錢　黃芩一錢　半夏一錢　白芍藥八分炒

大黃錢半　枳實炒一錢

右剉一劑。薑三片。棗二枚。水二盞。煎八分溫服。

小承氣湯　六七日不大便。腹脹滿潮熱不惡寒。

大黃三錢　厚朴炒二錢　枳實炒二錢

右剉一劑。水二盞。煎一盞熱服。

臨產五

歌　臨產之時勿易看。驀然氣湊目珠翻。唇青口噤涎沫。母子雙雙入死關。舌色鮮紅唇面黑。子存母死片時間。面紅舌黑兒難保。佛手仍須奪命丹。若逆催生龍蛻散。滑胎可救漏胞乾。死胎欲下芎藭散。更搗萆麻腳底攤。血入胞中時脹悶。上衝心目死何難。朴硝散共紅花酒。奪命神丹逐下安。產下血迷成血暈。清魂急灌命須還。血山一倒心無主。目暗頭眩汗雨漫。氣隨血脫多難救。薑桂參耆大劑堪。血搶心悶成狂妄。喘絕滿黃不等閒。兒枕痛時緣惡露。當歸失笑效非凡。忽然口噤言顛倒。見

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

鬼原非風與寒。敗血上衝心血耗。妙香散共黑龍丹。

論 夫婦人臨產。死生反掌。若善于救治者。實可以起死回生。稍不急救。多致夭枉。救之不得其法。藥之不能應手。亦莫能全其生也。將產努力過多。兒轉未逮。以致胎落於胯。不能育者。有因子橫于逆而難產者。有體肥脂厚。平素安逸而難產者。有子壯大而難產者。有矮石婦人交骨不開而難產者。有胞破而去水一二日。胞內乾澀而難產者。有胎死腹中不下者。其腹冷無黑可驗。有胞中積水。其腹大異常。脉息細弱。名曰胞水。醫者不識。疑為雙娠。臨產必去水斗餘。方產其兒手足軟短。多不育。縱不死。亦為殘疾。蓋水漬其胎故也。醫者識此蚤用藥行去其水。則無恙矣。有產下去血太多。產下即死者。有血奔上而昏暈者。有子下而胞不下。敗血灌滿胞中。胞不得下者。須行去胞血則下。有因取胞穩婆。悞傷內臟。輕則帶疾。重則即死。慎之慎之。凡此之狀。莫能悉舉。大抵貧賤婦人。生育極易者。以其勞役。胎氣流動故也。富貴之家。厚養安逸。身體肥壯。決難生育也。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

脉　臨產六至。脉號離經。或沉細滑。若無即生。浮大難產。寒熱又頻。此時凶候。急於色徵。面頰唇舌。忌黑與青面赤母活。子命必傾。若胎在腹。子母歸冥。

難產

坐艸早。努力多。兒轉不逮。或胞破水乾難產者。滑胎散。若橫逆及胞乾難產。神應散三服。如魚得水。決自轉生。或產不下。及矮石婦人交骨不開。芎歸湯。橫逆難生欲死。益母丸。如手足先出。以針刺兒手足。入二分。若得痛驚轉。即縮回順生也。

滑胎散　治坐草太蚤。努力太多。以致難產。

滑石六錢水飛　冬葵子五錢　甘艸一錢

右末之。每二錢。白湯調下。或酒下。

神應散　治橫逆難產。或胞漿先破。此藥如魚得水。

白芷一兩　百艸霜一兩　末之。童便米醋調下三錢

益母丸　治橫逆難生欲死。

益母艸不拘多少　陰乾末之。蜜丸彈子大。童便酒下。

芎歸湯方見胎前條下

催生

臨產腰痛見紅。催生如意散。如生理不順。產育艱難。或橫或逆。催生丹溫水服下。即產兒手中握出

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

藥丸爲驗也。或催生龍蛻散。如小兒手足先出。即以鹽塗兒手足底。急搔之。并以鹽塗母腹上。服神應散。

催生如意散　臨產腰痛。方可服之。

人參一錢去芦　乳香一錢　辰砂五分

右用雞子清一箇調藥。再用生薑湯調下。

催生丹　治生理不順。或橫或逆。生產艱難者。

兎腦髓一箇取臘月內殺研如泥　乳香五分另研　麝香五分另研

母丁香二錢五分去之　以兎腦和丸如芡實大。陰乾油紙裹。每用丸溫水下。即產兒手握出此丹。

催生龍蛻散　催生易產。如神藥也。

大蛇蛻一條服存性　蟬蛻一兩服存性

滑石五錢　葵子一兩炒　末之每一錢。順流水煎。調服

催生神應散　方見前難產條內

胞衣不下

胞衣不下。爲血入胞中。上衝心胸氣血脈悶不出。欲死者。必用逐其血。酒煎紅花服。或朴硝散。甚則奪命丹。胞衣不下。臍腹堅脹。急痛欲死。牛膝湯服。即爛下。產後一切危急症候。及胞衣不下急症者。

黑龍丹

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

朴硝散　下死胎。取胞衣產後敗血。

朴硝末之每服二錢。童便調下。

奪命丹　死胎不出及胞衣不下。欲死之候。用此丹

蛇蛻一條煅　千里馬即路上左脚草鞋洗淨煅存性一錢

金箔七片　銀箔七片　血餘煅一錢　馬明退即蚕退煅二錢

乳香五分另研　黑鉛二錢五分火鎔投水銀七錢半急攪結成砂子細研

右爲末。猪心血丸桐子大。每服二丸。倒流水灌下。

牛膝湯　治胞衣不出。臍腹堅脹。急痛服此爛下。

牛膝四兩去芦　瞿麥四兩　當歸三兩　通艸六兩

滑石八兩　葵子五兩　剉水九升。煎三升。三次服

黑龍丹　治產後一切血疾。及胎衣不下。危急之症

當歸二錢　五靈脂二錢　川芎二錢　熟地黃二錢

良薑二錢

一兩以沙合盛赤石脂以泥縫紙。加鹽泥固濟。炭火十斤。煅令通赤。火候冷。取開看成黑糟色。研細。却入後藥

百草霜五兩　硫黃一錢半　乳香一錢半　花蕊石一錢

琥珀一錢

並研細與前藥再研勻。以米醋糊丸如彈子大。每服一丸。炭火煅令通赤。投于生薑自然汁。與童便

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

入酒漉出控乾研細。只此酒下。

血暈

產後去血多。暈悶不醒者。芎歸湯。產後火載血上。血迷血暈。昏不知人。清魂散。如不醒以韭菜一二斤搗爛。入茶壺中。沸醋傾入壺內。蓋壺頭。以壺嘴放鼻中熏。或用醋炭頻淬熏之。或用乾漆燒煙。令聞煙。如不醒。急搗人中。提頂心中頭髮。灌以童便薑汁。自醒。

芎歸湯 方見胎前條下

清魂散　治血迷血暈。昏不知人。

澤蘭葉一兩　人參一兩去芦　荊芥穗四兩　甘艸炙八分

川芎二兩　末之。每一錢。熱湯溫酒各半盞。調下。

失血

產後去血過多。芎歸湯加人參焦薑。腹痛香桂散。失血過多。虛熱太甚。日暗神昏。手足冷。芎歸薑桂人參。汗多加黃耆。或益母丸加童便。自汗氣欲脫。黃耆湯。產後去血多。心虛怔忡錯語。茯苓益母丸。

芎歸湯 方見前胎前條下

香桂散　治去血過多。及下死胎。

麝香五分　桂心三錢　末之。作一服。溫酒調下。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

益母丸　方見前難產條內

黃耆湯　治產後失血。自汗[illegible]止。

黃耆二錢蜜炙　白朮一錢炒　防風一錢去芦　熟地黃二錢

牡蠣煅一錢半　白茯苓一錢　麥門冬五分　甘艸炙五分

右剉一劑。加大棗二枚。水二盞煎至八分。空心服。

茯苓散　產後心虛。怔忡不定。言語錯亂。神思不清

人參一錢去芦　甘草一錢炙　乾山藥一錢　當歸一錢

生薑五錢　遠志一錢去心　白茯苓八分　桂心五分

麥門冬一錢　大棗二箇　剉一劑。水二盞。煎八分服

惡露

血搶心悶成狂。喘滿欲絕者。蒲黃散。惡露不盡。心腹痛。黑神散。惡露不盡。兒[illegible]疼。當歸失笑散。一產後。忽然口噤。語言顛倒。乍見鬼神。此敗血衝心。非風寒及邪祟也。妙香散。或用黑龍丹煅過酒調下。

蒲黃散　產後惡露不快。血上搶心煩悶喘急等症。

乾荷葉炙二錢五分　甘艸二錢五分　牡丹皮二錢五分

玄胡索二錢五分　生地黃二錢五分

生蒲黃六錢　剉作二劑。水煎。入蜜少許。溫服

黑神散　惡露不盡。胎衣不下。血上攻心腹痛不止

黑豆炒半升　熟地黃四兩　當歸四兩　肉桂四兩

DO NOT COPY
Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

乾薑四兩炒焦　甘艸炙四兩　蒲黃生四兩　白芍藥四兩炒

右末之。每服二錢。童便酒各半盞。空心時調下。

當歸失笑散　治產後心腹絞痛欲死。及兒枕作疼。

蒲黃炒黑五錢　五靈脂五錢

右末之。每用二錢。醋調熬成膏子。白湯化下。

妙香散

麝香一錢研　山藥薑汁炒一兩　茯苓一兩

茯神一兩　遠志去心一兩　黃芪一兩　人參五錢

桂梗五錢　甘草五錢　木香煨二錢半　辰砂三錢

右末之。每一錢湯下。

黑龍丹　方見前[illegible]下[illegible]內

產後六

歌　產下嬰兒血氣空。絲毫觸犯便傷榮。倏然致疾如山重。不與尋常一樣同。去血過多因發熱。焦薑參朮入芎藭。陰虛作熱心煩悶。自汗黃芪可奏功。惡心嘔逆傷脾胃。抵聖湯醫腹脇膨。歸芪止汗除身熱。不愈當歸奏效崇。風中愈風湯立驗。茯苓散子治怔忡。諸風痿痺筋攣縮。志士明醫用血風。年見鬼神由血耗。調經散服起疲癃。中風口噤牙關閉。搐搦身張似角弓。此是血虛筋瘈瘲。舉輕古拜配

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

歸芎。產後經來因適斷。感于異症在其中。手牽足搐牙關緊。昏冒柴胡視聽聰。陰虛發熱憎寒症。晝日清明夜覺兇。加增四物神功大。一服能令病脫躬。胞中悞損成淋瀝。參朮煎膏溲自通。浮腫定須分水道。憂思鬱結在寬胸。痢初化滯香連芍。積久須當用胃風。初感寒邪微發表。熱邪不解守黃龍燥煩實熱芩連理。渴甚人參白虎從。熱泄柴芩除半夏。便難識以大柴攻。汗多表弱宜行桂。裏弱虛時製理中。發表內攻須帶補。勿行孟浪內傷榮。小便淋瀝行時痛。但用茅根可治癃。泄瀉君苓湯可用。寒加肉果桂薑同。若因熱泄并腸垢。薑炒黃連佐木通。

論產後氣血大損。易產力壯者。尚然感疾。為終身之患。產母不可恃健。不行保重。勞碌以損其榮。多食以傷其胃。外感六淫之邪。內受七情之氣。為患莫測。古云。產後犯若絲毫。感病重於山岳。倘夫或有惡露未盡而作熱作疼。真元不復而為痿為勞。比比皆然也。故產後諸疾。先以大補氣血。縱有他疾以不治之。或欲祛邪。必兼補劑。殊為切當。若以峻劑攻之。再損氣血。危可立待。或惡露當去者。亦須

East Asian Library Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

以去故生新。溫養爲主。斯得其正也。

脉 產後緩滑。沉細亦宜。實大弦牢。濇疾皆危。○脉經曰。婦人新生乳子。脉沉小滑者生。實大弦急者死。婦人生產之後。寸口脉發疾不調者死。沉細附骨不絕者生。婦人生產之後。因中風傷寒熱病。喘鳴而有息。脉實而浮緩者生。小急者死。○丹溪曰。產前脉細小。產後脉洪數。皆死。又曰。產前當洪數。既產而洪數。如故。豈得不死。

產後蓐勞

新產後。自汗。肢體走痛。虛眩無力者。名曰蓐勞。當歸羊肉湯。產後血氣大虧。失于將理。自汗發熱。羸。飲食不消。時欬發渴者。人參鼈甲散。發寒熱。子湯。

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗。肢體疼痛。名曰蓐勞。

當歸七錢酒洗 人參七錢去芦 黃芪一兩蜜炙 生薑五錢

右用羊肉一斤。煮清汁五大盞入藥煎四盞。作六服。

人參鼈甲散 治產後蓐勞。其狀虛羸。寒熱似瘧。

人參五錢去芦 桂心五錢 桑寄生五錢 當歸酒洗五錢

白茯苓五錢 白芍藥五錢 熟地黃五錢 桃仁去皮尖五錢

麥門冬五錢 甘艸炙五錢 續斷二錢五分 川牛膝去芦一錢五分

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

鼈甲炙一兩　黃芪炙一兩

右末之。猪腎一對。去脂膜。用水二盞。生薑一片。棗子三枚。煮一盞。入藥末二錢。葱白三寸。烏梅半箇。荊芥五穗。再煎十數沸。用細絹濾去查。空心溫服。

石子湯　治產後虛羸。往來寒熱。自汗乏力。喘促等症

猪腎一對去脂膜用竹刀切作四片　香蕈二兩　葱白頭二兩

白芍藥二兩　分二貼。每用水三升。煮升半。勻三服。

產後不語

產後敗血停蓄。上干于心。心氣閉塞。故舌強不能言語者。八珍散。產後內因痰氣鬱滯。閉目不語。

好白明礬一錢爲末。白沸湯調服。

八珍湯　方見前經候條下

產後虛渴

產後血熱。心煩口渴者。涼血飲。虛血煩渴者。生脉散。產後虛渴。少氣。脚弱目昏頭目眩暈。飲食無味者。熟地黃湯。或四物湯加麥門冬天花粉。

涼血飲　治產後血熱心煩。口渴煩燥。及經水不調。

黃芩二錢炒　赤芍藥二錢　川芎二錢　甘艸炙一錢

荊芥二錢取穗　瓜蔞根二錢　生地黃二錢　麥門冬去心二錢

右剉二貼。每貼竹葉七片。燈心二十莖。水煎溫服。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

生脉散　補氣復脉。生津液。止煩渴。

人參二錢去芦　麥冬去心鹽半　五味子一錢　水二盞煎服。

熟地黃湯　治產後虛渴。口乾少氣。脚弱。頭目昏暈。

人參四錢去芦　甘艸炙一錢　瓜蔞根六錢　麥門冬去心三錢

熟地黃酒浸曬乾兩半　分二貼。糯米一撮薑棗煎。溫服

四物湯　方見前經候條下

產後失血

產後去血過多。腹痛身熱自汗者。當歸黃芪湯。若去血多眩暈者。芎歸湯。虛甚者。加焦薑人參。腹痛加桂。產後去血多。陰虛內熱。心煩氣短自汗。當歸建中湯。

當歸黃芪湯　治產後失血過多。腰疼身熱自汗。

當歸三兩酒洗　黃芪二兩蜜炙　白芍藥一兩五錢酒炒

右剉。每用五錢。生薑三片。水二盞。煎八分。空心服

當歸建中湯　治產後虛損氣血。內熱心煩。短促之症。

當歸四兩酒洗　肉桂三兩　甘艸炙二兩　白芍藥炒六兩

右剉每用五錢生薑三片。大棗二枚。水二盞煎服

芎歸湯　方見胎前條下

產後下痢

產後下痢腹痛。裏急後重。至圊不能便者。香連散

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

加人參當歸神麴麥芽厚朴。病久不已四君子湯
加當歸白芍藥麴蘗陳皮木香黃連

香連散　治產後痢疾。裏急後重。腹中疼痛不可忍。

黃連炒一錢半　木香一錢二分　白朮炒二錢　白芍藥炒二錢
滑石二錢研細　甘艸炙五分　剉一劑。水二盞。煎八分服。

四君子湯　方見胎前條下

產後浮腫

產後敗血得蓄在臟。循經流入于四肢。化爲水。因
成虛浮腫者。調經散。產後血氣大虛。肢體浮腫者。
不可通利。其水宜大補氣血。四君子湯加蒼朮。

調經散　治產後敗血乘虛流入四肢以致浮腫。

當歸酒浸一兩　赤芍藥一兩　桂心一兩　沒藥一錢另研
琥珀一錢另研　麝香五分　細辛五分　甘艸炙二錢

右爲細末。每服五分。入生薑自然汁少許。酒調下。

四君子湯　方見胎前條下

產後發熱

產後血虛發熱。頭痛自汗。心煩短氣者。人參當歸
散。產後陰虛不足。發熱日輕夜重。憎寒者。四物湯
加焦薑。小熱加茯苓。產後蒸乳發熱者。四物湯加
黃芪人參白朮天花粉。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

人參當歸散　治產後血虛發熱自汗心煩短氣。

熟地黃一兩　人參去芦一兩　當歸酒洗一兩　麥門冬去心一兩

肉桂一兩　白芍藥炒二兩　每五錢。竹葉生薑煎服

四物湯　方見經候條下

產後風痿

產後諸風痿弱。筋攣無力者。血風湯。產後血虛氣弱汗多。風搏之而成痓。口噤反張脊強汗出不止者難治。大聖散加川烏黃芪。

血風湯　治產後諸風痿弱筋攣無力。四肢不[illegible]

秦艽一錢去[illegible]　[illegible]一錢　防風七分去芦　白芍藥[illegible]

白芷八分　川芎二錢三分　白朮炒一錢　當歸身酒洗[illegible]錢

熟地黃二錢　白茯苓一錢　半夏製八分　黃芪蜜炙一錢五分

右爲一劑。水二盞。煎一盞。溫服。或丸或散。俱可用

大聖散　方見胎前條下

產後怔忡

產後血少怔忡恍驚悸。睡不安寧者。益榮湯。或養心湯。或寧志丸。產後心虛怔忡恍忽者。茯苓散。

益榮湯　方見胎前條下

養心湯　治產後心虛血少。恍惚忡忡。驚悸不安。

黃芪炙五錢　白茯苓五錢　白茯神五錢　遠志湯泡去心炒五錢

Pre-Last Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

半夏麴五錢　當歸酒洗五錢　川芎藭五錢　酸棗仁炒二錢五分
辣桂二錢五分　人參二錢五分　五味子二錢　栢子仁炒二錢五分
甘草炙四錢　每服剉三錢。薑三片。棗二枚。水煎服。

寧志丸　治產後心血虛少。恍忽多驚。睡卧不得。

人參二錢五分　當歸酒洗三錢　琥珀二錢五分　栢子仁炒二錢五分
白茯苓二錢　白茯神二錢　乳香二錢五分　石菖蒲二錢五分
酸棗仁溫酒浸半日去殼隔紙炒二錢五分　硃砂二錢五分另研

右爲末。煉蜜丸如梧子大。每服三錢。棗子湯送下。

良方茯苓散　治產後心虛。怔忡不定。恍惚多驚。

人參去芦一錢　甘草炙一錢　乾山藥一錢　當歸酒洗一錢
生薑三錢　遠志二錢去心　白茯苓一錢　桂心一錢
麥冬去心一錢　大棗二枚　剉一劑。水二盞。煎一盞服

產後中風

產後中風口噤。牙關緊急。手足痹瘲者。舉輕古拜散。產後血大損。經絡空虛。勞碌太蚤。風邪乘虛而入者。小續命湯。或愈風湯。中風角弓反張。涎潮大豆子湯。

舉輕古拜散　方見胎前條下

小續命湯　治產後風邪乘虛而入。偏枯不遂。

麻黃去節一錢　人參去芦一錢　黃芩炒一錢　白芍藥炒一錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

川芎藭一錢　甘艸炙八分　杏仁十四粒　防己一錢

肉桂七分　附子麪裹煨一錢　剉一貼薑三片水煎服

愈風湯　即舉輕古拜散方見胎前條下

大豆子湯　治產後中風角弓反張涎潮口噤不開

黑豆半升炒令焦黑候煙起以無灰酒二升沃之入瓶內

每用此酒半升入獨活五錢同煎十數沸溫服

產後陰虛

產後陰虛血弱四物湯加炒黑乾薑產後去血過多陰虛生內熱煩懣吸吸短氣頭痛悶亂骨節煩疼人參當歸散陰虛發熱者小柴胡湯去半夏

[illegible]湯方見[illegible]

人參當歸散　治產後去血過多陰虛內熱煩亂

人參一兩去芦　當歸一兩酒洗　肉桂一兩　熟地黃一兩酒洗

麥冬去心一兩　白芍藥炒二兩　每五錢竹葉生薑煎服

小柴胡湯　方見胎前條下

產後乍見鬼神

產後乍見鬼神由血虛之極敗血攻冲邪淫干心胡言亂語如見鬼祟非風邪也調經散少加龍腦或妙香散加當歸黃連生地黃

調經散　方見前產後浮腫條內

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

妙香散　治產後乍見鬼神及惡露不盡如神藥也

麝香一錢研　白茯苓一兩　白茯神一兩　乾山藥一兩薑汁拌炒

黃芪一兩炙　遠志一兩去心　人參五錢去芦　桔梗五錢去芦

甘草五錢炒　辰砂三錢另研　木香二錢五分

末之每服一錢臨臥或食後溫酒送下。

產後傷寒

產後血氣大虧縱有寒邪不可大發汗芎歸湯加人參紫蘇乾薑微汗之熱不止黃龍湯加芎歸大熱加知母黃連攻可溫者宜時斟酌不可妄用峻劑耗損元氣也。

芎歸湯　方見胎前條內

黃龍湯　方見胎前條內

產後寒熱

產後寒熱頭痛自汗陰虛短氣者人參當歸散薷勞發寒熱肢體痛自汗當歸羊肉湯產後陰虛惜寒壯熱煩悶知母湯。

人參當歸散　方見前產後陰虛條內

當歸羊肉湯　方見前產後薷勞條內

知母湯　治產後乍寒乍熱心胸煩悶陰虛血少。

知母酒炒二錢　赤芍藥一錢　黃芩炒一錢　桂心入分

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

甘艸炙六分　剉一劑水二盞煎八分空心時溫服。

產後瘧疾

產後瘧疾。寒熱相半。或熱多。草果飲子。或清脾飲去青皮厚朴。寒多。人參養胃湯。或四獸飲勝金丹。

草果飲　治產後瘧疾寒熱往來。或熱勝于寒之症

艸果一錢去殼　川芎一錢　紫蘇葉一錢　白芷一錢

良薑七分　甘艸炙八分　陳皮去白八分　青皮一錢

右剉一劑用水二大盞煎至八分。溫服。日進三次。

清脾飲　人參養胃湯　四獸飲　勝金丹方俱見胎前條

產後泄瀉

產後泄瀉。君苓湯。挾寒。腹痛。腸鳴。小水清白不渴。口不渴。加肉豆蔻。煨桂。炒芍藥。如熱泄腸垢。口渴。痛一陣。瀉一陣。加炒黃連木通。或益元散。濕勝水泄。胃苓湯。

君苓湯　治產後泄瀉　即四君子加後藥四君方見胎前

白朮炒二錢　白茯苓二錢　猪苓一錢五分　澤瀉一錢五分　煎服

益元散　止瀉利水。生津止渴。一名六一散一名天水散

滑石水飛六兩　甘艸一兩為末　每服二錢。新汲水調下。

胃苓湯　即平胃散合後藥。治產後泄瀉平胃散方見胎前條

白朮土炒二錢　茯苓去皮二錢　猪苓一錢五分　澤瀉一錢五分　煎服。

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

產後心腹痛

產後敗血凝聚。氣上冲心作痛。大巖蜜湯。七情相干。血與氣併心痛。玄胡索湯。敗血攻刺心腹痛。失笑散。寒氣腹痛。理中湯。失笑散理中湯方俱見胎前條下。

大巖蜜湯 治產後敗血冲心。心腹疼痛不可忍者。

當歸酒浸一錢 獨活一錢 乾薑炮一錢 熟地黃酒蒸一錢

吳茱萸一錢 桂心一錢 遠志去心一錢 白芍藥炒一錢

甘草炙七分 細辛七分 剉一劑。水二盞。煎一盞服。

玄胡索湯 治產後七情傷感血與氣併。心腹疼痛。

玄胡索一錢 當歸酒洗一錢 白芍酒炒一錢 厚朴薑炒二錢

莪朮煨一錢 川練子一錢 三稜煨一錢 木香一錢煨

川芎一錢二分 桔梗一錢二分 黃芩炒八分 甘艸七分炙

檳榔一錢 剉一劑。水二盞。煎八分。空心時熱服。

產後咳嗽

產後惡露上攻。肺經受邪咳嗽。二母散。血風感寒熱濕氣。咳嗽痰涎。坐臥不安。旋覆花散。時感傷風咳嗽。有外邪。惡風寒發熱。參蘇飲。

二母散 治產後惡露上攻。流入肺經。以致咳嗽。

知母酒炒一兩 貝母去心一兩 人參去芦八錢 白茯苓去皮八錢

桃仁去皮尖四十九粒 杏仁去皮尖四十九粒

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右剉。每劑七錢。用水二盞。煎八分。食後細細呷下。

旋復散　治產後血風感寒暑濕氣。喘滿咳嗽壅盛。

旋復花一錢　赤芍藥八分　前胡八分去芦　杏仁去皮尖十四粒

半夏麴七分　荊芥去根六分　白茯苓八分　五味子去梗十粒

麻黃不去根節一錢　甘艸六分　薑棗水煎服。

參蘇飲　方見胎前條下

產後霍亂

產後霍亂。渴而飲水者。五苓散。寒多不渴者。人參理中湯。吐利厥冷者。加附子。腹痛甚。手足寒者。高良薑散。轉筋者。木瓜散。不止。辣蓼煎湯洗之。

五苓散　治產後霍亂吐瀉。口渴飲水。此藥甚效。

茯苓一錢五分　澤瀉去毛一錢　白朮土炒一錢　猪苓一錢

肉桂七分　剉一劑水二盞。煎至八分。空心溫服。

人參理中湯　即理中湯方見胎前條下

高良薑湯　治產後霍亂吐利。心腹疼痛。因寒所致。

良薑一兩　當歸酒洗二兩　草豆蔻仁炒一兩

右爲末。每服一錢。米湯調下。

木瓜散　治產後霍亂吐利。轉筋擾悶。如神藥也。

木瓜一錢五分　茴香炒一錢　紫蘇葉五分　甘艸三分炙

吳茱萸泡七次炒一錢　剉一劑。生薑五片。水二盞。煎服。

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

產後鬱冒

產後鬱冒。由胃弱不食多汗故也。血虛必厥。厥必鬱冒。白薇湯。產後有三疾。鬱冒則多汗。多汗則大便秘結。此皆去血過多。難以藥治。蘇麻粥主之。

白薇湯　治產後血虛鬱冒。及冒弱不食。脉微多汗。

白薇三錢　當歸三錢　人參一錢五分　甘艸炙七分　煎服。

蘇麻粥　治產後鬱冒則多汗。多汗則大便難之疾。

蘇子麻仁。不拘多少。研爛水濾取汁煮粥食之。

產後脚氣

產後熱悶。氣上冲。輒為脚氣。小續命湯。去麻黃石膏附子。平素感受風寒暑濕燥火之氣。因產後血氣不足。遂襲于足經。因乘而發者。獨活寄生湯。

小續命湯　方見前產後中風條內

獨活寄生湯　治產後風寒溼氣乘虛而入。成脚氣

獨活去芦八分　桑寄生八分　杜仲炒八分　川牛膝去芦一錢

細辛七分　秦艽去芦八分　白茯苓八分　白芍藥酒炒一錢

桂心六分　川芎藭八分　防風去芦七分　甘艸炙七分

人參去芦八分　熟地黃一錢　當歸酒洗一錢　水煎。空心熱服

產後遍身疼

因產後走動氣血。升降失常。留滯于關節間。筋脉

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

引急。或手足拘攣。不能屈伸。故遍身肢節走痛者。

趂痛散。餘血不盡。流于遍身肢節。腰脚關節處作疼。如神湯。

趂痛散　治產後走動氣血。升降失常。留滯疼痛。

當歸酒浸一錢　桂心八分　白朮炒一錢　川牛膝酒浸去芦一錢

黃芪蜜炙一錢　獨活去芦八分　生薑一錢　薤白一錢

桑上寄生一錢　剉一劑。水二盞。煎一盞。食前熱服。

如神湯　治產後餘血不盡。流入腰脚腿膝疼痛。

厚朴薑炒一錢　半夏湯泡六分　枳殼炒七分　白芍藥酒炒八分

木香六分　桂心六分　陳皮六分　白薑六分

桔梗八分去芦　香附醋炒七分　茴香炒六分　蒼朮米泔浸乾炒一錢

甘艸炙五分　人參去芦六分　白茯苓六分　川芎藭七分

當歸酒洗一錢　白芷八分　木瓜六分　桃仁去皮尖炒六分

右剉一劑。加生薑三片。水二盞。煎八分。食前熱服。

產後氣喘急

產後氣喘。由榮血暴竭。氣無所主。觸發于肺。故令喘急也。此孤陽絕陰。難以藥療。十死一生之候也。若敗血停滯。上朝于肺而作喘者。奪命丹主之。

奪命丹　方見臨產條下

產後頭疼

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

產後頭疼。有血虛。氣弱。痰厥。寒厥者之不同。用四物湯隨病加減。產後感于異症。手足牽搐。咬牙頭痛。昏冒。先服加減四物湯。次服秦艽丸。

加減四物湯 即四物湯加減方見經候條下 加減法詳見第三卷血症條下

秦艽丸 治產後氣血大虛風邪入于頭腦作痛者。

川芎 二兩 當歸 二兩酒洗 秦艽 一兩酒洗 荊芥 一兩取穗

末之。酒糊丸如菉豆大。每服三錢。食後白湯送下。

產後淋瀝 附胞損

產後諸淋。茅根湯。產後敗血不止。淋瀝不斷。烏金散。淋久不止。四肢乏力。沉困。牡蠣散。產時。穩婆誤損其尿胞。以致日夜淋瀝者。參朮膏主之。

茅根湯 治產後諸淋。無問冷熱。膏石氣肉等淋。

白茅根 二錢 瞿麥 一錢五分 葵子 二錢五分 白茯苓 一錢五分

人參 去芦一錢 蒲黃 生用一錢 桃膠 一錢 滑石 一錢五分研細水飛

半夏 薑製三分 紫貝 一个燒 石膏 一錢煅過 薑燈心水煎服

烏金散 治產後敗血不止。淋瀝不斷。腹痛頭眩。

麒麟竭 一兩 百艸霜 一兩 玄胡索 一兩 男子亂髮 煅一兩

當歸 酒洗一兩 肉桂 一兩 赤芍藥 一兩 鯉魚鱗 燒灰一兩

松墨 煅醋淬一兩 末之。每服二錢。空心溫酒調下。

牡蠣散 治產後淋瀝不絕。四肢乏力。不思飲食。

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

牡蠣粉二錢　川芎一錢　白茯苓一錢　熟地黃酒浸一錢

龍骨煅二錢　續斷一錢　當歸酒洗一錢　艾葉酒炒一錢

人參去芦一錢　五味子十粒　地榆一錢　甘艸炙五分

右剉一劑。薑三片。棗二枚。水二盞。煎一盞。空心服。

參朮膏　治產後悞損胞中。以致晝夜淋瀝不絕。

人參白朮各一斤。煎成膏子。每用三匙。白湯正。

產後腹痛嘔吐

產後惡露不少。敗血乘虛。散入于脾爲脹滿。胃受之則嘔吐。抵聖湯。產後腹脹而嘔逆者。胃氣不和故也。桔梗半夏湯主之。

抵聖湯　治產後惡露不少。敗血入于脾[illegible]

赤芍藥一錢　半夏泡一錢　澤蘭葉一錢　陳皮一[illegible]

人參去芦一錢　甘艸炙七分　生薑焙乾一錢　剉一[illegible]

桔梗半夏湯　治產後腹脹嘔逆。調和陰陽

桔梗二錢五分　陳皮二錢五分　半夏湯泡二錢五分　薑水煎溫服

產後小便不利

產後小水不通者。木通散。小水不通。腹滿。用鹽[illegible]臍中。葱白一把縛定。切去兩頭。留一寸厚。置鹽上。以艾灸之。熱氣入腹。即通利也。

木通散　治產後小便不利。此藥主之。其效如神。

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

木通一錢 麻子仁一錢 葵子一錢 滑石一錢研細水飛

檳榔一錢 枳殼一錢 甘艸一錢 剉一劑。水煎服。

產後口鼻黑作衄

產後氣消血敗。榮衛不理。散亂入于諸經。不得還元。故口鼻黑氣起及變鼻衄。此因產後虛熱。變成此症。爲胃絕肺敗。多死。犀角地黃湯主之。十可救

犀角地黃湯 治產後口鼻黑作衄。

犀角鎊碎三錢 生地黃三錢 白芍藥炒一錢半

牡丹皮一錢半

右剉一劑。水煎服。溫服。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library