PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

12

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2557
v.12

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

訂補明醫指掌卷之十

小兒科

初生護養一

歌 十月嬰兒初孕育。肌膚未實陰未足。正當生下未啼時。急以拭去胎液毒。黃連甘草硃蜜佳。免致斑瘡天死速。五六日間臍未乾。縱然炎熱不頻浴。但將故絮遮其身。下體單寒常露足。見些風日有何妨。月裏頻啼纔是癮。胎毒胎熱得以伸。熱氣隨啼無蘊蓄。勿令過愛不置懷。免與新綿重被覆。昧者重綿尚恐寒。乳哺不離猶恐哭。但見微風便感寒。

Gest Chinese Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

纔聞音響時驚愕。做出疾病不可言。所以富兒多命促。我嘗諳此歷驗之。故此子孫多易鞠。

論 夫嬰兒在胎。稟陰陽五行之氣。以生臟腑百骸。氣血筋脉。其形雖具。肌體未實。骨格未成。陽氣既足。陰血未全。所以不可太飽煖以銷其陰。此丹溪先生之大戒也。然兒在母腹中。必藉母氣血所養。故母熱則子熱。母寒則子寒。母驚則子驚。母弱則子弱。所以有胎熱胎寒胎驚之證。初生未啼時。口中尚有惡汁。急急拭去。更用甘草黃連硃砂蜜頻與之。以解三穢。[illegible]惟無驚熱之患。抑免痘疹之憂也。月裏常令啼哭。則胎中所受熱毒。從而散之。胎中驚氣。得而解之。則旬日之間。無重舌。木舌。口噤。胎風。胎熱。胎驚之病。斷臍後。臍或方褪。而尚未乾燥。頻浴之。則風濕侵入臍中。而有臍風撮口之證。乳食太多。則有吐乳。泄利。腹痛。痰涎。驚疳。風癇之證。綿衣太煖。則陰內銷。使兒嬌怯多病。畧見些少風寒。便易感冒。皆保重太過之所致也。所以貧兒堅勁無疾。富兒柔脆多夭者。譬之草木方生。以物覆蓋緊密。不令見風日雨露。則萎黃柔弱必矣。今之昧者。往往罹此。而不能育養其子。後之子。益

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

加珍愛。尤悔前子之不飽煖而死。竟不知其過愛而反害之也。嗚呼痛哉。

初生證

○小兒初生下口中尚含胎血如有手快穩婆。隨即以手幹出口中血與宿汁。此是胎毒。用拭穢法。

○有兒生下即死者。可看上腭有泡。急以摘破。綿拭去血。血勿入喉即活。

○小兒初生氣絕。不能啼者。以綿衣包。勿斷臍。將胞火上燒。仍將大綿撚蘸油。點燈燒臍帶即活。

○如生下二便不通者。急令人以湯漱口。吸咂兒前後心。及手足心臍下共七處。紅赤為度。

拭穢法　預以甘草細切少許。臨產時以綿裹沸湯泡盞內覆溫。收生之際。以軟綿裹指。蘸甘草汁拭其口。次用黃連細切。沸湯泡良久。濾淨。拭兒口中。吐去惡汁。更與硃砂一大豆許。細研。以蜜一蜆殼調勻。抹兒口。服之非獨鎮心定魄安神解毒。更能益肝膽。除煩熱。辟邪氣也。

月裏衆疾二

歌　寄語人家初誕兒。勿令頻浴水侵臍。或緣客氣相冲忤。撮口臍風病患危。木舌噤風誠可畏。十朝內

Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

染却難醫。生黃生赤兼生嘔。胎熱胎寒胎瘦肥。更有胎驚并內痢。臟寒不乳夜間啼。皆因禀受胎中毒。致使初生病染軀。五日以來便溺閉。要將良法急通之。若還姙母遵胎教。寧得嬰兒此症罹。

論　夫初生嬰兒。如草之萌芽。花之嫩蕋。血氣未充。肌膚未實。稍有傷觸。爲患匪輕。故古人以芽兒名之。凡兒初斷臍之後。不可頻浴。不惟風濕侵臍。抑且風寒感冒。爲病莫當。若臍嫩入水。便有臍風之患。不禁生人。或黑物鹽忤。便有口噤。客忤。驚啼。厥逆之變。乳食重復。不能消尅。便有吐瀉。生痰氣[illegible]

病過於溫煖。則陰消內熱。便有生赤。生黃瘡瘍。丹疹。赤目。重舌。木舌之病。過涼則臟冷。便有夜啼。腹痛。泄利。盤腸內痢之疾。然調理之法。在乎適中可也。有受胎氣成病。如噤風。木舌風者。由胎中感受熱氣。流毒於心脾。故形見於喉舌。生下復爲風邪搏擊。名曰犯風噤也。撮口臍風者。亦由胎氣挾熱兼風熱入臍。流毒心脾故也。若母恣食熱毒辛辣則生子成胎熱病。嗜食生冷。則生子成胎寒症。母受濕而傳於胎。則子生下發黃如金。名曰胎黃。母受熱而傳於胎。則子生下肌膚赤如丹塗。及爲胎

Pasi Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一肥胎瘦之候。若懷孕受驚者。則月裏有胎驚癇症之疾。若姙母恣食肥甘酒麪野味腥膻一應寒熱之物。及動止無忌。故令兒不寒則熱不虛則怯。熱則壅。寒則作泄。虛則作驚。怯則作結。善爲治者。寒則溫之。熱則凉之。壅者壯營。怯者益衛。驚則安神。結則微利。壅則瀉。泄則固脾。風則祛逐。濕則分消。痰則開豁

治黃

兒生下遍體黃如金。此胎中受濕熱也。其證壯熱大便不通。小便如梔汁。乳母可服生地黃湯加芍

陳忌食熱毒之物

生地黃湯　乳母服。亦與兒服

生地　赤芍　川芎　當歸　花粉等分水煎服

胎赤

小兒月裏遍身生赤。肌如丹塗者。此胎中受熱毒也。母服清凉飲子。外以藍葉散塗之。

清凉飲子　治一切裏熱血熱

當歸　赤芍　甘草　大黃　右水煎服。

藍葉散　治一切丹毒赤腫。身熱風熱毒盛赤如丹塗。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

藍葉。浮萍。水苔。同研爛絞汁。調朴硝土硃塗之。

發嘔

兒初生下便嘔者。此由拭口中穢血不盡。咽下。故令兒吐也。木瓜丸主之。大哭後食乳而嘔者。必乳停膈中。氣不宣通。故嘔也。消乳丸主之。即消食丸見變蒸門

木瓜丸

木瓜末　木香末　檳榔末　麝香各一字

蜜丸粟米大。每服三丸。甘草水下。

臍風撮口口噤

初生兒有一病。一口噤。一撮口。一臍風。皆是急症。噤口尤甚。過一臘方免此症。初生七日內外。忽口噤不乳。與撮口相似。但口噤面赤多啼。口不吐白沫。與撮口面青啼不出。口吐白沫者異。將天南星去皮臍。研為細末。龍腦少許合和。用指蘸生薑汁。同藥末於大牙根上擦之。立開。

臍風者。壯熱痰盛眼翻口噤是也。天麻防風丸

撮口者。唇撮聚不能開。蝎稍散。

錢孔純云。臍風撮口。若兩眉青色。臉赤腹脹。不可用藥。　聖惠方云。先撮口而生驚。若臍邊青黑。撮口不開。是為內搐不治。爪甲青黑即死。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

天麻防風丸 方見驚風

蝎梢散　治百日內撮口臍風。及胎風。

蝎梢四十九箇　僵蠶四十九箇　片腦少許另研　麝香少許另研

先將薄荷包札蝎梢僵蠶在內。炒薄荷葉乾爲度。共研細。入腦麝末研勻。用紫雄雞肝煎湯調下。

胎驚

胎驚者。生下至月裏。就驚踢抽掣。握拳發熱者。抱龍丸。至聖保命丹○按前症。是內臟感受。發爲痰搐。難治。發不過兩三次必死。

抱龍丸　治驚風痰喘咳嗽。保肝使心火不戕。

天竺黃一兩　雄黃　硃砂各五錢　膽星四兩

右研極細末。蜜丸龍眼大。每服一丸。薄荷湯調下。

至聖保命丹　治胎驚搐搦痰盛。及一切急慢驚風

天南星炮　僵蠶炒去絲嘴　防風各五錢　全蝎三十箇去蠆泥焙乾

白附子炮　天麻炒　蟬蛻各四錢　雄黃一錢　麝香少許

右末。蜜丸一錢重。硃砂金箔爲衣。薄荷燈心湯下。

胎熱

胎熱者。胎中受熱也。大小便不利。丹毒瘡瘍。赤疹赤目重舌木舌口瘡是也。大連翹飲。五福化毒丹。

大連翹飲

Last Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

柴胡　防風　荊芥　連翹　黃芩　山梔
木通　滑石　車前　瞿麥　蟬蛻　赤芍
甘草　便秘熱盛者。加大黃。

五福化毒丹

玄參三兩　桔梗三兩　甘草七錢　牙硝五錢　青黛一兩　人參七錢
茯苓一兩半　一方加黃連一兩炒　末之。煉蜜丸一
錢。硃砂衣。薄荷湯下。瘡疹後餘毒上攻。口齒臭氣
生地黃汁化下。

胎寒

胎寒腹痛。泄而不乳。胎白薑散當歸散。

白薑散　治胎中受寒腹痛不乳

木香　檳榔　陳皮　甘草炙　肉桂　白薑等分
每服一錢。水一合。煎。以綿蘸吮之嘔加木瓜丁香。

當歸散　治胎中受寒。厥逆便青。心腹疼。內鈎。

當歸二錢　木香　肉桂　人參　甘草減半　薑棗煎。

胎肥胎瘦

胎肥。生下肌肉厚。遍身色紅。滿月後。漸漸羸瘦。眼
粉紅。五心熱。大便難。時時生涎。胎弱。生下面無神
氣。肌肉薄。大便白水。時時硬氣。多歲。目無精光。肥
瘦並用浴體法。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

浴體法

天麻二錢 蝎梢去毒 硃砂五分 麝香一字 白礬三錢 青黛三錢

烏蛇肉三錢酒浸焙乾爲末

右同研勻。每用三錢。水三碗。桃枝一握。葉四五葉同煎十沸。溫浴。勿浴背。

○變蒸三

歌 嬰兒臟腑未全成。長養之時必變蒸。變則氣升蒸則熱。八蒸十變始成人。

論 夫小兒初生形雖具。其氣血精神。志意魂魄。俱未能全。故三十二日一變。六十四日一蒸。凡過一變。即覺性情自有異於前。所以長養志意故也。生至三十二日一變。生癸水。屬足少陰腎。主精神。六十四日一蒸。二變。生壬水。屬足太陽膀胱。其發耳與尻冷。至九十六日三變。生丁火。屬手少陰心。主藏神。其性爲喜。至一百二十八日四變。二蒸。生丙火。屬手太陽小腸。其發汗出而微驚。至一百六十日五變。生乙木。屬足厥陰肝。主藏魂。喜哭。至一百九十二日六變。三蒸。生甲木。屬足少陽膽。其發目不開而赤。至二百二十四日七變。生辛金。屬手太陰肺。主藏魄。生聲。至二百五十六日八變。四蒸。

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

生庚金。屬手陽明大腸。其發膚熱而汗。或不汗。至二百八十八日。九變生己土。屬足太陰脾。主藏意與智。至三百二十日。十變五蒸。生戊土。屬足陽明胃。其發不食腸痛而吐乳。又手厥陰心包絡與手少陽三焦二經。俱無形狀。故不變而不蒸。十變五蒸者。天地之數。以生成之。然後生志意能言語。知喜怒。故五始全也。十變後。六十四日爲一大蒸。計三百八十四日也。長其經脉手足。故手受血而能持物。足受血而能行立。又六十四日爲二大蒸。計四百四十八日。則言語意志。大異於前。又六十四日爲三大蒸。計五百一十二日。變蒸既足。兒乃成人。蓋變者。變生五臟志意。蒸者。蒸養六腑氣血。故變則上氣蒸。則體熱。每一變蒸輕則發熱微汗如驚。五日乃解。重則壯熱脉亂而數。或吐或汗。或煩啼燥渴。七日始解。亦有變蒸之餘。續感寒邪。隨症調之可也。其有不熱不驚而暗變者。胎氣實故耳。

柴胡湯　治變蒸骨熱心煩。啼叫不已。或寒熱往來

人參　甘草　麥冬去心　防風　柴胡　龍膽草

惺惺散　治變蒸發熱。咳嗽痰涎。鼻塞聲重。或挾痰疹發熱者。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

川芎　桔梗　人參　白朮　茯苓　甘草

細辛　花粉　生薑　薄荷　水煎溫服

紫陽黑散　治變蒸熱不解及挾時瘟病。

麻黃（去根節三分）　大黃（一分）　杏仁（一分一半去皮一半連皮）

右三味。燒存性。研末。每服半錢。水半盞煎服。抱兒於煖處。取微汗。身涼即愈。

調氣散　治變蒸吐瀉。不乳多啼

木香　香附　人參　厚朴　藿香　陳皮

甘草（等分）　蘇棗煎服

消食丸　治變蒸時乳食過多。胃氣不能消化。

砂仁　陳皮　三稜　蓬朮　神麯　麥芽（等分）

香附（加倍）　末之。麵糊丸。白湯下。量兒加減。

○辨虎口紋四

【歌】積黃青色是驚風。熱赤傷寒紫淡紅。黑痛白爲虛冷嗽。更參隨部用神工

【論】看小兒左右叉手處。名曰虎口。自虎口而上。第一節名曰風關。第二節名曰氣關。第三節名曰命關。有紋見於風關易治。透過氣關漸難。過三關多死候。左手之紋。病應心肝。右手之紋。病應脾肺。紋有五色。紫者風邪在表。驚則紋青。淡紅則寒熱在表。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

深紅必發傷寒痘疹青紅者驚熱。紋亂則病久。紋細則腹痛多啼。乳食不消。紋麄直射指甲。必主驚風惡候。紋黑如墨。大抵困重難治。

○診三關脉五

【歌】小兒有病須憑脉。一指三關定其息。浮洪風熱數爲驚。虛冷沉遲實有積。

【論】浮脉爲風秋得之曰平。餘時主傷風寒。頭疼壯熱。或夜熱晝涼。咳嗽噴嚏。鼻塞清涕。嘔逆不食　洪脉爲熱夏得之曰平。餘時主風熱壅盛。身體溫壯。發驚。瘡瘍血泄。　數脉爲驚。春得之曰平。餘時主驚風抽掣。脉數小者多睡惕跳。直視恐怖盜汗。夢中咬牙。吐舌喘吐。脉數大者一二日間。必發搐搦。沉遲爲虛冷。四時得之。主脾胃虛弱。滑泄脫肛。吐痢不止日漸尫羸。以成脾困。或作疳勞。　實脉爲積滯。冬得之曰平。餘時主食傷積聚腹脹或痛。髮豎吐利。緩治即成疳勞。丁奚哺露候。當取積後補。

吐瀉六

【歌】吐瀉須知熱與寒。瀉黃吐乳熱。邪干瀉青吐逆爲寒候。更把天時月日參。

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

論經云。脾虛則瀉。胃虛則吐。脾胃不和。陰陽不順。清濁相干。則吐瀉兼作。錢孔純云。小兒吐瀉。有濕。有熱。有寒。有驚。宜詳察而分治之。如夏月中暑發渴引飲。霍亂吐瀉。臉赤唇紅。去後黃沫色。小便赤澀者。爲熱。可用香薷五苓等藥治之。冬時中寒。腹痛厥逆。吐瀉白色。不渴。面微青色。唇紫。大便如凍汁。或米穀不化。先戰慄而小便去者。爲寒。可用香附砂仁煨薑木香等藥治之。面微黑黃。眼亦黃。手足及腎囊稍腫。腹脹臍凹。小便短少。善嘔而無食。[illegible]多唇白氣似愛坐。畏眠者。爲濕。可用蒼朮厚朴茯木瓜等藥治之。面赤身熱。睡臥不寧。目睛斜定。頸仰身搖。不時悸動。舌碎唇瘡。哯乳便青者。爲驚。可用天麻川芎茯苓肉果等藥治之。吐瀉乳食不化。因傷粘膩難消之物。滯於中脘。不上不下。但食即吐。面色青白。發熱。四肢逆冷。不可便投止吐瀉藥。當先取積消導。寬利胸膈。次用調脾和胃之劑。此皆合而言之也。愚謂有吐無瀉者。胃必熱。然亦有寒而吐者。有瀉無吐者。胃必寒。然亦有熱而瀉者。何以辨之。蓋吐清涼。順而易出者。爲寒。吐苦酸逆而難出者。爲熱。瀉青白。小便利者。爲寒。瀉黃赤。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

肛門如燒者爲熱。又瀉痢發噦者爲虛。只吐不瀉者爲逆。各隨其所屬治之可也。

和中清熱飲　治熱吐

黃連薑炒一錢　半夏薑製一錢　茯苓一錢五分　陳皮　藿香

砂仁各七分　水煎徐徐服

溫中止吐湯　治寒吐

白豆蔻　茯苓各一錢　半夏五分　生薑五片

水煎。磨沉香四分。熱服。

清熱止瀉湯　治熱瀉

白茯苓　滑石各一錢　白朮六錢　澤瀉七分

川黃連薑炒四分　加生薑煎服

溫脾止瀉湯　治寒瀉

白朮上炒　白茯苓各一錢　桂三分　肉果五分

甘草二分　加生薑煎服

安胃醒脾湯　治吐瀉兼作。脾胃俱受病者。

白朮　白茯各一錢　滑石水飛　砂仁炒各七分

木香煨五分　薑棗煎服　停食。加枳實山查麴蘖

夾驚。加膽星天麻。　風加防風乾葛。　暑加香薷

匾豆。　虛加人參。　內有熱加黃連。　口渴加烏

梅肉。　吐不止。加藿香。　瀉不止。加升麻。

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

○驚風七

歌　小兒驚病有多端。或食因驚或有痰。故使卒然成搐搦。咬牙眼竄足筋攣。食須消導痰須豁。驚可清心痰自安。或若驚風心積熱。風痰潮作起於肝。一時搐急如風火。驚熱風痰四症分。吐利致虛脾胃損。露睛昏睡遍身寒。慢驚自是使陰症。急救稍遲又恐難。虛極歸脾危急甚。脾風死在片時間。忽因客忤驚啼症。天弔驚抽眼目翻。內虧盤腸寒內盛嬰兒還有痙和癇。此爲驚候分深淺。勿得糢糊作等閒。

論　夫小兒元氣未充。心神未定。輒有驚悸。致病匪一。或多食而壅熱。或食後而遇驚。或舍空而痰聚。或內積熱而生風。故有驚搐風搐食搐痰搐四症。審其因而療之可也。或有實熱。外挾風邪。心受熱而即驚。肝風生而發搐。痰涎壅盛。風火併作。百脉阻滯。關竅不通。風熱蕃盛。而無所泄。乃暴烈而作急驚。其狀牙關緊急。熱涎潮作。竄視反張。搐搦搖頭。口眼眨引。口中熱氣。唇紅。大便閉。小便赤。脉浮數洪緊是也。或因吐利傷寒痢疾吐血瀉血之後。元氣不足而生風動驚者。名曰慢驚風。其狀遍身冷。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

口鼻氣亦冷。或身微熱不冷。手足瘛瘲。昏睡露睛。此無陽也。急宜溫補。隨症調之。尚可治療。其或面青額汗。舌短頭低。眼合困睡。搖頭頻嘔。口噤咬牙。手足微搐而不收。身冷肢厥。脉微沉。此慢脾之候。由吐利損脾。病傳已極。總歸處。惟脾所受。若逐風。則無風可逐。若療驚。則無驚可療。但脾間痰涎虛熱往來。此危甚也。大劑薑附。十可救一二。其天癇者。陽也。壯熱驚搐。眼目翻騰。手抽筋搐。或啼或笑。喜怒不常。甚者爪甲青如祟狀。蓋由乳母酒食過度。毒氣入乳。遂令心肺生熱。痰鬱氣滯。加之以外挾風邪故也。治宜解風熱而已。內癇者。陰也。其狀腹疼多啼。唇黑囊腫。傴僂反張。眼內有紅筋斑血。蓋風氣壅結。兼驚而得之。或胎中有驚有風而得。先是內臟抽掣。極痛狂叫。或吐瀉縮脚忍疼。癇症一過。外症抽掣又來。內外交攻。極難調理。須分兩項下藥可也。夜啼者臟冷也。蓋陰盛於夜則冷動。冷動則為陰極發躁。寒盛作疼。故夜啼亦有心熱煩啼者。必有臉紅舌白。小便赤澀之症也。當分寒熱治之。客忤者。由小兒神氣嫩弱。外來客氣。獸類異物。觸而忤之。其狀驚啼。口出黃白沫。面色變易。

喘息腹痛。發則瘛瘲如癇但眼不上竄。脉來弦數視口中有懸癰左右有小腫核。以竹針刺之。治宜辟邪正氣散驚定心爲上。延久則難爲力也。癇有五。小兒之惡症也。幼小血氣不斂。筋骨不聚。爲風邪所傷。驚怪所觸。乳哺失節。停痰結癖而得之。其狀神氣怫鬱。瞪眼直視。面目牽引。口噤流涎。肚腹膨脹。手足抽掣。或言或嘿。似死似生。或背項反張。或腰脊强直。但四肢柔軟。發而時醒爲癇。其五臟形症列于後。痓者痙也。痓有陰陽二症剛柔之名。一身强硬。發而終日不醒是也。癇有風驚食三症。各究其因而治之。詳其狀而辨之。則用藥無差。有不知其名而妄治。如涉海問津也。

急驚風

急驚之論。前代書所不載。惟曰陽癇。大槩失所愛護。或抱當風。或近熱地。晝則多食辛辣。夜則衾蓋太厚。鬱蒸邪熱。積于心。傳於肝。再受人切驚觸。或跌撲叫呼。雷聲鼓樂。雞鳴犬吠。一切所驚。未發之時。夜臥不穩。困中或哭。齧齒咬乳。鼻額有汗。氣促痰喘。忽爾悶絕。目直正視。牙關緊急。口噤不開。手足搐掣。此熱甚而然。況兼面紅脉數可辨。蓋心有

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

熱而肝有風。二臟乃陽中之陽。心。火也。肝。風也。風火。陽物也。風主乎動。火得風。則烟焰起。此五行之造化。二陽相鼓。風火相搏。肝藏魂。心藏神。因熱則神魂易動。故發驚也。心王乎神。獨不受觸。遇有驚則發熱。熱極生風。故能成搐。名曰急驚。以瀉青丸瀉肝。導赤散瀉心。珠珀丸。牛黃丸。皆要藥也。驚風關竅不利。人不省。通頂散。驚風熱涎潮作。牙關緊急者。礞石滾痰丸。驚熱者。凉驚丸。風盛發搐者。天麻防風丸。小兒只有痰熱。未有驚風者。止可退熱化痰。不宜妄投驚風藥。蓋經絡本無病。而以寒[illegible]攻擊之。反使痰熱透入。却成風癇。[illegible]急驚風。[illegible]三兩聲者。是心絕。難治。急驚風。四肢俱軟者不治。急驚風。鼻中出血者。其熱將散。故易治。口中出血者。是血妄行。故難治。驚風大小便秘者易治。尿屎遺者難治。急驚風關黑紋條直者死。

瀉青丸（又名鎮肝丸）治肝熱驚風目竄或暴赤抽搐

當歸　川芎　山梔　大黃　羌活　防風

膽草　生地　竹葉　琥珀　天竺黃（各等分）

右爲末。蜜丸芡實大。砂糖湯下。加硃砂。名驅風膏。

導赤散　治心經實熱。從小便利之。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

生地　木通　甘草　淡竹葉各等分　水煎服。

一方加防風黃芩黃連導去心經邪熱搐自止。

珠珀丸　治驚風痰涎。熱嗽不出聲。上下不能升降。

牛黃一錢　天竺黃　琥珀各五錢　雄黃四錢　冰片一分半

膽星一兩　青礞石硝煅如金色者一兩　細珠子一錢五分

一方有枳殼微炒一兩。生黃芩二兩。右各研極細末。蜜丸。重一錢二分。硃砂金箔為衣。薄荷燈心湯下

牛黃丸　治一切驚風。肺脹喘急。痰涎灌膈。手足搐搦目竄口喎角弓反張。悶亂癲癇。呵欠昏憒。

全蝎　殭蠶　天麻　羌活　防風等分　膽星

天竺黃次之　雄黃加箔　牛黃　冰片　麝香

右各為細末。研勻。蜜丸。重一錢二分。硃砂金箔為衣。薄荷燈心薑湯調下。大人中風亦可服

礞石滾痰丸　治驚癇痰涎壅盛。喘促不寧。

大黃酒拌蒸　黃芩各四兩　礞石硝煅金色五錢　沉香一錢

右為末。蜜丸如芡實大。量兒加減。大人亦可服

涼驚丸　治驚熱

防風三錢　青黛三錢　龍膽草三錢　鉤藤二錢

牛黃五分　麝香一分　龍腦少許　黃連二錢

右為末。蜜丸芡實大。每服一丸。薄荷湯下。不拘

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

通頂散 又名搐鼻散 方見中風

慢驚風　慢脾風

慢驚受病不一。或急驚用涼藥。取下太過。以致脾胃虛損。風邪乘之。又有吐瀉不止而成者。有氣虛暴吐瀉而成者。有傷寒傳變日久而成者。有久嗽而成者。有下積峻取而成者。惟吐瀉積痢成虛。則變症甚速。凡纔吐瀉。便是慢驚。須用溫中快裏。或搐來緊急。乃慢驚初傳。尚有陽症。不可誤作急驚用涼藥。世言搐慢為慢驚非也。若泥此。往往指慢脾風為慢驚矣。凡慢驚。男子以瀉得之為重。女子以吐得之為重。古人有云。病家怕驚不怕瀉。醫家怕瀉不怕驚。如瀉久不止。且先治瀉。若更治風。則驚風愈甚。只可養脾安胃生津大養脾丸。參苓白朮散。大醒脾散。烏蝎四君子湯。不拘時服。如因他症。例當循根原施治。慢驚。口眼手足一邊牽引者。難治。慢驚風要唇紅。若顖腫者死。仲景云。陰不得有汗。蓋陰症無汗。有汗亡陽。故凡慢驚有汗多死。

○慢驚傳入慢脾。其變甚速。虛又甚也。治必循次平和。無令速愈之理。治法大要生胃回陽。不可過劑。仲陽有黃土湯。以土勝水。木得其平。則風自止。以

脾土爲本也若眼半開半合手足不冷症候尚在慢驚則勿用回陽或已入慢脾而陽氣猶未脫者亦未可卽用硫黃附子等劑手足漸煖仍以醒脾散等調之慢脾風用藥仍非得已危如燈無油漸見昏滅慢脾風若見有一臟絕卽不可用藥

天麻防風丸　治一切驚風

天麻　防風　人參各一兩　膽星二錢兩雄黃二錢另研　甘草炙　全蝎薄荷湯煮數沸焙乾　殭蠶炒去絲嘴各五錢

右爲末蜜丸彈子大硃砂金箔爲衣每服一丸薄荷燈心薑湯下如驚重每丸加牛黃半分更妙

聖保命丹方見前胎驚條一切急慢驚風皆治

參苓白朮散方見四卷泄瀉條　治脾虛泄瀉之要藥

大醒脾散　治慢脾風

白朮　茯苓　陳皮　甘草　人參　石蓮肉　木香　丁香　南星　白附　砂仁　全蝎

右陳倉米一撮生薑一片大棗二枚煎服

烏蝎四君子湯　治慢驚慢脾風吐瀉不止者

卽四君子加烏全蝎薑棗煎

夜啼

夜啼有寒腹痛面青口中冷厥逆便泄不乳鈎藤

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

散去當歸。加乾薑肉桂。夜啼有熱症者。鈎藤散。去當歸木香。加辰砂木通。或乳頭散。啼而不哭是痛。故直聲來往無淚。哭而不啼是驚。故連聲多淚。若眼白青色。唇紫不治。

鈎藤散

鈎藤　茯神　茯苓　川芎　當歸　木香等分

甘草減半　薑棗煎服。加減如前。

乳頭散 又名火花膏　燈花七箇　硃砂少許　蜜調塗乳頭。與兒吮

客忤

客忤者。取其觸忤之意也。小兒氣血怯弱。精神恍惚。忽遇生人。及牛馬之類。感觸則生驚。狀貌如癇。眼不戴上。其脉弦急數者。是其候也。若中惡客忤。急作醋炭。或降香棗角熏之。以蘇合香丸薑湯調灌用豆豉搗丸彈子大。擦五心五六次。

蘇合香丸 方見第二卷中風條

天痼

小兒天痼者。取其眼上視而名之也。其症心神不安。渾身壯熱。手足抽掣。驚悸。眼目翻騰。痰熱壅滯。此候皆因乳母飲食無常。酒肉過度。毒氣入乳。即便乳兒。遂使宿滯不消。心肺生熱。熱盛鬱滯。加以

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

外挾風邪。致有此症。況小兒發搐。未有不眼上者。實以陽搐之候也。治宜去痰。解風熱。用鈎藤飲。如見魚口。鴉聲。目無光。指甲黑者死。

鈎藤飲　治天癇潮熱

鈎藤　茯苓各五錢　大黃煨二錢半　防風　硃砂

蟬退　羌活　獨活　青皮　甘草各二錢

右爲末。每服二錢。薑棗煎。

內癇

驚風內癇。盤腸氣癇。大同小異。內釣兼驚風而[illegible]之。服乳香丸効。氣釣惟小腸爲寒所搏。宜鈎藤[illegible]治之。歌云。盤腸氣發先腰曲。無淚叫啼眼乾[illegible]開脚冷上唇烏。額上汗流珠碌碌。

乳香丸　治驚風內癇。痛不可忍。

乳香　沉香　檳榔各一錢半　蝎梢二七箇　沒藥半錢

右爲末。煉蜜丸如豆大。嬰兒每服三丸。一歲五丸。三歲七丸。以意加減。煎乳香湯下。

鈎藤膏　治盤腸氣釣

乳香研　沒藥研　薑黃　木香　共爲末。煉蜜爲膏。每服如皂子大。煎鈎藤湯下。一日三服。

痓症

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

痓候。由先傷於風。又感寒濕致之。此虛極生熱。熱極生風之甚者也。傷風發熱。頭疼。汗出。嘔吐。醫者不明。又汗之。必發痓。寒濕發汗稍多。亦發痓。此症項背強直。腰身反張。搖頭瘛瘲。口噤發熱。腹痛不醒。其狀可畏。病足太陽經。剛痓無汗。柔痓有汗。其面紅眼赤。牙緊手張。痰涎壅盛。昏憒煩渴。小便赤澀。先譫語而發者。剛痓也。其大便滑泄。不語不渴。先手足冷而發者。柔痓也。並以小續命湯加減。剛痓去附子。用麻黃。柔痓用附子。去麻黃。大便利。厥逆者。則以熱附子佐之。痓最難痊。十救其一。過三日則難治也。

小續命湯 方見第二卷中風條

癇症

大抵癇症多端。不出五者。若面赤目瞪。舌吐心煩者。爲心癇。若面青唇青目上竄。手足攣掣。反折。爲肝癇。若面黃。腹滿自利。四肢不收。爲脾癇。若面白如枯骨。目白反視。驚跳口吐涎沫。爲肺癇。若面黑而晦。振目視人。吐清沫不動如尸。爲腎癇。五臟之癇雖各有主。然不過風驚食三者。又不外陰陽二症。陽癇發熱脉浮。洩赤便秘。口中氣熱。其病在腑。

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

易治陰癇身冷脉沉。口中氣冷其病在臟難治。治風癇。則先散風。治驚癇則先利驚治食癇則先消導。續以定癇等劑主之。

化風丹　凉風化痰。退熱定搐。治風癇先宜此藥

膽星　羌活　獨活　防風　天麻　人參

川芎　荊芥　粉草各一錢　全蝎一箇

右爲末。煉蜜爲丸皂角子大。每服一錢。薄荷湯下

此金丸　治驚癇先用此藥

人參　琥珀　茯苓　朱砂　遠志薑制炒

天麻　南星　川芎　菖蒲　青黛各一錢　麝香

右爲末。蜜丸桐子大。每服一二丸。金銀薄荷湯下

虎睛丸　治驚癇邪氣入心

虎睛細研　遠志薑制　犀角剉　大黃煨　菖蒲　麥冬各一分

蜣螂去足翅炒三枚

右爲末。米糊丸桐子大。每服一二丸。金銀湯下。

○疳病入

歌　心肺肝脾腎五疳。形容羸瘦髮毛乾。四肢枯細尿如乳。肚大青筋飲食貪。心症口乾時壯熱。虛驚面赤更心煩搖頭揉目睛生膜。髮直筋青疾在肝。咳嗽氣粗多喘急。肺家洒淅熱仍寒。遍身瘡疥形如

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

鬼。足冷斷宣把腎參。腹滿氣粗頻泄利。脾虛偏愛土泥食。潮熱骨蒸多盜汗。勞疳羸瘦面黃顏。脊疳脊骨如刀鋸。指背生瘡可驗看。腦熱顱高疳在腦。乾疳乾渴大便難。熱疳便澁身如火泄利頻頻認作寒齒痒多啼唇口紫。蛔蟲盤結胃腸間。丁奚項小并顱陷。肉削尻高臍又翻。哺露往來虛熱甚。頭開嘔吐胃中關。無辜腦項因生核。不破須知治療難。

論 夫小兒臟腑嫩嬌。腸胃脆弱。易傷飲食。一或失調。不為疳者鮮矣。蓋飲食恣情。甘肥無度。致傷脾胃。脾胃一虛。則飲食不能運化。食不能化。則腹滿泄利。生熱生積生痰。所以肌肉日削。氣血日消。元氣日損。骨熱煩蒸。或幼小缺乳。粥飲太早。耗傷形氣。此二者。疳之所肇端也。延及歲月。多致不救。疳之狀不一。古有五疳之名。蓋傳入五臟也。如心疳者。面黃頰赤。煩滿壯熱。心煩虛驚。口瘡。肝疳者。搖頭揉目。白膜遮睛。合面而睡。汗流。面色青黃。髮立青筋。腦熱羸瘦。脾疳者。肚腹脹。氣粗。利下酸臭。愛喫泥土。肺疳者。咳嗽氣逆多喘。揉鼻咬甲。寒熱往來。腎疳者。肌體極瘦。遍身瘡疥。齒腫斷宣。甚則牙齒

潰脫。俗云走馬疳。寒熱頭熱脚冷。此五疳也。五疳之外。又有熱疳者。潮熱如火。大便澀滯。冷疳者。時時泄利腹痛。虛汗不止。疳勞者。骨蒸潮熱。盜汗。腹急。面黃肌瘦。飲食不爲肌膚。脊疳者。蟲蝕脊膂。身熱黃瘦。煩熱下痢。脊骨如鋸。十指皆瘡。頻齧爪甲。腦疳者。頭悶腦熱。滿頭生瘡。身汗顖腫。乾疳者。瘦瘁少血舌乾目睛不轉。乾啼身熱。手足清冷。皮燥便秘。搭口癡眼。疳渴者。臟中有風熱。疳氣加之。乳母恣食五辛酒麪炙煿。使兒心肺壅熱。口則[illegible]飲水。乳食不進。夜則渴止。疳瀉者。毛焦唇白。

青紋肚大腸鳴。泄利。疳痢者。挾外邪。或停宿滯。頻下惡痢。疳腫脹者。虛中有積。毒與氣并。故腹肚頭面四肢浮腫。蛔疳者。多啼嘔清水。腹痛脹滿。唇口紫黑。腸頭及齒痒。丁奚疳者。手足極細。項小。尻高。肉削。體瘦。臍突。號哭胷陷。或生穀癥。痰喫生米。哺露疳者。虛熱往來。頭骨分開。翻食吐蟲。煩渴嘔噦無辜疳者。腦後項邊有核如彈。按之轉動。軟而不疼。其間有蟲如米粉。不速破之。則蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑。以致肢體癰瘡。便利膿血。壯熱羸瘦。頭露骨高。初起可用鐵破。膏藥貼之。得之浣衣時。投

兒衣露於簷下。爲無辜鳥落羽所汚。兒著此衣。蟲入皮膚故也。若衣用火烘著。則無此患。凡此之類皆疳症也。

茯苓丸　治心疳驚疳

茯神　琥珀　黃連　蘆薈　赤茯苓各三錢

遠志薑制　菖蒲各一錢　麝香少許　蝦蟇炙　鈎藤皮各二錢

右爲末。米糊丸。如麻子大。每服十丸。薄荷湯下。

大蘆薈丸　治肝疳。殺蟲。和胃。止瀉。兼治春疳。

蘆薈研　胡連　田連　蕪荑去扇　青皮　木香

鶴虱微炒　雷丸破開。有者住赤色者殺人不用。[illegible]　麝香少許　砂仁減

右爲末。米糊丸。菉豆大。每服一二十丸。米飲下。

清肺飲　治肺疳。熱蟲穿鼻孔。汗臭或生瘜肉。

紫蘇　前胡　黃芩　當歸　連翹　防風

赤茯　生地　天冬去心　甘草炙　枯梗各一兩　桑皮炒一兩

細剉。每服二錢。水煎。食後服。

肥兒丸　治脾疳食疳。若治一切疳。後備加減法

麥芽　神麴　史君　胡連　木香　檳榔

肉果○有蟲。加鶴虱。雷丸。胡粉。苦練根之類。○積多。加三稜。蓬朮。枳實。厚朴之類。○眼痛加木賊龍膽。車前之類。○腹膨脹。加蘿蔔子。蝦蟇乾

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之類。○浮腫。加赤茯苓。滑石。桑皮之類。○脾虛泄瀉。飲食不爲肌膚。加四君子之類。○肺熱咳嗽。潮熱骨蒸。衄血盜汗。加白芍。生地。黃芩。知母。銀柴。地骨。門冬之類。○渴加天花粉。烏梅之類。○血虛脉弱神衰。加當歸。熟地。人參。紫河車。

右爲末。丸如龍眼大。每服一丸。空心陳米湯化下

丸味地黃丸　治腎疳

熟地四兩　赤茯　山茱萸肉　川練子　當歸

川芎　丹皮　史君子肉　乾山藥各二兩

右爲末。蜜丸梧子大。每服七八十丸。空心溫酒下

走馬牙疳方　滕氏眞傳

五倍子焙　人中白煅　枯礬　緋丹焙紫色　輕粉少許

片腦少許

右共研勻。敷患處。

魃病附

小兒未斷乳。母復有胎兒飲其乳。羸瘦骨立。髮黃壯熱。大便不調。名曰魃病。或有姙而抱他兒。亦能致之。先令兒斷乳。後服消乳丸方丸變蒸　異攻散

異攻散　即四君子加陳皮。

○瘧疾丸

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

歌 兒瘧多從痰積成。風傷驚觸不同論。頭疼體痛爲風瘧。發搐由來必是驚。咳喘便知痰所得。若還食瘧腹中疼。瘧久脇傍因有塊。此名瘧母爲根深。

論 小兒之瘧。多是食積痰飲。留於脇下。故作寒熱。蓋人之一身。腰以上。陽主之。腰以下。陰主之。脇下者。當其中。爲陰陽升降之樞。故脇下有痰食。塞其道路。陽欲與陰交。而爲所阻。熱斯作焉。陽得過其處熱斯解矣。陰欲與陽交。而爲所間。寒斯作焉。陰得過其處。寒斯息矣。又有寒熱往來。兼以頭疼骨節痛。明是風邪。得汗即解。又有寒熱往來。兼以腹膨作痛。明是食積。得下即愈。又有熱而不寒者。病在裏。調其中而已。寒而不熱者。病在表。解其肌而已。一日一發者。榮衛行速故也。得病爲近。間日一發者。榮衛行遲故也。得病爲遠。凡治小兒之瘧。以食積痰飲爲主。而風邪次之。驚又次之。乃得治瘧之要焉。詳載第四卷第二論中。

○瘧疾例方

檳榔　草果　半夏　貝母　柴胡　黃芩等分

甘草少許　煎服

○食瘧腹膨食少。或時作痛。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

麥芽　神麯　檳榔　草果　柴胡　蘇葉

蘇梗各一錢　煎服

○痰瘧咳嗽喘急

川芎　柴胡　貝母　知母　橘紅　黃芩

蘇子各一錢　煎服。

○風瘧頭痛。骨節疼。或鼻塞氣麄。

羌活　防風　蘇葉　川芎　柴胡　白芷等分

甘草減半　煎服

○驚瘧寒熱發搐

茯神　遠志去心　麥冬去心　柴胡　半夏薑制各一

甘草二分　煎服

○痎瘧久不愈。脇下有塊。俗名瘧母。服鼈甲丸方見四卷

○陰瘧至晚即發。累月不已

人參　芍藥炒　川芎　柴胡各一錢　炙甘草

紅花各三分　煎服

○痢疾十

【歌】小兒食積因成痢。初起必當先導滯。赤屬熱而白屬寒。紅而散者從傷治。下如五色定難醫。久病脫肛宜補氣。若還身熱不加餐。從來患此終須斃

【論】小兒痢疾。不問新久。皆以食積治。新者必用消導。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

久者必兼調補。挾熱治熱。挾寒治寒。挾傷治傷。白者爲寒。赤者爲熱。深黃者亦熱。紅而散者爲傷。治痢以傷。痢或尋愈。治傷以痢。未有愈者。（詳載第四卷。宜參看）

○初痢宜消導

檳榔　枳實　蓬朮　大黃　牽牛（各等分）爲細末

白滾湯送下。每服三錢。逐去積滯。徐爲調補。

○赤痢宜消化兼涼

當歸　黃連　滑石　赤麴　芍藥　神麴

陳皮（各一錢）　甘草（四分）　煎服

○白痢宜消化兼溫

白朮　茯苓　神麴　麥芽（各一錢）　肉桂

木香　甘草　煎服

○純血痢兼傷治

當歸　紅花　赤麴　滑石　山查　麥芽

甘草（三分）　煎服

○積病十一

歌　積病原因乳哺成。審其虛實察其形。更看驚積與氣積。面黃肚熱得其情。

論　小兒有乳積。食積。氣積。驚積。虛積。實積。積塊之不同。惟夜間有熱。肚熱面黃者。傷積之明驗也。乳積

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

者。因兒啼叫未住。即便乳兒。致傷胃脘。吐下酸臭是也。食積者。乳食過飽。飽即困睡。肚脹吐瀉是也。氣積者。因母怒氣不散。即便乳兒。兒食氣乳。停滯不化。腹痛多啼。痢如蟹渤是也。驚積者。受驚而後有積。時泄青菜汁是也。虛積者。或曾傷食吐瀉。或曾取轉致虛。其積尚伏。故曰虛積。面與手足俱腫是也。實積者。壯熱屎硬。口渴引飲。善食是也。和脾化積湯加減治之。積塊者。丹溪云。氣不能成塊。乃痰與食積死血也。凡治積塊。不可專用下藥。徒損真氣。病亦不去。當消[illegible]行血開痰為主。塊去須大

[illegible]錢孔純云。癖塊遊走不定。攻則痛悶。日漸枯[illegible]急用化癖法貼之。內服消積化聚丸以除痼疾。若臉黑頰青不治。詳載第四卷。宜參看。

和脾化積湯　治小兒一切諸積。後備加減法。

山查　枳實　蓬朮　厚朴　白芍　甘草

陳皮○乳積。加砂仁。香附。○氣積。加木香。蘇梗○驚積。加茯神。遠志。○虛積。加白朮。茯苓。○實積。加檳榔。牽牛。○表有熱。加柴胡。黃芩。○裏有熱。加黃連。木通。○小便不利。加滑石。澤瀉。○大便不通。加大黃。枳殼。○寒月。加益智。草豆蔻

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

消積化聚丸　治五積六聚痞癖攻痛。

三稜　白朮炒　茯苓　黃連　乾漆炒去烟　木香

硇砂　益智炒　歸尾酒洗　麥芽微炒各三兩　紅花

砂仁炒　門冬　枳殼炒　穿山甲燒灰　青皮

柴胡　神麯炒各二兩　蓬朮煨　檳榔炙　桃仁

香附薑汁拌炒　鼈甲醋炙各四兩

右末。蜜丸。重三錢。空心陳米湯化下。

琥珀膏

大黃　朴硝各一兩爲末。以大蒜搗膏貼之。

○傷寒十二

歌。要兒氣怯病傷寒。夾食夾驚分兩般。要解六經傳變候。參詳仲景活人方。

論。活人書云。傷寒大人小兒治一般。但小小分劑。藥性差涼耳。要之其傳變。其形證與大人不殊也。其所異治者。夾驚夾食而已。錢仲陽云。小兒正傷寒者。謂感冒寒邪。壯熱頭痛。鼻塞流涕。畏寒拘急是也。須解表微汗。夾驚者。因驚而又感寒邪。或因傷寒熱極生風。是熱乘于心。心神易動。故發搐也。當先發表。後利驚。夾食者。或先傷于風寒。後復停滯飲食。或先停滯飲食。而後傷于風寒。以致發熱氣

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

粗喘氣壯熱頭疼腹脹作痛大便酸臭先用解散
次與消導不解者大柴胡湯下之其六經傳變證
治當遵仲景法自有專方不復贅論夾驚夾食者
各從本症治之

疎邪定驚湯　治夾驚傷寒乃太陽經之藥

麻黃　羌活　白芷　防風　膽星　天麻
薄荷　黃芩　前胡　桔梗　○冬月無汗去
黃芩薄荷加生薑葱白三時去麻黃○陽明經
目痛鼻乾不眠脉洪而長加葛根○少陽經耳
聾脇痛脉弦數而嘔加柴胡半夏橘皮生薑

少陽陽明合病加柴胡葛根芍藥去羌活麻黃
蓋少陽有三禁不可汗下利小便也○傳入陽
明爲裏脉沉實譫妄惡熱六七日不大便口燥
咽乾而渴用大柴胡湯

解肌調中飲　治夾食傷寒乃三陽經之藥

羌活　防風　柴胡　乾葛　蘇葉　黃芩
枳實　厚朴　神麯　山查　陳皮　半夏
加砂仁五分生薑三片煎服○如冬月去黃芩加
麻黃夏月加石膏○渴加天花粉去半夏○有汗
去蘇葉加芍藥○胸中滿悶加枳殼桔梗○喘加

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NO COPY

杏仁。○嗽加金沸草前胡○表邪退而便秘者去羌活。防風。蘇葉。乾葛。加大黃

大柴胡湯　治內熱。大便難。身熱。不惡寒。反惡熱

柴胡　黃芩　芍藥　半夏　枳實　大黃

右薑棗煎服

○痘瘡十三

歌　熱徹標形必定稀。根紅色澤滿而肥。清便自可身無恙。飲食如常不用醫。出不快時尤可發。審宜解毒勿教遲。鮮紅恐後翻成紫。泄痢須知裏氣虛。五六日來生痒塌咬牙寒噤異功宜瘡稠力薄難肥滿大劑參歸及桂蓍。紫草川芎香白芷。更加糯米復何疑。青乾黑陷溲便溜可用宣風急下之。身熱渴煩微腹滿。喘而便秘面紅癢。心煩悶亂溲黃赤。利水還須導赤除。七八日來猶發熱。內因熱盛外蒸皮。故使斑瘡痂不著。宣風散子入生犀。耳尻反熱知歸腎。黑陷分明有死期。百祥丸瀉膀胱火。下後身溫飲水奇。急用溫脾為上策。十中一二可扶持

論　夫痘瘡皆由子在母胎中。受其三穢液毒。停蓄臟腑。皆太陰濕土壅滯。君相二火之所作。因小兒真

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

氣既盛。正氣初旺。邪無所容。或風寒傷于表。食飲傷于裏。其毒由是發焉。故因外者治外。因內者治內。內外皆和。其痘自出。至于惡寒者發之。表太熱者奪之。裏渴者清之。秘者通之。驚者安之。泄者分之。虛者補之。寒者溫之。熱者和之。不可執一。大抵如傷寒隨經用藥。最爲高論。若輕者。發熱四五日。熱徹始出。其瘡必稀。故前後心無。頭面稀少。明潤光澤。作三四次出。無內外邪症。便溺如常。飲食如故。此受之最輕也。不用服藥自已。其一熱便湧出。密如釘頭。不分根脚。尚有表邪。時忽泄利嘔逆。飲食不進。或煩悶不安。或狂躁不寧。大小便秘澀不通。瘡色鮮紅。或灰白色而不澤。或隱隱在于皮膚中。或咳嗽鼻噴不止。或腰痛不能立起。耳尻反熱。身體反冷。惡寒振慄。咬牙痒塌。渴燥不止。黑陷青紫倒靨。此皆沉重之候也。必審其寒熱虛實而調之。則無不効矣。大抵寒爲虛。熱爲實。氣虛寒。則宜溫補。氣實熱。則宜清涼。血虛則宜補血。血熱則宜解毒。必取其氣血中和。無過不及可也。凡痘灰白不紅綻。不起發。出不快。昏暗陷頂。皆表寒而虛。二便清。飲食不化。身涼。手足口氣俱冷。不渴。少食。唇

DO NOT COPY
Fast Asian Library Digital Collection
Princeton University Library

白涕清。皆裏寒而虛。此表裏虛寒之症。急宜溫脾胃。補氣血。當用參耆四物木香肉桂等藥。以助貫膿收靨。夫表虛者。以補氣爲主。而補血次之。裏虛者。於補血之中。而兼補氣。苟能補氣。而脾胃自壯。胃氣隨暢。在後必無陷伏之憂。既能補血。則氣血週流。送毒出盡。不致凝滯。在後必無痒塌之患。凡紅紫乾滯黑陷焦枯者。皆表熱而實。大便秘結。小便赤澀。身熱鼻乾。氣熱唇燥。煩渴者。皆裏熱而實。此表裏實熱之症。急宜涼血解毒。當用化毒湯。[illegible]花。紫草。黃芩。牡丹皮。蟬退。鼠粘。荊芥之類。加[illegible]

[illegible]宜清涼解表。而分利次之。裏熱者。則重于[illegible]毒而兼清涼。或在二三日之前。熱毒盛者。微下之亦可。蓋涼血不至紅紫。解毒則免黑陷。故表虛不補。則成外剝。裏虛不補。則成內攻。表實過補。則不結靨。裏實過補。則發癰毒。所以痘症變遷無常。若色一轉。又當變通。不可拘于一定也。

氣虛

凡氣虛之症。初發身熱。手足厥冷。午涼午熱。精神倦怠。肌肉皖白。飲食減少。四肢倦而睡臥安靜。便清自調。虛症無疑。未見點前。用參耆飲加輕劑發

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

散。如紫蘇防風白芷。見點之後。用參耆飲加輕劑開提。如川芎桔梗。見點四日之後重用參耆飲隨病加減處治。七八日漿足之後。保嬰百補湯調養氣血而已。此症末稍。塌陷黑靨者。多用木香異功散收功。

血熱

凡血熱之症。初發身熱壯盛。腮紅臉赤。毛焦色枯。煩躁渴欲飲水。日夜啼哭。睡臥不寧。好睡冷處。小便赤澀。熱症無疑。未出之前。治從升麻葛根湯。或升麻流氣飲。雖皆可服。縱不若十神解毒湯爲穩。既出至見點二四日後。熱症悉平。勢將行漿。從太乙保和湯加減。八九日漿足之後。則有保嬰百補湯調養之。

毒盛

凡熱毒擁遏之症。初發身熱壯盛。腮紅臉赤。毛焦皮燥。氣粗喘滿。腹脹煩躁。狂言譫語。睡臥不寧。大便秘結。小便赤澀。面浮眼脹。多啼多怒。的係熱毒擁遏。未見點時。先須升麻葛根湯一服。隨服羌活散鬱湯。至見點三日之內。諸症悉平。勢將行漿。則服益元透肌散加減。漿足之後。即服保嬰百補湯

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

調養而已。六七日外有紫黑乾枯。及青灰乾白陷者。則有奪命。大造百祥。牛李。猪尾。宣風。獨聖等方。皆可審用。惟曾經泄瀉。有木香異功症。則從木香異功散治之。

參蓍保元湯　治氣虛痘症

人參一錢　黃蓍二錢　甘草五分初熱生用出定炙用　官桂三分

右剉。加生薑三片。糯米一撮。水煎。入人乳溫服。○按參蓍甘草。性味甘溫。專補中氣之虛。而又加官桂以制其血。血在內。引而出之。血在外。引而入之。參蓍非桂之逐血引導。則不能獨樹其功也。又加生薑糯米以助參蓍之力。

十神解毒湯　治血熱痘症古人用黃連解毒湯。恐驟用寒涼。不惟冰伏。熱毒反出。不快。抑且熱毒為其所抑。則鬱于臟腑。或肚痛腹脹。內潰而死者有之。豈若此方內外分消。用之為當。

生地　丹皮　赤芍　歸尾　紅花　川芎

桔梗　木通　連翹　腹皮　○身熱壯盛。加葛根前胡○毒盛綿密。咽痛。加甘草。荊芥。鼠粘子。○口渴煩躁。加麥冬。天花粉。○大便秘。加枳殼。前胡。酒蒸大黃。○小便短澀。睡臥不寧。譫語

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

加山梔竹葉。燈心。○發斑。加玄參。犀角。紫草。

羌活散鬱湯　治毒盛擁遏喘脹。或爲風寒外搏者。

羌活　防風　白芷　荊芥　桔梗　地骨皮

川芎　紫草　甘草　連翹　惡實　大腹皮

右爲粗。以水一鍾。燈心十四莖。煎六分。溫服。

太乙保和湯（又名紫草透肌湯）　專治血熱痘症。服十神解毒湯後。熱症悉去。內外和平。見點三日之後。不易長大。用之則能保和元氣。活血解毒。助痘成漿

紫草　川芎　山查　桔梗　人參　甘草

生地　紅花　木通　糯米　生薑　燈心

升麻葛根湯　治痘初發熱疑似之間

葛根　升麻　甘草　芍藥　生薑煎服

益元透肌散　專治擁熱痘症。服羌活散鬱湯後。擁症悉開。氣血和平。見點三四日後。不肥大。不成漿者。用之則能勻氣解毒。透肌達表。領出元陽。助痘成漿。而易結膿窠也

鼠粘　蟬蛻　陳皮　桔梗　木通　山查

川芎　紫草　人參　甘草　大棗燈心煎服

異功散　治表虛痒塌。內虛泄瀉。寒戰咬牙。頭溫（足冷）

木香　官桂　人參　附子　當歸　白朮

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

茯苓　陳皮　厚朴　丁香　肉果　半夏

木香散　治痘灰白表虛內虛泄瀉服服

木香　丁香　人參　甘草　茯苓　腹皮

桂心　青皮　前胡　訶子　煨薑　大棗

保嬰百補湯　治痘瘡八九日漿定之後別無他症

以此方調養氣血資補脾胃若有別症隨虛實加減

當歸　芎藭　熟地　山藥　人參　白朮

茯苓　甘草　黃芪　大棗　水煎溫服

訂補明醫指掌卷之十終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library