PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

TC91/2877
v.2

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

抱乙子幼科指掌遺藁卷一

海上困菴葉桂林甫編輯

男 大本蕉邨氏敬述

孫 化龍華陽
中樞朝陽 校錄

育嬰門

初氣受胎論

夫人稟天地陰陽之氣以生其性藉父精母血以成其形故兒在腹中受其精氣一月胚形如露珠二月胎形似桃花三月生血脈男女分四

© NOT FOR COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

此冊有水漬

月形體具五月五臟生能動六月六腑滅七月
毛髮生關竅通八月遊其魂魄九月三轉身十月
受氣足百神備乃始生所以古人云有孕不喪
房養子痘疹稀以慎重其胎也有生之後六十
日瞳子成嬰孩能咳笑識人應和一百日往脈
成能自反覆一百八十日尻骨成能獨坐二百
一十日掌骨成能匍匐三百日膊骨成能獨立
三百六十日膝骨成乃能趨步而行也此是常
法若不能依期者必有不平之處

顧顯經相兒命壽夭法 紅紫音信臭白同天 蓋蓋一日頂門

初生時叫聲連綿相屬者壽
聲絕而復揚急促者夭
兒女啼聲深者不成人
小兒啼聲散者不成人
臍中無血者好
臍小者不壽
自開目者不成人
目視不正數動者非佳兒

Princeton University Library
East Asian Library
DO NOT COPY
Gest Collection

汗血者多厄不壽

汗出不流者不成人

頭四破者不成人

早坐早行早齒早語者皆惡性非佳兒

頭毛不周匝者不成人

髮稀少者强不聽人「作不聽人」

額上有旋毛者早貴妨父母

兒生枕骨不成者能信而死

尻骨不成者能倨而死

掌骨不成者能匍匐而死

踵骨不成者能行而死

膊骨不成者能立而死

身不收者死

魚口者死

頤下破者死

股間無生肉者死

陰囊下白者死赤者死陰不起者死

卵縫通達黑者壽

通身軟弱如無骨者不壽
鮮白長大者壽
常搖手足者不成人
小便凝如脂膏者不成人
母食薑兒必餘指
兒在胎修灶缺唇
有孕指虹霓日月六指

附錄

男子二百六十五骨女人無頂威骨左洞右捌
初步五骨 缺盆下爲厭鐘骨厭鐘之下爲
倉骨倉骨之下爲髎骨髎骨之下左爲胸骨
右爲蕩骨 缺盆在結喉下四寸
凡男子胸骨高者好勇
凡女子蕩骨大者奪夫權 蕩骨之下爲臆骨
在右邊
凡臆骨高者多詐妄

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

凡甲隱骨長則大賢　缺盆之後爲偃

甲之端爲甲隱骨左右各一

凡男子進賢骨隆者爲名臣　前支缺盆

動骨飛動之左爲龍臑骨龍臑之下爲龍本

龍本之下爲腕也龍本上內爲進賢骨

凡女人及爵骨高者爲命婦　飛動之右爲虎

衝骨虎衝之下爲虎端骨虎端之下爲腕也

虎端上內爲及爵骨

壽夭論

孫眞人曰兒三歲已上視其性高下即可知其壽夭大略兒小時識悟通敏過人者多夭大則項槖顏回之流也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭郎楊修孔融之徒是也由此觀之夭壽大略可知也亦猶梅花早發不賭歲寒甘菊晚成終于年事是知晚成者壽之兆也

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

五

羅 命 木星
門

天天司中山年準 井
中庭粧匠堂粮壽頭 鬼

水承地
星漿閣 須

官

財 命
門 金星

初誕法

小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此爲玉衡一作衝若不急拭啼聲一發即入腹成病矣兒生落地不作聲者名曰夢生此由難產少氣故也取兒臍帶向身却將之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以葱白徐徐鞭之

亦可以本生父母真氣度之

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

產生法

一切勿斷臍以綿衣包兒勿令凍使煖用大油紙撚燒臍待氣回方可斷也

一或將胞衣連帶火灸令煖氣入兒腹

一取一猫用青布裹其頭自令一伶俐女人拿住猫頭向兒耳邊以口咬破猫耳猫必大叫一聲兒即醒矣

兒生無啼是胞門爲脂皮所塞用簪通開

一法石菖蒲搗自然汁灌之久口即活

小兒啼聲不出及聲不轉者舌下有膜如石榴子狀或口中上腭有泡速以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活若血出多以童便磨京墨塗之其血急須揩出勿使咽下咽下則傷人

East Asian Library, Gest Collection, Princeton University Library

浴兒法

小兒初生世俗多以苦草煎湯洗之須令冷熱調和爲要又不可久浴久浴冬夏恐傷冷熱頻浴背冷則發驚癇若不浴又令兒毛落新生浴兒者以猪胆汁一枚入湯中以浴兒終身無瘡疥勿以雜水浴之

兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各三兩枝亦得一作桃柳梅槐桑亦可用水三斗煑二十沸去滓浴兒神良去不祥令兒終身不生瘡疥

治兒驚辟諸惡氣者用虎艾湯浴之艾一斤虎頭骨一枚水三斗煑爲湯浴

East Asian Library, Princeton University
Gest Collection
DO NOT COPY

兒浴洗出戶日

寅卯酉日大吉　壬午未申丁巳癸凶

要訣云兒初出胎浴洗湯內宜入食鹽少許洗畢拭乾以膩粉　錢研末摩其遍身及兩脇然後鞠裹既不畏風又散穢氣洗三雖是古禮然鞠裹之嬰兒又復解開多致感冒故出胎便浴最爲穩當

保生要方云浴湯不犯生水則兒不生瘡

斷臍法

小兒已生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴乃先浴之然後斷臍則不傷水生病斷臍須將汁令盡否則寒濕入腹或作臍風令人隔单衣咬斷不犯刃剪自無冷氣內侵可免腹中釣痛之虞如或天冷難產者先紮臍帶用油紙撚條熱火燒斷令煖氣入兒腹中此又爲回生起死之妙法其臍斷訖連臍帶

East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University. Do Not Copy

中多有虫宜急撥去之不爾入兒腹成疾

斷兒臍者當令長九寸許須令至兒足趺上爲度不可太長則難乾而傷肌且恐引外風爲臍風不可太短短則逼內而傷臟或致成腹痛而夜啼只以兒足掌長短爲度乃酌中之法

一造道集云兒始生宜淨洗則燥血不留于褶路之間可使皮膚光澤然後剪臍臍者乃初生之蒂也剪之須長一尺一寸用粗線縛緊剪不長多致臍風縛不緊陰間虛腫

近來有以碗鋒代刀斷臍者亦可

藏衣法 載臨產門

避太歲後一位如太歲在寅則不可犯卯上也

East Asian Library, Princeton University
Digitized by Google

又裹臍法

凡裹臍須槌治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等合之緩急得中緩則恐脫下急則令兒嗌喉兒生七日後乃解去之易衣更裹解看裹臍時須閉戶下帳以防賊風冬間用火烘之令帳中溫煖換衣亦然仍以溫粉敷之若臍不愈燒絳帛末敷之若過一月有汁不愈用龍骨散敷之一日一度若臍間中水及中冷氣則令兒腹絞痛夭紇啼呼面目黃色此是中水傷冷之故當灸綿絮以熨之不時治護其腹若臍腫者當隨輕重而治重者便灸之輕者但汁出時時啼呼者當歸末和胡粉敷之與臍中水同治常用熟絮熨之

神妙龍骨散

龍骨二錢　黃丹一錢　枯礬一錢　麝香少許

右爲末敷之

或用亂髮燒灰敷之

Fast Asian Library Princeton University Gest Collection DO NOT COPY

或黃柏末敷之

或赤石脂末敷之

或粗紙灰敷之

凡斷臍後須摻藥用厚帛裹護不令着風入水若因浴水入或當風觧視或見尿濕氣所侵多致臍臼

拭口法

凡嬰兒在胎口有熱物蓋胎毒也開乳時以甘草鈎藤煎湯綿少許裹指醮拭淨然後與乳或先用甘草一寸許打碎水一合煑取一合以綿裹醮汁令兒吮之計得一蜆殼許當吐出惡物爲佳若不吐可消息饑渴須更更與之得吐即止令兒心神智慧無病也

一夏月或胎熱者用黃連二分甘草二分濃煎

Post-Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NO COPY

原書如此

汁入硃砂細末少許抹兒口打去腹中舊屎
次用硃蜜法以鎮心神安魂魄也蓋此二法
不宜多多則令兒脾胃冷腹脹陰癇氣急變
痙而死

硃蜜法

用硃砂豆大一粒研極細末白蜜一蜆殼和之
以綿纏筯頭蘸取與兒吮之一日令盡此二
豆許勿過與以傷胃也若面青白啼聲不响
是寒即不須服
一凡兒生下每日早晚須用清湯或温茶蘸軟
絹攪兒口內如齒邊有白點或小泡如粟米
狀即以指爪爬破或用細針挑破又以温湯

蘸軟帛裹指輕擦破則口內清爽自能下乳
不須服藥

乳兒法

凡乳兒勿令太飽飽則嘔唾每候兒唾者乳
太飽也以空乳吮之即消日四乳兒若臍未
愈乳兒太飽令風中臍也夏不去熱乳令兒
唾逆冬不去寒乳令兒咳痢母新房以乳令
兒羸瘦交脛不能行母有熱以乳兒令兒變
黃不能食母怒以乳兒多驚悸發痫氣又令
上氣癲狂母新吐下以乳兒令兒虛羸母醉
以乳兒令兒身熱腹滿母大飽以乳兒令兒
喘急

凡新生小兒月內飲猪乳大佳

凡乳母乳兒當先搯散其熱氣勿令汁奔出
令兒噎輒奪其乳令得息定復乳之如是十
返五返視兒飢飽節度知一日中幾乳而足
以爲常又常提去宿乳兒若卧乳母當以臂

Copyright © Princeton University East Asian Library

枕之令乳與兒頭平乃乳之令兒不噎母欲
蘇則奪其乳恐填塞口鼻又不知飢飽也兒
若多睡勿强與乳自然長而少病夜間乳兒
須乳母坐起抱而乳之夏月乳母浴後便乳
兒成胃氣赤白痢須定息良久熟揉其乳而
乳之可也

一瑣碎錄云兒睡忌乳母鼻風吹顖門成風疾
小兒不可就瓶及瓶中飲水令兒言語多訥

護兒法

凡小兒初生肌膚未定宜單衣勿用其父故衣
裹之女用其母舊衣裹之勿用新帛爲善一
者惜福二者和柔不損肌膚三者襲其父母
本氣令易生長不可令衣過厚令兒傷肌膚
害血脉發雜瘡而生黃也故不宜煖衣煖則
筋骨緩弱易發瘡瘍宜舊絮不宜新綿則汗
出表虛易受風寒也宜見風日若都不見風

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

日則令肌膚脆軟便易中傷凡天氣和煖無風之時令母將兒于日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風冷不致疾病也嘗見富貴之家重裀疊被日在懷抱中雖數歲亦未能行而日令小兒終日暴露或飢或寒絕無他病譬如草木生于深山窮谷容易合抱園圃中奇材異卉縱加培植有秀而不實者豈貴賤之理有異哉

人也變者生五臟也蒸者養六腑也變者上氣蒸者發熱每經一變一蒸情態即異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或汗或吐或煩躁啼渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷骯冷上唇發泡如濁珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則嚏嗽毛聳凡五臟六腑筋脈骨節循環各有証應其

治法平和者微表之實熱者微利之可服紫霜丸黑散子柴胡湯有寒無熱併吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主之變蒸之外小兒體貌情態自然平和大抵人得中和之道以爲純粹陰陽得所剛柔兼濟氣血和平百脈順遂所以心智益通精神俱備臟腑充實形體固壯齒細髮黑聲洪睡穩此乃受氣充足禀性得中而無疾爾前症証小兒所不免者雖勿藥亦可倘有不熱不驚略無症候而暗變者蓋受胎氣壯實故

晒衣法

凡小兒衣服襁褓日晒晚收不可露天過夜若在露天過夜次朝與兒穿上致染寒濕溫熱此所謂八邪之害久則令兒黃瘦腹痛身熱啼哭世俗謂之無辜疾皆因衣在露天過夜染着無辜鳥屎以致此疾八邪之害若濕熱風寒驚積饑飽是也

Estasian Library and the Gest Collection
Princeton University
NOT COPY

剃頭法

小兒初剃胎頭俱不擇日皆於滿月日剃之以便出房惟丁日不宜剃頭蓋胎髮穢惡有觸神灶致令小兒不安故必待滿月之日剃頭而出凡剃時就溫煖無風日光晴明處最妙剃後以茶葉嚼爛敷徧頭皮或以杏仁三枚去皮尖研碎以鮮薄荷三葉同研又以生麻油叁滴調粉拌和擦頭止避風邪免瘡疥

擇乳母法

小兒之不待乳於他母者固無論矣凡需乳母之家必察乳母之稟賦厚薄性情剛柔德行善惡兒食渠乳能速肖之此中關係非小殊不知漸染既久識性相同猶接木之造化也故不可不擇

防禁示法

凡小兒初生必防外客生人穢氣所觸遇歲之內能忌之者並無客忤之患

小兒畧識人物不宜携至神廟觀望神象威嚴閃爍恐致驚怖及非時鑼鼓鎗炮鷄犬之聲

小兒將人夏時用色帛絳紗縫囊盛去皮尖杏仁七粒與兒隨身佩帶聞雷不驚

病原法

小兒得病之原不勝枚舉大要先明

大喜後乳食變成驚癇

大哭後乳食多成吐瀉

大饑後乳食多成腹痛

大飽後飲水多成氣逆

大驚後乳食嘔吐心痛

當風乳兒或嗽吐腹脹

夜露乳兒多成嘔逆
正食便乳成痟黃口臭
正汗便乳成心痟壯熱
食熱麪乳兒多成龜胷鷄背
食酸醎炙煿乳兒成揭熱瘡疥
醉卧當風乳兒成头痛時嘔
嗽後飲乳成驚喘疾瘖
悲喜未定便乳成挺嗽
兒啼未定便乳生瘰癧瘡瘍

病因法

小兒致病之由有五一曰稟受之病與生俱生者也二曰果報之病伯牛之賴袁盎之瘡是也三曰六淫之病風寒暑濕燥火外邪所侵者也四曰七情之病喜怒憂思悲恐驚內邪所犯者也五曰自致之病金瘡刀砧顛撲誤傷干犯者也稟受果報無可挽回六淫七情預宜防慎自致者顯而易曉責有攸歸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

服藥法

小兒病在胷膈上者先食而后服藥

病在心腹以下者先服藥而後飲食

病在四肢血脉者當空心而在旦

病在骨髓者當飽滿而在夜

病在表者不拘時候

急治法

凡小兒百病皆由將養乖節或犯寒温乳哺失宜致傷饑飽遂令血氣不和腸胃不調或欲發驚癇或欲成伏熱小兒氣血脆弱病易變遷證候百端若見微證即當治之使不成病治之若晚百病即成凡諸病至於困者汗出如珠着身不流者不治病如胸陷者其口唇乾目反張口中氣出爪足與頭天柱倦卧不

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

攣手足四肢垂其臥正直如縛而不動或掌中冷至十日必死

方抱龍丸

灸法

灸百會穴三壯或七壯

刺法

刺少商

宜忌法

一凡小兒多因愛惜過當往往二兩歲未與飲食致脾胃虛弱平生多病自半年已後宜煎陳米稀粥時時與之十月以後漸與稠粥爛飯以助中氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物等類

一凡小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏也遇此症者但扶持在手不可擒捉蓋風氣方盛

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

恐流入筋脉或至手足拘攣反致難治若慢驚雖靜乃危病也治慢驚藥宜去龍腦縱須合用必以溫藥爲佐或少用之

歌曰

乳子須調護看承莫縱馳乳多防損胃食傷即傷脾食厚非爲益衣单政所宜無風頻見日寒暑順天時

調養法

小兒所以少痼病者其母懷娠時時勞役運動骨血則氣强胎養盛故也若侍御多血氣微胎養弱則兒軟脆易傷故多病痼兒皆須着帽項衣取燥菊花爲枕枕之兒母乳兒三時摸兒項間風池若壯熱者即須熨使微汗自愈凡兒以米作枕可除驚

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

直言法

宋儒有不爲良相願作良醫之說惜人不能以皆爲良醫也東坡蘇氏有言擇醫家之平日超出于衆者先告以病原之狀或寒或熱或風或食然後使脉以合之調治百發百中蓋小兒有病不能言況一病而變化不測吾欲愈吾之故何必考其術辭其疾耶此深得用醫之法故醫書有望聞問切之訣庶幾得

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

盡神聖工巧之用

望形法



望色法



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

聞聲音法



問情狀法

何處苦楚　何日發始　何因而致

曾服何藥　曾經何地

晝夜孰甚　寒熱孰多　喜惡何物

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

切脉理法

	寸	関	尺
左	浮本位	浮取	浮候
右	中取 沈候	中本位 沈取	中取 沈本位

論病原法

其人素稟孰盛

其病今在何類

標本孰居

畢竟病勢增減何如

服藥宜何如將息

病疾疢病痼今在何際

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治方術法

主治用何法　先後用何方

或問曰六法兼施得無瑣碎乎予曰醫藥人之司命爲謀勿忠非仁術矣病有不治之條醫有刲股之念誠如是而不捄焉彼雖命爾吾猶以爲未精吾技而誤于人也若夫輕疾小恙猶不可忽況臨危險之症長其瑣而併棄之非予志也已

慎藥法

凡八歲以下小兒無大病戒投藥餌有疾但以所宜藥爲細末調香油令人熱蘸按摩患處或水調成膏貼之或煎湯用絹帛染拭任意活法但使藥氣從毛孔穴絡薰蒸透達如不能驗方用藥餌量病重輕服藥多少若以香油潤手按摩牽引手舞足蹈未嘗不愈奇疾也

Do Not Copy East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

辨童男力童女法

欲識童男與童女　決在寸關并尺裏
自然緊數甚分明　都緣未散精華氣
童女童男何次別　須看太眞無損缺
大約童子尺脉沉　童女尺中洪拍拍

灸法

凡小兒新生無疾愼不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五脉因喜成病河洛關中土地多寒兒喜病痙凡生兒三日多逆針灸以防之又灸頰以防噤有噤者舌下脉急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血灸頰以防噤也吳蜀地温無此疾也古方既傳之今人又不詳南北地氣異宜便按方而用之是以多害

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

於小兒也所以田舍小兒任其自然皆得無有夭横之禍巢氏病源云小兒常須慎護風池風池在頸項筋兩轂之邊有病乃灸之苟疾微慎不欲妄施針灸吐下鍼灸傷乎經絡吐下動於臟腑故耳凡灸當先下兒使虛乃承虛灸之未下有實而灸白氣逼前後不通殺人癇發平旦在足少陽朝晨在足厥陰日中在足太陽黃昏在足太陰人定在足陽明夜半在足少陰

下毒法

按心鑑曰古方書言兒始生落草服朱粉朱砂白蜜黃連牛黃欲下胎毒今人率多用之不知今人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾敗陽之藥若與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎湯與三五日其毒自下又能助養脾氣消化乳食然古人之法不可沒用而效者多或不至如心鑑所云用之得法存乎其人

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

甘草法

須用好甘草中指一節許拍碎以水二蜆殼煎一蜆殼蘸兒吮之吐出惡汁爲佳不唾再服不問嬰虛實寒熱服之有益無損

黃連法

必用好川連五分槌碎滾湯泡成汁蘸點兒口中惡汁自下能除蘊熱驚癇瘡癤

韭汁法

小兒初生與韭根汁能唾惡水一法將汁塗兒唇上乾又塗數次不令入口

朱蜜法 載拭口法內

牛黃法

千金方云朱蜜竟與牛黃不獨益肝胆除熱

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

定精神止驚辟惡氣除百病

好牛黃少許好蜜煉熟和膏每服一豆許乳汁漸漸化服形色不實者不宜多服

赤粉法

用赤粉半錢旋旋令兒吮之良久有臍糞下爲佳

豬乳法

凡初生至滿月時時取豬乳滴口中佳遇豬兒飲母時即便提起後脚離乳急將之即得

臍帶法

用本兒落下臍帶左上焙燥爲末入辰砂黃連甘草各末五分和勻蜜拌三五次塗乳母乳上俟兒吞之令盡毒從次便出日後痘稀

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

臍突法

凡臍突一證又非臍風此亦因初生洗浴繫臍不緊穢水侵入於內產後旬日外臍忽光浮如吹捻動微響間或驚悸作啼治用白芍藥湯加意苡仁次煎空心溫服次以外消散塗貼自然平復

外消散

大黃　牡蠣各半兩　朴硝二錢

右前二味剉焙爲末仍入朴硝乳鉢內杵勻取田螺淨洗再以水半盞浸過去螺用水調塗腫處即消其螺仍放水中勿傷蓋殺生救生去生遠矣物命雖微亦可戒也

二豆散

赤小豆　豆豉　天南星去皮臍　白歛各一錢

右爲細末半錢用芭蕉自然汁調傅臍傍外緩緩束緊自愈

East Asian Library, Princeton University
Do Not Copy
Gest Collection

變蒸

論巢元方云小兒變蒸者以長氣血也變者上氣蒸者體熱錢仲陽曰變者易也又云變蒸者自內而長自下而上又身熱故每變畢即覺性情有異於前何者長生臟腑意智故也所謂三七二日長骨添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡自初生至三十二日一變生癸屬足少陰經腎臟精與志六十

East Asian Library
Princeton University Library
DO NOT COPY
and the Gest Collection

四日二變一蒸生壬屬太陽經膀胱腑其發耳與骯肴腎與膀胱合俱主于水天一生水地六成之至九十六日三變生丁屬手少陰經心臟神其性爲喜至一百二十八日四變二蒸生丙屬手太陽經小腸腑其發汗出而微驚心與小腸合爲火地二生火天七成之至一百六十日五變生乙屬足厥陰經肝臟魂喜哭至一百九十二日六變三蒸生甲屬足少陽經膽腑其發目不瞑一作面赤肝與膽合主木天三生木地八成之至二百二十四日七變生辛屬手太陰經肺臟魄主聲至二百五十六日八變四蒸生庚屬手陽明經大腸腑其發膚熱而汗或不汗肺與大腸合主金地四生金天九成之至二百八十八日九變生己屬足太陰經脾藏意與智至三百二十日十變五蒸生戊屬足陽明經胃腑其發不食腹痛而吐乳脾與胃合主土天五生土地十成之又手厥陰經心包絡爲臟手少陽經三焦爲腑此一腑一臟俱無狀故不變而

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
Digitized by Google

不蒸也前十變五蒸乃天地之數以生成之此後如生齒能言知喜怒故云始全也支太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日爲一大蒸計三百八十四日長其經脈手受血故能持物足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別治又六十四日爲二大蒸計四百四十八日又六十四日爲三大蒸計五百一十二日至五百七十六日變蒸既畢兒乃成

哺兒法

凡新生三日後應開腸胃助穀神可研米漿作厚飲如乳酪厚薄以豆大與兒咽之頻咽三豆許止日三與之滿七日可與哺也兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗若乳汁少不得拘此法當用意小增之若三十日而哺者令兒無疾兒哺早者兒不勝穀氣命生病頭面身體喜生瘡愈而

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

復發令兒瘦瘦難養三寸日後雖哺勿多若不嗜食勿強與之若致不消復生疾病哺乳不進者皆有痰癖也當以四物紫丸微下之節哺乳數日便自愈

四物湯

紫丸

也

方

麻黃散子

麻黃一兩炒焦　大黃五錢　杏仁五錢杵碎略炒焦

爲細末每用豆大許乳汁和嚥之

柴胡湯

柴胡　人參　甘草　龍胆草各一錢

河水一碗煎三分略飲數匙

當歸散

當歸焙　麻黃去根節各五錢　羌活

East Asian Library
Princeton University Library
DO NOT COPY
The Gest Collection

酸棗仁炒　人參　杜仲炙

桂心各二錢半

右爲細末每服一錢水一盞姜少許煎伍分

量兒大小乳前分減服

調氣散

木香七錢　香附酒醋童便鹽水炒　藿香梗

人參三分　陳皮三錢　甘草七分炙

爲末每用一錢姜棗同煎濾去滓服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library
Princeton University Library
DO NOT COPY
and the Gest Collection

目病
二黃散
蒼朮散
朮花散
通睛散
神精散
羔肝散
二花散
蛤粉散
獨勝散
三妙散
蜜蒙花散
仙遐散
蛇蛻散
羊肝散
蟬花散
蒺莉散
順耳散
通神散
穀精草散
蟬蛻明目散
丹毒
防風升麻湯
犀角解毒湯
白玉丹
大連翹飲
斑毒
消斑青黛飲
瘰癧
百解芎歸散
胆砂丸

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

目錄

膏藥方
乳蛾
水紅散　如聖散
損傷
降枝散　龍乳散
封藥

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
and the Gest Collection
University Library