PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

TC91/2877
v.3

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

抱乙子幼科指掌遺藁卷二

海上困菴葉其蓁杏林甫編輯

男　大本蕉村氏敬述

孫　化龍萃陽氏校

中樞朝陽氏錄

德懋修

曾　至　健亮恭

善元長讀

剛毅方

病機門

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

雜症

初生芽兒一塊血也有驚是胎驚有熱是胎熱內無脉外無形手無紋面無色有病殊不可曉惟心誠求之耳如有聲有淚者驚啼也有聲無淚者腹痛也若啼哭而手足撒或彎身如蝦者盤腸內痧也雖然不可過劑不若以外治法適其寒溫爲盡善也

噤口

一兒始生噤口以葱白一寸破四片乳汁和隔水蒸徐徐灌之

一初生渾身無皮者以米粉敷之

初生大小便閉者以葱三莖陰陽水濃煎湯去滓灌之

一初生二便不通腹脹欲絕令婦人唾兒前後心并臍上面手足心共七處凡三五次取紅

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

赤爲度須臾自通不爾無生意

夜啼以雞窠中草安母卧蓆下勿令母知極妙

一小兒初出腹有鵝口者其舌上有白屑如米甚者鼻中亦有之以髮纏筋頭沾井花水撩拭之便脫去如不脫可煑栗荴音甫汁令濃以綿纏筋頭蘸拭之

一小兒初出腹有連舌者舌下有膜如石榴子中隔連其舌下後令兒言語不發不轉也可以指爪摘斷之微血出無害以墨塗之若血出不止以髮灰敷之

又若喉裏舌上有物如蘆籜盛水狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長針留兩處如粟米許大以針刺決之令泄去青赤汁也即消去消者來日又刺之有重舌重腭重齗皆刺去血汁即消也

又小兒生輙死治之之法視兒口中懸癰前上腭有泡者以指甲摘取頭決令破潰去惡

Est Asian Library, Princeton University Library
DO NOT COPY
Get Collection

血勿令入咽入咽嚥下則殺兒急須悔之攪出乃妙仍以水拭淨之

一七日內腎縮受寒也硫黃吳茱萸等分爲末姜汁調塗小腹上蛇床子煎湯熏洗之即舒出

噤風

凡噤風者因胎中受熱毒流心脾生下復爲風邪所搏以致目閉口噤啼聲不出舌上如粟口唾白沫在百日內見　丹溪方八

撮口

凡撮口者因胎熱兼風自臍入於心脾以致面目黃赤氣息喘急啼聲不出舌强唇青聚口撮面腹脹青筋鈎腸牽痛唾白沫者不救法當疎利

臍風

原書如此

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

凡臍風者因斷臍之後爲水濕風邪所入以致
腹脹臍腫四肢柔直啼不吮乳甚者發搐若
臍邊青黑手拳口噤是爲內搐不治又斷臍
不盈尺多患此者以舊綿燒灰摻之齒斷有
泡如粟以帛裹指蘸溫水擦破口即開不必
用藥七日內患者多凶

朱肘溪方

金頭赤足蜈蚣一條去足
炙爲末以猪乳調塗兒口唇徐徐灌之

一方牛黃少許竹瀝調和服隨以猪乳滴於口
中

聖惠方

鬱金　藜蘆　瓜蒂等分

右爲末搐鼻中

陳無擇云視其齒斷有泡擦破口開用直白
殭蚕七條水淨炒爲末蜜調塗口內服之

保嬰集云臍風馬牙當作胎毒瀉足陽明火
用針挑破以桑樹白汁塗之

又曰初生小兒時常宜敷桑汁不然多有舌硬撮口之症

田氏方

天南星末加少許氷片以指蘸擦斷上口立開

臍風因浴拭外傷肌膚者綿灰枯礬等敷之或因束縛不緊風冷乘襲者以艾灸臍中亦有生者

定命丹 治天癇撮口

全蝎七枚炙 天麻 南星炮 白附子各二錢製 硃砂 青黛各一錢 輕粉五分 麝香一分 氷片少許

爲末米糊丸菉豆大每服一丸薄荷湯下先研半丸吹入鼻內

紫霜丸

代赭石二兩煅醋淬七次 赤石脂二兩研

杏仁五十粒炒 巴豆三十粒去膜油心

先將巴豆杏仁研膏入藥末研勻湯浸蒸餅

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

丸粟米大每服三五丸米飲下

千金黑散

麻黃　杏仁各五錢　大黃大株

炒研爲散乳調豆大服之

撮風散

蜈蚣乙條　蝎稍　殭蚕　朱砂

鈎藤勾各錢　麝香一字

爲末每服一字許竹瀝湯調下

觀面部形色壽夭圖



面部位圖

頭者諸陽經絡所會

面者五臟氣血之榮

色者五臟精神之華

五臟虛敗色必枯槁

五臟實盛色必光潤

光潤者壽

枯槁者夭

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

原書如此

察五色吉凶圖

面部五臟色診圖

面青屬肝病

面赤屬心病

面黃屬脾病

面白屬肺病

面黑屬腎病

色與相生則吉

色與相剋則凶

面部五臟形色應病歌

兩腮肝肺位　鼻準內斯脾　正額爲心主

頦問作腎隨　有內斯形刻　觀之識病機

面赤唇青者　傷寒熱證推　驚風青黑應

唇臉所由知　面黃多積病　瘧疾亦何離

白多應是瀉　痢更蹙雙眉　面青肝有病

春忠最難醫　舉金來剋木　餘倣此推之

觀形色法見前

面部五臟形色

錢仲陽曰左腮爲肝右腮爲肺額上爲心鼻

爲脾頦爲腎

色青主驚積不散欲發風候

紅主痰積驚悸

黃主食積癥傷欲作疳癖

白主洩瀉水穀更欲作嗽

黑主臟腑欲絶

印堂青主初患驚瀉紅主大驚夜啼黑色主

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

客忤

山根青主二次驚瀉後發躁黑黃甚者死

年壽平陷主夭青主發熱生驚黑主利死紅主躁死

黃色微曰平黃甚曰霍亂

承漿青主食時被驚黃主吐逆亦主血痢黑主驚風面眼黑睛黃主有熱白睛黃主食積疳蛔白睛青主驚黑睛黃主傷寒

眉上青吉忽紅主煩躁夜啼黃主霍亂久病紅者主死

風氣二池青主風候紫主吐逆或發熱黃主吐逆赤主煩躁夜啼

兩顴赤主肺有客熱

兩太陽青主二次受驚青自太陽入耳者死紅主血淋

兩臉青主客忤黃主痰溢赤主風熱

兩頰赤主傷寒

兩頤青主吐虫

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

兩金匱青第三次驚風黑遶口二日死青連
目耳七日死
兩風門紅主風熱黑主疝青主水驚黑從眉
入耳即日死唇黑不食者死
面青眼青肝病面赤心病面白肺病面黄脾
病面黑腎病
額間赤色主心經有熱煩躁驚悸若飲水或
叫哭屬本經實熱用瀉心散以清心火微赤
困卧驚悸熱渴飲湯屬虛熱用秘旨安神丸

以生心血青黑主驚風腹痛或瘈音記瘲啼
叫用五味異功散加木香柴胡鈎藤補脾肝
青黑主心腹痛此寒水乘心用益黄散微黄
主驚疳用安神丸
左臉青或兼赤主肝經風熱項强煩悶目劄
瘈瘲用柴胡清肝散色微赤倏熱咬牙屬虛
熱用地黄丸青黑主肝剋脾而驚搐腹痛用
六君子加姜桂微赤主潮熱血虛心躁先用
秘旨安神丸次用地黄丸

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

右臉赤主風邪氣粗咳嗽發熱飲水爲實熱用瀉白散若哽氣出氣唇白氣短屬虛熱用異功散若脾熱所傳用清胃散心火所刑用人參平肝散淡赤主潮熱心躁或大便堅秘用宣明柴胡飲子以踈導如潮熱未止更用鈎藤散以清肝色青白主咳嗽惡心先用惺惺散解表邪健脾土更以六君子湯調補中氣色青黑主驚風腹痛盤腸內釣用六君鈎藤平肝補脾

鼻微黃爲平赤主脾胃實熱身熱飲水乳食如常用瀉黃散清熱理脾微赤主脾經虛熱身凉飲湯乳食少思用異功散補中健脾色深黃主小便不通鼻中乾燥氣粗衄血乃脾熱傳於肺腎先用濟生犀角地黃湯後用地黃丸色淡白乃脾虛泄瀉乳食不化用六君子湯調補中氣青氣主脾土虛寒肝木所勝用異功散加木香炮姜溫中平肝黑爲死候額間色赤主腎與膀胱氣滯熱結而小便不

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

通用五苓散以分利鼻準微黃兼右腮微赤乃脾肺燥熱不能化生腎水用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸若頸間微赤乃膀胱陽虛陰無所化用六味地黃丸若小腹脹滿或陰囊腫脹屬陰虛濕熱壅滯用六味丸加車前牛膝脾肺氣虛不能通調水道者亦用前藥其小便赤色久而尿血亦屬肝腎氣虛有熱用六味地黃丸不應則用補中益氣湯益脾肺生肝腎若小便後出白津或

至中作痛屬肝經濕熱先用龍胆瀉肝湯後用六味地黃丸

印堂青黑主腹痛夜啼此脾氣虛寒也脾爲至陰故夜間腹痛而啼用鉤藤飲色淡白主泄瀉乳食不化屬脾氣虛弱用異功散加木香

人中色黃主傷乳胃道青主不利乳食不化噯氣酸腐此脾虛積滯先用大安丸消食後用異功散健脾無主蛔虫咬痛

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
The Gest Collection

唇色白主唾涎嘔逆或吐血便血乃脾氣虛弱不能攝逆經血歸源急用六君子湯色赤乾燥而皺者主脾經熱渴大便不通煩熱不寐先以清胃散治其熱次以四君子加黃連山梔調其脾黃主食積泄瀉乳食不化以六君子健脾色赤兼白主衄血乃脾肺虛熱不能攝血歸原用犀角地黃湯清熱補血用四君子補脾氣如久不應用麥門冬散或人參安胃散口畔色黃主脾經積熱用清胃散久病用四味肥兒丸以治疳熱唇口抽動主驚熱不安用異功散加山梔鈎藤補脾平肝若口流涎唇色紫乃脾氣虛寒用異功散加炮姜木香若腹中痛口吐涎乃虫作痛也先用蕪荑散後用調中丸不吐涎是積痛也用異功散手足厥冷用理中湯加烏梅溫補中氣而痛自止或唾後或大便去後而痛止者先用下積丸後用異功散

凡白主失血死青主驚風死黑色繞口者不治

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

耳後微赤此少陽經風熱用柴胡飲子清肝生血微黃主睡中驚悸咬牙用四君子加芎歸耳冷主痘疹也

耳枯燥主骨蒸疳熱作渴盜汗地黃丸若小便後出白津或玉莖痛癢屬肝經濕熱先用龍胆瀉肝湯後用地黃丸若稟賦腎氣不足或早近女色致小便瀉滯或作痛如淋地黃丸補中益氣湯滋其化源或大小便去後穀道牽痛者其虛尤甚前丸加牛藤車前肉桂

大抵多因稟賦[illegible]或乳食寒暑失節或妊娠乳母飲食起居化情所致初病元氣無虧乳食如常發熱壯熱二便秘結作渴飲水睡不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元虛食少發熱口乾飲湯嘔吐泄瀉體倦乏力睡則露睛者悉屬形病俱虛當補正氣更宜審胎氣之虛實臟腑之相勝而治之庶無悞矣

脉法關紋

錢仲陽曰小兒之脉氣不和則注急傷食則沉緩虛驚則促急風則浮冷則沉細脉亂者不治水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部分既別逆順難明若憑村口之浮沉必乃橫亡子孩子須明虎口辨別三關消詳用藥始無差悞

虎口三關脉紋圖

虎口叉手處是也食指寅位爲風關病易治卯位爲氣關病重辰位爲命關病難治

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library
The Gest Collection

入門歌

五指梢頭冷　驚來不可安　若逢中指熱
必定是傷寒　中指獨自冷　麻痘証相干
男左女右手　分明仔細看

三關五色脉紋應病歌

小兒三歲內　虎口脉須參　男左并女右
食指別三關　無病紋難認　色隱淡紅黃
色明應有患　青驚白是疳　紫色爲風襲
紅熱夾傷寒　黑時中惡極　黃積胃脾殃
青黑驚爲慢　紋多氣亂看　內癥紋侵掌
危亡入命關

一凡嬰兒未至三歲看虎口食指第一節名風關脉初見易治第二節名氣關脉見病深難治第三節名命關脉見死不治三關青是四足驚赤是水驚黑是人驚紫色瀉利黃色雷驚三關通度是極驚之候必死或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾必發驚熱左右一樣者是驚與積齊發有三條或散是肺生

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

風痰或似齁音吼平聲齁音喉聲有赤是傷寒及嗽如紅火是瀉紅黑相兼主不痢青多白痢紅多赤痢紫色相兼加渴虎口脈紋亂主胃氣不和青是驚與積青黑發慢驚脈

癍指紋曲裡風盛彎外食積此論[illegible]之法若三歲以下更用一指按高骨乃分三關定渠息數呼吸八至爲平脈九至不安十至危困浮主風沉遲主虛冷實主有熱緊主癲癇紅主熱盛沉緩主虛瀉微遲有積有虫遲濇主胃脘不和沉主乳食難化沉細主乳食停滯緊弦主腹中熱痛牢實主大便秘沉而數者骨中有熱弦長是肝膈有風緊數乃驚風爲患四肢掣顫浮洪胃口有熱沉緊主腹痛有寒虛濡者有氣又主慢驚芤主大便血四歲以下用一指滾轉尋三部以關爲準七八歲移指少許九歲次第依三關部位尋取十五歲依大方脈部位診視

Fast Asian Library Digital Collection
Princeton University Library

原書如此

三部九候脉形圖

寸部左屬心腔中

關部左屬肝胆

左屬肺胸中

關部右屬脾胃

尺部左屬腎小腸膀胱

右屬命門大腸

大凡看脉先定寸關尺三部浮中沉三候三部三候合而舉之爲九候關在高骨上關前爲寸關後爲尺即尋浮沉遲數陰陽冷熱沉遲爲陰浮數爲陽更兼看部位青主驚風白主虛瀉赤主痰熱黑色病甚黃主脾疳以此相參察病治療庶無悞矣

Fast Asian Library Project Collection
Princeton University Library

辨法

論脉沉遲手足冷腹虛脹糞色青或泄瀉或腹痛喜按之吐乳食目珠青面皖白慘淡口不渴倦怠多睡皆虛寒症也不可服冷藥

脉洪数有力手足熱兩腮紅大便秘小便赤煩躁發熱口渴引飲目赤多眵鼻孔乾燥啼叫不睡或吐瀉穢濁稠粘皆實熱症也不可用熱藥

若有陰症似陽症者脉雖洪大重按無力渴欲飲水與之則不能下藥

East Asian Library, The Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

觀眉端按指法圖

按全幼心鑑云小兒半歲之際有病當于額前眉端髮際之間以名中食三指曲按之兒頭在左舉右手在右舉左手食指爲上中指爲中名指爲下三指俱熱主感風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽若三指俱冷主外感風寒內傷飲食發熱吐瀉若食中二指熱主上熱下冷名中二指熱主夾驚之疾食指熱主胸滿食積又當參辨脉形如流珠形等是也

Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

流珠圖

論

流珠形圭飲食成傷內熱欲吐或腸鳴自利煩躁嗜臥用助胃膏治飲食分陰陽若食滯而病仍作用香砂助胃膏以補脾胃

環珠圖

論

環珠形圭脾虛停食胸膈脹滿煩渴發熱用五味異功散加山查枳實健脾消食後用六君子湯調養中氣

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

長珠圖

論

長珠形主脾傷飲食積滯
肚腹作痛寒熱不食先用
大安丸消其積滯次以異
功散健其脾氣

來蛇圖

論

來蛇形主脾胃濕熱中脘
不利乾嘔不食此疳邪內
作用四味肥兒丸治疳後
以四君子湯補脾

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

去蛇圖

論

去蛇形主脾虛食積吐瀉煩渴氣短喘急不食困睡先用六君子湯加枳實健脾消積次以七味白朮散調補胃氣

弓反裏圖

論

弓反裏形主感冒寒邪哽氣出氣驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳嗽吐涎先用惺惺散助胃氣祛外邪後以異功散加茯神當歸養心血助胃氣若外邪解而驚悸指冷脾氣受傷也七味白朮散補之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治脾氣虛甚故也

Fast Asian Library Do NOT COPY and the Gest Collection Princeton University Library

原書如此

弓反外圖

論

弓反外形主痰熱心神恍惚夾驚夾食風癇痰盛先以天麻防風丸祛外邪又用五味異功散調中氣

鎗圖

論

鎗形主風熱生痰發搐先用抱龍丸如未應牛黃清心丸若傳於脾肺或過[illegible]風痰之藥而見一切諸[illegible]專調補脾胃

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

魚骨圖

論

魚骨形主驚痰發熱先用抱龍丸屬肝火實熱者少用抑青丸以清肝隨用六味丸以補肝或發熱少食或痰盛發搐乃肝木尅脾土用六君子湯加柴胡補土以制肝木

水字圖

論

水字形主驚風食積胸膈煩躁頓悶少食或夜啼痰盛口噤搐搦此脾胃虛弱飲食積滯而木來尅土也先用大安丸消導飲食次以六君子加鈎藤補中氣清肝若已服消食化痰等劑而不愈者用四君子湯加升麻柴胡鈎藤升補脾氣平制肝木

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

針圖

論

鍼形主心肝熱極生風驚悸煩悶困倦不食痰盛搐搦先用抱龍丸祛風化痰次用六君子湯加鈎藤平肝實脾

透關射指圖

論

透關射指形主驚風痰熱聚于胸膈乃脾肺虧損痰邪乘聚先用牛黃清心丸清脾膈化痰涎次用六君子加桂梗白藥補脾土益肺金

East Asian Library Do NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

透關射甲圖

[illegible]主[illegible]屈肝木
[illegible]制脾土之敗症急用六
[illegible]子湯加木香鈎藤官桂
[illegible]脾土未應加附子以
[illegible]氣多有生者

[illegible]古人云小兒爲芽兒如草之芽水之漚蓋
因臟腑脆嫩精神未足口不能言最難投劑
當首察面色而知其所屬次驗虎口三關以
辨其所因實爲治法之簡要也

按流珠形只是一點紅色環珠差大長珠圓長
以上非謂圈子總是紅脉貫氣之如此來蛇
即是長珠形而散一頭大一頭尖去蛇亦如
此分上下朝故曰來夫角弓反張向裏爲順
向外爲逆鎗形直上魚骨分開水字即三脉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

並行鍼形即過關一二粒米許射甲命脉向外透指命脉曲裏雖然余常治之亦有不專執其形脉而投劑者盖但有是症即服是藥多效驗也

看顱囟訣

顱顖青筋　脉虛不榮　顱顖常陷

泄瀉便便　顱囟腫起　風痰不止

顱囟久冷　吐瀉青青　顱囟虛軟

癲癇不免　顱囟扁濶　暴泄易脫

顱囟歪長　風作即亡　顱顖連額

驚風易得　顱囟未克　怕熱怯寒

顱顖緩收　胎氣不固　顱顖動數

神昏氣弱　顱顖寬大　受疾怨害

EBSCO Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

顱顖未合　筋骨柔弱

仲芳心誠賦

欲保赤子。全仗心誠。口不能言渠疾苦。脉難以決渠浮沉。外感六淫。風寒火邪易襲。內因諸症。心肝脾臟爲多。欲觀氣色。先分部位。左頰屬木爲肝。右頰屬金爲肺。天庭高爲心火之位。承漿低爲腎水之區。脾土中央。鼻爲通氣。肝青腎黑。木水之色主驚寒。肺白心紅。金火之色爲虛熱。土色黃現。疳食症多。欲窮渠變。再察五官。鼻雖中央。肺竅通。聲重鼻塞。風寒可見。唇雖赤色。脾

Eastern Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

原書如此

氣應燥腫生瘡脾熱自詳舌乃心苗紅肩順面
乾黑者熱目爲肝竅赤腫熱而有神者生胃流
注於雙頤風熱內攻則紅腫腎開竅于兩耳腎
元憊則黑枯繞耳經絡足少陽暴聾紅腫恙生
於胆牙床經絡二陽明齒遲枯燥病歸乎腎再
觀渠外以知渠內紅氣現而熱蒸青色露而驚
悸如煤之黑兮中惡之因似橘之黃兮脾虛之
謂白乃疳勞紫爲熱極青遮口角扁鵲難醫黑
掩太陽盧醫莫治年壽赤光兮多生濃血山根

青色兮頻見灾危瀉痢而帶陽者須防咳嗽而
拖藍者可畏疼痛方般面青唇撮眉自蹙驚風
欲發面赤目直睡多驚火光燄燄外感風寒白
氣浮浮中藏癖積乍黃乍白兮疳熱連綿又赤
又青兮風邪緊急察之若精治之得理鴉聲魚
口枉費精神肉折皮乾空勞氣力氣色頓移形
容變異氣乏則脾冷腎虛則滯頤面目虛浮定
腹脹而氣促眉毛頻蹙則肚痛以多啼蚘出兮
脾胃將敗䘌虫兮肛臟先虧苟瞑眩而弗瘳總

Not for Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

盧扁而何益。手如数物兮肝風將發。面若塗朱兮心火已熾。坐卧愛冷兮煩熱之攻。伸縮就煖兮風寒之畏。肚大脚細兮胆欲困而成疳。瞠目張口兮熱已危而必斃。弄舌脾熱。解顱腎憊。重舌木舌兮虛熱積于心脾。哽氣喘氣兮實火浮於肝肺。齦宣息露必是牙疳。哺露丁奚多緣食積。唇乾定作渴。易鳴必自利。夜啼分爲四症。變蒸週于一歲。心熱若言而不能。脾虛無時而好睡。病後失音者腎怯。咳嗽失音者肺痿。肚痛而

清水流出者蟲。腹疼而大便酸臭者積。口頻撮而虛寒。舌長伸而火熾。龜胸兮肝火乘于肺膈。龜背兮腎風入乎骨髓。鼻乾黑燥兮火甚金衰。肚大青筋兮木强土潰。丹瘤瘡疥皆胎毒之連纏。吐瀉瘧痢乃食積之留滯。不能吮乳者熱在心脾。常欲俯卧者火蒸脾胃。喜視燈火者煩熱在心。愛吃泥土者疳熱在脾。腹痛寒侵。口瘡熱積。臍風忌于一臘。火丹畏于一週。驚自熱生。癇因痰致。吐瀉而精神好者則危。瘧痢而飲食減

者則瘁。驚本心生。風由肝致。搐合左右兮症有順逆。藥分補瀉兮病有虛實。急驚也。由於積熱之深。凉瀉偏宜。慢驚也。得于大病之後。溫補爲貴。頭搖目竄而氣喘兮止工莫醫。口噤鼻張而氣冷兮神丹何濟。閉目兮無魂。狂叫兮多祟。不知吞吐者死。反加悶亂者危。且如病則熱起。熱則驚生。或制熱以熱。或攻熱以寒。襁褓未寧兮但調乃母。匍匐不快兮當固正元。柰何瀉久成痢。積久成疳。瘧久成癖。驚久成癇。未致留連兮攻之宜速。已見疣痾兮治之宜緩。腸胃秘結兮急瀉而已。氣血虛乏兮宜補而痊。此皆指南之活幼。治病於萬全。

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

仲陽五臟見證

肝主風實則目直大叫頃急頓悶虛則咬牙呵欠氣熱則外生風氣溫則內生風大青膏散之若能食飲水不止大黃丸微下之肝熱則目直不搐手循衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之肝病秋見肺怯不能勝肝也當用益黃丸補脾瀉青丸治肝肝有風則目連眨音劄得心熱則搐用瀉青丸治肝導赤散治心甚則身反張目直不搐心不受熱也當用地

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

黃丸補腎瀉清丸治肝若唇白者不治
肝有風則目連眨風動渠目也熱則筋脉緊不
得轉動故目直也
心主驚實則叫哭發飲熱飲水而搐虛則困卧驚
悸不安
又云熱則睡中口氣溫及上竄咬禾而合面卧
有就冷之意皆心熱也導赤散主之若仰面卧
者乃心氣實氣不得上下流通也瀉心散主之
心病冬見火勝水也當補腎治心輕者病自愈

下竄不治者腎虛怯故也
脾主困實則困睡身熱飲水或不飲水虛則吐
瀉生風脾胃虛塞則面皖白目無精光口鼻氣
冷肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食用益黃散下
利用調中丸傷風手足冷者脾臟怯也先用益
黃散補脾後用大青膏發散脾病見四季皆倣
此順者易治逆者難治脾怯當面赤黃若兼五
臟相勝隨症治之
肺主喘實則悶亂喘促或飲水虛則哽氣短氣

Copy Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

出氣若肺盛復感風寒則胸滿氣急喘嗽用瀉白散肺熱則手掐眉目鼻面用甘桔湯肺虛熱則唇色深紅少用瀉白散肺怯則唇色白用阿膠散若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺病久唇白者此脾肺子母皆虛也若白如猪脂者吉白如枯骨者死如肺病春見肺勝肝也用地黃丸補肝腎瀉白散以治肺目淡青必發搐更有赤者當搐爲肝怯也

腎主虛無實症爲痘瘡實則黑陷更當分別症之虛實假如肺病又見肝症咬牙呵欠者易治肝虛不能勝肺也若目直視大叫哭項急煩悶者難治蓋肺病虛冷旺强實而勝肺也視病新久虛實虛則補其母實則瀉其子腎虛者由胎氣不足則神短囟開目多白睛面色皖白此皆難養縱長不過八八之數又曰腎氣不足則下竄蓋腎虛骨重性欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛目無睛光地黃丸腎病夏見水勝火也輕自愈重發驚搐

Copyright © 2010 Kyoto University
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

潔古五臟相乘爲五邪

肝主風

自病則風搐拘急若心乘肝爲實邪肺乘肝爲賊邪腎乘肝爲虛邪脾乘肝爲微邪自病者爲正邪

凡肝得病必先察渠肺腎腎者肝之母肺者肝之賊今肝之得病非腎水不能相生必是肺金鬼邪來剋故邪來自肺當先治肺攻賊鬼也若來自腎當先補腎滋化源也然後審

Not to be copy
Gest Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

本臟之虛實而寒溫之

心主熱

若肺乘心爲微邪肝乘心爲虛邪脾乘心爲實邪腎乘心爲賊邪

凡心臟得病必先調渠肝腎肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏之此心病先求肝經者清本源也五臟受病必傳所勝腎之邪必傳于心故先治腎遂賊邪也若肝腎脉俱和然後察渠心家之虛實而治之

脾主濕

自病則泄瀉多睡體重昏倦若肝乘脾爲賊邪心乘脾爲虛邪肺乘脾爲實邪腎乘脾爲微邪凡脾之得病必先察渠肝心二臟蓋肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則見邪有餘心氣虧則生氣不足當用平肝氣益心氣若診得脉肝心俱和則脾家自病細察虛實而施治之

肺主燥

自病則喘嗽燥則潤之若心乘肺爲賊邪肝乘肺爲微邪腎乘肺爲實邪脾乘肺爲虛邪凡肺之得病必先觀心脾二臟之虛實若心火爍金當抑心滋肺若脾氣虛冷不能相生而肺氣不足則風邪易感宜補脾肺若脾實而痰熱氣上蒸于肺宜瀉脾氣若心脾平和而肺自病當察虛實治之

腎主寒

自病則足脛寒而逆腎無實瘡疹黑陷乃寔是水制火也若心乘腎爲微邪肺乘腎爲虛邪肝乘腎爲實邪脾乘腎爲賊邪本臟虛弱正令不行鬼賊剋害當補本臟之正氣假令肺病喘嗽見于初春當補腎見于夏救肺見于秋救脾見于冬補心瀉本臟乃名寒嗽大抵五臟各至本位即氣盛不可更補到所剋位不可更瀉然五行之中惟腎水一臟無盛而反受邪何則肺屬金射于皮毛所主者氣腎屬水主于骨髓所藏者精氣之輕浮能上

而不能下精之流重能下而不能上今肺氣得熱而上蒸則不能下生于腎而受邪矣急服京藥解之若脾濕尅腎去脾濕脾肺和平察本臟治之

薛立齋五臟辨證用藥法

肝經實熱而外生風者大青膏散之既服而病不除者此脾氣虧損也異功散芎歸補之若肝經虛熱或因尅伐而內生風者異功散地黃丸補之若風邪入臟能食飲冷大便秘結者此邪氣內實也大黃丸下之既下而食少飲湯或腹脹者脾氣內虛也白术散補之氣血素弱或因病後或服尅伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠目淡青者乃肝經虛甚也急用地黃丸以補肝腎

若哽氣短氣長出氣乃肺虛甚也急用異功散以補脾肺若申酉時叫哭直視呵欠頓悶項急驚悸手足搐動發熱飲水者此風火相搏而勝肺金也柴胡梔子散以治肝火生肝血用異功散補脾土生肺金若唇白者爲脾絕死不治大抵嬰孩之症多因姙娠厚味七情或兒乳哺失宜或乳母飲食醬怒所致病氣既見形氣已虛當推素所而治之藥內加漏蘆木通與乳母服兒飲渠乳兒自飲藥二三匙可也後倣此

心病仰面臥者皆因心胸實熱故喜仰面而向虛也合面臥者因心胸虛熱而喜合臥以就實也實則調治心肝虛則調補脾肺二者別之盡厥狀矣若咬牙等症多有雷同不必拘泥如用瀉心導赤等劑邪氣雖去而病仍作當調補元氣或反甚急溫補元氣倘心病冬見如亥子時病益甚或不氣不語者乃腎水虛而心火甚也用地黃丸在乳下嬰兒必須乳母代服之

脾病實者痞氣實而形氣虛也若面色㿠白吐

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瀉腹痛口鼻氣冷屬寒水侮土宜益黃散若面青唇黯吐瀉手足並冷此脾土虛寒用乾薑理中湯若面色痿黃手足不冷此脾土虛弱用人參理中湯若傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹此脾肺氣虛用五味異功散以實脾氣加防風升麻散外邪若發于寅卯之時用六君子加柴胡升麻補脾土平肝木然面色黃者脾之本色也面赤者火生土爲順面青者木剋土爲逆當平調所勝以補元氣爲主

肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外邪所乘用參蘇飲心火炎爍用人參平肺散中焦實痞用大承氣湯脾不能生肺用異功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也若脉右寸必浮而有力宜瀉白散以瀉之蓋肺虛而有熱者熱肺熱傷肺之說不用人參悞矣仍參某症治之腎病下竄等症足不喜覆者蓋腰以下皆腎所主乃心氣不行于腎部也法用地黃丸壯腎水以制心火若因脾肺虛而不能生腎水者補中

益氣湯六味地黃丸以滋化源或瘡疹黑陷及
腎虛而邪氣實也當用地黃丸



驚積冷熱

○肝受驚則髮際色淺青渾身發熱生風目斜
視

肝受積食倉色黃早晚發熱或腹痛即是積
肝受冷面色青白口吐清水日睡夜煩
肝受熱眉眼紅赤而生風有痰則重
心受驚印堂赤則生風小水短赤舌于口外
心受積額角兩眼白赤吐瀉小便如米泔水

Eastasian Library DO NOT COPY
Princeton University Library

心受冷面淡白微帶赤吐清水不煩渴

心受熱面赤身熱煩渴小水不利即生驚風

脾受驚則面黃食傷身熱肚脹不食能生風

脾受積目胞腫蕩身熱不食肚熱脚冷唇黃

脾受冷面慘白身溫足冷肚腹泄瀉生虛風

脾受熱口乾燥啼叫嘔吐不食生驚風

肺受驚髮際赤口渴胸脹壅喘咳生風痰

肺受積胸中脹肚腹滿促壅多痰

肺受冷人中白色身溫足冷虛痰上攻則重

肺受熱頤頰紅鼻中出血口渴痰壅生風

腎受驚耳前色黑咬牙搐掣汗出則重

腎受積眼胞深沉耳聾頭生瘡

腎受冷額上微青目欠兩眼涎爛

腎受熱食倉色赤小水短赤多生驚悸

畏愛

肺本辛金　畏丁火　愛巳土

腎本癸水　畏巳土　愛辛金

肝本乙木　畏辛金　愛癸水
心本丁火　畏癸水　愛乙木
脾本己土　畏乙木　愛丁火

子母生成

肺　脾是母腎是子　腎　肺是母肝是子
肝　腎是母心是子　心　肝是母脾是子
脾　心是母肺是子

虛則補其母實則瀉其子虛者謂正氣虛實者謂邪氣實也

五臟好食

好食酸　曲直作酸肝木病
好食苦　炎上作苦心火病
好食甜　稼穡作甘脾土病
好食辛　從革作辛肺金病
好食鹹　潤下作鹹腎水病
好食炭　屬肝病　好食泥　屬脾病

Digitized by Google
Original from
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

好食茶　屬心病　好食布　屬肺病

好食塩　屬腎病

治吃生米方

蒼朮爲末蒸餅丸米湯下三十丸

生死證訣　舌附

面青赤主壯熱驚搐煩躁啼哭小水短赤

紅黑主口渴不寧身熱驚風目閉傷風鼻涕

黃目腫主疳積不消上身熱下身冷如冰

青唇白主吐乳胃冷不化食

淡白主失血及惡心吐瀉

青黑主腹痛着寒有積生虫則面有點

青白黃慘淡四肢冷身溫額汗顖陷閉目爲

陰寒

青色從眉入目連眉入耳者死

青色斜目下入口達鼻者死

青黑色鼻上唇烏虫咬腹痛而死

青黑白色在鼻上入耳目口中者死

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

舌上白胎表症也發熱惡寒無汗者發散之
舌上黃胎半表半裏也當用小柴胡湯和解
之

方 小柴胡湯

若乾渴者用黃芩湯以清之
舌上黑胎裏症也若乾燥者承氣湯下之
舌裂舌上芒刺皆主熱極宜 黃連清心飲
舌尖出血主熱極陽毒 黃連解毒湯
舌上生瘡心脾蘊熱小水不利清心蓮子飲
舌出弄舌者心熱 黃連瀉心湯
舌卷舌陷舌腫主驚不能救
舌黑者死
舌不收者死
舌縮者不治

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

五臟氣絕

心絕

顖腫顖陷汗出不流汗出如珠如油舌出舌腫發驚面黑暗髮直如麻皮膚無血色失血並皆心絕壬癸日死

肝絕

啼哭無淚爪甲暗黑眼深如縮陷舌卷囊縮發搐目斜視連唇口動手如抱頭脚直爪枯並皆肝絕庚辛日死

脾絕

人中滿或黑唇縮反張唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒舌腫尿血舌縮齒噤冷涎如油唾沫撮口面如土色四肢冷不乳瀉赤脾絕甲乙日死

肺絕

鼻煽口張湯藥嗆喉喉中聲鳴是胃脘直本不蔭肺氣喘不回痰涎塞口肺脹胸向頭汗肢冷皆肺

Eastern Asian Library Do Not Copy
Princeton University Library

絕丙丁日死

腎絕

面黑神昏目睛無光耳輪青黑牙齒焦枯驚風咬奶環口黑色遺尿足冷皆腎絕戊己日死

又魚目定睛肝絕

目無睛光黑睛不轉如魚猫之眼肝開竅於目瞳人屬腎子母俱絕近死申酉遠死庚辛日

又面青唇黑脾絕

唇爲肌肉之本面青木來剋土也唇黑水侮土也近死寅卯時遠死甲乙日木剋土也

辨症捷訣

一凡見小兒頭疼發熱鼻塞聲重咳嗽手背熱惡風寒皆屬外感無汗脈浮緊傷寒自汗脈浮緩傷風暑月吐瀉作渴齒燥脈虛傷暑浮腫洩瀉身重小便不利脈濡細傷濕舌乾口

Digitized by Google
Original from Harvard University
Digitized by Google

燥唇焦面赤或聲啞脉数傷熱

一凡見噯氣飽悶作酸腹脹不思食及惡聞食氣下洩臭屁惡心乍吐乍瀉或寒熱或腹中硬塊作痛手心熱脉弦滑俱屬內傷飲食

已上二症最多

一凡見發熱無汗表實大便閉裏實心胸飽悶腹中膨脹惡心噯氣吐出酸水手足有力腹痛手不可按脉洪實有力者俱屬實症

一凡見面恍白無神懶言氣短不思食腹脹不痛嗜卧二便如常眼唇閉手足無力慢驚久吐胃虛久瀉脫肛脾虛自汗表虛自痢裏虛脉來微細無力及有遲髮遲齒遲解顱鶴節俱屬腎氣未成元精不足

已上俱屬虛症

一凡見發熱手足心熱面紅唇乾舌乾口渴口上生瘡口中熱臭大便秘小便赤黃或痢下黃赤肛門焦痛喜飲冷水喜就凉處腹中熱痛脉來洪数俱屬熱症

East Asian Library Collection
Princeton University Library

原書如此

一凡見面白唇青手足冷四肢冷氣或泄瘕清白無熱不渴腹痛悠悠無增減或惡心嘔吐喜就煖處脉來沉遲無力俱屬寒症

已上諸症每症不必悉具凡見一二便作主治之若兼見者須照本條斟酌盡善自能中病也

方

瀉心散

黃連爲末每服五分臨卧温湯化下

柴胡疎肝散

陳皮　柴胡各二錢　川芎　枳殼

芍藥　香附各錢半　炙甘草五分

水一鍾半煎八分食前服

瀉白散

地骨皮　桑白皮蜜炒各一兩　甘草三錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

原書如此

爲末每服一二錢入粳米一百粒水煎服

人參平肺散　欬嗽喘嘔痰涎痞滿咽喉不利

人參　天冬　黃芩　地骨皮

陳皮　青皮　茯苓各八分　桑白皮炒

知母各一錢　五味子二十粒　甘草五分

薑三煎八分食遠服

柴胡清肝散

柴胡　黃芩炒　山梔　川芎

人參各一錢　甘草五分　連翹　桔梗各八分

燈心水煎服

瀉黃散

藿香　甘草各七錢　山梔一兩

石膏五錢　防風一二兩

蜜酒微炒爲末每服一二錢水煎去渣服

局方犀角地黃湯

生地四錢　芍藥　丹皮　犀角各一錢半鎊

右㕮咀水煎服　取汗退熱用角尖磨冲

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

拔萃犀角地黃湯

犀角磨汁　生地二錢　黃連　黃芩各一錢

水煎和汁溫服

黃芩清肺飲

梔子二錢　黃芩一錢

水煎服不利加鹽豉二十粒

滋腎丸

黃栢二兩酒拌陰乾　知母仝　肉桂二錢

爲細末熟水丸滾湯下

補中益氣湯

人參　黃芪炒　白朮炒　陳皮各錢半

柴胡　升麻各三分　甘草　當歸各一錢

薑棗水煎服

大安丸

即保和丸加白朮二兩方在泄瀉

四君子湯

人參　白朮　茯苓各二錢　炙甘草一錢

薑棗水煎或加粳米百粒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

麥門冬散

麥冬　生地一錢　白芍　蒲黃二錢

薑三片水煎

人參安胃散

人參　黃芪　白芍　茯苓

陳皮　黃連　甘草半生半熟

爲末用二錢水煎

調中丸

人參　白朮各五錢炒　乾薑炮　甘草炙各四錢

蜜丸菉豆大滾湯下即人參理中丸也若腎水侮土而虛寒者加半夏茯苓陳皮或嘔吐加藿香泄瀉加木香

柴胡飲子

柴胡　防風　當歸　人參

白芍　甘草　黃芩　滑石

大黃等分

加薑一片水煎

龍胆瀉肝湯

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胆草酒拌炒　人參　天冬　麥冬

甘草　黃連　山梔　知母各五分

黃芩　柴胡一錢　五味子三分

水煎服

直指蕪荑散

檳榔　蕪荑各三錢　木香一錢

末服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引虫頭向上以湯調藥溫服虫自軟困而下

卯青丸

羌活　川芎　當歸　防風

龍膽草

等分爲末蜜丸芡實大服一二丸砂糖化下

瀉青丸

前方加大黃　梔子仁　服一丸

七味白朮散

白朮　茯苓　人參　木香

藿香　乾葛　甘草

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

水煎二錢服

生地黃湯

生地五錢　地榆七錢　炙甘草二錢

水煎空心日晚服

大青膏

天麻　青黛五錢　白附子　烏蛇酒浸去肉焙

蝎尾各五分　淨焙　天竺黃　麝香

爲末蜜丸豆大薄荷湯下一丸

大黃丸

黑牽牛半生半熟　川芎各五錢　甘草二錢

大黃飯上蒸　酒洗

爲末糊丸麻子大每服數丸溫蜜水服以瀉

利爲度

導赤散

生地　木通　甘草

入竹葉二十片水煎服或爲末調服

一方加人參麥冬

甘桔湯

甘草二　桔梗四

荊芥湯

前方加荊芥三　治咽喉風熱腫痛

參蘇湯

人參　紫蘇　陳皮　桔梗

前胡　半夏　枳殼　葛根

茯苓　甘草　木香

加薑水煎

人參養榮湯

人參　黃芪　當歸　焦白朮

陳皮　桂心各一錢　茯苓　熟地

五味各七分　甘草炙五分　白芍錢半　遠志五分

薑棗煎服八分

宣明柴胡飲

柴胡　人參各五分　黃芩　芍藥各十分

當歸一錢　甘草四分　大黃八分

水煎服　按此方頗善大便如常禁用大黃

清心蓮子飲

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黄芩　麥冬　地骨皮　車前子

甘草各半錢　人參　黄芪　石莲

柴胡　茯苓各一錢

每服五錢水煎服

黄連解毒湯

黄連　黄芩　黄柏　梔子各等分

水煎服

黄連瀉心湯

大黄二兩　黄連一兩

微沸二味須臾絞去滓温服

黄芩湯

黄芩一兩半　芍藥　甘草炒各一兩

生薑煎服　如嘔加半夏二錢

柳丹散

柴胡　甘草各五分　川芎八分　白术炒

茯苓　鈎藤　當歸各一錢

水煎子母同服

煉蜜丸亦名柳青丸

Do Not Copy East Asian Library Princeton University Library

生犀散

地骨皮　乾葛　柴胡　赤芍藥各一兩　甘草五錢　犀角一錢

爲末每服一二錢

温驚丸一名粉紅丸

胆星二兩　天竺黄五錢　朱砂一錢五分

水片三分　坯子胭脂一錢紫胭脂另研

括蔞湯

括蔞根二錢　白甘草一錢

爲末漫火同炒黄研匀每服一字薄荷湯下

白粉散　治鼻疳諸瘡

海螵蛸三錢　白芨二錢　輕粉一錢

爲末水洗疳瘡乾摻

香瓜圓　治遍身汗出

胡黄連　大黄　柴胡　鱉甲

青皮　川黄柏　川連　蘆荟

右爲末　大黄瓜一條一頭割去塡入藥滿

復盖好揷扎定慢火煨熟祠搗糊丸菉豆大

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

服十丸

三聖圓

化痰寬胸消癖定驚除食癇合下三種名三聖

小青丸

牽牛末四錢　青黛二錢　鳳粉一錢

糊丸米大

小紅丸

方在急驚內

小黃丸

半夏三錢　黃柏二錢　色豆霜一字

薑汁糊丸米大

軟金丸　治驚熱痰盛壅嗽腸實

天竺黃三錢　輕粉一錢　半夏五錢

青黛一錢　黑牽牛七錢

煉蜜丸薄荷湯下

五福化毒丹

生地　熟地各五兩　青黛一兩　元參

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

甘草　甜硝各三兩　天冬　麥冬各四兩

煉蜜丸芡實大

地骨皮散

地骨　知母　柴胡　茯苓

半夏　人參　甘草

每服二錢薑煎服

甘露飲　治心胃積熱口舌生瘡咽痛口渴

生地　熟地　天冬　麥冬

只壳　黃芩　石斛　茵陳

枇杷葉　甘草

燈心爲引水煎服

靈礬散

五靈脂二錢　枯礬五分

每用一二錢水煎去滓溫服　治小兒虫咬心痛欲絕服之當吐虫出而愈

鷄頭丸　治諸病後不能言

雄鷄頭一枚炙　鳴蟬三個炙　大黃煨　甘草一兩

人參　木通各五錢　川芎　當歸

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黄芪　遠志　麥冬各七錢半

蜜丸豆大米飲下十丸

紫雪

黄金　寒水石　磁石　滑石

石羔各打碎四兩八錢

水五升煮至三升去黄金及藥滓入下藥

玄參二兩　羚羊角　木香　犀角

沉香各五錢　丁香一錢　升麻　甘草各三錢

同前汁煮取一升五合濾去滓入硝石二兩

朴硝一斤入前汁內微火煎柰條攪不住手

候有七合投入本盆中半日欲凝入

朱砂三錢　麝香三分　攪勻凝成雪霜紫色每

用一字令水調下喉風急病捻少許乾嚥立

效內外煩熱瘟疫狂妄五尸五疰口舌生瘡

並效

和中保安丸

香附四兩　青皮　白朮　神麯

麥芽　槟榔　甘草　厚朴各二兩

廣皮　山查各二兩　蒼朮　三稜
黃連　蘿蔔子各一兩　砂仁　五錢
爲末蒸餅丸菉豆大嘔吐薑湯下泄瀉米湯
下

木瓜丸
木瓜　木香　檳榔　膩粉
麝香
麴糊丸米大甘草湯下二丸
下露散

石膏　寒水石　甘草
温湯調服一字

木香丸
木香　檳榔　青黛　肉豆蔻
續隨子去油各一錢半　麝香少許
煉蜜丸菉豆大每服一二十丸薄荷湯下

小七香丸
香附　砂仁　陳皮　益智仁
蓬朮　丁香皮　甘松

薑糊丸

香稜丸

木香　三稜　青皮各五錢　川楝

皿香　蓬朮各一兩　枳殼半兩　丁香一錢

爲末醋糊丸

五色丸

黃芩　黃連　大黃加倍

水丸用青黛爲衣名青丸

朱砂爲衣名赤丸

雄黃爲衣名黃丸

皂角灰爲衣名黑丸

滑石末爲衣名白丸

固腸丸

樗根白皮醋炒爲末糊丸米湯下三十丸參

湯更妙

四順清凉飲

歸身　大黃　赤芍　甘草

水煎服

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

至寶錠子　驚疳吐瀉積滯皆效

廣皮　三稜　莪朮　厚朴

麥芽　蒼朮　菜服子　香附

枳實　草荳蔻各一兩　山查兩半　神麯二兩

爲末神麯糊爲丸每錠重五分薑湯磨服

集聖丸

蘆薈　五靈脂　夜明沙　砂仁

橘紅　木香　莪朮　史君子

川芎　黃連各二錢　青皮　當歸錢半

乾蟾三錢

猪胆汁糊丸米飲下

逍遙散

當歸　芍藥　白朮　茯神

甘草　柴胡等分

薑水煎服

加味逍遙散

前方加牡丹皮　梔子各七分

蕪荑散　治蚘咬心腹痛主劑

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蕪荑　雷丸各半兩　乾漆搥碎炒令烟盡一兩

爲末一二錢嬰兒五分調和溫服

秘旨補脾湯

治久病面黃肌瘦咬牙目劄頭髮稀少

人參　白朮各一錢　白芍　茯苓各八分

川芎　陳皮各六分　黃芪蜜炙

粉甘草炙五分　當歸各四分

薑水煎二三錢

香橘餅　治傷冷積瀉

木香　青皮各一錢　陳皮二錢　厚朴

神麯　麥芽炒各半兩

爲末蜜和成餅米飲下一枚

鈎藤飲子

鈎藤　防風　獨活　天竺黃

羌活各三錢　麻黃　升麻　甘草

龍胆草各二錢　川芎三錢　蟬退五個

薑棗煎服　立齋曰右方治一切驚風潮搐

目視昏迷外感形症俱實宜用之若形氣虛

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

病氣實者當用惺惺散加鈎藤麻黃若外邪少而形病俱虛者宜異功散

九還金液丹　此方有斡旋造化之功

胆星九制二兩　朱砂飛五錢　生半夏　殭蚕各一錢

牙皂去皮絃炒焦三錢　水片　麝少許

小麥麪炒熟煉蜜和勻豆大金薄爲衣黃蠟殼收藏　薄荷湯化下一丸

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library Digital Copy
Princeton University Library and the Gest Collection